

Estadísticas Ambientales

Noviembre 2011

Desde el mes de junio de 2004, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) elabora mensualmente el **Informe Técnico de Estadísticas Ambientales**, con la finalidad de proporcionar a la opinión pública indicadores, diagnósticos y señales de alerta que permitan evaluar el comportamiento de los agentes económicos en su interacción con el medio ambiente para el seguimiento de las políticas en materia ambiental.

El presente informe correspondiente a la situación ambiental del mes de noviembre de 2011, muestra indicadores sobre la calidad del aire en cuatro núcleos principales de Lima Metropolitana como la concentración de polvos atmosféricos sedimentable, concentración de contaminantes

gaseosos, radiación solar y vigilancia de la atmósfera global. Así como la calidad del agua del río Rímac, la producción de agua, el caudal de los ríos, emergencias y daños producidos por fenómenos naturales y antrópicos y los fenómenos meteorológicos como las heladas en el territorio nacional.

La información disponible tiene como fuente los registros administrativos de las siguientes Instituciones: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS). Progresivamente, se irá incorporando a otros organismos gubernamentales en la medida de la disponibilidad de datos.

Resumen Ejecutivo

I. Calidad del aire en Lima Metropolitana

1.1 Concentración de polvo atmosférico sedimentable (PAS)

De acuerdo a información proporcionada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), en el mes de noviembre del 2011, los distritos que conforman Lima Centro Este (El Agustino, Cercado y Lurigancho) y Lima Norte (Independencia) presentaron los mayores niveles de contaminación por polvo atmosférico sedimentable

(PAS), alcanzando 23,3 y 23,0 t/km²/mes, respectivamente; lo que equivale más de cuatro veces a lo recomendado por la OMS (5 t/km²/mes). Sin embargo, comparado con lo registrado en similar mes del año 2010 disminuyó en 11,4% y 5,7%, respectivamente.

Lima Metropolitana: Concentración de polvo atmosférico sedimentable (PAS), noviembre 2010 - noviembre 2011 (T/km²/mes)

Núcleos principales	Noviembre		Variación %
	2010	2011	2011/2010
Lima Centro Este (El Agustino, Cercado y Lurigancho)	26,3	23,3	-11,4
Lima Norte (Independencia)	24,4	23,0	-5,7
Lima Sur-Este (Pachacámac)	19,0	22,2	16,8
Lima Sur (Villa María del Triunfo)	24,0	21,6	-10,0
Promedio mensual (T/km²/mes)	14,4	13,6	-5,6

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)
Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.

Jefe del INEI
Dr. Alejandro Vilchez
De los Ríos

Subjefe de Estadística
Mg. Aníbal Sánchez

Directora Técnica
Rofilia Ramírez

Director Adjunto
Arturo Arias

Directora Ejecutiva
Cirila Gutiérrez

Investigadora
Eliana Quispe

Revisión
Doris Mendoza

**Para mayor información ver
Página Web:**

www.inei.gob.pe

1.2 Presencia de material particulado (PM₁₀)

En el mes de noviembre del 2011, el máximo valor obtenido de PM₁₀ fue en el distrito de Ate, cuyo valor fue de 104,4 ug/m³.

Comparado con lo obtenido el mes anterior (octubre 2011) disminuyó en 1,5%.

Lima Metropolitana: Valor mensual de PM10, 2011
(ug/m3)


Núcleos principales	2011				% Respecto al mes anterior
	Ago	Sep	Oct	Nov	
2011					
Ate	105,5	136,7	106,0	104,4	-1,5
San Borja	50,3	51,6	46,1	45,4	-1,5
Jesús María (Campo de Marte)	42,7	43,8	41,8	41,9	0,2

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)
Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.

1.3 Radiación solar Índice UV-B

El índice promedio del nivel de radiación ultravioleta (UV-B) para Lima Metropolitana en el mes de noviembre del 2011 llegó a 12 de intensidad, es decir, un nivel de riesgo muy alto

para la salud. Comparado con lo registrado en octubre del mismo año no mostró variación alguna.



II. Calidad del agua

2.1 Concentración de minerales en el río Rímac

De acuerdo a información monitoreada por SEDAPAL, en el mes de octubre del 2011 comparado con similar mes del año 2010, la presencia de minerales en el río Rímac se incrementó.

La presencia de hierro aumentó en 117,1%, el aluminio en 103,8%, el cadmio en 25,0% y el plomo en 14,3%.

Lima Metropolitana: Concentración promedio de minerales en el río Rímac, octubre 2010 - octubre 2011
Miligramos por litro

Año/Mes	Minerales			
	Hierro	Plomo	Cadmio	Aluminio
2010				
Octubre	0,3500	0,0140	0,0012	0,3660
2011				
Octubre	0,7600	0,0160	0,0015	0,7460
Variación porcentual				
Respecto a similar mes del año anterior	117,1	14,3	25,0	103,8

Bocatoma de la Atarjea.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

2.2 Calidad del agua en planta de tratamiento

En octubre de 2011, la concentración de contaminantes minerales: hierro y aluminio en las plantas de tratamiento de

SEDAPAL disminuyeron en 19,1% y 0,7%, respectivamente, mientras que se incrementó en 42,9% la presencia de cadmio.

Lima Metropolitana: Concentración promedio de minerales en las plantas de tratamiento de SEDAPAL, octubre 2010 - octubre 2011
Miligramos por litro

Año/Mes	Minerales			
	Hierro	Plomo	Cadmio	Aluminio
2010				
Octubre	0,0470	0,0050	0,0007	0,0670
2011				
Octubre	0,0375	0,0050	0,0010	0,0665
Variación porcentual				
Respecto a similar mes del año anterior	-19,1	0,0	42,9	-0,7

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

III. Producción de agua

3.1 Producción de agua potable a nivel nacional

La producción nacional de agua potable en el mes de setiembre del 2011, alcanzó los 92 millones 720 mil 900 metros cúbicos, lo cual representa un incremento de 0,5% (464 mil 700 metros


cúbicos) respecto al volumen alcanzado en similar mes del 2010. Sin embargo, comparado con el nivel obtenido en el mes de agosto del mismo año disminuyó en 0,8%.



3.2 Producción de agua potable en Lima Metropolitana

La producción de agua potable en Lima Metropolitana en octubre de 2011, alcanzó 55 millones 995 mil 900 metros cúbicos lo cual representa una disminución de 0,2% en relación

al volumen registrado en el mismo mes del 2010. En tanto que, el volumen de producción con respecto al mes anterior (setiembre 2011) creció en 4,2%.



3.2 Caudal de los ríos Rímac y Chillón

En el mes de octubre del 2011, el caudal promedio del río Rímac alcanzó a 23,8 (m³/s), cifra menor en 1,2%, respecto a octubre de 2010 y en comparación con el promedio histórico no mostró variación alguna.

En el caso del río Chillón, alcanzó a 2,7 (m³/s), lo cual representa un incremento de 12,5% respecto a lo observado en octubre de 2010, mientras que comparado con el promedio histórico (3,0 m³/s) disminuyó en 10,0%.

Caudal promedio de los ríos Rímac y Chillón
Mes: Octubre 2009-2011
(m³/s)

Ríos	Promedio histórico	Media 2009	Media 2010	Media 2011 P/	Var.Porc. 2011/2010	Var.Porc. Con promedio histórico
Río Rímac	23,8	20,8	24,1	23,8	-1,2	0
Río Chillón	3,0	3,6	2,4	2,7	12,5	-10

P/ Preliminar.

Fuente: SENAMHI Estación Hidrológica de Chosica R2 y Estación Hidrológica de Obrajillo

3.3 Caudal de los ríos según vertiente

El caudal promedio de los principales ríos que conforman la Vertiente del Pacífico de la zona Norte, en octubre de 2011 alcanzó 19,63 m³/s, lo cual representa un incremento de 21,5% respecto a lo registrado en octubre de 2010 y una disminución de 6,1% respecto al promedio histórico (20,9 m³/s).

variación alguna respecto a lo reportado en octubre de 2010, no obstante disminuyó en 1,2%, respecto al promedio histórico (13,41 m³/s).

Por su parte, el caudal promedio de la vertiente del Pacífico de la Zona Centro, alcanzó 13,25 m³/s cifra que no tuvo

Los ríos de la Zona Sur en octubre de 2011 registraron 17,70 m³/s, cifra menor en 25,0% respecto a octubre de 2010, mientras que se incrementó en 185,5% comparado a su promedio histórico (6,20 m³/s).

Perú: Promedio del caudal de los ríos de la vertiente del Océano Pacífico
Mes de octubre: 2010-2011
(m³/s)

Zonas	Octubre 2010	Octubre 2011	Var.Porc.
Zona Norte	16,15	19,63	21,5
Zona Centro	13,25	13,25	0,0
Zona Sur	23,60	17,70	-25,0

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)

Estadísticas Ambientales

Noviembre 2011

Resultados

1. Calidad del aire en Lima Metropolitana¹

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú-SENAMHI, mediante la Dirección de Proyectos de Desarrollo y Medio Ambiente, realiza la evaluación de las condiciones sinópticas y meteorológicas locales que influyen en el

comportamiento temporal y espacial de los contaminantes atmosféricos particulados y gaseosos medidos, usando métodos de muestreo pasivo y monitoreo automático en la cuenca atmosférica de Lima-Callao.

1.1 Concentración de Polvo Atmosférico Sedimentable (PAS)

Según información proporcionada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI, durante el mes de noviembre del año 2011, la concentración promedio de Polvo Atmosférico Sedimentable - PAS ($\Phi < 100$ micrometros) llegó a un promedio de 13,6 t/km²/mes, siendo inferior en 5,6% en relación al mismo mes del año anterior, mientras que aumentó en 4,6% a lo registrado el mes anterior que fue 13,0 t/km²/mes.

Sin embargo, comparado con la guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que considera como tolerable 5 t/km²/mes, el nivel de PAS registrado en el mes de noviembre fue 2,72 veces el standard de la OMS.

La zona crítica de más alta concentración de Polvo Atmosférico Sedimentable se produjo en Lurigancho (Lima Este), cifra que alcanzó 35,0 t/km²/mes, siendo superior en 7,0 veces a lo recomendado por la OMS. Mientras que la zona de menor concentración de Polvo Atmosférico Sedimentable se dio en Jesús María al obtenerse un promedio de 2,5 t/km²/mes, inferior al valor guía de la OMS que es de 5 t/km²/mes.

Según núcleos principales en el mes de noviembre de 2011, el punto crítico de contaminación por polvo atmosférico se

registró en el núcleo Lima Centro Este, integrado por los distritos de El Agustino, Cercado y Lurigancho que llegó a 23,3 t/km²/mes. No obstante, fue 4,66 veces a lo recomendado por la OMS.

En el distrito de Independencia en la zona de Lima Norte, éste contaminante alcanzó 23,0 t/km²/mes que representó una disminución de 5,7% respecto al mismo mes del año anterior (octubre 2010). Igualmente, decreció en 7,3% en relación al mes anterior. Pero, fue 4,6 veces el valor guía establecido por la OMS.

En Lima Sur Este en el distrito de Pachacámac este valor alcanzó 22,2 t/km²/mes cifra que comparada con el mes de noviembre de 2010 creció en 16,8%, asimismo, creció en 30,6% respecto al mes anterior (octubre 2011). Pero comparado con la norma de la Organización Mundial de la Salud (5 t/km²/mes) fue aproximadamente 4,5 veces este valor.

En el mes de estudio en la zona de Lima Sur en el distrito de Villa María del Triunfo la contaminación por polvo atmosférico alcanzó 21,6 t/km²/mes cifra que representó una disminución de 10,0% respecto a similar mes del año anterior. Mientras que, aumentó en 30,9% al compararlo en relación al mes anterior, no obstante, que este valor fue 4,32 veces el valor guía de la OMS.


^{1/} Nota aclaratoria: Las series estadísticas de los cuadros y gráficos N° 1, 2, 3 y 4 que corresponden a la calidad del aire en el Centro de Lima, reportado por la Dirección General de Salud Ambiental-DIGESA- Ministerio de Salud, fue reemplazado a partir de Julio de 2011 por información del cuadro y gráfico N° 1 correspondiente a Concentración de Polvo Atmosférico Sedimentable (PAS) y por los cuadros y gráficos del 2 al 4 referente a la concentración de Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno y PM₁₀ en las estaciones de Ate, San Borja, Campo de Marte y Santa Anita, proporcionado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú-SENAMHI. Este cambio de fuente de información, se debe a la discontinuidad de datos que proporcionaba DIGESA-MINSA.

Cuadro N° 1
Lima Metropolitana: Concentración de polvo atmosférico sedimentable (PAS),
según núcleos principales (puntuales y promedios), 2010-2011
 (T/km²/mes)

Año/Mes	Núcleos principales				Promedio T/km ² /mes	Guía OMS	Máximo		Mínimo	
	Lima Norte (Independencia)	Lima Centro Este (El Agustino, Cercado y Lurigancho)	Lima Sur- Este (Pachacámac)	Lima Sur (Villa María del Triunfo)			Valor T/km ² /mes	Distrito	Valor T/km ² /mes	Distrito
2010										
Enero	30,4	23,0	14,9	22,8	13,2	5,0	36,7	Lurigancho	3,6	Magdalena
Febrero	26,1	19,6	17,7	24,5	13,7	5,0	29,4	Comas	3,9	Jesús María
Marzo	24,1	21,0	19,8	21,1	14,2	5,0	29,4	Lurigancho	2,0	Jesús María
Abril	27,7	24,0	18,7	20,8	13,7	5,0	32,0	El Agustino	1,5	Jesús María
Mayo	23,4	24,8	16,2	27,0	13,5	5,0	37,6	Lurigancho	4,9	Magdalena
Junio	21,6	22,9	13,5	20,0	11,8	5,0	37,1	Lurigancho	3,5	Villa El Salvador
Julio	20,3	22,0	8,4	18,2	11,2	5,0	37,0	Lurigancho	3,2	Pueblo Libre
Agosto	19,5	23,0	11,5	21,2	11,6	5,0	36,9	Lurigancho	3,0	Pueblo Libre
Setiembre	21,8	24,0	13,5	18,0	12,3	5,0	40,7	Lurigancho	2,8	Pueblo Libre
Octubre	22,9	25,9	14,3	19,8	13,3	5,0	40,2	Lurigancho	3,6	Pueblo Libre
Noviembre	24,4	26,3	19,0	24,0	14,4	5,0	48,0	Lurigancho	4,2	Chorrillos
Diciembre
2011										
Enero	30,4	24,8	16,2	20,2	13,8	5,0	42,3	Lurigancho y Lurigancho y	4,0	Jesús María
Febrero	29,4	29,0	17,7	21,7	16,0	5,0	44,0	J. María	4,0	Magdalena
Marzo	24,6	31,6	18,4	18,4	15,8	5,0	49,0	Lurigancho	4,1	Bellavista
Abril	24,2	39,8	24,3	10,9	14,6	5,0	79,8	Lurigancho	4,0	Magdalena
Mayo	22,9	35,6	20,1	20,6	14,0	5,0	66,2	Lurigancho	4,2	Magdalena
Junio	24,4	29,9	10,8	15,5	13,8	5,0	58,1	Lurigancho	5,6	Callao
Julio	12,3	22,6	4,7	13,9	9,8	5,0	54,4	Lurigancho	0,8	Callao
Agosto	18,3	28,7	13,0	17,0	12,8	5,0	57,1	Lurigancho	3,3	Villa El Salvador
Setiembre	21,6	33,8	13,2	18,2	13,6	5,0	69,2	Lurigancho	2,9	Ancón
Octubre	24,8	30,0	17,0	16,5	13,0	5,0	53,4	Lurigancho	1,9	Villa El Salvador
Noviembre	23,0	23,3	22,2	21,6	13,6	5,0	35,0	Lurigancho	2,5	Jesús María
Variación porcentual										
Respecto al mes anterior	-7,3	-22,3	30,6	30,9	4,6		-34,5		31,6	
Respecto a similar mes del año anterior	-5,7	-11,4	16,8	-10,0	-5,6		-27,1		-40,5	

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) - Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.

Gráfico N° 1
Lima Metropolitana: Concentración de polvo atmosférico sedimentable (PAS),
(puntuales y promedios), 2010-2011
 (T/km²/mes)



Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) - Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.

1.2 Concentraciones de Contaminantes Gaseosos

El SENAMHI monitorea las concentraciones de contaminantes gaseosos del aire en cuatro estaciones ubicadas en los distritos

de: Ate, San Borja (Limatambo); Jesús María (Campo de Marte) y Santa Anita.

1.2.2 Dióxido de azufre

El dióxido de azufre (SO₂) es un gas pesado, incoloro e inodoro en concentraciones bajas y de color ocre en concentraciones altas. Se produce principalmente por la quema de combustibles fósiles. Es perjudicial para los seres humanos y la vegetación, contribuye a la acidez de las precipitaciones. Los efectos nocivos en la salud de las personas están relacionados con alteraciones respiratorias y en los pulmones pudiendo causar bronquitis y procesos asmáticos.

En el mes de noviembre de 2011, en el distrito de Ate el valor mensual de dióxido de azufre reportado por el SENAMHI fue de 4,5 ppb que comparado con el mes anterior (octubre 2011) significó un incremento de 28,6%. Con relación al comportamiento de la concentración promedio diaria la máxima concentración fue de 8,1 ppb registrado el domingo 27, representando el 26,5% del ECA diario para SO₂ (80 µg/m³ = 30,6 ppb);

En la estación de Limatambo en el distrito de **San Borja** este contaminante registró 2,6 ppb incrementándose en 4,0% respecto a lo obtenido en el mes de octubre. El máximo valor obtenido durante el mes de estudio se registró el domingo 20 y fue 3,9 ppb siendo el 12,7% del ECA.

En la estación de Campo de Marte en el distrito de **Jesús María** en Lima Centro se midió 2,4 ppb, incrementándose en 20,0% al compararlo con el valor del mes anterior. No obstante el máximo valor diario se detectó el viernes 21 que alcanzó 4,1 ppb lo que equivale al 13,3% del valor del ECA. (30,6 ppb).

Para el distrito de **Santa Anita** el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), en el mes de noviembre del año en curso, no reportó el valor mensual.


Cuadro N° 2
Lima Metropolitana: Valor mensual de Dióxido de Azufre, 2011
(ppb)

Año/Mes	Ate	San Borja	Jesús María (Campo de Marte)	Santa Anita
2011				
Enero	13,5	1,6	1,2	...
Febrero	...	2,3
Marzo	7,7	4,1	2,4	...
Abril	5,4	2,1	0,9	...
Mayo	3,6	1,6	1,5	...
Junio	3,5	1,7	2,8	2,6
Julio	3,0	2,0	1,4	5,6
Agosto	2,7	2,5	1,6	9,2
Setiembre	3,1	2,0	1,4	2,8
Octubre	3,5	2,5	2,0	14,4
Noviembre	4,5	2,6	2,4	...
		Variación porcentual		
Respecto al mes anterior	28,6	4,0	20,0	-

ppb: Partes por billón.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) - Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.

Gráfico N° 2
Lima Metropolitana: Valor mensual de Dióxido de Azufre, por estaciones de medición, 2011 (ppb)



Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) - Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.

1.2.2 Dióxido de Nitrógeno

El dióxido de nitrógeno (NO_2), es un gas de color marrón claro producido por la quema de combustibles a altas temperaturas como es el caso de las termoeléctricas y la combustión del parque automotor. Este contaminante causa problemas respiratorios como ocurre en los automóviles.

En el distrito de **Ate** en el mes de noviembre de 2011, el dióxido de nitrógeno alcanzó 31,3 ppb, cifra que disminuyó en 6,0% respecto a lo obtenido en el mes de octubre que fue de 33,3 ppb. El día miércoles 9 de noviembre a las 10:00 horas se registró la máxima concentración de NO_2 cuyo valor fue de 59,9 ppb representando el 56,0% del ECA que es 106,9 ppb o su equivalente de $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ establecido por Decreto Supremo N° 03-MINAM-2008.

En el distrito de **San Borja** (Limatambo-San Borja) el valor de dióxido de nitrógeno en noviembre fue de 9,3 ppb cifra que decreció en 13,1% respecto al mes anterior. El máximo valor obtenido en la estación de Lima Sur fue de 19,3 ppb el

día viernes 11 de noviembre a las 10:00 horas cifra que correspondió al 18,1% del ECA diario (106,9 ppb o su equivalente $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

El SENAMHI informó que en el distrito de **Jesús María** en la estación del Campo de Marte el valor mensual de dióxido de nitrógeno alcanzó 10,7 ppb lo que significó un incremento de 3,9% respecto al mes anterior. El máximo valor en Lima Centro fue de 21,5 ppb alcanzado el día sábado 26 de noviembre a las 10:00 horas, lo que representó el 20,1% de su valor ECA diario (106,9 ppb).

Por su parte en el distrito de **Santa Anita** en la estación Lima Este 2 (Municipalidad de Santa Anita) el nivel alcanzado durante el mes en estudio fue de 15,5 ppb cifra que disminuyó en 14,4% respecto a octubre de 2011. El máximo valor en la estación Lima Este fue de 44,3 ppb verificado el día 15 a las 9:00 horas representando el 41,4% del ECA diario.


Cuadro N° 3
Lima Metropolitana: Valor mensual de Dióxido de Nitrógeno, 2011
 (ppb)

Año/Mes	Ate	San Borja	Jesús María (Campo de Marte)	Santa Anita
2011				
Enero	16,7	13,6	9,2	...
Febrero	...	12,6
Marzo	29,8	17,0	12,1	...
Abril	25,1	14,8	10,4	...
Mayo	19,3	15,2	10,3	...
Junio	17,5	12,2	11,3	21,4
Julio	24,1	12,5	11,6	18,9
Agosto	24,3	11,6	13,6	19,6
Setiembre	22,1	9,3	13,9	21,1
Octubre	33,3	10,7	10,3	18,1
Noviembre	31,3	9,3	10,7	15,5
Variación porcentual				
Respecto al mes anterior	-6,0	-13,1	3,9	-14,4

ppb: Partes por billón.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) - Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.

Gráfico N° 3
Lima Metropolitana: Valor mensual de Dióxido de Nitrógeno, por estaciones de medición, 2011
 (ppb)



ppb: Partes por billón

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) - Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.

1.2.3 Partículas PM₁₀

Las partículas PM₁₀ es el material particulado de diámetro menor o igual a 10 micrómetros. Son las partículas sólidas o líquidas suspendidas en el aire las cuales tienen diferente composición química. Se produce por la quema de combustibles o la quema de carbón o madera. Afecta al sistema respiratorio y cardiovascular.

En la estación de Lima Este en el distrito de Ate, la concentración promedio mensual de PM₁₀ fue de 104,4 ug/m³ cifra inferior en 1,5% respecto a lo obtenido en octubre de 2011. Los valores diarios de estas partículas monitoreadas durante el mes en estudio, no superó a su valor ECA diario que es 150 ug/m³ para 24 horas, siendo el día miércoles 30 que registró el máximo valor de 144,9 ug/m³ cifra equivalente en 96,6% respecto a su ECA diario.

En el distrito de San Borja en la estación de Limatambo-San Borja de Lima Sur la concentración promedio diario de PM₁₀ alcanzó 45,4 ug/m³ valor mensual que disminuyó en 1,5% al compararlo respecto a octubre. El día sábado 5 de noviembre se registró la máxima concentración de 63,3 ug/m³ cifra equivalente al 42,2% respecto a su valor ECA diario (150,0 ug/m³).

En el distrito de Jesús María en la estación del Campo de Marte (Lima Centro), el valor mensual para este material particulado alcanzó 41,9 ug/m³ siendo superior en 0,2% respecto al mes anterior. El día que registró el valor más alto en el mes fue el día 5 de octubre con 62,6 ug/m³, representando 41,7% en relación a su valor ECA diario (150,0 ug/m³).


Cuadro N° 4
Lima Metropolitana: Valor mensual de PM_{10r} 2011
(ug/m³)

Año/Mes	Ate	San Borja	Jesús María (Campo de Marte)
2011			
Enero	129,5	48,8	46,8
Febrero	...	49,0	...
Marzo	162,9	60,5	58,1
Abril	150,1	55,7	48,6
Mayo	111,8	55,7	48,3
Junio	63,6	49,4	41,2
Julio	99,0	47,9	38,6
Agosto	105,5	50,3	42,7
Setiembre	136,7	51,6	43,8
Octubre	106,0	46,1	41,8
Noviembre	104,4	45,4	41,9
Variación porcentual			
Respecto al mes anterior	-1,5	-1,5	0,2

ug/m³: Microgramo por metro cúbico.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) - Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.

Gráfico N° 4
Lima Metropolitana: Valor mensual de PM_{10r} por estaciones de medición, 2011
(ug/m³)



ug/m³: Microgramo por metro cúbico.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) - Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.

1.3 Radiación solar

Es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el sol, las más conocidas son las de tipo infrarrojo y las ultravioletas.

1.3.1 Radiación ultravioleta

Se denomina radiación ultravioleta (UV) al conjunto de radiaciones de espectro electromagnético con longitudes de onda menores que la radiación visible (luz), desde los 400 hasta los 150 (Nanómetro). Se suele diferenciar tres tipos de radiaciones ultravioletas (UV): UV-A, UV-B y UV-C).

En este documento se presenta las radiaciones de UV-B, banda de los 280 a los 320 nm. Esta es absorbida casi totalmente por el ozono. Este tipo de radiación es dañino, especialmente para el ADN. Provoca melanoma u otro tipo de cáncer de piel, de la vista por exposición a dosis altas, especialmente la córnea, como puede causar daños a la vida marina.

Para su medición el SENAMHI emplea el indicador la cual ha sido definida y normalizada bajo la supervisión de diversas

En este Informe Técnico se presenta la evolución de las radiaciones ultravioletas (UV) elaborada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

instituciones internacionales como la Organización Meteorológica Mundial, Organización Mundial de la Salud y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (United Nations Environment Programme (UNEP).

El SENAMHI recomienda a la población tomar medidas de precaución como el uso de protectores solares, sombreros, gorros y lentes de sol con cristales que absorban la radiación UV-B. Se debe evitar que los niños tengan una exposición excesiva al sol. Los policías de tránsito, profesores de educación física, ambulantes, turistas y público en general, deben tomar las precauciones ante exposiciones prolongadas de tiempo. La máxima radiación se presenta desde las 10:00 de la mañana hasta las 15:00 horas. Los niveles de riesgo por radiación ultravioleta se puede observar en la siguiente tabla:

Índice UV-B	Nivel de Riesgo	Acciones de Protección
1-2	Mínimo	Ninguna
3-5	Bajo	Aplicar factor de protección solar
6-8	Moderado	Aplicar factor de protección solar, uso de sombrero
9-11	Alto	Aplicar factor de protección solar, uso de sombrero y gafas con filtro UV-A y B
12-14	Muy alto	Aplicar factor de protección solar, uso de sombrero y gafas con filtro UV-A y B
>14	Extremo	Aplicar factor de protección solar, uso de sombrero y gafas con filtro UV-A y B. Exposiciones al sol por un tiempo limitado.


El índice promedio del nivel de radiación ultravioleta (UV-B) para Lima Metropolitana del mes de noviembre del año 2011 y por segundo mes consecutivo representó un nivel 12 de

intensidad, es decir un nivel de riesgo muy alto para la salud. Comparado con el mes anterior octubre 2011 no mostró variación alguna.

Cuadro N° 5
Lima Metropolitana: Índice UV-B promedio mensual, 2010-2011

Año/Mes	2010	2011	Variación %	
			2011/2010	Respecto al mes anterior
Enero	8,0	-	-	-
Febrero	12,0	13,0	8,3	-
Marzo	11,0	11,0	-	-15,4
Abril	9,0	10,0	11,1	-9,1
Mayo	5,0	5,0	0,0	-50,0
Junio	4,0	4,0	0,0	-20,0
Julio	3,0	3,0	0,0	-25,0
Agosto	-	4,0	-	33,3
Setiembre	6,0	6,0	0,0	50,0
Octubre	7,0	12,0	71,4	100,0
Noviembre	-	12,0	-	0,0
Diciembre	-	-	-	-

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) - Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.



1.4 Vigilancia de la Atmósfera Global

El SENAMHI cuenta con una estación de observación que es parte de la Red de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG), ubicada en la sierra central del Perú (Junín - Marcapomacocha), considerada como la estación VAG más

alta del mundo, a 4 mil 470 metros de altitud, en cuyas instalaciones se encuentra un equipo denominado Espectrofotómetro Dobson, el cual mide la cantidad de ozono atmosférico total.

1.4.1 Monitoreo de Ozono atmosférico

El monitoreo de la capa de ozono por parte del SENAMHI en esta parte del trópico, es de gran interés, tanto para la comunidad científica nacional e internacional, por cuanto permite conocer su variabilidad y la incidencia que ésta tiene sobre los cambios climáticos. El SENAMHI mantiene estrechos vínculos con la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y con el Proyecto de Ozono Mundial de la NOAA.

El valor promedio medido en Marcapomacocha en el mes de octubre alcanzó a 259,5 Unidades Dobson (UD) que al compararlo con similar mes del año anterior disminuyó en 0,7%. Mientras que, respecto al mes anterior aumentó en 0,2%. Se observó que el valor máximo fue de 267,4 UD y su valor mínimo alcanzó 247,5 UD.


Cuadro N° 6
Marcapomacocha: Vigilancia de la Atmósfera Global, 2010-2011
Unidad Dobson (UD)

Año/Mes	Valor		
	Promedio	Máximo	Mínimo
2010			
Enero	237,6	241,5	233,6
Febrero	231,8	234,4	230,4
Marzo	239,1	242,1	234,7
Abril	238,3	245,1	232,5
Mayo	238,4	240,4	234,9
Junio	239,8	247,0	231,4
Julio	246,0	257,7	232,4
Agosto	253,3	259,5	244,0
Setiembre	264,6	277,8	256,0
Octubre	261,3	268,4	251,7
2011			
Enero	-	-	-
Febrero	253,2	259,6	245,7
Marzo	252,3	261,6	249,3
Abril	247,5	256,1	243,6
Mayo	237,3	242,9	228,1
Junio	240,4	247,0	235,3
Julio	243,7	255,1	233,2
Agosto	250,3	258,0	245,3
Setiembre	259,0	265,4	253,3
Octubre	259,5	267,4	247,5
Variación porcentual			
Respecto al mes anterior	0,2	0,8	-2,3
Respecto a similar mes del año anterior	-0,7	-0,4	-1,7

Altitud: 4 470 m.s.n.m.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) - Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.

Gráfico N° 6
 Marcapomacocha: Vigilancia de la Atmósfera Global, 2010-2011
 Unidad Dobson (UD)



Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) - Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.

2. Calidad del agua

La contaminación del agua de los ríos es causada principalmente por el vertimiento de relaves mineros (parte alta y media de la cuenca), aguas servidas urbanas y desagües industriales a lo largo de todo su cauce (generalmente en la parte media y baja de la cuenca). Dicha contaminación es resultado de la presencia de elementos físicos, químicos y biológicos, que en altas concentraciones, son dañinos para la salud humana y el

ecosistema. Cabe indicar, que la calidad de agua también se ve afectada por el uso de plaguicidas y pesticidas en la actividad agrícola. Todo ello, ocasiona un gasto adicional en el tratamiento del elemento, es decir, cuanto más contaminada esté el agua, mayor es el costo del proceso para reducir el elemento contaminante, ya que se debe realizar el respectivo tratamiento para hacerla potable.

2.1 Presencia máxima de Hierro (Fe) en el río Rímac


En el mes de octubre de 2011, la concentración máxima de hierro (Fe) en el río Rímac fue de 2,59 miligramos por litro, lo que representó un incremento de 9,3%, en relación a lo reportado en octubre de 2010 que alcanzó

2,37 miligramos por litro. Mientras que, la presencia de hierro disminuyó en 76,8%, con respecto a setiembre 2011 (11,18 miligramos por litro).

Cuadro N° 7
 Lima Metropolitana: Concentración máxima de hierro total (Fe) en el río Rímac, 2008-2011
 Microgramo por litro

Mes	2008	2009	2010	2011	Variación %	
					2011/2010	Respecto al mes anterior
Enero	91,93	27,92	57,88	32,19	-44,4	-20,6
Febrero	298,38	151,74	35,38	72,85	105,9	126,3
Marzo	72,73	902,05	246,57	27,35	-88,9	-62,5
Abril	10,68	19,14	27,89	55,80	100,1	104,0
Mayo	4,19	4,12	4,41	1,31	-70,3	-97,7
Junio	7,07	17,92	3,11	2,88	-7,4	119,8
Julio	4,91	3,75	6,46	1,99	-69,2	-30,9
Agosto	2,48	3,07	2,14	15,41	620,1	674,4
Setiembre	1,54	1,86	1,60	11,18	598,8	-27,4
Octubre	0,99	8,24	2,37	2,59	9,3	-76,8
Noviembre	0,93	43,54	2,56			
Diciembre	10,71	41,28	40,54			

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).



2.2 Presencia promedio de Hierro (Fe) en el río Rimac

SEDAPAL reporta que la concentración promedio de hierro (Fe) en el río Rímac durante el mes de octubre de 2011 fue de 0,76 miligramos por litro, cifra superior en


117,1%, respecto al promedio reportado en el mismo mes del 2010. Mientras que, al comparar con la presencia de hierro del mes anterior (setiembre 2011) decreció en 22,4%.

Cuadro N° 8
Lima Metropolitana: Concentración promedio de hierro total (Fe) en el río Rimac, 2008-2011
Miligramos por litro

Mes	2008	2009	2010	2011	Variación %	
					2011/2010	Respecto al mes anterior
Enero	12,16	3,85	10,32	6,18	-40,0	60,5
Febrero	36,38	27,31	7,36	15,85	115,4	156,5
Marzo	15,30	51,96	29,10	6,63	-77,2	-58,2
Abril	1,35	4,26	4,35	11,10	155,2	67,4
Mayo	0,60	0,52	0,81	0,27	-66,7	-97,6
Junio	1,29	1,05	0,64	0,74	15,6	174,1
Julio	0,95	0,52	0,86	0,40	-53,5	-45,9
Agosto	0,65	0,47	0,35	1,38	294,3	245,0
Setiembre	0,44	0,55	0,40	0,98	145,0	-29,0
Octubre	0,38	1,02	0,35	0,76	117,1	-22,4
Noviembre	0,31	6,00	0,39			
Diciembre	1,36	6,04	3,85			

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

Gráfico N° 8
Lima Metropolitana: Concentración promedio de hierro total (Fe) en el río Rimac, 2008-2011
Miligramo por litro



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

2.3 Presencia máxima de Hierro (Fe) en la planta de tratamiento

Posterior al proceso de tratamiento en las plantas de SEDAPAL, la concentración máxima de hierro (Fe) en el mes de octubre 2011 alcanzó a 0,10 miligramos por litro, dicha cifra no mostró variación alguna en relación a igual mes del año anterior. En tanto que, disminuyó en 16,7% respecto al mes anterior (setiembre 2011). Igualmente, decreció en 66,7% con relación al límite permisible^{2/}, que es de 0,3 miligramos por litro.

La presencia de hierro en el agua ocasiona inconvenientes domésticos, tales como: Sabor desagradable, turbidez rojiza y manchas en la ropa en el momento del lavado. En casos extremos, el agua sabe a metal. Desde el punto de vista sanitario, uno de los riesgos de la presencia de este metal reside en que consume el cloro de la desinfección, quedando el agua desprotegida frente a los agentes patógenos.

Cuadro N° 9
Lima Metropolitana: Concentración máxima de hierro total (Fe) en las plantas de tratamiento 1 y 2 de SEDAPAL, 2008-2011
Miligramos por litro


Mes	2008	2009	2010	2011	Variación %		
					2011/2010	Respecto al mes anterior	Respecto al Límite 1/
Enero	0,15	0,15	0,16	0,12	-25,0	200,0	-60,0
Febrero	0,16	0,08	0,13	0,13	0,0	8,3	-56,7
Marzo	0,10	0,08	0,10	0,11	10,0	-15,4	-63,3
Abril	0,09	0,10	0,16	0,16	0,0	45,5	-46,7
Mayo	0,19	0,13	0,09	0,13	44,4	-18,8	-56,7
Junio	0,14	0,09	0,12	0,14	16,7	7,7	-53,3
Julio	0,10	0,15	0,09	0,09	0,0	-35,7	-70,0
Agosto	0,10	0,11	0,09	0,13	44,4	44,4	-56,7
Setiembre	0,12	0,09	0,12	0,12	0,0	-7,7	-60,0
Octubre	0,14	0,12	0,11	0,10	-9,1	-16,7	-66,7
Noviembre	0,09	0,17	0,12				
Diciembre	0,10	0,14	0,04				

Nota: El límite permisible de hierro en el agua potable, según Norma ITINTEC es de 0,300 miligramos por litro.

1/ Variación porcentual: 2011 / Límite permisible (Norma ITINTEC para agua potable).

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

2/ Mediante Resolución Directoral N° 339-87-ITINTEC-DG se aprobó la Norma Técnica Peruana N° 214.003 que establece los requisitos físico-químicos, organolépticos y microbiológicos que debe cumplir el agua para ser considerada potable. ITINTEC - Instituto de Investigación Tecnológica y de Normas Técnicas, desde 1992 ha sido reemplazado por el INDECOPI.



2.4 Presencia promedio de Hierro (Fe) en la planta de tratamiento

En octubre de 2011, la concentración promedio de hierro (Fe) en la planta de tratamiento alcanzó a 0,038 miligramos por litro, cifra inferior en 19,1% respecto al mes de octubre

de 2010. Igualmente, disminuyó en 9,5% en relación al mes anterior (setiembre 2011) y en 87,3% al comparar con el límite permisible^{2/}, que es de 0,3 miligramos por litro.

Cuadro N° 10
Lima Metropolitana: Concentración promedio de hierro total (Fe) en las plantas de
tratamiento 1 y 2 de SEDAPAL, 2008-2011
 Miligramos por litro

Mes	2008	2009	2010	2011	Variación %		
					2011/2010	Respecto al mes anterior	Respecto al Límite 1/
Enero	0,059	0,058	0,041	0,044	7,3	-55,6	-85,3
Febrero	0,054	0,044	0,041	0,050	22,0	13,6	-83,3
Marzo	0,039	0,031	0,038	0,041	7,9	-18,0	-86,3
Abril	0,037	0,037	0,044	0,042	-4,5	2,4	-86,0
Mayo	0,040	0,035	0,044	0,033	-25,0	-21,4	-89,0
Junio	0,070	0,034	0,035	0,034	-2,9	3,0	-88,7
Julio	0,047	0,037	0,040	0,027	-32,5	-20,6	-91,0
Agosto	0,045	0,037	0,042	0,041	-2,4	51,9	-86,3
Setiembre	0,046	0,043	0,046	0,042	-8,7	2,4	-86,0
Octubre	0,045	0,040	0,047	0,038	-19,1	-9,5	-87,3
Noviembre	0,034	0,034	0,045				
Diciembre	0,038	0,030	0,099				


Nota: El límite permisible de hierro en el agua potable, según Norma ITINTEC es de 0,300 miligramos por litro.

1/ Variación porcentual: 2011 / Límite permisible (Norma ITINTEC para agua potable).

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

2/ Mediante Resolución Directoral N° 339-87-ITINTEC-DG se aprobó la Norma Técnica Peruana N° 214.003 que establece los requisitos físico-químicos, organolépticos y microbiológicos que debe cumplir el agua para ser considerada potable. ITINTEC - Instituto de Investigación Tecnológica y de Normas Técnicas, desde 1992 ha sido reemplazado por el INDECOPI.

Gráfico N° 10
Lima Metropolitana: Concentración promedio de hierro total (Fe) en las plantas de tratamiento 1 y 2 de SEDAPAL, 2008-2011
Miligramos por litro



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

2.5 Presencia máxima de Plomo (Pb) en el río Rímac

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Metropolitana (SEDAPAL), informó que en el mes de octubre de 2011 la concentración máxima de plomo (Pb) en el río Rímac alcanzó 0,05 miligramos por litro, cifra que representó una disminución de 72,2%, respecto al mes de octubre de 2010. Asimismo, decreció en 61,5% en relación a la presencia de Pb registrada en setiembre de 2011.


La presencia de plomo en altas concentraciones produce efectos tóxicos en la salud, los niños son más susceptibles que los adultos, habiéndose documentado la presencia de retraso en el desarrollo, problemas de aprendizaje, trastornos en la conducta, alteraciones del lenguaje y de la capacidad auditiva, anemia, vómito y dolor abdominal recurrente.

Cuadro N° 11
Lima Metropolitana: Concentración máxima de plomo (Pb) en el río Rímac, 2008-2011
Miligramos por litro

Mes	2008	2009	2010	2011	Variación %	
					2011/2010	Respecto al mes anterior
Enero	1,14	0,29	0,43	0,34	-20,9	-50,0
Febrero	3,21	0,53	0,30	0,39	30,0	14,7
Marzo	0,67	2,15	3,44	0,15	-95,6	-61,5
Abril	0,06	0,20	0,24	0,23	-4,2	53,3
Mayo	0,05	0,05	0,06	0,03	-50,0	-87,0
Junio	0,08	0,14	0,17	0,09	-47,1	200,0
Julio	0,08	0,05	0,10	0,04	-60,0	-55,6
Agosto	0,06	0,04	0,04	0,18	350,0	350,0
Setiembre	0,04	0,04	0,05	0,13	160,0	-27,8
Octubre	0,05	0,09	0,18	0,05	-72,2	-61,5
Noviembre	0,05	0,70	0,04			
Diciembre	0,22	1,84	0,68			

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Gráfico N° 11
Lima Metropolitana: Concentración máxima de plomo (Pb) en el río Rímac, 2008-2011
Miligramos por litro



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

2.6 Presencia promedio de Plomo (Pb) en el río Rímac

SEDAPAL, reportó en el mes de octubre de 2011 que la concentración promedio de plomo (Pb) en el río Rímac, alcanzó a 0,016 miligramos por litro, incrementándose en


14,3% respecto a la presencia de Pb registrada en octubre de 2010. Mientras que, disminuyó en 20,0% en relación a setiembre 2011.

Cuadro N° 12
Lima Metropolitana: Concentración promedio de plomo (Pb) en el río Rímac, 2008-2011
Miligramos por litro

Mes	2008	2009	2010	2011	Variación %	
					2011/2010	Respecto al mes anterior
Enero	0,185	0,053	0,083	0,071	-14,5	-4,1
Febrero	0,338	0,183	0,064	0,086	34,4	21,1
Marzo	0,113	0,274	0,251	0,042	-83,3	-51,2
Abril	0,017	0,039	0,042	0,043	2,4	2,4
Mayo	0,014	0,022	0,013	0,012	-7,7	-72,1
Junio	0,033	0,017	0,021	0,022	4,8	83,3
Julio	0,028	0,015	0,019	0,010	-47,4	-54,5
Agosto	0,026	0,011	0,013	0,022	69,2	120,0
Setiembre	0,019	0,020	0,020	0,020	0,0	-9,1
Octubre	0,019	0,027	0,014	0,016	14,3	-20,0
Noviembre	0,028	0,070	0,011			
Diciembre	0,047	0,132	0,074			

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

Gráfico N° 12
Lima Metropolitana: Concentración promedio de plomo (Pb) en el río Rimac, 2008-2011
Miligramos por litro



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

2.7 Presencia máxima de Plomo (Pb) en la planta de tratamiento

Según el reporte de SEDAPAL posterior al proceso de tratamiento del agua de río, mostró que la concentración máxima de plomo (Pb) en octubre de 2011 fue de 0,009 miligramos por litro, cifra que no mostró variación alguna

respecto a octubre de 2010. Pero, disminuyó en 10,0% respecto al mes anterior (setiembre 2011) y en 82,0% comparado con el límite permisible (0,05 miligramos por litro).

Cuadro N° 13
Lima Metropolitana: Concentración máxima de plomo (Pb) en las plantas de tratamiento 1 y 2 de SEDAPAL, 2008-2011
Miligramos por litro


Mes	2008	2009	2010	2011	Variación %		
					2011/2010	Respecto al mes anterior	Respecto al Límite 1/
Enero	0,008	0,016	0,035	0,010	-71,4	42,9	-80,0
Febrero	0,007	0,015	0,014	0,006	-57,1	-40,0	-88,0
Marzo	0,009	0,021	0,021	0,006	-71,4	0,0	-88,0
Abril	0,010	0,018	0,014	0,006	-57,1	0,0	-88,0
Mayo	0,018	0,024	0,008	0,009	12,5	50,0	-82,0
Junio	0,039	0,013	0,010	0,009	-10,0	0,0	-82,0
Julio	0,022	0,022	0,013	0,008	-38,5	-11,1	-84,0
Agosto	0,022	0,018	0,013	0,011	-15,4	37,5	-78,0
Setiembre	0,011	0,015	0,016	0,010	-37,5	-9,1	-80,0
Octubre	0,026	0,019	0,009	0,009	0,0	-10,0	-82,0
Noviembre	0,017	0,009	0,008				
Diciembre	0,017	0,033	0,007				

Nota: El límite permisible de plomo en el agua potable, según Norma ITINTEC es de 0,05 miligramos por litro.

1/ Variación porcentual: 2011 / Límite permisible (Norma ITINTEC para agua potable).

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Gráfico N° 13
Lima Metropolitana: Concentración máxima de plomo (Pb) en las plantas de
tratamiento 1 y 2 de SEDAPAL, 2008-2011
Miligramos por litro



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

2.8 Presencia promedio de Plomo (Pb) en la planta de tratamiento

Luego de realizado el proceso de tratamiento del agua del río Rímac, SEDAPAL reportó que la concentración promedio del plomo (Pb) fue 0,005 miligramos por litro, cifra que no mostró variación alguna en relación a similar mes del 2010

y respecto al mes anterior. No obstante que disminuyó en 90,0%, al comparar con el límite permisible (0,05 miligramos por litro).

Cuadro N° 14
Lima Metropolitana: Concentración promedio de plomo (Pb) en las plantas de
tratamiento 1 y 2 de SEDAPAL, 2008-2011
Miligramos por litro


Mes	2008	2009	2010	2011	Variación %		
					2011/2010	Respecto al mes anterior	Respecto al Límite 1/
Enero	0,004	0,007	0,009	0,007	-22,2	-22,2	-82,0
Febrero	0,004	0,007	0,005	0,004	-20,0	-42,9	-92,0
Marzo	0,004	0,009	0,006	0,004	-33,3	0,0	-92,0
Abril	0,005	0,006	0,008	0,004	-50,0	0,0	-92,0
Mayo	0,006	0,008	0,007	0,005	-28,6	25,0	-90,0
Junio	0,011	0,005	0,007	0,005	-28,6	0,0	-90,0
Julio	0,008	0,007	0,006	0,005	-16,7	0,0	-90,0
Agosto	0,008	0,006	0,008	0,005	-37,5	0,0	-90,0
Setiembre	0,006	0,010	0,008	0,005	-37,5	0,0	-90,0
Octubre	0,007	0,008	0,005	0,005	0,0	0,0	-90,0
Noviembre	0,007	0,007	0,004				
Diciembre	0,008	0,011	0,009				

Nota: El límite permisible de plomo en el agua potable, según Norma ITINTEC es de 0,05 miligramos por litro.

1/ Variación porcentual: 2011 / Límite permisible (Norma ITINTEC para agua potable).

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Gráfico N° 14
Lima Metropolitana: Concentración promedio de plomo (Pb) en las plantas de
tratamiento 1 y 2 de SEDAPAL, 2008-2011
Miligramos por litro



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

2.9 Presencia máxima de Cadmio (Cd) en el río Rímac

En octubre de 2011, la presencia máxima de cadmio (Cd) en el río Rímac fue de 0,0029 miligramos por litro, disminuyendo en 6,5% respecto a la concentración de Cd registrada en el mismo mes del año pasado; igualmente, decreció en 77,9% en relación a setiembre de 2011.


El agua con concentraciones muy altas de cadmio irrita el estómago, conduciendo a vómitos y diarreas. El cadmio absorbido por el cuerpo humano produce descalcificación de los huesos, ocasionando que se vuelvan quebradizos y en dosis mayores produce la muerte.

Cuadro N° 15
Lima Metropolitana: Concentración máxima de cadmio (Cd) en el río Rímac, 2008-2011
Miligramos por litro

Mes	2008	2009	2010	2011	Variación %	
					2011/2010	Respecto al mes anterior
Enero	0,0451	0,0077	0,0148	0,0106	-28,4	-4,5
Febrero	0,0849	0,0238	0,0073	0,0153	109,6	44,3
Marzo	0,0520	0,0856	0,0351	0,0106	-69,8	-30,7
Abril	0,0052	0,0257	0,0040	0,0129	222,5	21,7
Mayo	0,0063	0,0053	0,0050	0,0074	48,0	-42,6
Junio	0,0042	0,0045	0,0100	0,0083	-17,0	12,2
Julio	0,0042	0,0052	0,0047	0,0047	0,0	-43,4
Agosto	0,0037	0,0031	0,0028	0,0097	246,4	106,4
Setiembre	0,0027	0,0026	0,0050	0,0131	162,0	35,1
Octubre	0,0045	0,0049	0,0031	0,0029	-6,5	-77,9
Noviembre	0,0074	0,0101	0,0039			
Diciembre	0,0163	0,0133	0,0111			

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

Gráfico N° 15
Lima Metropolitana: Concentración máxima de cadmio (Cd) en el río Rímac, 2008-2011
Miligramos por litro



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

2.10 Presencia promedio de Cadmio (Cd) en el río Rímac

El agua del río Rímac en el mes en estudio registró una concentración promedio de cadmio (Cd) de 0,0015 miligramos por litro, aumentando en 25,0% respecto a lo


observado en el mismo mes de 2010. Mientras que, disminuyó en 40,0% en relación al mes anterior (setiembre 2011).

Cuadro N° 16
Lima Metropolitana: Concentración promedio de cadmio (Cd) en el río Rímac, 2008-2011
Miligramos por litro

Mes	2008	2009	2010	2011	Variación %	
					2011/2010	Respecto al mes anterior
Enero	0,0074	0,0024	0,0031	0,0036	16,1	24,1
Febrero	0,0078	0,0060	0,0030	0,0048	60,0	33,3
Marzo	0,0074	0,0109	0,0054	0,0030	-44,4	-37,5
Abril	0,0019	0,0034	0,0023	0,0045	95,7	50,0
Mayo	0,0026	0,0019	0,0021	0,0034	61,9	-24,4
Junio	0,0022	0,0017	0,0022	0,0026	18,2	-23,5
Julio	0,0020	0,0016	0,0014	0,0019	35,7	-26,9
Agosto	0,0015	0,0011	0,0012	0,0020	66,7	5,3
Setiembre	0,0012	0,0013	0,0019	0,0025	31,6	25,0
Octubre	0,0016	0,0012	0,0012	0,0015	25,0	-40,0
Noviembre	0,0019	0,0021	0,0017			
Diciembre	0,0028	0,0027	0,0029			

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

Gráfico N° 16
Lima Metropolitana: Concentración promedio de cadmio (Cd) en el río Rímac, 2008-2011
 Miligramos por litro



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

2.11 Presencia máxima de Cadmio (Cd) en la planta de tratamiento

La concentración máxima de cadmio posterior al tratamiento en las plantas de SEDAPAL en octubre de 2011 fue de 0,0019 miligramos por litro, aumentando en 26,7% respecto a lo observado en el mismo mes de

2010 (0,0015 mg/l). No obstante, disminuyó en 24,0% respecto a setiembre de 2011 y en 62,0% al compararlo con el límite permisible que es de 0,005 miligramos por litro (mg/l).

Cuadro N° 17
Lima Metropolitana: Concentración máxima de cadmio (Cd) en las plantas de tratamiento 1 y 2 de SEDAPAL, 2008-2011
 Miligramos por litro


Mes	2008	2009	2010	2011	Variación %		
					2011/2010	Respecto al mes anterior	Respecto al Límite 1/
Enero	0,0022	0,0016	0,0016	0,0023	43,8	130,0	-54,0
Febrero	0,0014	0,0018	0,0023	0,0019	-17,4	-17,4	-62,0
Marzo	0,0019	0,0022	0,0018	0,0016	-11,1	-15,8	-68,0
Abril	0,0020	0,0024	0,0018	0,0027	50,0	68,8	-46,0
Mayo	0,0023	0,0021	0,0025	0,0025	0,0	-7,4	-50,0
Junio	0,0023	0,0018	0,0021	0,0025	19,0	0,0	-50,0
Julio	0,0019	0,0021	0,0019	0,0025	31,6	0,0	-50,0
Agosto	0,0022	0,0015	0,0020	0,0022	10,0	-12,0	-56,0
Setiembre	0,0020	0,0020	0,0021	0,0025	19,0	13,6	-50,0
Octubre	0,0020	0,0017	0,0015	0,0019	26,7	-24,0	-62,0
Noviembre	0,0017	0,0016	0,0015				
Diciembre	0,0017	0,0019	0,0010				

Nota: El límite permisible de Cadmio en el agua potable, según Norma ITINTEC es de 0,005 miligramos por litro.

1/ Variación porcentual: 2011 / Límite permisible (Norma ITINTEC para agua potable).

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Gráfico N° 17
Lima Metropolitana: Concentración máxima de cadmio (Cd) en las plantas de tratamiento 1 y 2 de SEDAPAL, 2008-2011
 Miligramos por litro



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

2.12 Presencia promedio de Cadmio (Cd) en la planta de tratamiento

SEDAPAL reportó que la concentración promedio de cadmio en las plantas de tratamiento en octubre 2011 fue de 0,0010 miligramos por litro, con un incremento de 42,9% respecto a octubre de 2010; mientras que, disminuyó en

9,1% en relación al mes anterior (setiembre 2011). Asimismo, se redujo en 80,0% respecto al límite permisible que es de 0,005 miligramos por litro (mg/l).

Cuadro N° 18
Lima Metropolitana: Concentración promedio de cadmio (Cd) en las plantas de tratamiento 1 y 2 de SEDAPAL, 2008-2011
 Miligramos por litro


Mes	2008	2009	2010	2011	Variación %		
					2011/2010	Respecto al mes anterior	Respecto al Límite 1/
Enero	0,0008	0,0008	0,0010	0,0012	20,0	-33,3	-76,0
Febrero	0,0007	0,0009	0,0011	0,0008	-27,3	-33,3	-84,0
Marzo	0,0007	0,0008	0,0010	0,0009	-10,0	12,5	-82,0
Abril	0,0007	0,0011	0,0012	0,0011	-8,3	22,2	-78,0
Mayo	0,0010	0,0010	0,0014	0,0013	-7,1	18,2	-74,0
Junio	0,0012	0,0010	0,0013	0,0015	15,4	15,4	-70,0
Julio	0,0009	0,0010	0,0008	0,0013	62,5	-13,3	-74,0
Agosto	0,0009	0,0009	0,0010	0,0030	200,0	130,8	-40,0
Setiembre	0,0007	0,0010	0,0012	0,0011	-8,3	-63,3	-78,0
Octubre	0,0006	0,0008	0,0007	0,0010	42,9	-9,1	-80,0
Noviembre	0,0007	0,0009	0,0007				
Diciembre	0,0008	0,0010	0,0018				

Nota: El límite permisible de Cadmio en el agua potable, según Norma ITINTEC es de 0,005 miligramos por litro.

1/ Variación porcentual: 2011 / Límite permisible (Norma ITINTEC para agua potable).

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Gráfico N° 18
Lima Metropolitana: Concentración promedio de cadmio (Cd) en las plantas de
tratamiento 1 y 2 de SEDAPAL, 2008-2011



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

2.13 Presencia máxima de Aluminio (Al) en el río Rímac


El aluminio en el río Rímac en octubre de 2011 registró una concentración máxima de 1,94 miligramos por litro (mg/l) que representa una reducción de 1,0% respecto a lo reportado en octubre de 2010. Asimismo, decreció en 78,1% en relación a setiembre 2011.

El consumo de concentraciones significativas de aluminio puede causar un efecto serio en la salud como: Daño al sistema nervioso central, demencia, pérdida de la memoria, apatía y temblores severos.

Cuadro N° 19
Lima Metropolitana: Concentración máxima de aluminio (Al) en el río Rímac, 2008-2011
 Miligramos por litro

Mes	2008	2009	2010	2011	Variación %	
					2011/2010	Respecto al mes anterior
Enero	31,22	9,55	31,32	21,88	-30,1	39,8
Febrero	256,67	75,21	30,06	43,52	44,8	98,9
Marzo	23,81	748,70	110,99	18,28	-83,5	-58,0
Abril	4,25	25,31	22,93	32,95	43,7	80,3
Mayo	2,34	5,81	2,64	0,98	-62,9	-97,0
Junio	5,76	14,41	2,57	2,69	4,7	174,5
Julio	2,79	1,95	4,00	1,85	-53,8	-31,2
Agosto	1,81	1,42	1,87	8,45	351,9	356,8
Setiembre	1,11	1,75	1,42	8,84	522,5	4,6
Octubre	0,66	6,70	1,96	1,94	-1,0	-78,1
Noviembre	1,63	41,28	1,95			
Diciembre	8,52	34,34	15,65			

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)



2.14 Presencia promedio de Aluminio (Al) en el río Rímac

Durante el mes de análisis, el río Rímac registró una concentración promedio de aluminio (Al) de 0,746 miligramos por litro (mg/l), representando en términos


porcentuales un aumento de 103,8%, respecto a lo registrado en similar mes de 2010 (0,366 mg/l) pero, decreció en 18,0% en relación a lo reportado en setiembre de 2011.

Cuadro N° 20
Lima Metropolitana: Concentración promedio de aluminio (Al) en el río Rímac, 2008-2011
Miligramos por litro

Mes	2008	2009	2010	2011	Variación %	
					2011/2010	Respecto al mes anterior
Enero	4,516	1,935	6,542	4,403	-32,7	94,4
Febrero	20,878	15,215	6,669	10,930	63,9	148,2
Marzo	5,950	29,206	21,125	5,015	-76,3	-54,1
Abril	0,782	3,178	3,902	7,347	88,3	46,5
Mayo	0,377	0,471	0,568	0,197	-65,3	-97,3
Junio	0,903	1,027	0,489	0,628	28,4	218,8
Julio	0,579	0,532	0,629	0,349	-44,5	-44,4
Agosto	0,471	0,298	0,284	1,001	252,5	186,8
Setiembre	0,305	0,505	0,358	0,910	154,2	-9,1
Octubre	0,253	1,150	0,366	0,746	103,8	-18,0
Noviembre	0,257	5,172	0,360			
Diciembre	0,926	5,018	2,265			

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

Gráfico N° 20
Lima Metropolitana: Concentración promedio de aluminio (Al) en el río Rímac, 2008-2011
 Miligramos por litro



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

2.15 Presencia máxima de Aluminio (Al) en la planta de tratamiento

Posterior al proceso de tratamiento de las aguas del río Rímac en las plantas de SEDAPAL en octubre de 2011 la concentración máxima de aluminio fue de 0,1450 mg/l. Comparado con igual mes de 2010, aumentó en 0,3%;

asimismo, creció en 40,8% respecto a setiembre de 2011. Mientras que, disminuyó en 27,5% respecto al límite permisible, que es de 0,200 miligramos por litro (mg/l).


Cuadro N° 21
Lima Metropolitana: Concentración máxima de aluminio (Al) en las plantas de tratamiento 1 y 2 de SEDAPAL, 2008-2011
 Miligramos por litro

Mes	2008	2009	2010	2011	Variación %		
					2011/2010	Respecto al mes anterior	Respecto al Límite 1/
Enero	0,0715	0,1290	0,1725	0,1420	-17,7	53,8	-29,0
Febrero	0,0750	0,0770	0,1560	0,1310	-16,0	-7,7	-34,5
Marzo	0,0590	0,1040	0,1775	0,1345	-24,2	2,7	-32,8
Abril	0,0840	0,1305	0,1105	0,1430	29,4	6,3	-28,5
Mayo	0,1270	0,1835	0,1410	0,1110	-21,3	-22,4	-44,5
Junio	0,1870	0,1010	0,1165	0,1655	42,1	49,1	-17,3
Julio	0,1055	0,1515	0,1545	0,1680	8,7	1,5	-16,0
Agosto	0,1330	0,1165	0,1170	0,1200	2,6	-28,6	-40,0
Setiembre	0,1495	0,1000	0,1165	0,1030	-11,6	-14,2	-48,5
Octubre	0,0935	0,1275	0,1445	0,1450	0,3	40,8	-27,5
Noviembre	0,1430	0,1515	0,1205				
Diciembre	0,1315	0,1280	0,0923				

Nota: El límite permisible de Aluminio en el agua potable, según Norma ITINTEC es de 0,200 miligramos por litro.

1/ Variación porcentual: 2011 / Límite permisible (Norma ITINTEC para agua potable).

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).



2.16 Presencia promedio de Aluminio (Al) en la planta de tratamiento

La concentración promedio de aluminio en la planta de tratamiento de SEDAPAL en el mes de octubre alcanzó 0,0665 mg/l, siendo menor en 0,7% respecto a similar mes de 2010.

No obstante, aumentó en 9,9% en relación a setiembre de 2011. Pero, disminuyó en 66,8%, respecto al límite permisible que es de 0,200 miligramos por litro (mg/l).

Cuadro N° 22
Lima Metropolitana: Concentración promedio de aluminio (Al) en las plantas de tratamiento 1 y 2 de SEDAPAL, 2008-2011
 Miligramos por litro


Mes	2008	2009	2010	2011	Variación %		
					2011/2010	Respecto al mes anterior	Respecto al Límite 1/
Enero	0,0500	0,0592	0,0865	0,0815	-5,8	-48,4	-59,3
Febrero	0,0519	0,0535	0,0815	0,0650	-20,2	-20,2	-67,5
Marzo	0,0495	0,0560	0,0725	0,0635	-12,4	-2,3	-68,3
Abril	0,0522	0,0620	0,0800	0,0595	-25,6	-6,3	-70,3
Mayo	0,0545	0,0677	0,0765	0,0540	-29,4	-9,2	-73,0
Junio	0,0665	0,0574	0,0795	0,0640	-19,5	18,5	-68,0
Julio	0,0575	0,0710	0,0640	0,0635	-0,8	-0,8	-68,3
Agosto	0,0575	0,0630	0,0760	0,0660	-13,2	3,9	-67,0
Setiembre	0,0560	0,0750	0,0755	0,0605	-19,9	-8,3	-69,8
Octubre	0,0560	0,0719	0,0670	0,0665	-0,7	9,9	-66,8
Noviembre	0,0570	0,0850	0,0576				
Diciembre	0,0600	0,0835	0,1580				

Nota: El límite permisible de Aluminio en el agua potable, según Norma ITINTEC es de 0,200 miligramos por litro.

1/ Variación porcentual: 2011 / Límite permisible (Norma ITINTEC para agua potable).

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Gráfico N° 22
Lima Metropolitana: Concentración promedio de aluminio (Al) en las plantas de
tratamiento 1 y 2 de SEDAPAL, 2008-2011
 Miligramos por litro



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

2.17 Presencia máxima de Materia Orgánica en el río Rímac

Durante el mes de octubre de 2011, la concentración máxima de materia orgánica en el río Rímac fue de 1,78 miligramos por litro (mg/l), cifra superior en 17,9%, respecto al mes de octubre de 2010. Mientras que, disminuyó 6,3% al comparar la presencia de materia orgánica del mes en estudio con el mes anterior (setiembre 2011).


La mayor parte de la materia orgánica que contamina el agua procede de los desechos de alimentos, de las aguas negras domésticas e industriales. La materia orgánica es descompuesta por bacterias, protozoarios y diversos microorganismos.

Cuadro N° 23
Lima Metropolitana: Concentración máxima de materia orgánica en el río Rímac, 2008-2011
 Miligramos por litro

Mes	2008	2009	2010	2011	Variación %	
					2011/2010	Respecto al mes anterior
Enero	5,380	8,120	10,350	3,720	-64,1	41,4
Febrero	3,900	11,700	3,670	5,020	36,8	34,9
Marzo	8,000	36,500	13,700	3,000	-78,1	-40,2
Abril	4,820	2,350	5,200	4,480	-13,8	49,3
Mayo	7,570	1,530	1,640	2,860	74,4	-36,2
Junio	1,750	1,500	1,690	3,840	127,2	34,3
Julio	3,370	1,730	2,250	4,710	109,3	22,7
Agosto	2,460	2,110	1,700	2,180	28,2	-53,7
Setiembre	1,930	2,260	1,480	1,900	28,4	-12,8
Octubre	1,770	2,070	1,510	1,780	17,9	-6,3
Noviembre	1,830	4,360	1,740			
Diciembre	2,430	2,620	2,630			

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

Gráfico N° 23
Lima Metropolitana: Concentración máxima de materia orgánica en el río Rímac, 2008-2011
 Miligramos por litro



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

2.18 Presencia promedio de Materia Orgánica en el río Rímac

SEDAPAL reportó que la concentración promedio de materia orgánica en el río Rímac fue de 1,5 miligramos por litro (mg/l), cifra superior en 40,2%, respecto a lo observado en el mismo


mes del 2010. Igualmente, aumentó en 9,5% en relación con el mes anterior (setiembre 2011).

Cuadro N° 24
Lima Metropolitana: Concentración promedio de materia orgánica en el río Rímac, 2008-2011
 Miligramos por litro

Mes	2008	2009	2010	2011	Variación %	
					2011/2010	Respecto al mes anterior
Enero	2,760	2,040	1,900	1,750	-7,9	24,1
Febrero	1,900	3,610	1,640	2,240	36,6	28,0
Marzo	1,499	3,910	3,760	1,720	-54,3	-23,2
Abril	1,071	1,430	1,330	1,920	44,4	11,6
Mayo	1,360	1,153	1,050	1,900	81,0	-1,0
Junio	1,075	1,212	1,150	2,470	114,8	30,0
Julio	1,213	1,320	1,450	2,350	62,1	-4,9
Agosto	1,250	1,390	1,130	1,410	24,8	-40,0
Setiembre	1,130	1,440	1,070	1,370	28,0	-2,8
Octubre	1,036	1,514	1,070	1,500	40,2	9,5
Noviembre	1,100	1,850	1,200			
Diciembre	1,730	1,560	1,410			

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

Gráfico N° 24
Lima Metropolitana: Concentración promedio de materia orgánica en el río Rímac, 2008-2011
 Miligramos por litro



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

2.19 Presencia máxima de Materia Orgánica en la planta de tratamiento

Posterior al proceso de tratamiento de las aguas del río Rímac en las plantas de tratamiento de SEDAPAL, se observó que la concentración máxima de materia orgánica fue de 1,82 miligramos por litro (mg/l), representando un crecimiento

de 29,1% con respecto a octubre de 2010. Igualmente, se incrementó en 20,9% en relación al mes anterior (setiembre 2011).


Cuadro N° 25
Lima Metropolitana: Concentración máxima de materia orgánica en las plantas de tratamiento 1 y 2 de SEDAPAL, 2008-2011
 Miligramos por litro

Mes	2008	2009	2010	2011	Variación %	
					2011/2010	Respecto al mes anterior
Enero	1,1750	1,7050	1,4200	1,6500	16,2	20,0
Febrero	1,4900	1,4200	1,4300	2,2950	60,5	39,1
Marzo	0,8500	1,4650	1,1200	1,5050	34,4	-34,4
Abril	0,6850	1,1500	1,5500	1,9600	26,5	30,2
Mayo	2,7100	1,2600	1,6400	2,1950	33,8	12,0
Junio	1,2650	0,9650	1,5850	2,4200	52,7	10,3
Julio	1,3050	1,2850	1,6450	3,5200	114,0	45,5
Agosto	1,0400	1,4000	1,4400	1,7250	19,8	-51,0
Setiembre	0,9200	1,9900	1,1500	1,5050	30,9	-12,8
Octubre	0,7450	1,8300	1,4100	1,8200	29,1	20,9
Noviembre	1,9550	1,4250	1,2900			
Diciembre	1,9250	1,2500	1,3750			

Nota: No se ha fijado el límite permisible (TINTEC) para materia orgánica en el agua potable.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Gráfico N° 25
Lima Metropolitana: Concentración máxima de materia orgánica
en las plantas de tratamiento 1 y 2 de SEDAPAL, 2008-2011
 Miligramos por litro



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

2.20 Presencia promedio de Materia Orgánica en la planta de tratamiento

En octubre de 2011, se observa en las plantas de tratamiento de SEDAPAL que la concentración promedio de materia orgánica fue de 1,325 miligramos por litro (mg/l), cifra superior


en 55,9% en relación a lo obtenido en octubre de 2010. Mientras que, disminuyó en 2,2% respecto al mes de setiembre 2011 (1,355 mg/l).

Cuadro N° 26
Lima Metropolitana: Concentración promedio de materia orgánica
en las plantas de tratamiento 1 y 2 de SEDAPAL, 2008-2011
 Miligramos por litro

Mes	2008	2009	2010	2011	Variación %	
					2011/2010	Respecto al mes anterior
Enero	0,755	1,115	0,875	1,040	18,9	3,7
Febrero	0,626	1,090	0,955	1,350	41,4	29,8
Marzo	0,504	0,915	0,925	1,105	19,5	-18,1
Abril	0,456	0,845	0,520	1,205	131,7	9,0
Mayo	0,848	0,886	1,050	1,420	35,2	17,8
Junio	0,734	0,846	0,915	1,750	91,3	23,2
Julio	0,660	0,895	1,091	1,735	59,0	-0,9
Agosto	0,725	0,915	0,935	1,125	20,3	-35,2
Setiembre	0,655	1,085	0,900	1,355	50,6	20,4
Octubre	0,535	1,218	0,850	1,325	55,9	-2,2
Noviembre	0,730	1,190	0,923			
Diciembre	1,250	1,015	1,003			

Nota: No se ha fijado el límite permisible (ITINTEC) para materia orgánica en el agua potable.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).



2.21 Presencia máxima de Nitratos (NO₃) en el río Rímac

En el mes de octubre de 2011, la concentración máxima de nitratos (NO₃) en el río Rímac fue de 6,109 miligramos por litro, cifra menor en 5,3%, respecto al mes de octubre de 2010; asimismo, dicha presencia disminuyó en 6,7% en relación a lo observado en setiembre 2011.


Los niveles elevados de nitratos pueden indicar la posible presencia de otros contaminantes, tales como

microorganismos o pesticidas, que podrían causar problemas a la salud. A partir de grandes concentraciones de nitrato en el agua (más de 100 miligramos por litro) se percibe un sabor desagradable y además puede causar trastornos fisiológicos. Por sus efectos tóxicos, los nitratos pueden ocasionar signos de cianosis (coloración azulada de la piel o de las membranas mucosas a causa de una deficiencia de oxígeno en la sangre).

Cuadro N° 27
Lima Metropolitana: Concentración máxima de nitratos en el río Rímac, 2008-2011
 Miligramos por litro

Mes	2008	2009	2010	2011	Variación %	
					2011/2010	Respecto al mes anterior
Enero	6,892	5,329	4,284	3,610	-15,7	-36,3
Febrero	6,753	4,291	3,448	4,559	32,2	14,0
Marzo	4,750	5,023	3,321	3,657	10,1	-19,8
Abril	5,880	4,799	5,051	3,312	-34,4	-9,4
Mayo	6,165	5,722	7,394	4,358	-41,1	31,6
Junio	6,168	7,522	7,987	6,016	-24,7	38,0
Julio	6,279	7,716	5,648	5,626	-0,4	-6,5
Agosto	12,044	7,272	5,577	6,284	12,7	11,7
Setiembre	6,626	7,111	5,957	6,548	9,9	4,2
Octubre	5,876	6,848	6,448	6,109	-5,3	-6,7
Noviembre	5,233	5,776	5,670			
Diciembre	6,114	7,908	5,664			

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)



2.22 Presencia promedio de Nitratos (NO₃) en el río Rímac

La concentración promedio de nitratos (NO₃) en el río Rímac en octubre de 2011 fue 5,552 miligramos por litro, cifra que aumentó en 11,2% respecto a similar mes de 2010.


Asimismo, aumentó en 22,9% en relación al mes de setiembre de 2011.

Cuadro N° 28
Lima Metropolitana: Concentración promedio de nitratos en el río Rímac, 2008-2011
Miligramos por litro

Mes	2008	2009	2010	2011	Variación %	
					2011/2010	Respecto al mes anterior
Enero	4,9830	4,3638	2,9540	3,2250	9,2	-37,6
Febrero	4,3465	3,3830	2,7700	3,3240	20,0	3,1
Marzo	4,1795	3,5240	2,5480	3,2920	29,2	-1,0
Abril	4,1885	3,6550	3,4430	2,3850	-30,7	-27,6
Mayo	5,2284	4,9558	5,7590	3,6290	-37,0	52,2
Junio	5,6296	5,9045	6,4958	5,4280	-16,4	49,6
Julio	5,0107	5,8110	4,8680	4,5310	-6,9	-16,5
Agosto	6,3150	5,7610	4,3890	5,2230	19,0	15,3
Setiembre	5,2840	5,4710	4,8260	4,5160	-6,4	-13,5
Octubre	5,2729	5,9863	4,9950	5,5520	11,2	22,9
Noviembre	4,4410	5,2120	4,8508			
Diciembre	5,0130	4,3490	5,1660			

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

Gráfico N° 28
Lima Metropolitana: Concentración promedio de nitratos en el río Rímac, 2008-2011
 Miligramos por litro



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

2.23 Presencia máxima de Nitratos (NO₃) en la planta de tratamiento

Luego del proceso de tratamiento de las aguas del río Rímac, SEDAPAL reportó que la concentración máxima de nitratos fue de 7,4135 mg/l en el mes de octubre de 2011, cifra mayor en 50,8%, respecto a igual mes de 2010.

Asimismo, aumentó en 38,1% en relación al mes anterior (setiembre 2011). Pero, se redujo en 83,5% respecto al límite permisible que es de 45,00 miligramos por litro (mg/l).


Cuadro N° 29
Lima Metropolitana: Concentración máxima de nitratos en las plantas de tratamiento 1 y 2 de SEDAPAL, 2008-2011
 Miligramos por litro

Mes	2008	2009	2010	2011	Variación %		
					2011/2010	Respecto al mes anterior	Respecto al Límite 1/
Enero	5,5815	4,6710	3,8685	3,8120	-1,5	-28,1	-91,5
Febrero	5,1565	3,4000	3,5325	2,7400	-22,4	-28,1	-93,9
Marzo	3,7610	4,2645	2,5050	2,7070	8,1	-1,2	-94,0
Abril	4,5000	4,3040	3,9215	3,5145	-10,4	29,8	-92,2
Mayo	5,5515	4,5255	5,0875	4,1810	-17,8	19,0	-90,7
Junio	5,8175	5,6275	5,4530	5,0870	-6,7	21,7	-88,7
Julio	5,9115	5,5800	5,3255	5,2395	-1,6	3,0	-88,4
Agosto	6,2300	6,0220	5,1310	5,6035	9,2	6,9	-87,5
Setiembre	5,6730	5,2330	5,3645	5,3700	0,1	-4,2	-88,1
Octubre	5,9105	5,6605	4,9175	7,4135	50,8	38,1	-83,5
Noviembre	5,7095	5,1060	5,5150				
Diciembre	5,9165	3,9525	5,3015				

Nota: El límite permisible de Nitratos en el agua potable, según Norma ITINTEC es de 45,00 miligramos por litro.

1/ Variación porcentual: 2011 / Límite permisible (Norma ITINTEC para agua potable).

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).



2.24 Presencia promedio de Nitratos (NO₃) en la planta de tratamiento

SEDAPAL reportó que la concentración promedio de nitratos fue de 5,6205 mg/l en el mes de octubre de 2011, cifra superior en 18,8%, respecto a lo obtenido en octubre

de 2010. Asimismo, aumentó en 7,4% en relación a setiembre 2011. Mientras que, se redujo en 87,5% respecto al límite permisible que es de 45,00 miligramos por litro (mg/l).


Cuadro N° 30
Lima Metropolitana: Concentración promedio de nitratos en las plantas de tratamiento 1 y 2 de SEDAPAL, 2008-2011
 Miligramos por litro

Mes	2008	2009	2010	2011	Variación %		
					2011/2010	Respecto al mes anterior	Respecto al Límite 1/
Enero	4,2425	4,2093	3,0520	3,0760	0,8	-29,6	-93,2
Febrero	3,8890	3,0155	2,9730	2,4260	-18,4	-21,1	-94,6
Marzo	3,5893	3,5935	2,3185	2,4240	4,6	-0,1	-94,6
Abril	4,0779	3,4375	3,0375	2,9980	-1,3	23,7	-93,3
Mayo	5,3203	4,3194	4,6030	3,7610	-18,3	25,5	-91,6
Junio	5,7125	5,4325	5,1744	4,8920	-5,5	30,1	-89,1
Julio	5,5210	5,3205	5,0609	4,5900	-9,3	-6,2	-89,8
Agosto	6,0755	5,2940	4,8235	5,3415	10,7	16,4	-88,1
Setiembre	5,0865	4,9370	4,9895	5,2310	4,8	-2,1	-88,4
Octubre	5,5933	5,3166	4,7330	5,6205	18,8	7,4	-87,5
Noviembre	5,3465	4,7505	4,8034				
Diciembre	5,1865	3,3380	4,3684				

Nota: El límite permisible de Nitratos en el agua potable, según Norma ITINTEC es de 45,00 miligramos por litro.

1/ Variación porcentual: 2011 / Límite permisible (Norma ITINTEC para agua potable).

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).



2.25 Nivel promedio de turbiedad en el río Rímac

En el mes de octubre de 2011, el nivel de turbiedad en el río Rímac fue 21,9 UNT, cifra superior en 79,5% respecto al mes de octubre de 2010; asimismo, dicha presencia aumentó en 1,9%, respecto a lo observado en setiembre del 2011.


Cuadro N° 31
Lima Metropolitana: Nivel promedio de turbiedad en el río Rímac, 2008-2011
(Unidades Nefelométricas de Turbiedad - UNT)

Mes	2008	2009	2010	2011	Variación %	
					2011/2010	Respecto al mes anterior
Enero	165,0	98,6	235,0	283,0	20,4	2647,6
Febrero	936,2	380,7	623,9	356,0	-42,9	25,8
Marzo	290,9	879,6	556,3	169,4	-69,5	-52,4
Abril	78,8	96,1	84,1	176,6	110,0	4,3
Mayo	12,3	13,0	20,4	16,5	-19,1	-90,7
Junio	18,9	27,2	24,4	19,7	-19,3	19,4
Julio	17,5	14,1	16,9	15,3	-9,5	-22,3
Agosto	16,7	14,1	14,5	23,8	64,1	55,6
Setiembre	12,2	15,2	13,1	21,5	64,1	-9,7
Octubre	13,5	30,0	12,2	21,9	79,5	1,9
Noviembre	12,3	160,6	12,5			
Diciembre	48,5	108,8	10,3			

Nota: Río (Bocatoma).

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Gráfico N° 31
Lima Metropolitana: Nivel promedio de turbiedad en el río Rímac, 2008-2011
 (Unidades Nefelométricas de Turbiedad - UNT)



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

2.26 Nivel máximo de turbiedad en el río Rímac

El nivel de turbiedad máximo en el mes de octubre de 2011, fue 42,8 UNT, cifra superior en 35,9% respecto al mes de octubre de 2010. Igualmente, dicha presencia aumentó en


34,2% respecto a lo observado en setiembre de 2011 que fue de 31,9 UNT.

Cuadro N° 32
Lima Metropolitana: Nivel máximo de turbiedad en el río Rímac, 2008-2011
 (Unidades Nefelométricas de Turbiedad - UNT)

Mes	2008	2009	2010	2011	Variación %	
					2011/2010	Respecto al mes anterior
Enero	1 578,5	471,2	1 467,8	2 465,9	68,0	416,6
Febrero	8 089,6	1 385,0	5 041,1	1 534,5	-69,6	-37,8
Marzo	2 616,5	10 921,3	2 257,8	709,3	-68,6	-53,8
Abril	1 666,6	314,7	323,2	1 579,5	388,7	122,7
Mayo	19,5	57,9	63,7	25,2	-60,4	-98,4
Junio	52,9	65,8	183,0	58,3	-68,1	131,3
Julio	55,4	33,1	24,3	24,7	1,6	-57,6
Agosto	26,6	24,3	18,5	85,4	361,6	245,7
Setiembre	18,9	27,8	23,7	31,9	34,6	-62,6
Octubre	37,8	124,3	31,5	42,8	35,9	34,2
Noviembre	21,7	780,0	32,8			
Diciembre	555,1	630,4	477,3			

Nota: Río (Bocatoma).

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).



2.27 Nivel mínimo de turbiedad en el río Rímac

En el mes de octubre el nivel mínimo de turbiedad registra 13,6 UNT, cifra superior en 78,9% respecto al mes de octubre de

2010. Mientras que, dicha presencia disminuyó en 12,3% en relación a lo observado en setiembre de 2011 (15,5 UNT).


Cuadro N° 33
Lima Metropolitana: Nivel mínimo de turbiedad en el río Rímac, 2008-2011
(Unidades Nefelométricas de Turbiedad - UNT)

Mes	2008	2009	2010	2011	Variación %	
					2011/2010	Respecto al mes anterior
Enero	11,6	12,8	23,4	19,6	-16,2	-79,9
Febrero	9,8	36,6	35,2	52,4	48,9	167,3
Marzo	24,1	66,6	52,1	31,3	-39,9	-40,3
Abril	10,5	10,4	10,9	16,2	48,6	-48,2
Mayo	8,0	7,0	9,5	11,0	15,8	-32,1
Junio	9,5	12,1	8,0	13,0	62,5	18,2
Julio	10,2	9,3	9,5	11,0	15,8	-15,4
Agosto	8,1	8,7	10,7	12,8	19,6	16,4
Setiembre	7,6	8,1	8,0	15,5	93,8	21,1
Octubre	8,9	10,7	7,6	13,6	78,9	-12,3
Noviembre	9,4	12,8	6,8			
Diciembre	8,8	15,9	97,4			

Nota: Río (Bocatoma).

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Gráfico N° 33
Lima Metropolitana: Nivel mínimo de turbiedad en el río Rímac, 2008-2011
 (Unidades Nefelométricas de Turbiedad - UNT)



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

3. Producción de agua

3.1 Producción de agua potable a nivel nacional

En el mes de setiembre de 2011, el agua potable producida por 22 Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento registró 92 millones 720 mil 900 metros cúbicos, representando en términos porcentuales un incremento de 0,5% comparado con el volumen alcanzado en el mismo mes del 2010. Mientras que, decreció en 0,8% respecto al mes de agosto de 2011.

Para el periodo enero-setiembre la producción acumulada de agua potable totalizó 863 millones 504 mil 500 metros cúbicos, cifra que creció en 0,1% respecto a igual periodo acumulado de 2010 (862 millones 343 mil 700 metros cúbicos).

Cuadro N° 34
Perú: Volumen mensual de producción de agua potable, 2008-2011
 (Miles de m³)


Mes	2008	2009	2010	2011 P/	Variación %	Respecto al mes anterior
					2011/2010	
Enero	96 427,1	99 672,4	99 121,1	99 625,8	0,5	1,6
Febrero	91 562,2	91 064,7	92 163,5	92 345,2	0,2	-7,3
Marzo	97 739,6	100 177,7	102 356,2	101 594,4	-0,7	10,0
Abril	93 836,2	96 255,7	97 526,0	97 314,6	-0,2	-4,2
Mayo	93 120,9	96 575,4	97 845,8	98 221,0	0,4	0,9
Junio	87 460,6	90 573,9	93 071,6	93 820,9	0,8	-4,5
Julio	91 541,1	91 910,5	93 804,8	94 407,8	0,6	0,6
Agosto	90 076,2	92 807,5	94 198,5	93 453,9	-0,8	-1,0
Setiembre	89 780,8	90 909,7	92 256,2	92 720,9	0,5	-0,8
Octubre	93 948,8	94 730,2	95 040,2			
Noviembre	92 666,6	93 732,3	95 476,0			
Diciembre	96 872,8	98 516,0	98 060,6			
Enero-setiembre	831 544,7	849 947,5	862 343,7	863 504,5	0,1	

Nota: La información corresponde a 22 empresas prestadoras de servicio de saneamiento.

P/ Preliminar

Fuente: Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento.

Gráfico N° 34
Perú: Volumen mensual de producción de agua potable, 2008-2011
(Miles de m³)



Nota: La información corresponde a 22 empresas prestadoras de servicio de saneamiento.
Fuente: Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento.

3.2 Producción de agua potable en Lima Metropolitana

La producción de agua potable en Lima Metropolitana en octubre de 2011, alcanzó 55 millones 995 mil 900 metros cúbicos lo que en términos porcentuales representó una disminución de 0,2% en relación al volumen observado en el mismo mes de 2010, que fue de 56 millones 118 mil 300 metros cúbicos, como resultado de la menor actividad en las plantas de tratamiento. En tanto que, el volumen de producción con respecto al mes anterior (setiembre 2011) creció en 4,2%.


En lo que va del año para el periodo acumulado enero-octubre 2011, la producción de agua potable alcanzó los 569 millones 360 mil 400 metros cúbicos que comparado con el acumulado enero-octubre 2010 tuvo un incremento de 0,5% en la producción de agua.

Cuadro N° 35
Lima Metropolitana: Producción mensual de agua potable, 2008-2011
(Miles de m³)

Mes	2008	2009	2010	2011	Variación %	
					2011/2010	Respecto al mes anterior
Enero	57 453,0	59 658,9	58 610,8	60 666,0	3,5	2,4
Febrero	55 212,6	54 884,2	55 324,2	56 277,0	1,7	-7,2
Marzo	58 962,8	60 348,0	61 869,3	62 230,0	0,6	10,6
Abril	56 744,8	57 691,8	58 586,5	58 628,2	0,1	-5,8
Mayo	54 695,1	57 373,7	57 457,1	58 396,0	1,6	-0,4
Junio	50 875,9	52 710,6	54 275,4	54 788,0	0,9	-6,2
Julio	54 068,9	53 638,7	54 461,0	54 521,5	0,1	-0,5
Agosto	52 698,2	54 333,4	55 323,6	54 129,6	-2,2	-0,7
Setiembre	52 167,2	53 173,8	54 256,0	53 728,2	-1,0	-0,7
Octubre	54 402,3	55 340,0	56 118,3	55 995,9	-0,2	4,2
Noviembre	53 909,6	54 919,0	55 311,0			
Diciembre	57 558,4	57 532,1	59 226,0			
Enero-octubre	547 280,8	559 153,1	566 282,2	569 360,4	0,5	

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Gráfico N° 35
Lima Metropolitana: Volumen mensual de producción de agua potable, 2008-2011
 (Miles de m³)



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)

4. Caudal de los ríos

4.1 Caudal de los ríos en Lima Metropolitana

4.1.1 Caudal del río Rímac

El Servicio Nacional de Meteorología (SENAMHI) informa que el caudal promedio del río Rímac en el mes de octubre del año en curso alcanzó a 23,8 metros cúbicos por segundo (m³/s), cifra que representó una disminución de 1,2%, respecto


a octubre de 2010. Pero, al compararlo tanto con el mes anterior y el promedio histórico no mostró variación alguna en ambos casos.

Cuadro N° 36
Lima Metropolitana: Comportamiento del caudal promedio del río Rímac, 2009-2011
 (m³/s)

Mes	Promedio histórico	Media 2009	Media 2010	Media 2011	Variación %		
					2011/2010	Respecto al mes anterior	Media 2011/ Promedio histórico
Enero	44,2	38,9	53,6	40,2	-25,0	29,7	-9,0
Febrero	53,7	69,0	49,7	53,5	7,6	33,1	-0,4
Marzo	64,4	71,4	64,3	55,6	-13,5	3,9	-13,7
Abril	47,7	46,8	42,5	58,6	37,9	5,4	22,9
Mayo	26,5	19,9	23,3	32,6	39,9	-44,4	23,0
Junio	22,7	18,8	17,6	27,4	55,7	-16,0	20,7
Julio	21,6	18,3	17,1	34,8	103,5	27,0	61,1
Agosto	23,0	19,3	16,2	24,9	53,7	-28,4	8,3
Setiembre	23,7	20,6	24,4	23,8	-2,5	-4,4	0,4
Octubre	23,8	20,8	24,1	23,8 P/	-1,2	0,0	0,0
Noviembre	26,1	29,5	23,1				
Diciembre	30,8	38,8	31,0				

P/ Preliminar.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) Estación Hidrológica de Chosica R2.



4.1.2 Caudal del río Chillón

En octubre de 2011 el SENAMHI informó que el caudal promedio del río Chillón alcanzó 2,7 metros cúbicos por segundo (m³/s), lo que en términos porcentuales representó un incremento de 12,5% respecto a lo observado en octubre

de 2010. Mientras que, disminuyó en 6,9% respecto al mes anterior (setiembre 2011) y en 10,0% en relación a su promedio histórico.

Cuadro N° 37
Lima Metropolitana: Comportamiento del caudal promedio del río Chillón, 2009-2011
(m³/s)

Mes	Promedio histórico	Media 2009	Media 2010	Media 2011	Variación %		
					2011/2010	Respecto al mes anterior	Media 2011/ Promedio histórico
Enero	7,6	7,3	16,4	13,3	-18,9	72,7	75,0
Febrero	10,4	17,3	10,2	15,4	51,0	15,8	48,1
Marzo	11,2	16,1	15,8	14,1	-10,8	-8,4	25,9
Abril	7,2	13,8	10,0	13,7	37,0	-2,8	90,3
Mayo	3,2	4,0	3,2	3,6	12,5	-73,7	12,5
Junio	2,2	2,6	2,1	1,8	-14,3	-50,0	-18,2
Julio	1,8	1,9	2,0	1,7	-15,0	-5,6	-5,6
Agosto	1,8	1,6	1,9	1,9	0,0	11,8	5,6
Setiembre	2,1	1,7	2,6	2,9	11,5	52,6	38,1
Octubre	3,0	3,6	2,4	2,7 P/	12,5	-6,9	-10,0
Noviembre	3,6	7,0	2,5				
Diciembre	5,1	11,4	7,7				

P/ Preliminar.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), Estación Hidrológica de Obrajillo.

4.2 Caudal de los ríos, según vertiente

La información que a continuación detallamos muestra el comportamiento de los caudales promedio de los principales ríos del país que integran las tres vertientes hidrológicas: i) Océano Pacífico, ii) Océano Atlántico y iii) Lago Titicaca.

4.2.1 Caudal de los ríos de la Vertiente del Pacífico

4.2.1.1 Zona Norte

El caudal promedio de los principales ríos que conforman la zona norte de la Vertiente del Pacífico en octubre de 2011 alcanzó 19,63 m³/s. Los ríos de esta vertiente presentan un incremento de 21,5%, respecto a lo registrado en octubre

de 2010; mientras que, disminuyó en 7,1% al comparar con lo obtenido en setiembre de 2011. También disminuyó en 6,1% respecto al promedio histórico de los meses de octubre (20,9 m³/s).

Cuadro N° 38
Perú: Comportamiento promedio del caudal de los ríos de la zona norte de la vertiente del Océano Pacífico, 2009-2011 (m³/s)


Mes	Promedio histórico	Media 2009	Media 2010	Media 2011	Variación %		
					2011/2010	Respecto al mes anterior	Media 2011/ Promedio histórico
Enero	64,53	104,76	42,25	57,90	37,0	173,6	-10,3
Febrero	145,43	236,41	114,91	162,60	41,5	180,8	11,8
Marzo	226,20	278,68	161,15	72,34	-55,1	-55,5	-68,0
Abril	173,05	148,65	146,78	205,95	40,3	184,7	19,0
Mayo	88,40	116,50	93,20	68,05	-27,0	-67,0	-23,0
Junio	51,83	61,10	51,68	40,10	-22,4	-41,1	-22,6
Julio	35,95	51,34	31,62	36,43	15,2	-9,2	1,3
Agosto	24,30	32,84	23,72	18,88	-20,4	-48,2	-22,3
Setiembre	16,65	27,86	21,17	21,13	-0,2	11,9	26,9
Octubre	20,90	22,00	16,15	19,63 P/	21,5	-7,1	-6,1
Noviembre	23,18	23,00	16,53				
Diciembre	38,57	38,56	21,16				

Comprende los ríos: Tumbes, Chira, Macará, Chancay y Jequetepeque. A partir de setiembre del 2009 no se incluye información de Jequetepeque.

P/ Preliminar.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

Gráfico N° 37
Perú: Caudal promedio de los ríos de la zona norte, 2009-2011 (m³/s)



Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

4.2.1.2 Zona Centro

El comportamiento hidrológico promedio en la zona centro de la Vertiente del Pacífico (ríos Rímac y Chillón) durante el mes de octubre de 2011, alcanzó 13,25 m³/s, cifra que no tuvo variación alguna respecto a lo reportado en octubre de

2010. En relación al mes anterior (setiembre 2011) decreció en 0,8%; igualmente, disminuyó en 1,2%, respecto al promedio histórico.

Cuadro N° 39
Perú: Comportamiento promedio del caudal de los ríos de la zona centro de la vertiente del Océano Pacífico, 2009-2011 (m³/s)

Mes	Promedio histórico	Media 2009	Media 2010	Media 2011	Variación %		
					2011/2010	Respecto al mes anterior	Media 2011/ Promedio histórico
Enero	25,90	22,10	35,00	26,75	-23,6	38,2	3,3
Febrero	32,05	43,13	29,95	34,45	15,0	28,8	7,5
Marzo	37,80	43,75	40,05	34,85	-13,0	1,2	-7,8
Abril	27,45	29,38	26,26	36,15	37,7	3,7	31,7
Mayo	14,85	12,30	13,23	18,10	36,8	-49,9	21,9
Junio	12,45	10,70	9,83	14,60	48,5	-19,3	17,3
Julio	11,70	10,05	9,55	18,25	91,1	25,0	56,0
Agosto	12,40	10,44	9,05	13,40	48,1	-26,6	8,1
Setiembre	12,92	11,13	13,25	13,36	0,8	-0,3	3,4
Octubre	13,41	12,20	13,25	13,25 P/	0,0	-0,8	-1,2
Noviembre	14,85	18,26	12,80				
Diciembre	17,95	25,10	19,35				

Comprende los ríos: Chillón y Rímac.

P/ Preliminar.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

4.2.1.3 Zona Sur

El caudal promedio en la Vertiente del Pacífico en octubre de 2011 registró 17,70 m³/s, cifra menor en 25,0% respecto a octubre de 2010. Asimismo, dicho caudal disminuyó en

7,3% en relación al mes setiembre de 2011. No obstante, se incrementó en 185,5% comparado a su promedio histórico (6,20 m³/s).

Cuadro N° 40
Perú: Comportamiento promedio del caudal de los ríos de la zona sur de la vertiente del Océano Pacífico, 2009-2011 (m³/s)

Mes	Promedio histórico	Media 2009	Media 2010	Media 2011	Variación %		
					2011/2010	Respecto al mes anterior	Media 2011/ Promedio histórico
Enero	102,60	19,90	43,34	72,20	66,6	170,4	-29,6
Febrero	192,60	44,34	130,20	338,90	160,3	369,4	76,0
Marzo	183,30	81,61	94,56	159,70	68,9	-52,9	-12,9
Abril	99,80	29,60	41,60	167,80	303,4	5,1	68,1
Mayo	49,70	18,30	30,80	73,70	139,3	-56,1	48,3
Junio	41,30	16,65	38,45	28,55	-25,7	-61,3	-30,9
Julio	23,35	15,55	33,56	21,65	-35,5	-24,2	-7,3
Agosto	21,70	15,10	30,60	19,40	-36,6	-10,4	-10,6
Setiembre	19,95	14,15	28,80	19,10	-33,7	-1,5	-4,3
Octubre	6,20	14,05	23,60	17,70 P/	-25,0	-7,3	185,5
Noviembre	23,70	13,60	19,60				
Diciembre	27,50	13,55	26,70				

Nota: La información incluye el caudal del río Camaná.

P/ Preliminar.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

4.2.2 Nivel de los ríos de la vertiente del Atlántico

4.2.2.1 Selva Norte

El nivel promedio de los ríos de la selva norte (Amazonas y Nanay) en octubre de 2011, alcanzó 110,45 (m.s.n.m.) metros sobre el nivel del mar, cifra que se incrementó en 3,3% respecto a igual mes de 2010. Asimismo, aumentó en

2,2% al compararlo con setiembre 2011. Mientras que, se redujo en 0,2%, en relación a su promedio histórico (110,70 m.s.n.m.).

Cuadro N° 41
Perú: Comportamiento promedio del nivel de los ríos de la Selva Norte de la vertiente del Atlántico, 2009-2011
(m.s.n.m.)

Mes	Promedio histórico	Media 2009	Media 2010	Media 2011	Variación %		
					2011/2010	Respecto al mes anterior	Media 2011/ Promedio histórico
Enero	113,83	113,15	113,08	111,43	-1,5	1,0	-2,1
Febrero	114,38	115,68	113,90	112,45	-1,3	0,9	-1,7
Marzo	115,46	116,40	114,30	114,30	0,0	1,6	-1,0
Abril	116,38	116,84	115,28	116,58	1,1	2,0	0,2
Mayo	116,52	117,40	115,34	116,95	1,4	0,3	0,4
Junio	114,65	116,20	113,06	115,31	2,0	-1,4	0,6
Julio	112,60	113,93	110,57	113,15	2,3	-1,9	0,5
Agosto	110,45	111,60	106,89	109,30	2,3	-3,4	-1,0
Setiembre	109,75	110,23	107,24	108,10	0,8	-1,1	-1,5
Octubre	110,70	110,60	106,94	110,45 P/	3,3	2,2	-0,2
Noviembre	112,32	109,92	108,70				
Diciembre	113,39	114,25	110,32				

Nota: La unidad de medida de variación del nivel de agua del río está expresada en metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.).

Comprende los ríos: Amazonas y Nanay.

P/ Preliminar.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

4.2.2.2 Selva Central

En el mes de análisis el nivel promedio de los ríos de la selva central fue de 4,94 metros, cifra superior en 11,5%, respecto a lo obtenido en octubre de 2010. Asimismo, se

incrementó en 24,7% en relación al mes de setiembre 2011. Mientras que, disminuyó 2,4% respecto a su promedio histórico.

Cuadro N° 42
Perú: Comportamiento promedio del nivel de los ríos de la Selva Central de la vertiente del Atlántico 2009-2011
(Metros)

Mes	Promedio histórico	Media 2009	Media 2010	Media 2011	Variación %		
					2011/2010	Respecto al mes anterior	Media 2011/ Promedio histórico
Enero	7,62	7,14	7,25	6,85	-5,5	7,0	-10,1
Febrero	7,94	7,62	7,65	7,69	0,5	12,3	-3,1
Marzo	8,19	7,84	7,66	7,82	2,1	1,7	-4,5
Abril	8,15	7,91	7,50	7,95	6,0	1,7	-2,5
Mayo	7,54	7,51	6,84	7,43	8,6	-6,5	-1,5
Junio	6,59	6,63	5,92	6,17	4,2	-17,0	-6,4
Julio	5,88	7,50	5,05	5,50	8,9	-10,9	-6,5
Agosto	5,23	6,71	4,37	4,88	11,7	-11,3	-6,7
Setiembre	5,35	6,32	4,30	3,96	-7,9	-18,9	-26,0
Octubre	5,06	6,79	4,43	4,94 P/	11,5	24,7	-2,4
Noviembre	6,78	5,90	5,46				
Diciembre	7,30	7,85	6,40				

Nota: La unidad de medida de variación del nivel de agua del río está expresada en metros (m).

Comprende los ríos: Huallaga, Ucayali, Tocache, Aguaytia y Mantaro. El periodo de julio-octubre del 2009 no incluye el caudal del río Mantaro.

P/ Preliminar.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

4.2.3 Caudal de los ríos de la Vertiente del Lago Titicaca

El caudal promedio de los principales ríos que conforman la Vertiente del Lago Titicaca (Ramis, Huancané, Coata e Ilave) en octubre de 2011 alcanzó 10,30 m³/seg, cifra superior en

165,5% respecto a octubre de 2010. Igualmente, aumentó en 159,4% en relación a lo registrado en setiembre de 2011 y en 60,2% al compararlo con su promedio histórico.

Cuadro N° 43
Perú: Comportamiento promedio del caudal de los ríos de la vertiente del Lago Titicaca 2009-2011
(m³/s)

Mes	Promedio histórico	Media 2009	Media 2010	Media 2011	Variación %		
					2011/2010	Respecto al mes anterior	Media 2011/ Promedio histórico
Enero	81,98	44,88	84,24	27,33	-67,6	67,2	-66,7
Febrero	114,10	52,12	113,68	168,30	48,0	515,8	47,5
Marzo	103,73	90,11	86,13	145,38	68,8	-13,6	40,2
Abril	56,35	41,40	37,65	97,40	158,7	-33,0	72,8
Mayo	21,45	21,20	11,29	32,88	191,2	-66,2	53,3
Junio	10,18	11,30	6,66	11,73	76,1	-64,3	15,2
Julio	7,78	7,76	4,48	7,18	60,3	-38,8	-7,7
Agosto	6,63	5,79	3,23	4,78	48,0	-33,4	-27,9
Setiembre	5,73	5,10	2,60	3,97	52,7	-16,9	-30,7
Octubre	6,43	3,78	3,88	10,30 P/	165,5	159,4	60,2
Noviembre	10,43	6,42	3,73				
Diciembre	21,05	25,40	16,35				


Nota: La información de julio del 2009 no incluye Coata.

Comprende los ríos: Ramis, Huancané, Coata e Ilave.

P/ Preliminar.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

Gráfico N° 38
Perú: Caudal promedio de los ríos de la vertiente del Lago Titicaca, 2009-2011
(m³/s)



Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

5. Emergencias y daños producidos por fenómenos naturales y antrópicos

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) reporta que las emergencias ocurridas en el mes de octubre de 2011 en el territorio nacional totalizan 251 ocurrencias, las mismas que

provocaron 5 mil 85 damnificados, 3 mil 759 viviendas afectadas, 359 viviendas destruidas y 20 hectáreas de cultivo destruidas.


Cuadro N° 44
Perú: Emergencias y daños producidos a nivel nacional, octubre 2009-2011

Periodo	N° de emergencias P/	N° de damnificados P/	N° de viviendas afectadas P/	N° de viviendas destruidas P/	Hectáreas de cultivo destruidas P/
2009					
Enero	495	3 132	5 375	903	39
Febrero	478	2 662	5 573	504	4
Marzo	569	5 713	16 178	1 248	86
Abril	381	6 470	24 716	1 356	46
Mayo	208	1 357	232	240	82
Junio	264	884	2 128	178	-
Julio	296	744	984	148	-
Agosto	275	1 074	276	221	-
Setiembre	247	1 457	2 695	312	-
Octubre	326	3 444	2 013	552	6
Noviembre	293	2 328	1 040	468	4
Diciembre	205	2 313	1 251	494	9
2010 P/					
Enero	810	33 837	11 607	5 034	4 019
Febrero	607	10 507	14 692	2 175	1 296
Marzo	426	4 699	3 445	941	46
Abril	298	2 813	3 166	567	144
Mayo	202	1 026	3 197	231	-
Junio	239	4 658	279	202	-
Julio	344	1 445	997	311	25
Agosto	377	3 919	1 242	599	-
Setiembre	348	4 046	1 437	827	10
Octubre	307	4 106	3 213	691	13
Noviembre	406	2 000	712	428	83
Diciembre	171	1 368	608	263	-
2011 P/					
Enero	375	10 202	8 188	1 965	2 331
Febrero	762	73 463	43 442	14 717	17 094
Marzo	572	19 274	11 056	3 891	1 648
Abril	402	59 397	15 400	1 239	2 029
Mayo	264	1 611	829	144	206
Junio	306	1 574	2 316	202	26
Julio	270	1 751	904	207	434
Agosto	337	2 366	1 437	314	5
Setiembre	279	3 009	815	438	28
Octubre	251	5 085	3 759	359	20
Variación porcentual					
Respecto al mes anterior	-10,0	69,0	361,2	-18,0	-28,6
Respecto a similar mes del año anterior	-18,2	23,8	17,0	-48,0	53,8

P/ Preliminar.

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

Gráfico N° 39
Perú: Emergencias producidas a nivel nacional, 2008-2011



Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)

En el mes de octubre el INDECI registró 19 personas fallecidas y 30 personas heridas. El número de personas afectadas asciende a 17 mil 300 personas y la población con mayor número de afectados se localizó en: Ica (13 mil 239 personas). Asimismo, los departamentos de: Cajamarca (948 personas), San Martín (918 personas), Ayacucho (737

personas) y Loreto (660 personas). El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) define como persona afectada a toda persona que ha perdido parte de su medio de supervivencia o que sufre perturbación en su ambiente por efectos de un fenómeno natural o inducido por el hombre.

Cuadro N° 45

Perú: Emergencias, fallecidos, desaparecidos, heridos, damnificados, afectados, viviendas afectadas, viviendas destruidas y hectáreas de cultivo destruidas a nivel nacional, según departamento, octubre 2011


Departamento	Total de emergencias P/	N° de fallecidos P/	N° de desaparecidos P/	N° de heridos P/	N° de damnificados P/	N° de afectados P/	N° de viviendas afectadas P/	N° de viviendas destruidas P/	Hectáreas de cultivo destruidas P/
Total	251	19	-	30	5 085	17 300	3 759	359	20
Amazonas	3	-	-	-	6	-	-	-	-
Apurímac	21	2	-	-	174	144	34	27	-
Arequipa	1	4	-	-	-	-	-	-	-
Ayacucho	33	-	-	1	667	737	126	123	-
Cajamarca	7	-	-	-	-	948	49	1	-
Callao	2	-	-	1	9	3	1	3	-
Cusco	30	-	-	-	247	50	23	25	20
Huancavelica	3	-	-	-	9	20	9	-	-
Huánuco	2	-	-	-	-	67	8	2	-
Ica	21	2	-	6	2 846	13 239	3 028	25	-
Junín	3	-	-	-	15	-	-	-	-
La Libertad	1	-	-	-	11	-	-	-	-
Lambayeque	3	-	-	-	8	-	1	2	-
Lima	26	3	-	-	334	104	28	9	-
Loreto	29	-	-	-	283	660	122	61	-
Pasco	7	-	-	1	-	1	3	6	-
Piura	14	-	-	3	177	9	2	41	-
Puno	12	7	-	18	152	393	94	6	-
San Martín	28	1	-	-	134	918	229	25	-
Tacna	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tumbes	2	-	-	-	-	7	2	-	-
Ucayali	2	-	-	-	13	-	-	3	-

P/ Preliminar.

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

Las mayores emergencias se reportaron en los departamentos de Ayacucho (33), Cusco (30), Loreto (29), San Martín (28), Lima (26), Apurímac (21), Ica (21), Piura 14 y Puno (12). También se produjeron emergencias en Cajamarca (7) y Pasco (7). Asimismo, Amazonas, Huancavelica, Junín y Lambayeque registraron 3

emergencias en cada departamento, respectivamente. En menor proporción se registraron emergencias en el Callao, Huánuco, Tumbes, y Ucayali en los que se registró 2 emergencias en cada uno respectivamente. Finalmente en Arequipa, La Libertad y Tacna se presentaron 1 emergencia por cada uno.



El INDECI informa que las principales emergencias que fueron ocasionados por fenómenos naturales sucedidos en el mes de octubre, son a causa de vendavales (61 emergencias), sismo (20), lluvia (17) e inundación (6) entre


otros. Asimismo, las emergencias ocasionadas por la intervención del hombre fueron: Incendio urbano (105), colapso de viviendas (7), incendio forestal (5) y explosión (4).

Cuadro N° 46
Perú: Emergencias y daños producidos a nivel nacional, según tipo de fenómeno, octubre 2011

Tipo de fenómeno	Total	%	Fallecidos	Desaparecidos	Heridos	Has. de Cultivo
	Emergencias		P/	P/	P/	P/
Total	251	100,0	19	-	30	20
Fenómenos naturales	130	51,8	5	-	1	20
Vendavales (Vientos fuertes)	61	24,3	-	-	-	-
Sismos	20	7,9	-	-	-	-
Precipitaciones - Lluvia	17	6,8	-	-	-	-
Inundación	6	2,4	-	-	-	20
Derrumbe	5	2,0	-	-	-	-
Deslizamiento	5	2,0	4	-	-	-
Helada	5	2,0	-	-	-	-
Otros fenómenos naturales	5	2,0	-	-	-	-
Lloclla (Huayco)	3	1,2	1	-	1	-
Precipitaciones - Granizo	2	0,8	-	-	-	-
Tormenta eléctrica	1	0,4	-	-	-	-
Fenómenos antrópicos	121	48,2	14	-	29	-
Incendio urbano	105	41,8	7	-	11	-
Colapso de viviendas	7	2,8	-	-	-	-
Incendio forestal	5	2,0	-	-	-	-
Explosión	4	1,6	7	-	18	-


P/ Preliminar.

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).




Los damnificados a nivel nacional fueron 5 mil 85 personas, siendo Ica el departamento que registra el mayor número de damnificados representando el 56,0% del total nacional; seguido por el departamento de Ayacucho (667 personas) que representa el 13,1%, Lima (334 personas) fue el 6,6%, Loreto (283 personas) con el 5,6% y Cusco (247 personas) con el 4,9%. INDECI define como damnificado a la persona que ha sido afectada parcial o íntegramente

por una emergencia o desastre y que ha sufrido daño o perjuicio a su salud o en sus bienes, en cuyo caso, generalmente ha quedado sin alojamiento o vivienda en forma total o parcial, permanente o temporalmente, por lo que recibe refugio y ayuda humanitaria temporal y además no tiene capacidad propia para recuperar el estado de sus bienes y patrimonio.



Para el mes de octubre de 2011 el INDECI, reporta 359 viviendas destruidas a nivel nacional, observándose que los departamentos con mayor número de viviendas

destruidas son: Ayacucho (123), Loreto (61), Piura (41) y Apurímac (27). Igualmente, Cusco, Ica y San Martín tuvieron 25 viviendas destruidas en cada departamento.



6. Fenómenos meteorológicos

6.1 Heladas

El territorio peruano tiene una configuración geográfica especial, debido a la presencia de la Cordillera de los Andes que posee una influencia significativa en las variaciones de la temperatura del aire, dando lugar a una variedad de climas. Entre estas variaciones de la temperatura, encontramos las que se registran en ciertos lugares del país con temperaturas bajo cero grados centígrados, comúnmente llamadas heladas y que se encuentran con mayor frecuencia en ciertos lugares de la sierra con alturas generalmente sobre los 3 mil metros sobre el nivel del mar, coincidente con la hora de la temperatura mínima del día, normalmente en la madrugada. Los impactos que tienen las heladas en las actividades económicas, especialmente en el agro, así como sus repercusiones en el área social y ambiental, son significativos.

Según información de 18 estaciones de monitoreo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), los mayores días de heladas meteorológicas (31 días) en el departamento de Arequipa se presentaron

en las estaciones de Pillones, Imata y Salinas, en tanto que la estación de Caylloma reportó 29 días.

En el departamento de Puno se reportaron 31 días de heladas en las estaciones de Crucero Alto y Capazo. También se registraron mayor frecuencia de días con heladas en las estaciones de Cojata (26), Lagunillas (26), Mazo Cruz (25), Macusani (19) y Desaguadero (12). Mientras que menor número de días tuvo la estación de Cabanillas (1).

Igualmente, el departamento de Tacna tuvo 30 días de heladas verificadas en la estación de Chuapalca.

En el departamento del Cusco las estaciones de Anta y Sicuani reportaron 4 y 2 días de heladas respectivamente, mientras que en Junín en las estaciones de Marcapomacocha y La Oroya registraron 24 y 8 días de este fenómeno en cada estación. En la estación de La Victoria en el departamento de Cajamarca registró 5 días de heladas.

Gráfico N° 47

Perú: Departamentos que sufrieron heladas meteorológicas, octubre 2011

Departamento	Estación	Número de días de heladas P/	Frecuencia(%) días de heladas/Total días del mes
Arequipa	Imata	31	100,0
Arequipa	Pillones	31	100,0
Arequipa	Salinas	31	100,0
Arequipa	Caylloma	29	93,5
Cajamarca	La Victoria	5	16,1
Cusco	Anta	4	12,9
Cusco	Sicuani	2	6,5
Junín	Marcapomacocha	24	77,4
Junín	La Oroya	8	25,8
Puno	Capazo	31	100,0
Puno	Crucero Alto	31	100,0
Puno	Cojata	26	83,9
Puno	Lagunillas	26	83,9
Puno	Mazo Cruz	25	80,6
Puno	Macusani	19	61,3
Puno	Desaguadero	12	38,7
Puno	Cabanillas	1	3,2
Tacna	Chuapalca	30	96,8

P/ Preliminar.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

Las temperaturas más bajas se registraron en las estaciones de Chuapalca (-19,5 °C) en Tacna. Asimismo, en Mazo Cruz (-16,6 °C), Capazo (-15,0 °C), Crucero Alto (-11 °C) y Lagunillas (-10,8 °C) en Puno. Igualmente, en Imata (-15,0 °C), Pillones (-14,4 °C) y Salinas (-11,8 °C) en

Arequipa se registraron bajas temperaturas. En tanto que en las estaciones de La Oroya (-2,6 °C), Sicuani (-2,2 °C), Anta (-1,8 °C) y Cabanillas (-1,0 °C) presentaron este fenómeno meteorológico.

Gráfico N° 48


Perú: Intensidad de heladas meteorológicas, octubre 2011

Departamento	Estación	Mayor intensidad de la helada en grados Celsius (°C) P/
Tacna	Chuapalca	-19,5
Puno	Mazo Cruz	-16,6
Arequipa	Imata	-15,0
Puno	Capazo	-15,0
Arequipa	Pillones	-14,4
Arequipa	Salinas	-11,8
Puno	Crucero Alto	-11,0
Puno	Lagunillas	-10,8
Arequipa	Caylloma	-8,6
Puno	Macusani	-6,0
Puno	Cojata	-5,0
Junín	Marcapomacocha	-4,6
Cajamarca	La Victoria	-4,2
Puno	Desaguadero	-4,0
Junín	La Oroya	-2,6
Cusco	Sicuani	-2,2
Cusco	Anta	-1,8
Puno	Cabanillas	-1,0

P/ Preliminar.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

Gráfico N° 44
Perú: Altitud de las estaciones meteorológicas reportadas, octubre, 2011
(m.s.n.m.)



a/ Huancavelica.

b/ Cajamarca.

Metros sobre el nivel del mar: m.s.n.m.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)

Ficha Técnica

1. Objetivo del Informe Técnico

Mostrar las variaciones en el corto plazo de las estadísticas ambientales provenientes de las diferentes Instituciones Gubernamentales dedicadas al estudio y protección del medio ambiente, a fin de apoyar en la toma de decisiones para el desarrollo sostenible.

2. Cobertura: Nacional y Área Metropolitana de la Provincia de Lima.

3. Periodicidad: Mensual

4. Fuente

Registros administrativos y reportes de monitoreos desarrollados por las entidades públicas sobre estadísticas ambientales.

5. Entidades Informantes

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL S.A.) y para el resto del país, las empresas prestadoras de servicio de saneamiento, información recopilada por las Oficinas Departamentales del INEI:

EMUSAP S.R.L. Amazonas (Amazonas), SEDA Chimbote S.A. (Áncash), EMUSAP S.A. Abancay (Apurímac), EPS SEDAPAR S.A. (Arequipa), EPS Ayacucho S.A. (Ayacucho), EPS SEDACAJ S.A. Cajamarca (Cajamarca), SEDA Cusco S.A.A. (Cusco), EMAPA Huancavelica (Huancavelica), SEDA-Huánuco (Huánuco), EMAPICA Ica (Ica), SEDAM Huancayo S.A. (Junín), SEDALIB S.A. -

Trujillo (La Libertad), EPSEL S.A. (Lambayeque), EPS SEDALORETO S.A. (Loreto), EMAPA Tambopata (Madre de Dios), EPS Moquegua S.A. (Moquegua), EPS GRAU (Piura), EMSA (Puno), SEDA Juliaca (Puno), EMAPA Yunguyo (Puno), EPS Moyobamba (San Martín), EMAPA S.A. (San Martín), EMFAPA Tumbes (Tumbes) y EMAPACOP S.A. (Ucayali).

6. Variables de Seguimiento

Las variables de seguimiento para el Área Metropolitana de Lima, son: Producción de agua y calidad de agua.

Las variables de seguimiento para el nivel nacional están constituidas por: Volumen de producción de agua potable, caudal promedio de los ríos de las vertientes del Océano Pacífico, Atlántico y Lago Titicaca, precipitaciones pluviales promedio en las cuencas de las vertientes del Océano Pacífico, Atlántico y Lago Titicaca. Finalmente, se incluye información referida a emergencias y daños producidos por fenómenos naturales y antrópicos.

7. Tratamiento de la Información

Se identifica la información estadística proveniente de registros administrativos o estaciones de monitoreo, generados en las instituciones públicas, que estén disponibles fácilmente, documentados y sean actualizados regularmente.

Esta información es requerida oficialmente a las diversas instituciones y luego de un proceso de análisis y consistencia es presentada en cuadros, acompañados de gráficos y breves comentarios que ayuden a una mejor interpretación de las cifras.

Créditos

Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento - EPSs

Equipo de Planeamiento Operativo y Financiero.

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL

Dirección General de Hidrología y Recursos Hídricos.

Dirección de Climatología.

Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI

Oficina de Estadística y Telemática.

Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI