

El Instituto Nacional de Estadística e Informática, presenta el Informe Técnico de Estadísticas Ambientales, correspondiente al mes de junio 2019. El informe es de periodicidad mensual y se elabora desde junio de 2004, su finalidad es proporcionar estadísticas e indicadores, para contribuir con el monitoreo y seguimiento de las políticas públicas ambientales.

Las fuentes de información son los registros administrativos y estudios realizados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS).



## 1. RADIACIÓN ULTRAVIOLETA

El índice de radiación ultravioleta (IUV) es un indicador de la intensidad de la radiación ultravioleta relacionado con el riesgo a la salud. El IUV se publica como una recomendación conjunta entre la organización meteorológica mundial (OMM) y la organización mundial de la salud (OMS).


### 1.1 Índice de Radiación Ultravioleta IUV, según promedio mensual

#### GRÁFICO Nº 01

CIUDAD DE LIMA: ÍNDICE DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA, SEGÚN PROMEDIO MENSUAL

Mes: Junio 2019/ Junio 2018

Índice de radiación ultravioleta (IUV)



Nota: No se dispone de información para el mes de enero 2018 y marzo 2019.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) - Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El monitoreo por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) en la ciudad de Lima correspondiente al mes de junio 2019 fue de un índice mínimo para la salud, el cual fue 2 del nivel de radiación ultravioleta (UV-B). El índice aumentó en 100% en comparación con similar mes del año anterior que fue 1.

#### Créditos

Econ. José García Zanabria  
Jefe(e) del INEI

Dr. Anibal Sánchez Aguilar  
Subjefe de Estadística

José Robles Franco  
Director Nacional de  
Cuentas Nacionales

Maximo Fajardo Castillo  
Director Nacional Adjunto  
de Cuentas Nacionales

Javier Vásquez Chihuán  
Director Ejecutivo de  
Cuentas de Hogares

Investigadoras

Fanny Sumalave Velásquez  
Rosa Blas Alcantara


### 1.1.1 Índice de Radiación Ultravioleta IUV, según máximo mensual

#### GRÁFICO N° 02

CIUDAD DE LIMA: ÍNDICE DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA, SEGÚN MÁXIMO MENSUAL

Mes: Junio 2017-2019

Índice de radiación Ultravioleta (IUV)



El índice de radiación ultravioleta en la ciudad de Lima durante el mes de junio 2019, presentó un valor máximo mensual que fue de 4, considerado como un nivel de riesgo bajo para la salud.

En comparación con su valor máximo mensual del año anterior aumentó en 33,3%.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) - Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.  
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

### Medidas Preventivas contra efectos de la Radiación Ultravioleta

En nuestro país, con el objetivo de establecer medidas de prevención se emitió la Ley N° 30102, en este dispositivo se precisan medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar. Se establecen obligaciones específicas a los titulares de las instituciones y entidades públicas y privadas como:

- Informar y sensibilizar al personal sobre los riesgos por la exposición a la radiación ultravioleta y su forma de prevenirla.
- Disponer que las actividades que no se realicen en ambientes protegidos de la radiación ultravioleta se efectúen entre las 8:00 y 10:00 horas o a partir de las 16:00 horas.
- Disponer de accesorios de protección contra los rayos ultravioleta como sombreros, gorros, anteojos y bloqueadores solares, etc.
- Colocar carteles indicando “La exposición prolongada a la radiación solar produce daño a la salud”.
- Los centros educativos deben de contar con áreas protegidas contra la radiación ultravioleta para actividades al aire libre.

Nivel de Riesgo	Índice UV-B	Acciones de Protección
Mínimo	0	Ninguna
	1	
	2	
Bajo	3	Aplicar factor de protección solar
	4	
	5	
Moderado	6	Aplicar factor de protección solar, uso de sombrero
	7	
	8	
Alto	9	Aplicar factor de protección solar, uso de sombrero y gafas con filtro UV-A y B
	10	
	11	
Muy alto	12	Aplicar factor de protección solar, uso de sombrero y gafas con filtro UV-A y B
	13	
	14	
Extremo	> 14	Aplicar factor de protección solar, uso de sombrero y gafas con filtro UV-A y B. Exposiciones al sol por un tiempo limitado

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).



## 1.2 Calidad del aire en Lima Metropolitana



El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), mediante la Dirección de Proyectos de Desarrollo y Medio Ambiente, realiza la evaluación de las condiciones sinópticas y meteorológicas locales que influyen en el comportamiento temporal y espacial de los contaminantes atmosféricos particulados y gaseosos, medidos mediante métodos de muestreo pasivo y monitoreo automático en la cuenca atmosférica de Lima-Callao.

El Estándar de Calidad Ambiental (ECA) de aire es la medida que establece el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, que en su condición de cuerpo receptor no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni el ambiente. En el cuadro siguiente se presenta el ECA Nacional establecido, correspondiente a las concentraciones de material particulado y contaminantes gaseosos que son medidos por SENAMHI.

**ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL (ECAs) DE AIRE, SEGÚN CONTAMINANTES**  
Microgramos por metro cúbico ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )

CONTAMINANTE	FRECUENCIA	ECA AIRE (8 Jun 2017 - a la fecha)	ECA AIRE (2001 - 7 Jun 2017)
Material Particulado menor de 10 micras - $\text{PM}_{10}$	24 horas (día)	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Material Particulado menor de 2,5 micras - $\text{PM}_{2,5}$	24 horas (día)	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Dióxido de Azufre - $\text{SO}_2$	24 horas (día)	250 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Dióxido de Nitrógeno - $\text{NO}_2$	1 hora	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Ozono Superficial - $\text{O}_3$	8 horas	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Monóxido de Carbono - CO	1 hora	30,000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	30,000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Fuente: D.S N° 003-2017-MINAM (vigente), D.S N° 003-2008-MINAM (derogado) y D.S N° 074-2001-PCM (derogado).

El SENAMHI monitorea la calidad del aire en diez (10) estaciones, meteorológicas ubicadas en los distritos de Ate, San Borja, Jesús María (Campo de Marte), Santa Anita, Villa María del Triunfo, Huachipa, San Juan de Lurigancho (Universidad César Vallejo), San Martín de Porres, Carabayllo y Puente Piedra.

### Concentraciones de Material Particulado

La contaminación por partículas proviene de muchas fuentes diferentes. Las partículas finas (2,5 micrómetros de diámetro como máximo) provienen de centrales eléctricas, procesos industriales, tubos de escape de vehículos, cocinas a leña e incendios forestales. Las partículas gruesas (entre 2,5 y 10 micrómetros) provienen de operaciones de molienda y trituración, del polvo de las carreteras y de algunas operaciones agrícolas.

La contaminación del aire se asocia al aumento de la morbilidad y la mortalidad, principalmente debido a enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón, infecciones respiratorias agudas, asma y a los efectos nocivos en el embarazo. El parto prematuro (menos de 37 semanas de gestación) y el bajo peso al nacer (menos de 2,500 g) se han asociado con la exposición a la contaminación del aire. (Souza, 2015).

### 1.2.1 Concentraciones de Material Particulado

#### Partículas PM<sub>10</sub>

Son pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, ceniza, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera y cuyo diámetro aerodinámico es menor que 10 µm (1 micrómetro corresponde la milésima parte de 1 milímetro). Están formadas principalmente por compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales pesados entre otros, y material orgánico asociado a partículas de carbono (hollín).




Según los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), se debe indicar que para el mes de junio 2019 no se realizó el monitoreo del material particulado inhalable PM<sub>10</sub> en las estaciones de medición de San Borja, Huachipa, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Carabaylo y Puente Piedra.

#### ZONA LIMA NORTE

##### GRÁFICO N° 03

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DIARIA DE MATERIAL PARTICULADO INFERIOR A 10 MICRAS (PM<sub>10</sub>), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE SANTA ANITA – JUNIO 2019




µg/m³: Microgramo por metro cúbico. ECA: 100,0 µg/m³  
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.  
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

La estación de medición de Santa Anita registró valores superiores al ECA PM<sub>10</sub>. Se puede indicar que esta estación registra concentraciones altas en 2 días del mes de junio 2019. Los valores que sobrepasaron el límite permitido fueron 119,8 µg/m³ (9 de junio) y 113,7 µg/m³ (8 de junio).

#### ZONA LIMA CENTRO

##### GRÁFICO N° 04

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DIARIA DE MATERIAL PARTICULADO INFERIOR A 10 MICRAS (PM<sub>10</sub>), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE CAMPO DE MARTE – JUNIO 2019




µg/m³: Microgramo por metro cúbico. ECA: 100,0 µg/m³  
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.  
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

En la estación de medición de Campo de Marte se observaron niveles de concentración inferiores al límite permitido del PM<sub>10</sub>, es decir que los resultados no superaron el ECA permitido en los 30 días monitoreados. Estas concentraciones diarias registradas oscilaron entre 15,3 µg/m³ (12 de junio) y 73,7 µg/m³ (9 de junio) esta última fue la concentración más alta.

**ZONA LIMA SUR**

**GRÁFICO N° 05**

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DIARIA DE MATERIAL PARTICULADO INFERIOR A 10 MICRAS (PM<sub>10</sub>), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – JUNIO 2019




µg/m³: Microgramo por metro cúbico. ECA: 100,0 µg/m³  
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.  
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

La estación de medición de Villa María del Triunfo registró valores superiores al ECA PM<sub>10</sub>. Se puede indicar que esta estación registra concentraciones altas en 3 días del mes de junio 2019. Los valores más altos registrados fueron: 119,3 ug/m³ (2 de junio), 121,6 ug/m³ (8 de junio) y 114,6 ug/m³ (9 de junio).

**ZONA LIMA ESTE**

**GRÁFICO N° 06**

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DIARIA DE MATERIAL PARTICULADO INFERIOR A 10 MICRAS (PM<sub>10</sub>), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE ATE – JUNIO 2019



µg/m³: Microgramo por metro cúbico. ECA: 100,0 µg/m³  
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.  
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

En la estación de medición de Ate se registraron valores que superaron el límite permitido del ECA:PM<sub>10</sub>, en 10 días de los 14 días de análisis, estos valores que oscilaron entre 129,8 ug/m³ (17 de junio) a 305,7 ug/m³ (8 de junio).

### Partículas PM<sub>2,5</sub>


Es el material particulado con un diámetro aerodinámico inferior a 2.5 micras. Estas partículas son tan pequeñas que pueden ser detectadas solo con un microscopio electrónico, las fuentes de las partículas finas incluyen todo tipo de combustiones incluidas los vehículos automóviles, plantas de energía, quema residencial de madera, incendios forestales entre otros procesos industriales.

Según los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), se debe mencionar que para el mes de junio 2019 en las estaciones de monitoreo de San Borja, Santa Anita, Carabayllo y Puente Piedra no se realizó el monitoreo de las concentraciones del material particulado fino PM<sub>2,5</sub>.

### ZONA LIMA NORTE

#### GRÁFICO N° 07

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DIARIA DEL MATERIAL PARTICULADO INFERIOR A 2,5 MICRAS (PM<sub>2,5</sub>), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE SAN MARTÍN DE PORRES – JUNIO 2019




µg/m³: Microgramo por metro cúbico. ECA: 50,0 µg/m³  
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.  
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

Las concentraciones diarias de la partícula PM<sub>2,5</sub>, en la estación de monitoreo de San Martín de Porres no superó el límite de ECA PM<sub>2,5</sub>: 50,0 µg/m³ en los 30 días monitoreados. La concentración diaria más cercana al límite permitido se reflejó el 9 de junio (46,6 µg/m³).

### ZONA LIMA CENTRO

#### GRÁFICO N° 08

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DIARIA DEL MATERIAL PARTICULADO INFERIOR A 2,5 MICRAS (PM<sub>2,5</sub>), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE CAMPO DE MARTE – JUNIO 2019




µg/m³: Microgramo por metro cúbico. ECA: 50,0 µg/m³  
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.  
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

La concentración diaria de la partícula PM<sub>2,5</sub>, en la estación de monitoreo de Campo de Marte superó el límite de ECA PM<sub>2,5</sub>: 50,0 µg/m³ en 2 días de los 30 días monitoreados. Las concentraciones que superaron el límite permitido del ECA fueron: 66,9 µg/m³ (9 de junio) y 50,8 µg/m³ (8 de junio).

**ZONA LIMA SUR**

**GRÁFICO N° 09**

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DIARIA DEL MATERIAL PARTICULADO INFERIOR A 2,5 MICRAS (PM<sub>2,5</sub>), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – JUNIO



µg/m³: Microgramo por metro cúbico.

ECA: 50,0 µg/m³

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

La concentración diaria de la partícula PM<sub>2,5</sub> en la estación de monitoreo de Villa María del Triunfo ubicada en la zona sur de Lima superó en un día el límite de ECA PM<sub>2,5</sub>: 50,0 ug/m³. La concentración que superó fue de 50,0 ug/m³ (8 de junio).

**ZONA LIMA ESTE**

**GRÁFICO N° 10**

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DIARIA DEL MATERIAL PARTICULADO INFERIOR A 2,5 MICRAS (PM<sub>2,5</sub>), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE ATE – JUNIO 2019



µg/m³: Microgramo por metro cúbico.

ECA: 50,0 µg/m³


Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

La estación de medición de Ate superó el ECA PM<sub>2,5</sub>:50,0 ug/m³ en 13 días de los 21 días analizados. En los 13 días se registraron valores de concentración que se encontraron en el intervalo de 52,8 ug/m³ (14 de junio) a 137,5 ug/m³ (8 de junio).

**GRÁFICO N° 11**

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DIARIA DEL MATERIAL PARTICULADO INFERIOR A 2,5 MICRAS (PM<sub>2,5</sub>), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – JUNIO 2019




µg/m³: Microgramo por metro cúbico. ECA: 50,0 µg/m³  
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.  
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

La estación de medición de San Juan de Lurigancho superó el Estándar de Calidad Ambiental PM<sub>2,5</sub>. Se registraron máximos valores en 5 días de los 30 días monitoreados, estos valores que superaron el estandar oscilaron entre 51,2 ug/m³ (28 de junio) a 62,0 ug/m³ (8 de junio).

**GRÁFICO N° 12**

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DIARIA DEL MATERIAL PARTICULADO INFERIOR A 2,5 MICRAS (PM<sub>2,5</sub>), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE HUACHIPA – JUNIO 2019



µg/m³: Microgramo por metro cúbico. ECA: 50,0 µg/m³  
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.  
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

La estación de medición de Huachipa superó el Estándar de Calidad Ambiental PM<sub>2,5</sub>. Se registraron valores que superaron el ECA permitido en 7 días monitoreados de los 11 días analizados. Los valores que superaron el ECA permitido oscilaron entre 52,7 ug/m³ (11 de junio) a 126,6 ug/m³ (9 de junio).

## 1.2.2 Concentraciones de Contaminantes Gaseosos

### Dióxido de Azufre

El dióxido de azufre u óxido de azufre, es un gas incoloro con un característico olor asfixiante. Se trata de una sustancia reductora que, con el tiempo, el contacto con el aire y la humedad, se convierte en trióxido de azufre. La velocidad de esta reacción en condiciones normales es baja.


Según los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), para el mes de junio 2019 no se obtuvo información del contaminante gaseoso de dióxido de azufre (SO<sub>2</sub>) de las estaciones de monitoreo de Campo de Marte, Santa Anita, Carabayllo y Puente Piedra.



### ZONA LIMA NORTE

#### GRÁFICO N°13

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL DIÓXIDO DE AZUFRE (SO<sub>2</sub>), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE SAN MARTÍN DE PORRES – JUNIO 2019



µg/m³: Microgramo por metro cúbico.

ECA: 250,0 µg/m³

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

Las cifras registradas en la estación de monitoreo de San Martín de Porres no superaron el límite del ECA SO<sub>2</sub>, en los 17 días monitoreados. Las concentraciones del contaminante gaseoso de dióxido de azufre oscilaron entre 35,4 µg/m³ (1 de junio) a 37,4 µg/m³ (9 de junio).

### ZONA LIMA CENTRO

#### GRÁFICO N° 14

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL DIÓXIDO DE AZUFRE (SO<sub>2</sub>), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE SAN BORJA – JUNIO 2019



µg/m³: Microgramo por metro cúbico.

ECA: 250,0 µg/m³

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

Las cifras registradas en la estación de monitoreo de San Borja no superaron el límite del ECA SO<sub>2</sub> en los días monitoreados. Estas concentraciones del contaminante gaseoso de dióxido de azufre fueron: 3,2 µg/m³ (1 y 3 de junio), 3,1 µg/m³ (5 de junio), 3,0 µg/m³ (2 de junio) y 2,9 µg/m³ (4 de junio).

**ZONA LIMA SUR**

**GRÁFICO N°15**

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL DIÓXIDO DE AZUFRE (SO<sub>2</sub>), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – JUNIO 2019



µg/m³: Microgramo por metro cúbico.

ECA: 250,0 µg/m³

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

Las cifras registradas en la estación de monitoreo de Villa María del Triunfo no superaron el límite del ECA SO<sub>2</sub>: 250,0 ug/m<sup>3</sup>. Estas concentraciones oscilaron entre 17,1 ug/m<sup>3</sup> (18 de junio) a 29,0 ug/m<sup>3</sup> (8 de junio).

**ZONA LIMA SUR**

**GRÁFICO N° 16**

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL DIÓXIDO DE AZUFRE (SO<sub>2</sub>), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE ATE – JUNIO 2019



µg/m³: Microgramo por metro cúbico.

ECA: 250,0 µg/m³


Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

Las cifras registradas en la estación de monitoreo de Ate no superaron el límite del ECA SO<sub>2</sub>: 250,0 ug/m<sup>3</sup>. Estas concentraciones oscilaron entre 10,1 ug/m<sup>3</sup> (12 de junio) a 13,9 ug/m<sup>3</sup> (8 de junio).

**GRÁFICO N° 17**

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL DIÓXIDO DE AZUFRE (SO<sub>2</sub>), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – JUNIO 2019



µg/m³: Microgramo por metro cúbico.

ECA: 250,0 µg/m³


Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

En la estación de monitoreo de San Juan de Lurigancho las mediciones no superaron el Estándar de Calidad Ambiental SO<sub>2</sub>. Estas concentraciones del contaminante gaseoso de dióxido de azufre oscilaron entre 7,8 ug/m<sup>3</sup> (4 de junio) a 19,3 ug/m<sup>3</sup> (27 de junio).

**GRÁFICO N° 18**

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL DIÓXIDO DE AZUFRE (SO<sub>2</sub>), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE HUACHIPA – JUNIO 2019



µg/m³: Microgramo por metro cúbico.

ECA: 250,0 µg/m³

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

En la estación de monitoreo de Huachipa las mediciones no superaron el Estándar de Calidad Ambiental SO<sub>2</sub>. Estas concentraciones del contaminante gaseoso de dióxido de azufre oscilaron entre 21,1 ug/m<sup>3</sup> (5 de junio) a 48,0 ug/m<sup>3</sup> (9 de junio).

### Dióxido de Nitrógeno

El dióxido de nitrógeno u óxido de nitrógeno (NO<sub>2</sub>) es un compuesto químico formado por los elementos nitrógeno y oxígeno, uno de los principales contaminantes entre los varios óxidos de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno es de color marrón-amarillento. Se forma como subproducto en los procesos de combustión a altas temperaturas, como en los vehículos motorizados y las plantas eléctricas. Por ello es un contaminante frecuente en zonas urbanas.




Según los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) en el mes de junio 2019 para el Dióxido de Nitrógeno (NO<sub>2</sub>) se registraron concentraciones (ug/m<sup>3</sup>) en las estaciones de monitoreo de Ate, Villa María del Triunfo, Huachipa, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. La frecuencia del monitoreo es de 1 hora diaria en el mes.

#### ZONA LIMA NORTE

##### GRÁFICO N°19

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO<sub>2</sub>), EN LA ESTACIÓN DE SAN MARTÍN DE PORRES – JUNIO 2019



ug/m<sup>3</sup>: Microgramo por metro cúbico.

ECA: 200,0 ug/m<sup>3</sup>

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

En la estación de monitoreo de San Martín de Porres, se realizó la medición del dióxido de nitrógeno durante el mes de junio; al respecto tomando como referencia el máximo valor reportado en el periodo investigado; analizamos los valores alcanzados el día en que se registró la máxima concentración del compuesto químico el cual osciló entre 76,8 ug/m<sup>3</sup> a 156,8 ug/m<sup>3</sup>, siendo este último la máxima concentración reportado el 9 de junio a las 09:00 horas. Todos los valores diarios registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental.

#### ZONA LIMA SUR

##### GRÁFICO N° 20

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO<sub>2</sub>), EN LA ESTACIÓN DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – JUNIO 2019



ug/m<sup>3</sup>: Microgramo por metro cúbico.

ECA: 200,0 ug/m<sup>3</sup>

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

En la estación de monitoreo de Villa María del Triunfo, se realizó la medición del dióxido de nitrógeno durante el mes de junio; al respecto tomando como referencia el máximo valor reportado en el periodo investigado; analizamos los valores alcanzados el día en que se registró la máxima concentración del compuesto químico el cual osciló entre 3,0 ug/m<sup>3</sup> a 3,6 ug/m<sup>3</sup>, siendo este último la máxima concentración reportada el día 18 de junio a las 04:00 horas. Todos los valores diarios registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental.

**ZONA LIMA ESTE**

**GRÁFICO N° 21**

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO<sub>2</sub>), EN LA ESTACIÓN DE ATE – JUNIO 2019




µg/m³: Microgramo por metro cúbico. ECA: 200,0 µg/m³  
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.  
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

En la estación de monitoreo de Ate, se realizó la medición del dióxido de nitrógeno durante el mes de junio; al respecto tomando como referencia el máximo valor reportado en el periodo investigado; analizamos los valores alcanzados el día en que se registró la máxima concentración del compuesto químico el cual oscilo entre 59,6 µg/m³ a 160,9 µg/m³, siendo este último la máxima concentración reportada y se dio el 8 de junio a las 10:00 horas. Todos los valores diarios registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental.

**GRÁFICO N° 22**

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO<sub>2</sub>), EN LA ESTACIÓN DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – JUNIO 2019




µg/m³: Microgramo por metro cúbico. ECA: 200,0 µg/m³  
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.  
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

En la estación de monitoreo de San Juan de Lurigancho, se realizó la medición del dióxido de nitrógeno durante el mes de junio; al respecto tomando como referencia el máximo valor reportado en el periodo investigado; analizamos los valores alcanzados el día en que se registró la máxima concentración del compuesto químico el cual osciló entre 32,2 µg/m³ a 74,0 µg/m³, siendo este último la máxima concentración reportada el 8 de junio a las 11:00 horas. Todos los valores diarios registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental.

**GRÁFICO N° 23**

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO<sub>2</sub>), EN LA ESTACIÓN DE HUACHIPA – JUNIO 2019



µg/m³: Microgramo por metro cúbico. ECA: 200,0 µg/m³  
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.  
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

En la estación de monitoreo de Huachipa, se realizó la medición del dióxido de nitrógeno durante el mes de junio; al respecto tomando como referencia el máximo valor reportado en el periodo investigado; analizamos los valores alcanzados el día en que se registró la máxima concentración del compuesto químico el cual oscilo entre 42,7 µg/m³ a 91,3 µg/m³, siendo este último la máxima concentración reportada y se dio el 9 de junio a las 17:00 horas. Todos los valores diarios registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental.

### Ozono Troposférico

El Ozono troposférico (O<sub>3</sub>) es un potente oxidante que produce efectos adversos en la salud humana, reportó valores elevados en las estaciones de monitoreo de Ate y Villa María del Triunfo que corresponden a Lima Este y Lima Sur. La frecuencia del monitoreo es de 8 horas diarias en el mes.


Según los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), se debe indicar que para el mes de junio 2019 no se realizó el monitoreo para las estaciones de Santa Anita, San Martín de Porres, Carabayllo y Puente Piedra.



### ZONA LIMA CENTRO

#### GRÁFICO N° 24

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL OZONO TROPOSFÉRICO (O<sub>3</sub>), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE SAN BORJA – JUNIO 2019




µg/m<sup>3</sup>: Microgramo por metro cúbico. ECA: 100,0 µg/m<sup>3</sup>  
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.  
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

En la estación de San Borja, se realizó la medición del ozono troposférico durante el mes de junio, medición que no superó el ECA:100,0 ug/m<sup>3</sup>; al respecto en el presente análisis se tomó como referencia el día en que se registró la máxima concentración de este antioxidante (2 de junio) se observa que los valores oscilaron entre 0,9 ug/m<sup>3</sup> a 5,0 ug/m<sup>3</sup> este último fue la máxima concentración reportada a las 12:00 horas.

Todos los valores diarios registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental.

#### GRÁFICO N° 25

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL OZONO TROPOSFÉRICO (O<sub>3</sub>), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE CAMPO DE MARTE– JUNIO 2019



µg/m<sup>3</sup>: Microgramo por metro cúbico. ECA: 100,0 µg/m<sup>3</sup>  
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.  
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.


En la estación de Campo de Marte, se realizó la medición del ozono troposférico durante el mes de junio; al respecto en el presente análisis se tomó como referencia el día en que se registró la máxima concentración de este antioxidante (12 de junio) se observa que no superó el ECA:100,0 ug/m<sup>3</sup>, los valores monitoreados oscilaron entre 48,9 ug/m<sup>3</sup> a 75,1 ug/m<sup>3</sup> este último fue la máxima concentración reportada a las 04:00 horas.

Todos los valores diarios registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental.

**ZONA LIMA SUR**

**GRÁFICO N° 26**

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL OZONO TROPOSFÉRICO (O<sub>3</sub>), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO– JUNIO 2019



µg/m³: Microgramo por metro cúbico. ECA: 100,0 µg/m³  
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.  
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.


En la estación de Villa María del Triunfo, se realizó la medición del ozono troposférico durante el mes de junio, medición que no superó el ECA:100,0 ug/m³; al respecto en el presente análisis se tomó como referencia el día (5 de junio) en que se registró la máxima concentración de este antioxidante. Se observa que los valores oscilaron entre 21,6 ug/m³ a 31,5 ug/m³ este último fue la máxima concentración reportada a las 14:00 horas.

Todos los valores diarios registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental.

**ZONA LIMA ESTE**

**GRÁFICO N° 27**

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL OZONO TROPOSFÉRICO (O<sub>3</sub>), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE ATE – JUNIO 2019




µg/m³: Microgramo por metro cúbico. ECA: 100,0 µg/m³  
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.  
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

En la estación de Ate, se realizó la medición del ozono troposférico durante el mes de junio; se tomó como referencia el máximo valor reportado en el periodo investigado el cual no superó el ECA:100,0 ug/m³; analizando los valores alcanzados el día en que se registró la máxima concentración del ozono troposférico (2 de junio) se observa que los valores oscilaron entre 7,6 ug/m³ a 33,9 ug/m³ este último fue la máxima concentración reportada a las 12:00 horas.

Todos los valores diarios registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental.

**GRÁFICO N°28**

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL OZONO TROPOSFÉRICO (O<sub>3</sub>), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – JUNIO 2019




µg/m³: Microgramo por metro cúbico. ECA: 100,0 µg/m³  
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.  
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

En la estación de San Juan de Lurigancho, se realizó la medición del ozono troposférico durante el mes de junio el cual no superó el ECA:100,0 µg/m³. El presente análisis tomó como referencia el día en que se registró la máxima concentración de este antioxidante (2 de junio) se observa que los valores oscilaron entre 4,9 µg/m³ a 41,0 µg/m³ este último fue la máxima concentración reportada a las 12:00 horas.

Todos los valores diarios registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental.

**GRÁFICO N°29**

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL OZONO TROPOSFÉRICO (O<sub>3</sub>), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE HUACHIPA – JUNIO 2019



µg/m³: Microgramo por metro cúbico. ECA: 100,0 µg/m³  
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.  
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

En la estación de Huachipa, se realizó la medición del ozono troposférico durante el mes de junio el cual superó el ECA:100,0 µg/m³. El presente análisis tomó como referencia el día en que se registró la máxima concentración de este antioxidante (7 de junio) se observa que los valores que superaron el límite permitido oscilaron entre 123,7 µg/m³ a 159,5 µg/m³ este último fue la máxima concentración reportada a las 15:00 horas.

### Monóxido de Carbono


El Monóxido de Carbono (CO), gas incoloro y altamente tóxico que puede causar la muerte cuando se respira en niveles elevado. Se produce por la combustión deficiente de sustancias como: gas, gasolina, kerosene, carbón, petróleo, tabaco o madera. Los vehículos con el motor encendido lo despiden. La frecuencia del monitoreo es de 1 hora diaria en el mes. Según los reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) no se llegó a registrar concentraciones de Monóxido de Carbono (CO) para las estaciones de San Borja, Santa Anita, Carabayllo y Puente Piedra.



### ZONA LIMA NORTE

#### GRÁFICO N°30

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL MONÓXIDO DE CARBONO (CO), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE SAN MARTÍN DE PORRES – JUNIO 2019



µg/m³: Microgramo por metro cúbico. ECA: 30 000,0 µg/m³  
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.  
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.


En la estación de monitoreo de San Martín de Porres, se realizó la medición del monóxido de carbono durante el mes de junio; al respecto se tomó como referencia el máximo valor reportado en el periodo investigado. Analizando los valores alcanzados el día en que se registró la máxima concentración del monóxido de carbono observamos que los valores oscilaron entre 588,8 ug/m³ a 1098,2 ug/m³ siendo este último la máxima concentración reportada y se dio el 9 de junio a las 09:00 horas.

Todos los valores diarios registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental.

### ZONA LIMA CENTRO

#### GRÁFICO N°31

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL MONÓXIDO DE CARBONO (CO), EN LA ESTACIÓN DE CAMPO DE MARTE – JUNIO 2019




µg/m³: Microgramo por metro cúbico. ECA: 30 000,0 µg/m³  
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.  
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

En la estación de Campo de Marte, se realizó la medición del monóxido de carbono durante el mes de junio; al respecto se tomó como referencia el máximo valor reportado en el periodo investigado; analizamos los valores alcanzados el día en que se registró la máxima concentración del monóxido de carbono en el cual sus valores oscilaron entre 560,0 ug/m³ a 1133,9 ug/m³, siendo este último la máxima concentración reportada y se dio el 9 de junio a las 10:00 horas. Todos los valores diarios registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental.

**ZONA LIMA SUR**

**GRÁFICO N°32**

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL MONÓXIDO DE CARBONO (CO), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO– JUNIO 2019




µg/m³: Microgramo por metro cúbico. ECA: 30 000,0 µg/m³  
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.  
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

En la estación de Villa María del Triunfo, se realizó la medición del monóxido de carbono durante el mes de junio; al respecto se tomó como referencia el máximo valor reportado en el periodo investigado; analizamos los valores alcanzados el día en que se registró la máxima concentración del monóxido de carbono en el cual sus valores oscilaron entre 622,1 µg/m³ a 1005,1 µg/m³, siendo este último la máxima concentración reportada que no superó el Estándar de Calidad Ambiental y se dio el 8 de junio a las 12:00 horas. Todos los valores diarios registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental.

**ZONA LIMA ESTE**

**GRÁFICO N°33**

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL MONÓXIDO DE CARBONO (CO), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE ATE – JUNIO 2019




µg/m³: Microgramo por metro cúbico. ECA: 30 000,0 µg/m³  
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.  
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

En la estación de Ate, se realizó la medición del monóxido de carbono durante el mes de junio; al respecto tomando como referencia el máximo valor reportado en el periodo investigado; analizamos los valores alcanzados el día en que se registró la máxima concentración del monóxido de carbono (3 de junio) en el cual sus valores oscilaron entre 1784,8 µg/m³ a 2122,9 µg/m³ siendo este último la máxima concentración que no superó el límite permitido el cual fue reportado a las 08:00 horas.

Todos los valores diarios registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental.

**GRÁFICO N°34**

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL MONÓXIDO DE CARBONO (CO), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – JUNIO 2019




µg/m³: Microgramo por metro cúbico. ECA: 30 000,0 µg/m³  
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.  
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

En la estación de San Juan de Lurigancho, se realizó la medición del monóxido de carbono durante el mes de junio; al respecto tomando como referencia el máximo valor reportado en el periodo investigado; analizamos los valores alcanzados el día en que se registró la máxima concentración del monóxido de carbono (8 de junio) el cual osciló entre 2610,5 ug/m³ a 3512,1 ug/m³, siendo este último la máxima concentración reportada a las 08:00 horas. Todos los valores diarios registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental.

**GRÁFICO N°35**

LIMA METROPOLITANA: VALOR DIARIO DEL MONÓXIDO DE CARBONO (CO), EN LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DE HUACHIPA – JUNIO 2019



µg/m³: Microgramo por metro cúbico. ECA: 30 000,0 µg/m³  
 Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales.  
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e informática.

En la estación de Huachipa, se realizó la medición del monóxido de carbono durante el mes de junio; al respecto tomando como referencia el máximo valor reportado en el periodo investigado; analizamos los valores alcanzados el día en que se registró la máxima concentración del monóxido de carbono (9 de junio) el cual osciló entre 2235,6 ug/m³ a 2909,5 ug/m³, siendo este último la máxima concentración reportada a las 09:00 horas. Todos los valores diarios registrados en esta estación de monitoreo no superaron el estándar de calidad ambiental.



## 1.3 La atmósfera

### 1.3.1 Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG)

El SENAMHI, es la entidad encargada de realizar las actividades de la estación de Vigilancia de la Atmósfera Global (VAG) de Marcapomacocha ubicada en la sierra central del país (Provincia de Yauli, departamento de Junín), a una altitud de 4 479 metros sobre el nivel del mar.

Las actividades de vigilancia que realiza se enmarcan en las mediciones de la concentración de ozono total atmosférico en forma diaria en base a mediciones realizadas con el Espectrofotómetro Dobson el cual contribuye con el Programa de Vigilancia de la Atmósfera Global – VAG de la Organización Meteorológica Mundial – OMM. Otras variables como la radiación ultravioleta, radiación solar global y parámetros meteorológicos también se vienen midiendo en dicha estación.



### Monitoreo de Ozono Atmosférico

#### CUADRO N° 01

#### PERÚ: VIGILANCIA DEL OZONO ATMOSFÉRICO EN LA ESTACIÓN VAG MARCAPOMACOCOA

Mes: Junio 2019 / Junio 2018

Unidades Dobson (UD)

Año/Mes	Valor		
	Promedio	Máximo	Mínimo
<b>2018</b>			
Enero	241,9	244,2	239,2
Febrero	242,7	248,4	238,3
Marzo	241,2	245,2	238,2
Abril	241,9	245,2	239,8
Mayo	242,3	244,4	240,3
Junio	240,8	244,6	235,5
Julio	240,8	243,0	238,6
Agosto	241,4	247,7	238,6
Setiembre	249,4	254,6	243,7
Octubre	247,8	253,3	243,2
Noviembre	247,6	253,2	242,2
Diciembre	247,5	252,9	243,0
<b>2019</b>			
Enero	240,1	242,8	238,6
Febrero	-	-	-
Marzo	-	-	-
Abril	-	-	-
Mayo	240,7	243,2	239,4
Junio	240,6	245,6	238,7
<b>Variación porcentual</b>			
JUN19/MAY19	0,0	1,0	-0,3
JUN19/JUN18	-0,1	0,4	1,4

Nota: Ubicación - Marcapomacocha, Yauli, Junín. Latitud: 11.40°S Longitud: 76.34°W Altitud: 4470 m.s.n.m. No se registro valores para los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) - Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales. Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

La concentración de Ozono en la estación VAG de Marcapomacocha, en el mes de junio de 2019 tuvo como valor máximo, mínimo y promedio 245,6 UD, 238,7 UD y 240,6 UD respectivamente.

De acuerdo al análisis realizado al similar mes del año anterior se observa una disminución del valor promedio en 0,1% y un crecimiento en su valor máximo y mínimo en 0,4% y 1,4% respectivamente.


Asimismo, en comparación al mes anterior mayo 2019 se observa un aumento en su valor máximo en 1,0% y una disminución de 0,3% en su valor mínimo.

#### GRÁFICO N° 36

#### PERÚ: VIGILANCIA DEL OZONO ATMOSFÉRICO EN LA ESTACIÓN VAG MARCAPOMACOCOA

Mes: Enero 2018 – Junio 2019

Unidades Dobson (UD)



Nota: No se registro valores para los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2019.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) - Dirección General de Investigación y Asuntos Ambientales. Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.



## 2. CALIDAD DEL AGUA

La contaminación del agua de los ríos es causada principalmente por el vertimiento de relaves mineros (parte alta y media de la cuenca), aguas servidas urbanas y desagües industriales a lo largo de todo su cauce (generalmente en la parte media y baja de la cuenca).

Dicha contaminación es resultado de la presencia de elementos físicos, químicos y biológicos, que en altas concentraciones, son dañinos para la salud humana y el ecosistema. Cabe indicar, que la calidad de agua también se ve afectada por el uso de plaguicidas y pesticidas en la actividad agrícola. Todo ello, ocasiona un gasto adicional en el tratamiento del elemento, es decir, cuanto más contaminada esté el agua, mayor es el costo del proceso para reducir el elemento contaminante, ya que se debe realizar el respectivo tratamiento para hacerla potable.



### 2.1 Concentración de minerales en el río Rímac

La contaminación causada por la actividad minera es más peligrosa tanto para la salud de la población como para los ecosistemas acuáticos, la contaminación minera aporta metales pesados y otras sustancias tóxicas, como por ejemplo el Hierro.

El Hierro (Fe) es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre (5%). Es un metal maleable, tenaz, de color gris plateado y magnético, su presencia en el agua provoca precipitación y coloración no deseada. Expuesto al aire húmedo, se corroe formando óxido de hierro hidratado, una sustancia pardo-rojiza, escamosa, conocida comúnmente como orín. El hierro en los tejidos, puede ocasionar el desarrollo de muchas enfermedades graves.

#### 2.1.1. En el río Rímac

##### CUADRO N° 02

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN PROMEDIO Y MÁXIMO DE HIERRO (Fe) EN EL RÍO RÍMAC

Mes: Junio 2019/ Junio 2018

Microgramos por litro (mg/l)

Meses	Valor	
	Promedio	Máximo
<b>2018</b>		
Enero	3,00	27,23
Febrero	2,14	11,28
Marzo	13,37	56,36
Abril	2,26	14,25
Mayo	0,85	2,67
Junio	0,26	1,13
Julio	0,26	1,13
Agosto	0,38	3,32
Setiembre	0,29	2,94
Octubre	0,32	0,79
Noviembre	0,41	1,93
Diciembre	1,42	8,30
<b>2019</b>		
Enero	6,50	44,36
Febrero	11,43	72,74
Marzo	6,64	24,53
Abril	1,48	14,01
Mayo	1,11	5,31
Junio	0,49	1,46
<b>Variación porcentual</b>		
Jun 19/May 19	-55,9	-72,5
Jun 19/Jun 18	88,5	29,2

Punto de monitoreo: Bocatoma La Altarjea.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

En el mes de junio de 2019, la concentración máxima del hierro en el río Rímac fue de 1,46 mg/l lo que representó una disminución de 72,5% en relación a lo reportado en el mes anterior que alcanzó 5,31 mg/l.


En cuanto la concentración promedio para el mes de junio 2019 fue 0,49 mg/l que disminuyó en 55,9% con respecto al mes anterior.

##### GRÁFICO N° 37

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE HIERRO (Fe) EN EL RÍO RÍMAC

Mes: Junio 2017 - 2019

Microgramos por litro (mg/l)



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

### 2.1.2 En las plantas de tratamiento de SEDAPAL

**CUADRO N° 3**

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE HIERRO (Fe) EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 1 Y 2 DE SEDAPAL

Mes: Junio 2019/ Junio 2018

Microgramos por litro (mg/l)

Meses	Valor	
	Promedio	Máximo
<b>2018</b>		
Enero	0,020	0,088
Febrero	0,016	0,052
Marzo	0,017	0,069
Abril	0,017	0,115
Mayo	0,016	0,041
Junio	0,012	0,049
Julio	0,012	0,049
Agosto	0,015	0,041
Setiembre	0,017	0,091
Octubre	0,014	0,052
Noviembre	0,019	0,084
Diciembre	0,016	0,054
<b>2019</b>		
Enero	0,023	0,137
Febrero	0,015	0,038
Marzo	0,018	0,083
Abril	0,018	0,071
Mayo	0,022	0,068
Junio	0,020	0,074
<b>Variación porcentual</b>		
Jun 19/May 19	-9,1	8,8
Jun 19/Jun 18	66,7	51,0

La concentración de plomo en las plantas de tratamiento 1 y 2 de SEDAPAL se mantuvo por debajo del límite permisible: 0,300 mg/l. Se registró para su valor máximo 0,074 mg/l y para su valor promedio de 0,020 mg/l. Asimismo, hubo un aumento de 51,0% en su volar máximo respecto al mes de junio 2018 igualmente se registró un aumento de 8,8% respecto a mayo 2019.


<sup>1/</sup> El límite permisible de Hierro en el agua potable, según Norma ITINTEC es de 0,300 miligramos por litro.  
 Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).  
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

**GRÁFICO N° 38**

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE HIERRO (Fe) EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 1 Y 2 DE SEDAPAL

Mes: Junio 2017 - 2019

Microgramos por litro (mg/l)



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).  
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

## 2.2 Presencia máxima y promedio de Plomo (Pb)

El plomo es un metal pesado que se encuentra de forma natural en la corteza terrestre y ha sido distribuido en el ambiente, debido a fuentes fijas o móviles contaminantes antropogénicas o naturales.

Existen compuestos orgánicos e inorgánicos del plomo, que son liberados al aire durante la combustión del carbono y aceite. Este puede ingresar al organismo por tres vías: respiratoria, digestiva y dérmica o cutánea y causar efectos nocivos para la salud del hombre a nivel celular, sin que ni siquiera puedan ser percibidos a corto plazo. Dados los efectos nocivos del plomo y su influencia para la salud de la población, este es en la actualidad, un motivo de atención especial por constituir una parte importante de la contaminación ambiental presente en muchas ciudades en el mundo.



### 2.2.1 En el río Rímac

#### CUADRO N° 4

#### LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN PROMEDIO Y MÁXIMA DE PLOMO (Pb) EN EL RÍO RÍMAC

Mes: Junio 2019/ Junio 2018

Microgramos por litro (mg/l)

Meses	Valor	
	Promedio	Máximo
<b>2018</b>		
Enero	0,027	0,298
Febrero	0,016	0,067
Marzo	0,082	0,435
Abril	0,020	0,070
Mayo	0,013	0,069
Junio	0,005	0,024
Julio	0,005	0,024
Agosto	0,005	0,040
Setiembre	0,005	0,041
Octubre	0,008	0,039
Noviembre	0,008	0,036
Diciembre	0,020	0,093
<b>2019</b>		
Enero	0,065	0,484
Febrero	0,069	0,334
Marzo	0,039	0,091
Abril	0,011	0,085
Mayo	0,016	0,080
Junio	0,009	0,037
	<b>Variación porcentual</b>	
Jun 19/May 19	-43,8	
Jun 19/Jun 18	80,0	54,2

Punto de monitoreo: Bocatoma La Atarjea.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) reportó para el mes de junio 2019 que la concentración promedio y máximo de plomo en el río Rímac fue de 0,009 mg/l y 0,037 mg/l respectivamente.


Asimismo, se registró un aumento de 54,2% y 80,0% en su valor máximo y promedio en comparación con el mes de junio 2018.

#### GRÁFICO N° 39

#### LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE PLOMO (Pb) EN EL RÍO RÍMAC

Mes: Junio 2017 - 2019

Microgramos por litro (mg/l)



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

## 2.2.2 En las plantas de tratamiento de SEDAPAL

### CUADRO N° 5

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE PLOMO (Pb) EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 1 Y 2 DE SEDAPAL

Mes: Junio 2019/ Junio 2018

Microgramos por litro (mg/l)

Meses	Valor	
	Promedio	Máximo
<b>2018</b>		
Enero	0,001	0,002
Febrero	0,001	0,004
Marzo	0,001	0,004
Abril	0,001	0,004
Mayo	0,002	0,007
Junio	0,001	0,003
Julio	0,001	0,003
Agosto	0,000	0,003
Setiembre	0,000	0,001
Octubre	0,000	0,001
Noviembre	0,000	0,002
Diciembre	0,001	0,002
<b>2019</b>		
Enero	0,001	0,005
Febrero	0,000	0,001
Marzo	0,001	0,002
Abril	0,000	0,001
Mayo	0,001	0,003
Junio	0,001	0,003
<b>Variación porcentual</b>		
Jun 19/May 19	0,0	0,0
Jun 19/Jun 18	0,0	0,0

La concentración de plomo en las plantas de tratamiento 1 y 2 se mantuvo por debajo del límite permisible: 0,05 mg/l. Su valor máximo y promedio fue 0,003 mg/l y 0,001 mg/l respectivamente, valores que no tuvieron variación con respecto al mes anterior y a similar mes, junio 2019.

1/ El límite permisible de plomo en el agua potable, según Norma ITINTEC es de 0,05 miligramos por litro.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

### GRÁFICO N° 40

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE PLOMO (Pb) EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 1 Y 2 DE SEDAPAL

Mes: Junio 2017 - 2019

Microgramos por litro (mg/l)



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

## 2.3 Presencia máxima y promedio de Cadmio (Cd)

El cadmio es una sustancia natural en la corteza terrestre. Se encuentra como mineral combinado con otras sustancias tales como oxígeno (óxido de cadmio), cloro (cloruro de cadmio), o azufre (sulfato de cadmio, sulfuro de cadmio).

Se encuentra también en todo tipo de terrenos y rocas, incluso minerales de carbón y abonos minerales, contienen algo de cadmio. La mayor parte del cadmio es extraído durante la producción de otros metales como zinc, plomo y cobre, no se oxida fácilmente, y tiene muchos usos incluyendo baterías, pigmentos, revestimientos para metales, y plásticos. El cadmio tiene efectos tóxicos en los riñones y en los sistemas óseo y respiratorio; además, está clasificado como carcinógeno para los seres humanos.



### 2.3.1 En el río Rímac

#### CUADRO N° 6

#### LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN PROMEDIO Y MÁXIMO DE CADMIO (Cd) EN EL RÍO RÍMAC

Mes: Junio 2019/ Junio 2018

Microgramos por litro (mg/l)

Meses	Valor	
	Promedio	Máximo
<b>2018</b>		
Enero	0,002	0,011
Febrero	0,001	0,003
Marzo	0,005	0,064
Abril	0,002	0,004
Mayo	0,003	0,004
Junio	0,002	0,003
Julio	0,002	0,003
Agosto	0,001	0,004
Setiembre	0,001	0,003
Octubre	0,001	0,003
Noviembre	0,001	0,002
Diciembre	0,001	0,003
<b>2019</b>		
Enero	0,003	0,020
Febrero	0,004	0,013
Marzo	0,003	0,005
Abril	0,002	0,008
Mayo	0,002	0,005
Junio	0,001	0,003
	<b>Variación porcentual</b>	
Jun 19/May 19	-50,0	-40,0
Jun 19/Jun 18	-50,0	0,0

Punto de monitoreo: Bocatoma La Atarjea.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

En el río Rímac se observó que durante el mes de junio 2019 la concentración máxima y promedio de cadmio fue 0,003 mg/l y 0,001 mg/l respectivamente.


Se registró una disminución de 40,0% en su valor máximo con respecto al mes anterior mayo (0,005 mg/l) y una disminución de 50% con respecto a junio 2018 y al anterior mes (mayo 2019).

#### GRÁFICO N° 41

#### LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE CADMIO (Cd) EN EL RÍO RÍMAC

Mes: Junio 2017 - 2019

Microgramos por litro (mg/l)



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

### 2.3.2 En las plantas de tratamiento de SEDAPAL

#### CUADRO N° 7

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE CADMIO (Cd) EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 1 Y 2 DE SEDAPAL

Mes: Junio 2019/ Junio 2018

Microgramos por litro (mg/l)

Meses	Valor	
	Promedio	Máximo
<b>2018</b>		
Enero	0,000	0,001
Febrero	0,001	0,001
Marzo	0,001	0,001
Abril	0,001	0,002
Mayo	0,002	0,002
Junio	0,002	0,002
Julio	0,002	0,002
Agosto	0,001	0,001
Setiembre	0,001	0,001
Octubre	0,001	0,001
Noviembre	0,000	0,001
Diciembre	0,001	0,001
<b>2019</b>		
Enero	0,001	0,001
Febrero	0,001	0,001
Marzo	0,001	0,001
Abril	0,001	0,002
Mayo	0,001	0,002
Junio	0,001	0,001
<b>Variación porcentual</b>		
Jun 19/May 19	0,0	-50,0
Jun 19/Jun 18	-50,0	-50,0

La información proporcionada por SEDAPAL de las plantas de tratamiento 1 y 2 correspondiente al mes de junio 2019 indica que la concentración máxima y promedio alcanzada asciende a 0,001 mg/l para cada caso, lo cual indica que los valores se mantuvieron por debajo del límite permisible (0,005 mg/l).

Asimismo, hubo disminución de 50% en su valor promedio y máximo con respecto a junio 2018. Igualmente, una disminución de 50% con respecto al mes anterior que registro 0,002 mg/l.

El límite permisible de cadmio en el agua potable, según Norma ITINTEC es de 0,005 miligramos por litro.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

#### GRÁFICO N° 42

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE CADMIO (Cd) EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 1 Y 2 DE SEDAPAL

Mes: Junio 2017 - 2019

Microgramos por litro (mg/l)



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

## 2.4 Presencia máxima y promedio de Aluminio (Al)

El aluminio es el elemento metálico más abundante y constituye alrededor del 8% de la corteza terrestre. Las sales de aluminio se usan ampliamente como coagulante para el tratamiento del agua para reducir la materia orgánica, el color, turbidez y nivel de microorganismos. Este tipo de uso puede provocar un incremento en las concentraciones de aluminio del agua tratada. Si esa concentración residual de aluminio es elevada, aparece un sabor y turbidez del agua no deseada.



La ingesta de aluminio a través de los alimentos, en particular los que contienen compuestos de aluminio como aditivos, representan la vía principal de exposición al aluminio para el público en general. En los estudios realizados en animales, el aluminio bloquea la acción potencial o la descarga eléctrica de las células nerviosas reduciendo la actividad del sistema nervioso.

### 2.4.1 En el río Rímac

#### CUADRO N° 8

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN PROMEDIO Y MÁXIMO DE ALUMINIO (Al) EN EL RÍO RÍMAC

Mes: Junio 2019/ Junio 2018

Microgramos por litro (mg/l)

Meses	Valor	
	Promedio	Máximo
<b>2018</b>		
Enero	3,06	26,69
Febrero	2,28	12,54
Marzo	12,25	52,58
Abril	1,80	12,56
Mayo	0,81	2,20
Junio	0,25	1,06
Julio	0,25	1,06
Agosto	0,35	2,69
Setiembre	0,29	3,08
Octubre	0,25	0,54
Noviembre	0,35	1,32
Diciembre	1,26	7,10
<b>2019</b>		
Enero	5,80	35,54
Febrero	13,40	82,33
Marzo	7,18	24,23
Abril	1,05	8,47
Mayo	0,85	3,53
Junio	0,37	1,31
	<b>Variación porcentual</b>	
Jun 19/May 19	-56,5	-62,9
Jun 19/Jun 18	48,0	23,6

Punto de monitoreo: Bocatomá La Atarjea.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Para el mes de junio 2019 la presencia de aluminio en el río Rímac fue de 0,37 mg/l para el valor promedio y 1,31 mg/l para el valor máximo.


Se registraron disminuciones en su valor promedio y máximo de 56,5% y 62,9% respecto al mes anterior. Asimismo, un aumento de 48,0% y 23,6% en sus valores promedio y máximo respectivamente en comparación a junio 2018.

#### GRÁFICO N° 43

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE ALUMINIO (Al) EN EL RÍO RÍMAC

Mes: Junio 2017 - 2019

Microgramos por litro (mg/l)



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

## 2.4.2 En las plantas de tratamiento de SEDAPAL

### CUADRO N° 9

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE ALUMINIO (Al) EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 1 Y 2 DE SEDAPAL

Mes: Junio 2019/ Junio 2018

Microgramos por litro (mg/l)

Meses	Valor	
	Promedio	Máximo
<b>2018</b>		
Enero	0,030	0,110
Febrero	0,030	0,100
Marzo	0,020	0,060
Abril	0,030	0,060
Mayo	0,050	0,110
Junio	0,038	0,067
Julio	0,038	0,067
Agosto	0,030	0,066
Setiembre	0,033	0,073
Octubre	0,024	0,096
Noviembre	0,035	0,143
Diciembre	0,038	0,074
<b>2019</b>		
Enero	0,042	0,100
Febrero	0,016	0,076
Marzo	0,022	0,072
Abril	0,036	0,088
Mayo	0,048	0,092
Junio	0,044	0,112
<b>Variación porcentual</b>		
Jun 19/May 19	-8,3	21,7
Jun 19/Jun 18	15,8	67,2

El límite permisible de aluminio en el agua potable, según Norma ITINTEC es de 0,200 miligramos por litro.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

SEDAPAL estableció que luego del proceso de tratamiento del agua realizada en el río Rímac, la concentración máxima y promedio de aluminio durante el mes de junio 2019 estuvo por debajo del límite permisible (0,200 mg/l).

El valor máximo alcanzado fue 0,112 mg/l y para su valor promedio se registró 0,044 mg/l.


Asimismo, hubo un aumento de 15,8% y 67,2% en su valor promedio y máximo respectivamente en comparación con junio 2018.

### GRÁFICO N° 44

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE ALUMINIO (Al) EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 1 Y 2 DE SEDAPAL

Mes: Junio 2017 – 2019

Microgramos por litro (mg/l)



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

## 2.5 Presencia máxima y promedio de Materia Orgánica

La materia orgánica (o material orgánico, material orgánico natural, MON) es materia elaborada de compuestos orgánicos que provienen de los restos de organismos que alguna vez estuvieron vivos, tales como plantas animales y sus productos de residuo en el ambiente natural. La materia orgánica está formada por materia inerte y energía.

A fin de transformar el agua cruda contaminada del río Rímac en agua para consumo, se realiza un conjunto de procesos a su llegada a la Planta de Tratamiento La Atarjea de SEDAPAL, a fin de garantizar la calidad del agua potable que se ofrece a la población de Lima y Callao, por lo que debe evitarse el arrojamiento de basura y sustancias contaminantes al río Rímac que constituye la principal fuente de agua para la capital del país.

El proceso de tratamiento que se realiza en la Planta de La Atarjea es óptimo y con un alto nivel tecnológico y operativo.



### 2.5.1 En el río Rímac

#### CUADRO N° 10

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN PROMEDIO Y MÁXIMO DE MATERIA ORGÁNICA EN EL RÍO RÍMAC

Mes: Junio 2019/ Junio 2018

Microgramos por litro (mg/l)

Meses	Valor	
	Promedio	Máximo
<b>2018</b>		
Enero	2,85	21,27
Febrero	1,89	2,90
Marzo	3,44	9,50
Abril	1,51	7,81
Mayo	1,38	2,97
Junio	1,53	2,34
Julio	1,53	2,34
Agosto	1,73	2,59
Setiembre	2,05	2,80
Octubre	1,91	2,43
Noviembre	1,79	2,22
Diciembre	2,29	3,15
<b>2019</b>		
Enero	3,77	19,95
Febrero	2,77	7,60
Marzo	1,87	5,00
Abril	1,49	2,85
Mayo	1,32	2,46
Junio	2,25	3,08
<b>Variación porcentual</b>		
Jun 19/May 19	70,5	25,2
Jun 19/Jun 18	47,1	31,6

Punto de monitoreo: Bocatomá La Atarjea.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

La información reportada por SEDAPAL indica que, durante el mes de junio 2019, la concentración máxima y promedio de materia orgánica en el río Rímac fue de 3,08 mg/l y 2,25 mg/l respectivamente.


Se registró aumento en su valor máximo y promedio de 25,2% y 70,5% con respecto al mes anterior. Asimismo, aumentos en su valor máximo y promedio de 31,6% y 47,1% con respecto a junio 2018.

#### GRÁFICO N° 45

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EN EL RÍO RÍMAC

Mes: Junio 2017 - 2019

Microgramos por litro (mg/l)



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

## 2.5.2 En las plantas de tratamiento de SEDAPAL

### CUADRO N° 11

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 1 Y 2 DE SEDAPAL

Mes: Junio 2019/ Junio 2018

Microgramos por litro (mg/l)

Meses	Valor	
	Promedio	Máximo
<b>2018</b>		
Enero	1,41	1,76
Febrero	1,34	2,16
Marzo	1,22	1,79
Abril	0,90	1,47
Mayo	1,02	1,35
Junio	1,23	1,51
Julio	1,23	1,51
Agosto	1,68	1,37
Setiembre	1,57	1,76
Octubre	1,41	1,71
Noviembre	1,38	1,72
Diciembre	1,44	1,90
<b>2019</b>		
Enero	1,46	1,75
Febrero	1,08	1,56
Marzo	0,97	1,18
Abril	1,15	1,48
Mayo	1,07	1,38
Junio	1,59	2,32
<b>Variación porcentual</b>		
Jun 19/May 19	48,6	68,1
Jun 19/Jun 18	29,3	53,6

Nota: No se ha fijado el límite permisible (ITINTEC) para materia orgánica en el agua potable.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Los valores reportados en el mes de junio 2019 en las plantas de tratamiento 1 y 2 de SEDAPAL de materia orgánica fue de 2,32 mg/l para el valor máximo y 1,59 mg/l para el valor promedio.


Las concentraciones registradas en las plantas de tratamiento muestran aumentos de 53,6% y 29,3% en su valor máximo y promedio con respecto a su similar mes del año anterior.

### GRÁFICO N° 46

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 1 Y 2 DE SEDAPAL

Mes: Junio 2017 - 2019

Microgramos por litro (mg/l)



Nota: No se ha fijado el límite permisible (ITINTEC) para materia orgánica en el agua potable.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

## 2.6 Presencia máxima y promedio de Nitratos (NO<sub>3</sub>)

Los nitratos pueden encontrarse en pequeñas cantidades en: El suelo, alimentos, las aguas (superficiales y subterráneas). Los nitratos proceden, en parte, de la descomposición natural de proteínas de plantas o animales por medio de microorganismos.

Está reconocido que un agua contaminada con nitratos empleada para la preparación de biberones es susceptible de hacer aparecer en los lactantes una cianosis debida a la formación de metahemoglobina. Esta intoxicación, provocada por la absorción de nitratos, es en realidad debida a los nitritos formados por reducción de aquellos bajo la influencia de una acción bacteriana.



### 2.6.1 En el río Rímac

#### CUADRO N° 12

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN PROMEDIO Y MÁXIMO DE NITRATOS (NO<sub>3</sub>) EN EL RÍO RÍMAC

Mes: Junio 2019/ Junio 2018

Microgramos por litro (mg/l)

Meses	Valor	
	Promedio	Máximo
<b>2018</b>		
Enero	4,53	6,32
Febrero	4,19	6,58
Marzo	2,73	4,07
Abril	3,08	3,85
Mayo	4,06	5,72
Junio	5,20	6,05
Julio	5,20	6,05
Agosto	5,42	7,17
Setiembre	5,87	6,82
Octubre	6,38	10,90
Noviembre	5,00	6,14
Diciembre	5,09	6,63
<b>2019</b>		
Enero	3,86	5,36
Febrero	2,59	3,94
Marzo	2,39	2,90
Abril	2,75	4,26
Mayo	5,15	6,66
Junio	4,87	6,30
	<b>Variación porcentual</b>	
Jun 19/May 19	-5,4	-5,4
Jun 19/Jun 18	-6,3	4,1

Punto de monitoreo: Bocatoma La Atarjea.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Para el mes de junio 2019 la presencia de nitratos (NO<sub>3</sub>) en el río Rímac fue 6,30 mg/l en su valor máximo y 4,87 mg/l en su valor promedio.


De acuerdo al análisis realizado con respecto al similar mes del año anterior, indica que la presencia de nitrato aumento en 4,1% con respecto a su similar mes del año anterior con respecto a su valor máximo.

#### GRÁFICO N° 52

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE NITRATOS (NO<sub>3</sub>) EN EL RÍO RÍMAC

Mes: Junio 2017 - 2019

Microgramos por litro (mg/l)



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

## 2.6.2 En las plantas de tratamiento de SEDAPAL

### CUADRO N° 13

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE NITRATOS (NO<sub>3</sub>) EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 1 Y 2 DE SEDAPAL

Mes: Junio 2019/ Junio 2018

Microgramos por litro (mg/l)

Meses	Valor	
	Promedio	Máximo
<b>2018</b>		
Enero	3,92	4,78
Febrero	3,43	3,87
Marzo	2,39	3,24
Abril	2,38	3,17
Mayo	3,48	4,39
Junio	4,49	5,22
Julio	4,49	5,22
Agosto	4,78	5,66
Setiembre	5,05	5,79
Octubre	5,11	5,71
Noviembre	4,21	4,71
Diciembre	4,30	4,65
<b>2019</b>		
Enero	3,61	4,53
Febrero	2,50	3,52
Marzo	2,25	2,66
Abril	3,18	4,08
Mayo	4,39	5,02
Junio	4,56	5,41
<b>Variación porcentual</b>		
Jun 19/May 19	3,9	7,8
Jun 19/Jun 18	8,5	3,6

El límite permisible de Nitratos en el agua potable, según Norma ITINTEC es de 45,00 miligramos por litro.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

La concentración de nitratos en las plantas de tratamiento 1 y 2 del agua del río Rímac, correspondiente a junio 2019 muestra que la concentración máxima y promedio fue de 5,41 mg/l y 4,56 mg/l respectivamente, valores que se hallan por debajo del límite permisible (45,00 mg/l).


Los valores representaron aumentos de 7,8% y 3,9% en sus valores máximo y promedio respectivamente con respecto al mes anterior.

### GRÁFICO N° 48

LIMA METROPOLITANA: CONCENTRACIÓN DE NITRATOS (NO<sub>3</sub>) EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 1 Y 2 DE SEDAPAL

Mes: Junio 2017 – 2019

Microgramos por litro (mg/l)



El límite permisible de Nitratos en el agua potable, según Norma ITINTEC es de 45,00 miligramos por litro.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

## 2.7 Niveles de turbiedad en el río Rímac

La turbidez es una medida del grado en el cual el agua pierde su transparencia debido a la presencia de partículas en suspensión. Cuantos más sólidos en suspensión haya en el agua, más sucia parecerá ésta y más alta será la turbidez. La turbidez es considerada una buena medida de la calidad del agua.

La turbidez se mide en Unidades Nefelométricas de turbiedad, o Nephelometric Turbidity Unit (NTU). El instrumento usado para su medida es el nefelómetro o turbidímetro, que mide la intensidad de la luz dispersada a 90 grados cuando un rayo de luz pasa a través de una muestra de agua.

Pero, además, es esencial eliminar la turbidez para desinfectar efectivamente el agua que desea ser bebida. Esto añade costes extra para el tratamiento de las aguas superficiales.



### CUADRO N° 14

#### LIMA METROPOLITANA: NIVELES DE TURBIEDAD EN EL RÍO RÍMAC

Junio 2019/ Junio 2018

Unidades Nefelométricas de Turbiedad (UNT)

Meses	Valor		
	Promedio	Máximo	Mínimo
<b>2018</b>			
Enero	192,6	1 750,8	17,5
Febrero	95,7	616,5	18,2
Marzo	617,2	3 589,7	67,0
Abril	56,5	155,3	15,6
Mayo	18,8	43,5	12,5
Junio	16,9	40,7	9,4
Julio	20,6	55,0	12,0
Agosto	22,7	62,4	11,8
Setiembre	13,5	19,8	10,3
Octubre	17,9	72,9	10,4
Noviembre	24,2	91,0	8,9
Diciembre	69,4	417,8	10,8
<b>2019</b>			
Enero	530,1	5 690,1	41,7
Febrero	718,1	4 459,1	57,0
Marzo	294,9	1 239,8	65,2
Abril	43,3	259,6	11,7
Mayo	25,9	83,8	13,1
Junio	25,0	59,0	8,0
	<b>Variación porcentual</b>		
Jun 19/May 19	-3,5	-29,6	-38,9
Jun 19/Jun 18	47,9	45,0	-14,9

Punto de monitoreo: Bocatomá La Atarjea.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El nivel de turbiedad registrada para el mes de junio 2019 mostro cifras de 25,0, 59,0 y 8,0 UNT para sus valores promedio, máximo y mínimo.


También se registraron aumento de 47,9% y 45,0% en su valor promedio y máximo con respecto a junio 2018.

### GRÁFICO N° 49

#### LIMA METROPOLITANA: NIVELES DE TURBIEDAD EN EL RÍO RÍMAC

Mes: Junio 2017 – 2019

Unidades Nefelométricas de Turbiedad (UNT)



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.



### 3. PRODUCCIÓN DE AGUA

SEDAPAL abastece a la población mediante la producción de agua proveniente de fuentes superficiales y subterráneas. En caso de las fuentes superficiales, éstas se captan del Río Rímac y Chillón mediante las Plantas de Tratamiento de Agua Potable La Atarjea, Planta Huachipa y Planta Chillón; esta última a cargo del Consorcio Agua Azul S.A. En cuanto a las fuentes subterráneas, éstos son pozos ubicados en Lima Metropolitana. Las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) son entidades que operan en el ámbito urbano; constituidas con el exclusivo propósito de prestar servicios de saneamiento, de conformidad a lo dispuesto en Ley General de Servicios de Saneamiento.



El proceso de producción de agua potable consiste en la realización de una serie de actividades que permiten la potabilización del agua captada de las fuentes superficiales, este proceso interno se realiza para garantizar agua limpia al 100% a la población. El proceso se realiza por medio de análisis fisicoquímicos y bacteriológicos, horarios y diarios de seguimiento continuo al agua en los diferentes procesos, apoyados por un sistema, que mide en tiempo real el comportamiento de variables, como pH, Conductividad, Turbiedad y Caudal.

#### 3.1 Producción de agua potable a nivel nacional

##### CUADRO N° 15

PERÚ: PRODUCCIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE

Mes: Abril 2017 - 2019

Miles de metros cúbicos (Miles de m<sup>3</sup>)

Producción	Abril			Variación porcentual
	2017 p/	2018 p/	2019 p/	2019 / 2018
<b>Volumen</b>	101 897	107 871	110 933	2,8

**Nota:** Información de las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS) a nivel nacional.  
P/ Preliminar.

**Fuente:** Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS).  
**Elaboración:** Instituto Nacional de Estadística e Informática.

##### GRÁFICO N° 50

PERÚ: PRODUCCIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE

Mes: Abril 2017 - 2019

Miles de metros cúbicos (Miles de m<sup>3</sup>)



**Nota:** La información corresponde a 25 empresas prestadoras de servicio de saneamiento.

**Fuente:** Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS).  
**Elaboración:** Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Para el mes de abril 2019, la producción de agua potable producida por las 25 Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento registró 110 millones 933 mil metros cúbicos, representando un incremento de 2,8% comparado al volumen alcanzado en el mes de abril 2018 (107 millones 871 mil m<sup>3</sup>).

### 3.2 Producción de agua potable en Lima Metropolitana

#### CUADRO N° 16

LIMA METROPOLITANA: PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

Mes: Junio 2017 - 2019

Miles de metros cúbicos (Miles de m<sup>3</sup>)

Producción	Junio			Variación porcentual
	2017	2018	2019 P/	2019 / 2018
Volumen	55 436	57 457	59 151	2,9

P/ Preliminar.

Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

#### GRÁFICO N° 51

LIMA METROPOLITANA: PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

Mes: Junio 2017-2019

Miles de metros cúbicos (Miles de m<sup>3</sup>)



Fuente: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

La producción de agua potable en Lima Metropolitana para el mes de junio 2019 alcanzó los 59 millones 151 mil metros cúbicos, que representó un incremento de 2,9% en relación al volumen producido en el mes de junio 2018 (57 millones 457 mil metros cúbicos).



## 4. CAUDAL DE LOS RÍOS

Se denomina caudal en hidrografía, hidrología y, en general, en geografía física, al volumen de agua que circula por el cauce de un río en un lugar y tiempo determinados. Se refiere fundamentalmente al volumen hidráulico de la escorrentía de una cuenca hidrográfica concentrada en el río principal de la misma.



El promedio histórico se basa en un registro del SENAMHI de subidas y bajadas de los caudales en los últimos 25 años; por ejemplo en los meses de verano, los caudales suelen incrementarse debido a las lluvias que se dan en la parte central de Lima, así como en las regiones de la zona sur del país, como Tacna y Arequipa.

Las lluvias generan que los caudales aumenten súbitamente y superen su promedio histórico, pero este aumento de caudal se puede aprovechar para llenar los reservorios que se utilizan en época de estiaje (cuando hay menos volumen del caudal).

### 4.1 Caudal de los ríos Rímac y Chillón

#### CUADRO N° 17

LIMA METROPOLITANA: CAUDAL PROMEDIO DE LOS RÍOS RÍMAC Y CHILLÓN

Mes: Junio 2018-2019

Metro cúbico por segundo (m<sup>3</sup>/s)

Río	Junio			Variación porcentual	
	Promedio histórico	Promedio 2018	Promedio 2019 P/	2019/2018	Prom. 2019 / Prom. hist.
Rímac	22,06	26,57	21,52	-19,0	-2,4
Chillón	15,19	2,24	1,03	-54,0	-93,2

P/ Preliminar.


Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)-Estación Hidrológica de Chosica y Obrajillo.  
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

#### GRÁFICO N° 52

LIMA METROPOLITANA: CAUDAL PROMEDIO DE LOS RÍOS RÍMAC Y CHILLÓN

Mes: Junio 2018-2019

Metro cúbico por segundo (m<sup>3</sup>/s)



Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).  
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, informa que el caudal promedio del río Rímac correspondiente al mes de junio 2019, alcanzó 21,52 m<sup>3</sup>/s que representó una disminución de 2,4%, con respecto a su promedio histórico (22,06 m<sup>3</sup>/s) y una disminución de 19,0% en comparación con el mismo mes del año anterior (26,57 m<sup>3</sup>/s).

Mientras que el caudal promedio del río Chillón alcanzó 1,03 m<sup>3</sup>/s que representó una disminución del 54,0% con similar mes del año anterior y una disminución de 93,2% con su promedio histórico (15,19 m<sup>3</sup>/s).

## 4.2 Caudal de los ríos, según vertiente

### 4.2.1 Caudal de los ríos de la vertiente del Pacífico

#### CUADRO N° 18

PERÚ: CAUDAL PROMEDIO DE LOS RÍOS DE LA VERTIENTE DEL PACÍFICO

Mes: Junio 2018-2019

Metro cúbico por segundo (m<sup>3</sup>/s)

Zona	Junio			Variación porcentual	
	Promedio histórico	Promedio 2018	Promedio 2019 P/	2019/2018	Prom. 2019 / Prom. hist.
Zona Norte	45,68	34,77	36,78	5,8	-19,5
Zona Centro	18,63	14,41	11,28	-21,7	-39,5
Zona Sur	40,60	23,86	35,33	48,1	-13,0

P/ Preliminar.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

#### GRÁFICO N° 53

PERÚ: CAUDAL PROMEDIO DE LOS RÍOS DE LA VERTIENTE DEL PACÍFICO

Mes: Junio 2018-2019

Metro cúbico por segundo (m<sup>3</sup>/s)



Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

En el mes de junio 2019, el caudal promedio de los principales ríos de la zona norte de la vertiente del Pacífico alcanzó 36,78 m<sup>3</sup>/s, representando una disminución del 19,5% respecto a lo registrado en su promedio histórico (45,68 m<sup>3</sup>/s). Asimismo, un aumento 5,8% respecto al promedio del mes de junio del año anterior (34,77 m<sup>3</sup>/s).

En la zona centro de la vertiente, el caudal promedio durante el mes de junio 2019, alcanzó 11,28 m<sup>3</sup>/s, significando una disminución de 39,5% y 21,7% con respecto a su promedio histórico y similar mes del año anterior, respectivamente.

En la zona sur de la vertiente el caudal promedio fue 35,33 m<sup>3</sup>/s, cifra inferior en 13,0% respecto a su promedio histórico (40,60 m<sup>3</sup>/s), y un aumento de 48,1% respecto a su similar mes del año anterior (23,86 m<sup>3</sup>/s).

## 4.2.2 Nivel de los ríos de la vertiente del Atlántico

### CUADRO N° 19

PERÚ: NIVEL PROMEDIO DE LOS RÍOS DE LA VERTIENTE DEL ATLÁNTICO

Mes: Junio 2018-2019

Zona	Junio			Variación porcentual	
	Promedio histórico	Promedio 2018	Promedio 2019 P/	2019/2018	Prom. 2019 / Prom. hist.
Zona Norte (msnm)	115,03	115,43	115,18	-0,2	0,1
Zona Centro (m)	5,11	5,00	4,68	-6,4	-8,4

P/ Preliminar.


Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

### GRÁFICO N° 54

PERÚ: NIVEL PROMEDIO DE LOS RÍOS DE LA VERTIENTE DEL ATLÁNTICO

Mes: Junio 2018-2019



Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Se registró el nivel promedio de los ríos de la vertiente del Atlántico para la zona norte y la zona centro los promedios fueron 115,18 msnm y 4,68 m respectivamente para el mes de junio 2019.

Las cifras registradas indican que hubo una disminución de 0,2% respecto a su similar mes del año anterior (115,43 msnm) y un aumento de 0,1% con su promedio histórico (115,03 msnm).

Asimismo, para la zona centro se registró disminuciones en 6,4% y 8,4% comparando el valor promedio de junio 2018 (5,00 m) y su promedio histórico (5,11 m) respectivamente.

### 4.2.3 Caudal de los ríos de la vertiente del Lago Titicaca

#### CUADRO N° 20

PERÚ: CAUDAL PROMEDIO DE LOS RÍOS DE LA VERTIENTE DEL LAGO TITICACA

Mes: Junio 2018-2019

Metro cúbico por segundo (m<sup>3</sup>/s)

Vertiente	Junio			Variación porcentual	
	Promedio histórico	Promedio 2018	Promedio 2019 P/	2019/2018	Prom. 2019 / Prom. hist.
Titicaca	10,72	10,95	11,62	6,1	8,4

P/ Preliminar.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

#### GRÁFICO N° 55

PERÚ: CAUDAL PROMEDIO DE LOS RÍOS DE LA VERTIENTE DEL LAGO TITICACA,

Mes: Junio 2018-2019

Metro cúbico por segundo (m<sup>3</sup>/s)



Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología registró que el caudal de los ríos de la vertiente del Lago Titicaca para el mes de junio 2019, llegó a 11,62 m<sup>3</sup>/s, representando aumentos de 6,1% y 8,4% respecto a su similar mes del año anterior (10,95 m<sup>3</sup>/s) y su promedio histórico (10,72 m<sup>3</sup>/s), respectivamente.



## 5. PRECIPITACIONES

En meteorología, la precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae de la atmósfera y llega a la superficie terrestre. Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, granizo, pero no virga, neblina ni rocío, que son formas de condensación y no de precipitación. La cantidad de precipitación sobre un punto de la superficie terrestre es llamada pluviosidad, o monto pluviométrico.



### 5.1 Precipitaciones en la vertiente del Océano Pacífico

#### CUADRO N° 21

PERÚ: PROMEDIO DE LAS PRECIPITACIONES EN LA VERTIENTE DEL PACÍFICO

Mes: Junio 2018-2019

Milímetros (mm)

Zona	Junio			Variación porcentual	
	Promedio histórico	Promedio 2018	Promedio 2019 P/	2019/2018	Prom. 2019 / Prom. hist.
Zona Norte	22,55	5,15	3,98	-22,7	-82,4
Zona Centro	7,20	19,40	2,10	-89,2	-70,8
Zona Sur	2,76	10,60	0,23	-97,8	-91,7

mm: Milímetros

P/ Preliminar.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

#### GRÁFICO N° 56

PERÚ: PROMEDIO DE LAS PRECIPITACIONES EN LA VERTIENTE DEL PACÍFICO

Mes: Junio 2018-2019

Milímetros (mm)



Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informa que para el mes de junio 2019 el promedio de precipitaciones registradas en la zona norte de la vertiente del Océano Pacífico fue 3,98 milímetros el cual disminuyó en 22,7% en relación a lo registrado en el mes de junio 2018 (5,15 mm); caso similar se observa con el promedio histórico que disminuyó en 82,4% (22,55 mm).

Para la zona centro de la vertiente del Océano Pacífico el promedio fue 2,10 milímetros el cual disminuyó en 70,8% con respecto a su promedio histórico (7,20 mm). Asimismo, una disminución de 89,2% con respecto al mes de junio 2018 (19,40 mm).

En la zona sur de la vertiente del Océano Pacífico el promedio fue de 0,23 milímetros el cual disminuyó en 91,7% y 97,8% en su promedio histórico y similar mes del año anterior respectivamente.

## 5.2 Precipitaciones en la vertiente del Atlántico

### CUADRO N° 22

PERÚ: PROMEDIO DE LAS PRECIPITACIONES EN LA VERTIENTE DEL ATLÁNTICO

Mes: Junio 2018-2019

Milímetros (mm)

Zona	Junio			Variación porcentual	
	Promedio histórico	Promedio 2018	Promedio 2019 P/	2019/2018	Prom. 2019 / Prom. hist.
Zona Norte	192,43	91,10	297,90	227,0	54,8
Zona Centro	85,66	95,80	38,02	-60,3	-55,6
Zona Sur	6,02	25,00	11,15	-55,4	85,2

mm: Milímetros

P/ Preliminar.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

### GRÁFICO N° 57

PERÚ: PROMEDIO DE LAS PRECIPITACIONES EN LA VERTIENTE DEL ATLÁNTICO

Mes: Junio 2018-2019

Milímetros (mm)



Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Para el mes de junio 2019, la precipitación promedio en la zona norte de la vertiente del Atlántico alcanzó los 297,90 milímetros, lo que refleja aumentos de 227,0% respecto a similar mes del año anterior (91,10 milímetros), asimismo un aumento de 54,8% respecto a su promedio histórico (192,43 milímetros).

En la zona centro de la vertiente, se registró una precipitación promedio de 38,02 milímetros, representando una disminución de 60,3% respecto a similar mes del año anterior (95,80 milímetros) y una disminución de 55,6% en relación al promedio histórico (85,66 milímetros).

Y en la zona sur de la vertiente, la precipitación promedio fue de 11,15 milímetros que registró un aumento de 85,2% con respecto a su promedio histórico (6,02 mm).

### 5.3 Precipitaciones en la vertiente del Lago Titicaca

#### CUADRO N° 23

PERÚ: PROMEDIO DE LAS PRECIPITACIONES EN LA VERTIENTE DEL LAGO TITICACA

Mes: Junio 2018-2019

Milímetros (mm)

Zona	Junio			Variación porcentual	
	Promedio histórico	Promedio 2018	Promedio 2019 P/	2019/2018	Prom. 2019 / Prom. hist.
Titicaca	6,94	27,24	3,32	-87,8	-52,2

mm: Milímetros

P/ Preliminar.

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

#### GRÁFICO N° 58

PERÚ: PROMEDIO DE LAS PRECIPITACIONES EN LA VERTIENTE DEL LAGO TITICACA

Mes: Junio 2018-2019

Milímetros (mm)



Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El promedio de la precipitación presentada en la vertiente del Lago Titicaca para el mes de junio 2019 fue de 3,32 milímetros, significando una disminución de 87,8% y 52,2% respecto a su similar mes del año anterior (27,24 mm) y a su promedio histórico (6,94 mm) respectivamente.



## 6. EMERGENCIAS Y DAÑOS PRODUCIDOS POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS

El territorio peruano es afectado con frecuencia por la ocurrencia de fenómenos naturales, tales como inundaciones, sismos, avalanchas, heladas, etc.

- Los fenómenos naturales son aquellos provocados por el medio natural, como los geológicos (sismos, terremotos, etc) y los hidrometeorológicos como los huracanes, tormentas tropicales e inundaciones.
- Los fenómenos antrópicos son aquellos provocados por el ser humano como los derrames de petróleo, combustibles, detergente, productos químicos, las guerras, los incendios, los accidentes de avión y de tren.

En ese marco el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), es el ente encargado de evitar o mitigar la pérdida de vidas, bienes materiales y el deterioro del medio ambiente, que como consecuencia de la manifestación de los peligros naturales y/o tecnológicos en cualquier ámbito del territorio nacional, pueda convertirse en emergencia o desastre, atentando contra el desarrollo sostenible del Perú.



### CUADRO N° 24

#### PERÚ: NÚMERO DE EMERGENCIAS Y DAÑOS PRODUCIDOS A NIVEL NACIONAL

Mes: Junio 2019/ Junio 2018

Número (N°)

Periodo	N° de emergencias	N° de damnificados	N° de viviendas afectadas	N° de viviendas destruidas	Hectáreas de cultivo destruidas
<b>2018</b>					
Enero	469	5 199	5 546	258	31
Febrero	359	1 037	3 896	178	415
Marzo	463	2 552	4 317	297	241
Abril	323	2 328	695	189	126
Mayo	169	1 106	444	27	2
Junio	401	592	2 000	99	202
Julio	274	1 257	1 011	44	55
Agosto	284	2 920	557	222	149
Setiembre	311	1 263	467	186	172
Octubre	236	576	827	74	181
Noviembre	201	1 868	826	57	55
Diciembre	504	800	441	78	12 412
<b>2019 P/</b>					
Enero	65	408	131	53	7,25
Febrero	1 632	5 568	4 137	282	-
Marzo	1 910	1 112	8 217	169	266
Abril	751	87	124	10	1 433
Mayo	473	190	66	19	58
Junio	349	111	196	47	3
	<b>Variación porcentual</b>				
Respecto al mes anterior	-26,2	-41,6	197,0	147,4	-94,8
Respecto a similar mes del año anterior	-13,0	-81,3	-90,2	-52,5	-98,5

P/ Preliminar.

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).


Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

### GRÁFICO N° 59

#### PERÚ: NÚMERO DE EMERGENCIAS Y DAÑOS PRODUCIDOS A NIVEL NACIONAL

Mes: Junio 2019 / Junio 2018

Número (N°)



P/ Preliminar.

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó, para el mes de mayo de 2019, a nivel nacional se registraron 349 emergencias, 111 damnificados, 196 viviendas afectadas, 47 viviendas destruidas y 3 hectáreas de cultivo destruidas.

Se registró una disminución en 13,0% en emergencias, 81,3% en número de damnificados, 90,2% en número de viviendas afectadas, 52,5% en número de viviendas destruidas y 98,5% en hectáreas de cultivo destruidas con respecto a su similar mes del año anterior (junio 2018).

Asimismo, con respecto al mes anterior (mayo 2019) se analizó las cifras las cuales concluyeron que hubo una disminución de 26,2% y 41,6% en el número de emergencias y en el número de damnificados.

**CUADRO N° 25****PERÚ: NÚMERO DE EMERGENCIAS OCURRIDAS, SEGÚN DEPARTAMENTO**

Mes: Junio 2019

Número (N°)

Departamento	Total de emergencias P/	N° de fallecidos P/	N° de heridos P/	N° de damnificados P/	Distribución % de los damnificados	N° de afectados P/	Distribución % de los afectados	N° de viviendas afectadas P/	N° de viviendas destruidas P/	Hectáreas de cultivo destruidas P/
<b>Total</b>	<b>349</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>111</b>	<b>100,0</b>	<b>574</b>	<b>100,0</b>	<b>196</b>	<b>47</b>	<b>3,12</b>
Apurímac	52	-	-	-	...	352	61,3	128	-	-
Cajamarca	43	-	-	-	...	122	21,3	31	-	-
Lima	39	-	1	12	10,8	-	...	-	-	-
Arequipa	24	-	-	-	...	67	11,7	26	-	0,12
Cusco	19	-	-	-	...	-	...	-	-	-
Pasco	19	-	-	-	...	1	0,2	2	-	-
Huancavelica	18	-	-	-	...	-	...	-	-	-
Huánuco	18	1	-	4	3,6	-	...	-	-	-
Piura	17	-	21	21	18,9	-	...	-	1	-
La Libertad	15	-	-	-	...	-	...	-	-	-
Junín	11	-	-	1	0,9	-	...	-	1	-
Áncash	9	-	-	-	...	-	...	-	-	3
Puno	9	-	-	-	...	-	...	-	-	-
Tumbes	8	-	-	10	9,0	32	5,6	9	1	-
Ica	7	-	-	-	...	-	...	-	-	-
San Martín	7	-	-	53	47,7	-	...	-	9	-
Ucayali	7	-	-	8	7,2	-	...	-	2	-
Ayacucho	6	-	-	-	...	-	...	-	-	-
Amazonas	5	-	-	-	...	-	...	-	33	-
Loreto	5	-	-	-	...	-	...	-	-	-
Tacna	4	-	-	2	1,8	-	...	-	-	-
Lambayeque	2	-	-	-	...	-	...	-	-	-
Madre de Dios	2	-	-	-	...	-	...	-	-	-
Moquegua	2	-	-	-	...	-	...	-	-	-
Provincia Constitucional del Callao	1	-	-	-	...	-	...	-	-	-

P/ Preliminar.


Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

**GRÁFICO N° 60****PERÚ: NÚMERO DE EMERGENCIAS OCURRIDAS, SEGÚN DEPARTAMENTO**

Mes: Junio 2019

Número (N°)



Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

INDECI informó que el número total de emergencias ocurridas a nivel nacional fue de 349 emergencias, reportadas en el mes de junio 2019. Se registró 1 persona fallecida, 22 personas heridas, 111 personas damnificadas, 574 personas afectadas, 196 viviendas afectadas, 47 viviendas destruidas y 3,12 hectáreas de cultivo destruidas.

El mayor número de emergencias ocurridas se registró en el departamento de Apurímac (52), Cajamarca (43), Lima (39), Arequipa (24), Cusco y Pasco (19 en cada departamento), Huancavelica y Huánuco (18 en cada departamento), Piura (17), La Libertad (15), Junín (11), Áncash y Puno (9 en cada departamento), Tumbes (8), Ica, San Martín y Ucayali (7 en cada departamento), Ayacucho (6), Amazonas y Loreto (5 en cada departamento), Tacna (4), Lambayeque, Madre de Dios y Moquegua (2 en cada departamento) y Provincia Constitucional del Callao (1).

**CUADRO N° 26**

PERÚ: EMERGENCIAS Y DAÑOS PRODUCIDOS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN TIPO DE FENÓMENO

Mes: Junio 2018/ Junio 2017

Emergencias

Tipo de fenómeno	Emergencias			Daños producidos Junio 2019			
	Junio 2018	Junio 2019 P/	Variación % 2019 / 2018	Damnificados P/	Afectados P/	Afectados P/	Heridos P/
<b>Total</b>	<b>401</b>	<b>349</b>	<b>-13,0</b>	<b>111</b>	<b>574</b>	<b>196</b>	<b>47</b>
<b>Fenómenos naturales</b>	<b>342</b>	<b>229</b>	<b>-33,0</b>	<b>4</b>	<b>574</b>	<b>196</b>	<b>0</b>
Heladas	145	124	-14,5	-	541	185	-
Vientos fuertes	15	40	166,7	-	5	2	-
Lluvias intensas	21	25	19,0	-	-	-	-
Deslizamiento	8	16	100,0	-	-	1	-
Descenso de temperatura	31	7	-77,4	-	-	-	-
Friaje	17	4	-76,5	-	-	-	-
Inundación por desborde de río	3	3	0,0	-	-	-	-
Sismos	1	3	200,0	-	-	-	-
Derrumbe cerros	2	2	0,0	-	-	-	-
Maretazo (marejadas)	-	2	...	-	28	8	-
Granizadas	-	1	...	4	-	-	-
Sequías	-	1	...	-	-	-	-
Erupciones volcánicas	-	1	...	-	-	-	-
Nevada	97	-	...	-	-	-	-
Otros	2	-	...	-	-	-	-
<b>Fenómenos antrópicos</b>	<b>59</b>	<b>120</b>	<b>103,4</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
Incendios urbanos	58	75	29,3	101	-	-	47
Incendios forestales	1	13	1 200,0	-	-	-	-
Derrumbe vivienda	-	12	...	6	-	-	-
Accidente de transporte medio terrestre	-	5	...	-	-	-	-
Inundación por desborde de canales	-	4	...	-	-	-	-
Derrumbe estructura general	-	4	...	-	-	-	-
Otros	-	2	...	-	-	-	-
Inundación por desborde en la ruptura de diques	-	1	...	-	-	-	-
Explosiones	-	1	...	-	-	-	-
Contaminación ambiental de aguas	-	1	...	-	-	-	-
DSNPP gas natural	-	1	...	-	-	-	-
DSNPP hidrocarburos	-	1	...	-	-	-	-

P/ Preliminar.

Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Para el mes de junio 2019 se reportaron 349 emergencias ocurridas a nivel nacional que fueron de tipo: fenómenos naturales y fenómenos antrópicos. En relación a los fenómenos naturales (229 emergencias) estas emergencias se refieren a heladas (124), vientos fuertes (40), lluvias intensas (25), deslizamiento (16), descenso de temperatura (7), friaje (4), inundación por desborde de río y sismos (3 en cada caso), derrumbe de cerros y maretazo (marejadas) (2 en cada caso), granizadas, sequías y erupciones volcánicas (1 en cada caso).

En relación a los fenómenos antrópicos (120 emergencias) estas emergencias se refieren a incendios urbanos (75), incendios forestales (13), derrumbe vivienda (12), accidente de transporte medio terrestre (5), inundación por desborde de canales y derrumbe estructura general (4 en cada caso), inundación por desborde en la ruptura de diques, explosiones, contaminación ambiental de aguas, DSNPP gas natural y DSNPP hidrocarburos (1 en cada caso), Otros (2).



## 7. HELADAS

El territorio peruano tiene una configuración geográfica especial, debido a la presencia de la Cordillera de los Andes que posee una influencia significativa en las variaciones de la temperatura del aire, dando lugar a una variedad de climas. Entre estas variaciones de la temperatura, encontramos las que se registran en ciertos lugares del país con temperaturas bajo cero grados centígrados, comúnmente llamadas heladas y que se encuentran con gran frecuencia en ciertos lugares de la sierra con alturas generalmente sobre los 3 mil metros sobre el nivel del mar, coincidente con la hora de la temperatura mínima del día, generalmente en la madrugada. Los impactos que tienen las heladas en las actividades económicas, especialmente en el agro, así como sus repercusiones en el área social y ambiental, son significativos.



### CUADRO N° 27

PERÚ: DÍAS DE HELADAS Y MAYOR INTENSIDAD REGISTRADA, SEGÚN ESTACIÓN

Mes: Junio 2018 - 2019

Grado Celsius (°C)

Estación	Departamento	Días de heladas durante el mes Junio 2019	Mayor Intensidad registrada (Grados Celsius, °C)	
			2018	2019
Imata	Arequipa	30	-14,6	-14,2
Caylloma	Arequipa	30	-10,6	-9,8
Pillones	Arequipa	30	-13,4	-13,8
Salinas	Arequipa	30	-11,3	-10,8
Chuapalca	Tacna	30	-16,8	-20,0
Cojata	Puno	30	-9,4	-14,6
Capazo	Puno	30	-12,6	-15,0
Crucero Alto	Puno	30	-10,6	-9,8
Macusani	Puno	30	-10,6	-12,0
Mazo Cruz	Puno	29	-17,4	-17,2
Sicuani	Cusco	26	-7,0	-7,4
Desaguadero	Puno	26	-9,0	-6,0
La Oroya	Junín	25	-4,0	-7,9
Cabanillas	Puno	25	-4,8	-10,4
Anta Ancachuro	Cusco	24	-6,5	-7,5
Santa Ana	Junín	21	-3,6	-5,0
La Victoria	Cajamarca	16	0,0	-2,9
Lircay	Huancavelica	5	-	-2,0
Candarave	Tacna	1	-	-2,0

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).  
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El SENAMHI monitorea heladas meteorológicas en 19 estaciones durante el mes de junio 2019, que se encuentran ubicadas en los departamentos de Puno, Tacna, Arequipa, Junín, Cusco, Huancavelica y Cajamarca.

Las temperaturas más bajas se registraron en las estaciones de Chuapalca (-20,0°C), Mazo Cruz (-17,2°C), Capazo (-15,0°C), Cojata (-14,6°C), Imata (-14,2°C), Pillones (-13,8°C), Macusani (-12,0°C), Salinas (-10,8°C), Cabanillas (-10,4°C), Caylloma y Crucero Alto (-9,8°C en cada estación), La Oroya (-7,9°C), Anta Ancachuro (-7,5°C), Sicuani (-7,4°C), Desaguadero (-6,0°C), Santa Ana (-5,0°C), La Victoria (-2,9°C), Lircay y Candarave (-2,0°C en cada estación).


Las estaciones que tuvieron mayor número de días donde se registraron las heladas meteorológicas fueron: Imata, Caylloma, Pillones, Salinas, Chuapalca, Cojata, Capazo, Crucero Alto y Macusani (30 días en cada estación), Mazo Cruz (29 días), Sicuani y Desaguadero (26 días en cada estación), La Oroya y Cabanillas (25 días en cada estación), Anta Ancachuro (24 días), Santa Ana (21 días), La Victoria (16 días), Lircay (5 días) y Candarave (1 día).

### GRÁFICO N° 61

PERÚ: MAYOR INTENSIDAD REGISTRADA DE LAS HELADAS METEOROLÓGICAS

Mes: Junio 2019

Temperatura bajo cero grados



P/ Preliminar.  
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).  
Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

**GRÁFICO N° 62**  
**PERÚ: ALTITUD DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS**  
 Metros sobre el nivel del mar



Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).  
 Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

## GLOSARIO

## Concepto de términos Medio Ambientales

TÉRMINO	CONCEPTO
<b>AFECTADO</b>	Persona, animal, territorio o infraestructura que sufre perturbación en su ambiente por efectos de un fenómeno. Puede requerir de apoyo inmediato para eliminar o reducir las causas de la perturbación para la continuación de la actividad normal.
<b>ATMÓSFERA</b>	Es la capa gaseosa que rodea la Tierra y un elemento primordial que mantiene la vida de todos los seres vivos dentro del planeta, nos protege físicamente contra agentes externos como los meteoritos; además, de ser un regulador térmico y protegernos de las radiaciones ultravioleta.
<b>CALIDAD DEL AGUA</b>	Es una medida de la condición del agua en relación con los requisitos de una o más especies bióticas o a cualquier necesidad humana o propósito. La calidad del agua se ve afectado por la contaminación del agua de los ríos es causada principalmente por el vertimiento de relaves mineros (parte alta y media de la cuenca), aguas servidas urbanas y desagües industriales a lo largo de todo su cauce (generalmente en la parte media y baja de la cuenca), que tiene efectos dañinos para la salud y el ecosistema; así como también se ve afectada por el uso de plaguicidas y pesticidas en la actividad agrícola.
<b>DAMNIFICADO</b>	Persona afectada, parcial o íntegramente por una emergencia o desastre y, que ha sufrido daño o perjuicio a su salud o sus bienes, en cuyo caso generalmente ha quedado sin alojamiento o vivienda en forma total o parcial, permanente o temporalmente, por lo que recibe refugio y ayuda humanitaria temporales. No tiene capacidad propia para recuperar el estado de sus bienes y patrimonio.
<b>DIÓXIDO DE AZUFRE</b>	Es un gas pesado, incoloro e inodoro en concentraciones bajas y de color ocre en concentraciones altas. Se produce principalmente por la quema de combustibles fósiles. Es perjudicial para los seres humanos y la vegetación, contribuye a la acidez de las precipitaciones.
<b>DIÓXIDO DE NITRÓGENO</b>	Es un gas de color marrón claro o amarillo, producido por la quema de combustibles a altas temperaturas, como es el caso de las termoeléctricas, plantas industriales y la combustión del parque automotor. Es un agente oxidante y contaminante del medio ambiente y genera el smog fotoquímico y la lluvia ácida. La exposición a periodos prolongados o a altas concentraciones afecta las vías respiratorias, causando graves cambios en el tejido pulmonar.
<b>ESTÁNDAR DE CALIDAD AMBIENTAL (ECA)</b>	Es el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire, en su condición de cuerpo receptor que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni el ambiente.
<b>FENÓMENOS INDUCIDO</b>	También llamado fenómeno tecnológico o antrópico, producido por la actividad del hombre. Llámense incendios, accidentes, derrame de sustancia nociva, contaminación y otros.
<b>FENÓMENOS NATURALES</b>	Todo lo que ocurre en la naturaleza, puede ser percibido por los sentidos y ser objeto del conocimiento. Se clasifican en: fenómenos generados por procesos dinámicos en el interior de la tierra; fenómenos generados por procesos dinámicos en la superficie de la tierra; fenómenos meteorológicos o hidrológicos; fenómenos de origen biológico.
<b>HELADAS</b>	Se produce cuando la temperatura ambiental baja debajo de cero grados. Son generadas por la invasión de masas de aire de origen antártico y, ocasionalmente, por un exceso de enfriamiento del suelo durante cielos claros y secos. Es un fenómeno que se presenta en la sierra peruana y con influencia en la selva, generalmente en la época de invierno.
<b>ÍNDICE UV-B</b>	Es una medida sencilla de la intensidad de la radiación ultravioleta en la superficie terrestre y un indicador de su capacidad de producir lesiones cutáneas
<b>MATERIAL PARTICULADO</b>	Se denomina material particulado a una mezcla de partículas líquidas y sólidas, de sustancias orgánicas e inorgánicas, que se encuentran en suspensión en el aire. El material particulado forma parte de la contaminación del aire. Su composición es muy variada y podemos encontrar, entre sus principales componentes, sulfatos, nitratos, el amoníaco, el cloruro sódico, el carbón, el polvo de minerales, cenizas metálicas y agua. Dichas partículas además producen reacciones químicas en el aire.
<b>MONÓXIDO DE CARBONO</b>	Es un gas inodoro, incoloro y altamente tóxico. Puede causar la muerte cuando se respira en niveles elevados. Se produce por la combustión deficiente de sustancias como gas, gasolina, keroseno, carbón, petróleo, tabaco o madera.
<b>NIVELES DE TURBIEDAD EN EL RÍO RÍMAC</b>	El instrumento usado para la medición de la turbiedad es el nefelómetro o turbidímetro, que mide la intensidad de la luz dispersada a 90 grados cuando un rayo de luz pasa a través de una muestra de agua. Una medición de la turbidez puede ser usada para proporcionar una estimación de la concentración de sólidos totales en suspensión.  La unidad nefelométrica de turbidez, (UNT) es una unidad utilizada para medir la turbidez de un fluido, sólo líquidos y no aplicable a gases o atmósfera.

<b>OZONO TROPOSFÉRICO</b>	<p>Es un gas incoloro y muy irritante creado por reacciones fotoquímicas entre los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles producidos en buena medida por la quema de combustible, vapores de gasolina y solventes químicos.</p> <p>El ozono (O<sub>3</sub>) es un gas que se encuentra en diversas partes de la atmósfera. El de la atmósfera superior, o estratosfera, es un gas esencial que ayuda a proteger a la Tierra de los dañinos rayos ultravioletas del sol. En contraste, el ozono hallado cerca de la superficie, en la troposfera, perjudica tanto a la salud humana como al medio ambiente. Por esta razón el ozono se describe a menudo como “bueno arriba y malo de cerca”.</p>
<b>PARTÍCULAS PM<sub>2,5</sub></b>	<p>Es el material particulado menor a 2,5 micras (PM<sub>2,5</sub>), está conformado por partículas sólidas o líquidas; es generado por fuentes de combustión, principalmente el parque automotor. Su tamaño hace que sean 100% respirables, penetrando así en el aparato respiratorio.</p>
<b>PARTÍCULAS PM<sub>10</sub></b>	<p>Es el material particulado de diámetro menor o igual a 10 micras. Son partículas sólidas o líquidas suspendidas en el aire cuya composición química es muy diversa y depende tanto de la fuente emisora como del mecanismo de su formación. Incluye tanto las partículas gruesas (de un tamaño comprendido entre 2,5 y 10 µg/m<sup>3</sup>) como las finas (de menos de 2,5 µg/m<sup>3</sup>, PM<sub>2,5</sub>). Las primeras se forman básicamente por medio de procesos mecánicos, como las obras de construcción, la resuspensión del polvo de los caminos y el viento, mientras que las segundas como antes se indicó proceden sobre todo de fuentes de combustión.</p> <p>Entre los compuestos que generalmente conforman la mayor parte de las partículas están el amoníaco, sulfatos, carbón y polvo, que afectan el sistema respiratorio y cardiovascular.</p>
<b>RADIACIÓN SOLAR</b>	<p>Es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el sol, las más conocidas son del tipo infrarrojo y ultravioleta.</p>
<b>RADIACIÓN ULTRAVIOLETA (UV)</b>	<p>Se denomina al conjunto de radiaciones de espectro electromagnético con longitudes de onda menores que la radiación visible (luz), desde los 400 hasta los 150 nanómetros (nm). Se suele diferenciar tres tipos de radiación ultravioleta (UV): UV-A, UV-B y UV-C.</p>
<b>PRESENCIA DE ALUMINIO (AL)</b>	<p>El consumo de concentraciones significativas de aluminio puede causar un efecto serio en la salud, como daño al sistema nervioso central, demencia, pérdida de la memoria, apatía y temblores severos.</p>
<b>PRESENCIA DE CADMIO (CD)</b>	<p>El agua con concentraciones muy altas de cadmio irrita el estómago, produce vómitos y diarreas. El cadmio absorbido por el cuerpo humano produce descalcificación de los huesos, ocasionando que se vuelvan quebradizos; y en dosis altas ocasiona la muerte.</p>
<b>PRESENCIA DE MATERIA ORGÁNICA</b>	<p>Gran parte de la materia orgánica que contamina el agua procede de los desechos de alimentos y de las aguas negras domésticas e industriales. La materia orgánica es descompuesta por bacterias, protozoarios y diversos microorganismos.</p>
<b>PRESENCIA DE NITRATOS (NO<sub>3</sub>)</b>	<p>Los niveles elevados de nitratos pueden indicar la posible presencia de otros contaminantes, tales como microorganismos o pesticidas, que podrían causar problemas a la salud. A partir de grandes concentraciones de nitrato en el agua (más de 100 miligramos por litro) se percibe un sabor desagradable y además puede causar trastornos fisiológicos. Por sus efectos tóxicos, los nitratos pueden ocasionar signos de cianosis (coloración azulada de la piel o de las membranas mucosas a causa de una deficiencia de oxígeno en la sangre).</p>
<b>PRESENCIA DE PLOMO (PB)</b>	<p>La presencia de plomo en altas concentraciones produce efectos tóxicos en la salud, siendo los niños más susceptibles que los adultos, habiéndose documentado la presencia de retraso en el desarrollo, problemas de aprendizaje, trastornos en la conducta, alteraciones del lenguaje y de la capacidad auditiva, anemia, vómito y dolor abdominal recurrente.</p>
<b>OZONO ESTRATOSFÉRICO</b>	<p>Es el componente de la atmósfera que permite preservar la vida sobre la Tierra y actúa como escudo para protegerla de la radiación ultravioleta-B, perjudicial para la vida humana, el ecosistema terrestre y marino. La capa de ozono se encuentra en la estratósfera, aproximadamente entre los 30 y 50 kilómetros de altitud, es un filtro natural que nos protege de los rayos ultravioleta (dañinos), emitidos por el Sol, ya que absorbe la radiación solar.</p>
<b>UNIDAD DOBSON</b>	<p>Es una manera de expresar la cantidad presente, de ozono en la atmósfera terrestre, específicamente en la estratósfera.</p>

# Ficha Técnica

## 1. Objetivos

### Objetivo general:

Proporcionar estadísticas e indicadores sobre aspectos relevantes del medio ambiente, a fin de favorecer el monitoreo y seguimiento de las políticas públicas ambientales en el corto plazo.

### Objetivos específicos:

- Mostrar el índice de radiación ultravioleta (IUV)
- Mostrar las concentraciones de material particulado  $PM_{2.5}$  y  $PM_{10}$ .
- Mostrar las concentraciones de contaminantes gaseosos como el dióxido de azufre ( $SO_2$ ), dióxido de nitrógeno ( $NO_2$ ), ozono troposférico ( $O_3$ ) y monóxido de carbono (CO).
- Presentar mediciones de la concentración de ozono total atmosférico realizado por la estación VAG Marcapomacocha.
- Proporcionar información sobre la calidad de agua mediante las concentraciones de minerales como: (hierro (Fe), plomo (Pb), Cadmio (Cd), Aluminio (Al), materia orgánica y nitratos ( $NO_3$ ) en el río Rímac y en las plantas de tratamiento 1 y 2 de SEDAPAL.
- Producción nacional y de Lima Metropolitana de agua potable.
- Caudal de los ríos Rímac y de principales ríos de las vertientes del pacífico, atlántico y del Lago Titicaca, así como el promedio de precipitaciones.
- Emergencias y daños producidos por fenómenos naturales y antrópicos y de la medición de las heladas.

## 2. Características técnicas

### Cobertura geográfica

- A nivel de Lima Metropolitana.
- A nivel Nacional se presenta la Producción de agua, Emergencias y daños producidos por fenómenos naturales y antrópicos y Heladas.

### Cobertura temática

- Radiación ultravioleta
- Calidad del aire
- Calidad del agua
- Producción de agua
- Caudal de los ríos
- Precipitaciones
- Emergencias y daños producidos por fenómenos naturales y antrópicos
- Heladas

## 3. Periodo de referencia

Es el mes anterior al mes de la publicación del año de referencia.

## 4. Métodos y Fuentes

- Envío de solicitudes de información para elaborar el Informe Técnico de Estadísticas Ambientales a las siguientes entidades:
  - ◆ Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)
  - ◆ Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL)
  - ◆ Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS)
  - ◆ Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
- Revisión de la información recopilada, en casos de inconsistencias se coordina con las entidades proveedores.
- Elaboración de gráficos y cuadros estadísticos
- Análisis, Interpretación y comentarios de las cifras estadísticas.

## 5. Publicación/Productos

El Informe Técnico de Estadísticas Ambientales, se publica mensualmente en la página web del INEI, de acuerdo al cronograma establecido.