

ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR 2000

Departamento de Apurímac

*Instituto Nacional de
Estadística e Informática*

*Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo
Internacional
(USAID)*

*Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia
(UNICEF)*

*Measure/DHS+, Macro
International Inc.*

**Lima - Perú
Noviembre del 2001**

El programa de Encuestas de Demografía y Salud (ahora conocido como Measure/DHS) proporciona asistencia a instituciones gubernamentales y privadas en la planeación y ejecución de encuestas nacionales en países en vías de desarrollo. Con financiamiento proveniente de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el programa DHS es implementado por Macro International Inc., con sede en Maryland, USA. Los objetivos de este programa son a) proporcionar bases de datos y análisis a los organismos ejecutivos en el campo de la población para facilitar la consideración de alternativas y la toma de decisiones bien informadas; b) expandir la base internacional de datos en los campos de población y salud materno-infantil; c) aportar avances en la metodología de encuestas por muestreo; y d) consolidar la capacidad técnica y los recursos para la realización de encuestas demográficas complejas en los países participantes. Para información adicional sobre el programa DHS favor dirigirse a:

Programa DHS/Macro International Inc.
11785 Beltsville Drive
Calverton Maryland 20705 USA
Teléfono: (301) 572-0200
Telefax: (301) 572-0999.

Dentro del marco de las encuestas DHS, el INEI ha levantado cuatro encuestas nacionales de demografía y salud: ENDES 1986, ENDES 1991-1992, ENDES 1996 y ENDES 2000. La financiación de los costos locales de la ENDES 2000 estuvo a cargo de INEI; USAID (Washington y Perú) a través del programa DHS de Macro International Inc; y, el Fondo de Población de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Para información adicional sobre las encuestas favor dirigirse a:

Instituto Nacional de Estadística e Informática
Av. General Garzón No 658
Jesús María, Lima 11
Perú
Teléfono: (511) 433-8284/433-3104
Fax: (511) 433-3159

Preparado	:	Por la Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales Impreso en los Talleres de la Oficina de Impresiones de la Oficina Técnica de Administración del Instituto Nacional de Estadística e Informática
Diagramación	:	Centro de Edición del INEI
Edición	:	100 Ejemplares
Domicilio	:	Av. Gral. Garzón N° 658 Jesús María, Lima 11
Orden N°	:	691-OTA-INEI
Depósito Legal	:	N° 1501132001-3887

PRESENTACION

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), presenta el **Informe de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2000)** del departamento de Apurímac, el cual provee información actualizada sobre la situación demográfica, los aspectos de salud reproductiva y de salud materno infantil del departamento de Apurímac.

El objetivo del documento es el de proporcionar la información que permita apoyar la toma de decisiones, la formulación y evaluación de planes y proyectos a nivel descentralizado.

La ejecución de la **ENDES IV**, ha sido posible gracias al apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/Washington y USAID/Perú) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Parte importante del éxito del estudio se debe a la asistencia técnica de Macro International Inc. y a la activa participación de los jefes departamentales del INEI y los representantes de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales que participaron en la concepción de esta importante investigación nacional.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática, expresa su más profundo reconocimiento a las mujeres de Apurímac, seleccionadas al azar, que proporcionaron sus datos y a todas las instituciones y personas que contribuyeron al desarrollo de la encuesta, especialmente a las Supervisoras y Entrevistadoras que recorrieron los confines del país en búsqueda de las viviendas seleccionadas y cuyo esfuerzo hizo posible culminar la ardua fase de recolección de datos para la presentación de este informe.

Lima, Noviembre del 2001

Gilberto Moncada Vigo

Jefe

Instituto Nacional de Estadística
e Informática

PRESENTACION	3
RESUMEN GENERAL	11
DATOS BASICOS	15
 I. INTRODUCCIÓN	 19
1.1 Antecedentes y Objetivos de la Encuesta	19
Antecedentes y Justificación	19
Objetivos de la Encuesta	19
1.2 Aspectos Metodológicos	20
Población Bajo Estudio	20
Diseño y Tamaño de la Muestra para la ENDES 2000	20
Cuestionarios y Principales Temas Investigados	20
1.3 Aspectos Operativos de la Encuesta	22
Entrenamiento del Personal	22
Recolección de los Datos	22
Consistencias y Procesamiento de Datos	22
1.4 Contexto Económico y Políticas de Población y Salud	23
Perú: Economía, Programa Nacional de Población y Programa de Salud al año 2000	23
Economía	23
Política y Programa Nacional de Población	24
Plan Nacional de Población 1998 - 2002	24
Salud Reproductiva y Programa de Planificación Familiar 1996-2000	24
Programas y Prioridades de Salud	25
Acciones en favor de la Mujer	25
Erradicación de la Violencia Contra la Mujer	26
1.5 Nivel Departamental	26
1.5.1 Apurímac: Aspectos Geográficos, Políticos Administrativos	26
Aspectos Geográficos	26
Aspectos Políticos Administrativos	27
Población	27
Economía	27
1.5.2 Apurímac: Tamaño de la Muestra de la ENDES IV	27

II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION	31
2.1 Características de la Población del Departamento de Apurímac	31
Población por Edad, Sexo y Residencia Urbana-Rural	31
Nivel de Educación y Asistencia a Centros de Enseñanza Regular	33
Asistencia Escolar	34
Composición de los Hogares	35
2.2 Características de las Viviendas	36
Disponibilidad de Bienes de Consumo Duradero y Medio de Transporte	38
III. CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS MUJERES	41
3.1 Entrevistadas por Edad, Estado Conyugal y Area de Residencia	41
3.2 Nivel de Educación	42
3.3 Acceso a Medios Masivos de Comunicación	45
3.4 Situación Laboral	46
3.5 Decisiones sobre Aspectos importantes en el Hogar	48
IV. FECUNDIDAD	57
4.1 Niveles, Tendencias y Diferenciales de la Fecundidad	57
4.2 Fecundidad Acumulada	60
4.3 Intervalos entre Nacimientos	61
4.4 Edad de la Madre al Nacimiento del Primer Hijo	62
4.5 Fecundidad en Adolescentes	63
V. PLANIFICACION FAMILIAR	67
5.1 Conocimiento de Métodos	67
5.2 Uso de Métodos Anticonceptivos	69
El Uso Pasado	69
Prevalencia Actual del Uso de Métodos	70
Diferenciales en los Niveles de Uso Actual	71
Número de Hijos al Iniciar el Uso de Anticonceptivos	73
Conocimiento del Período Fértil	73
Fuentes de Suministro de Métodos Modernos	74

5.3	Discontinuación del Uso de Métodos y Uso Futuro	77
	Razones de Discontinuación del Uso de Métodos Anticonceptivos	77
	Intenciones de Uso en el Futuro	78
5.4	Mensajes sobre Planificación Familiar: Exposición y Aceptabilidad	79
	Discusión sobre la Planificación Familiar entre parejas	81
VI.	OTROS DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD	85
6.1	Estado Conyugal Actual	85
6.2	Edad a la Primera Unión Conyugal	87
6.3	Edad a la Primera Relación Sexual	88
6.4	Actividad Sexual Previa y Reciente	89
6.5	Infertilidad Postparto	90
6.6	Exposición al Riesgo de Embarazo entre las Mujeres de 30 y Más Años	92
VII.	PREFERENCIAS DE FECUNDIDAD	95
7.1	El Deseo de Más Hijos	95
7.2	La Necesidad Insatisfecha y la Demanda de Servicios de Planificación Familiar	98
	La Necesidad Insatisfecha de Planificación Familiar	98
	La Demanda Total de Planificación Familiar	98
7.3	Número Ideal de Hijos	100
7.4	Planificación de la Fecundidad	101
7.5	Tasas de Fecundidad Deseada	102
VIII.	MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ	107
8.1	Mortalidad Infantil y en la Niñez	107
	Niveles y Tendencias de la Mortalidad Infantil y en la Niñez	108
8.2	Diferenciales de la Mortalidad Infantil y en la Niñez	108
8.3	La Mortalidad Perinatal	110
8.4	Grupos de Alto Riesgo Reproductivo	111

IX. SALUD MATERNO-INFANTIL	115
9.1 Atención Prenatal y Asistencia en el Parto	115
Atención Prenatal	115
Toxoide Antitetánico	119
9.2 Asistencia del Parto	121
Lugar de Ocurrencia del Parto	121
Tipo de Asistencia Durante el Parto	122
Características del Parto	123
9.3 Cuidado Postnatal de las Madres	125
9.4 Síntomas que Llevan a Buscar Ayuda Médica	128
9.5 Vacunación	129
Vacunación en Cualquier Momento	129
Vacunación a la Edad Apropiaada	131
9.6 Enfermedades Respiratorias Agudas	131
9.7 Prevalencia y Tratamiento de la Diarrea	134
Prevalencia de la Diarrea	134
Conocimiento del Cuidado de la Diarrea	135
Formas de Eliminación de las Deposiciones de los Niños	136
X. LACTANCIA Y NUTRICION DE NIÑOS Y MADRES	141
10.1 Iniciación de la Lactancia	141
10.2 Lactancia y Alimentación Suplementaria según Edad del Niño	143
10.3 Duración de la Lactancia según Características Seleccionadas	144
10.4 Tipo de Alimentación Complementaria según Meses desde el Nacimiento	146
10.5 Nutrición de los Niños	149
Prevalencia de la Desnutrición Crónica	149
Prevalencia de la Desnutrición Aguda o Emaciación	149
Prevalencia de la Desnutrición Global o General	149
10.6 Nutrición de las Mujeres	151
Estatura de las Mujeres en Edad Fértil	151
Peso y Masa Corporal de las Mujeres	152

10.7 Anemia en Niños y Mujeres	154
Introducción	154
Prueba de Anemia	154
Resultados	155
XI. CONOCIMIENTO DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS	161
11.1 Conocimiento de VIH/SIDA y Formas de Evitar el Contagio	161
11.2 Conocimiento de Asuntos Relacionados con el VIH/SIDA	165
11.3 Conocimiento de las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS)	166
11.4 Prevalencia de las Enfermedades de Transmisión Sexual	168
11.5 Conducta Sexual, Uso del Condón y Acceso al Condón	170
XII. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS NIÑOS	175
12.1 Violencia Verbal del Esposo contra la Mujer	175
12.2 Violencia Física contra la Mujer	177
12.3 Solicitud de Ayuda y Denuncia del Maltrato	179
12.4 Maltrato a los Niños	182
ANEXO	189
APENDICE A: DISEÑO Y COBERTURA DE LA MUESTRA	201
A.1 Introducción	203
A.2 Diseño y Selección	203
Unidades de Muestreo	203
Marco Muestral	203
Composición de la Muestra	204
Selección de la Muestra	204
Rendimiento de la Muestra	207
Metodología de Estimación	207
APENDICE B: LOS ERRORES DE MUESTREO	209
APENDICE C: LISTA DE CUADROS	217
LISTA DE GRAFICOS	222

RESUMEN General

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN

La altura del territorio del departamento de Apurímac oscila entre los 2378 m.s.m. (distrito de Abancay, provincia del mismo nombre) y los 3952 m.s.m. (distrito de Pataypampa en la provincia de Grau). Su población proyectada al 2000 es de 426,904 habitantes. Según la ENDES 2000, el 76 por ciento de sus habitantes vive en el área rural.

La población de Apurímac es joven. Los menores de 15 años representan el 42 por ciento de la población total del departamento. La población en edad de trabajar, 15 a 64 años, representa el 51 por ciento de la población total del departamento y las personas de la tercera edad llegan solo a 7 por ciento.

Con relación a algunas variables para analizar la situación de la educación, la ENDES 2000 encontró que la población femenina de 6 años a más del departamento que no tiene ningún grado de instrucción llega a 29 por ciento, y la que solamente tiene estudios a nivel primaria es 48 por ciento. La situación de los hombres es mejor que la de las mujeres, el porcentaje de los hombres que no tiene ningún grado de instrucción llega a 11 por ciento y el porcentaje de los que sólo tienen primaria es de 53 por ciento. Asimismo, se aprecia que la mediana de estudios lograda por los hombres llega a 5 años y por las mujeres a 3. El nivel de inasistencia o deserción escolar en la población de 6 a 24 años es de 26 por ciento.

El 83 por ciento de los hogares en el departamento de Apurímac tiene a un hombre como jefe del hogar. En el área rural y urbana predominan los hogares con jefatura masculina.

Los hogares con jefatura femenina solo llega a 17 por ciento. El promedio de miembros por hogar es de 4.2 personas.

Con relación a la disponibilidad de los servicios básicos dentro de las viviendas; el 55 por ciento de las viviendas del departamento de Apurímac no tiene servicio eléctrico, en el área rural esta proporción llega a 69 por ciento. El 41 por ciento de las viviendas tiene servicio de agua dentro de la vivienda. La diferencia de los hogares que cuentan con este servicio tanto en el área urbana 86 por ciento y en el rural 29 por ciento es alta. Los hogares que cuentan con inodoro exclusivo dentro de la vivienda, llegan a 16 por ciento. Siendo mayor en el área urbana 58 por ciento, que en el área rural 4 por ciento.

CARACTERISTICAS DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL

Las mujeres en edad fértil (MEF), representan el 20 por ciento del total de la población del departamento de Apurímac. El estado conyugal de las mujeres en edad fértil es el siguiente: el 71 por ciento son casadas o convivientes. Cerca de la cuarta parte de entrevistadas son mujeres solteras.

El 44 por ciento de las mujeres entrevistadas tiene algún año de educación primaria, el 28 por ciento secundaria y el 13 por ciento educación superior.

Cuando se le pidió al 59 por ciento de mujeres sin nivel de educación y a las que tienen educación primaria que leyeran una cartilla, se obtuvo que solamente 28 por ciento podía leer con facilidad, lo cual indica que el analfabetismo funcional en las MEF del departamento de Apurímac es considerable.

El 27 por ciento de las MEF, trabaja en forma permanente. El trabajo estacional de las MEF a nivel nacional se presenta en mayor proporción en Apurímac, 24 por ciento.

FECUNDIDAD

La Tasa Global de Fecundidad (TGF) en el departamento de Apurímac entre 1997-2000 llegó a 4.2 hijos por mujer. En el área rural llega a 4.7 hijos por mujer y en área urbana a 3.2. La tasa global de fecundidad por edad más alta tanto en el área urbana y rural la tienen las mujeres de 20 a 24 años, 175 y 236 nacimientos por mil respectivamente. La fecundidad, presenta marcadas diferencias según nivel educativo de la mujer, 4.3 hijos en las mujeres sin educación y 2.9 hijos en las que alcanzaron nivel superior.

Respecto a la fecundidad de las adolescentes, el 18 por ciento de las mujeres de 15 a 19 años de edad ya son madres. En el área rural, este porcentaje llega a 25 por ciento y en el área urbana a 6 por ciento.

Con relación a las preferencias en la fecundidad, en el departamento de Apurímac la mayoría de las mujeres en unión que no desea tener más hijos incluyendo a las esterilizadas llega a 71 por ciento. Mayor porcentaje de las mujeres del área rural (72%) que del área urbana (69%) manifiesta su deseo de no tener más hijos.

Por otro lado, el número promedio ideal de hijos para las mujeres actualmente unidas es de 2.6 hijos.

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

En el departamento de Apurímac, el 95 por ciento de las mujeres conoce o ha oído hablar de algún método anticonceptivo. Sin embargo, el uso actual de cualquier método anticonceptivo por el total de mujeres en edad fértil llega a 48 por ciento y en las mujeres unidas llega a 64 por ciento. Cabe destacar que la

mayor fuente de suministro de métodos es el Ministerio de Salud.

El inyectable es el método moderno con mayor proporción de uso actual (16% del total de mujeres y 22% de las actualmente unidas). El método tradicional más usado por las mujeres de este departamento es la abstinencia periódica (10% del total de mujeres y 13% por las actualmente unidas). Llama la atención que el mayor porcentaje de mujeres unidas usuarias de la abstinencia periódica se encuentra entre las que tienen educación secundaria y superior.

El 78 por ciento de las mujeres usuarias del ritmo o abstinencia periódica, conoce que los días centrales o de mitad del ciclo menstrual son los días de mayor riesgo para que una mujer pueda quedar embarazada.

Las principales causas de discontinuación de métodos anticonceptivos entre las MEF son las siguientes: los efectos secundarios (27%), haber quedado embarazada mientras usaba el método (21%).

MORTALIDAD INFANTIL

La tasa de mortalidad infantil para el quinquenio 1995-2000 es de 37 defunciones por cada mil nacidos vivos. La mortalidad infantil ha tenido una reducción de 62 por ciento con respecto al quinquenio anterior 1990-1995 que tuvo una tasa de 99 por mil.

La reducción de la mortalidad durante el primer año de vida ha sido mayor en el período postneonatal, al pasar de 46 defunciones por cada mil nacidos vivos en el quinquenio 1990-1995 a 11 en el quinquenio 1995-2000, para una reducción del 76 por ciento. La mortalidad neonatal por otra parte disminuyó en 50 por ciento al pasar de 53 a 26 defunciones por cada mil nacidos vivos.

Es importante señalar que el 56 por ciento de los nacimientos ocurrieron en alguna condición de alto riesgo reproductivo.

SALUD MATERNO INFANTIL

Vacunación contra el tétano neonatal

El 85 por ciento de las mujeres entrevistadas recibió protección contra el tétanos neonatal y el 59 por ciento de ellas tuvo dos dosis o más.

Asistencia del parto

El 50 por ciento de los nacimientos de los 5 años anteriores a la encuesta fueron partos domiciliarios y el 49 por ciento ocurrió en un servicio de salud.

Vacunación

En el departamento de Apurímac el 65 por ciento de niños de 18 a 29 meses recibió todas las vacunas recomendadas. El porcentaje de niños menores de un año que recibieron las vacunas a la edad apropiada alcanza a 55 por ciento.

Infecciones respiratorias agudas y Enfermedades diarreicas agudas

El 8 por ciento de los niños menores de cinco años presentó síntomas de infección respiratoria aguda, durante los quince días antes a la encuesta y el 74 por ciento fue llevado a un establecimiento de salud.

El 21 por ciento de los niños menores de cinco años tuvo diarrea en las dos semanas anteriores a la encuesta; de los cuales, el 64 por ciento recibió líquidos en la cantidad recomendada, recibieron líquido en la misma cantidad de lo habitual 16 por ciento y en menor cantidad recibieron 18 por ciento. El consumo de alimentos sólidos por los niños que tuvieron diarrea en el tiempo referido fue el siguiente: a 55 por ciento se les dio menos cantidad de alimentos sólidos, a 26 por ciento la misma cantidad, solo a 13 por ciento se les dio más cantidad y a 7 por ciento no se les dio ningún alimento sólido.

LACTANCIA Y NUTRICIÓN

En el departamento de Apurímac la lactancia a los niños es generalizada; 99 por ciento de los niños nacidos en los cinco años anteriores a la ENDES 2000 ha lactado alguna vez. Mayor porcentaje de niños 94 por ciento, empezó a lactar el primer día de nacido, frente a un menor porcentaje de aquellos que iniciaron la lactancia durante la primera hora de nacidos 73 por ciento.

Nutrición de los niños y anemia en los niños y en las mujeres

El 43 por ciento de los niños menores de cinco años adolece de desnutrición crónica, este tipo de desnutrición afecta al 50 por ciento de los niños del área rural y a 15 por ciento del área urbana.

La proporción de niños que sufre de anemia, es alta en el departamento de Apurímac. Cerca de la mitad de los menores de cinco años padecen de anemia: 20 por ciento de anemia moderada, 25 por ciento de anemia leve y solo el 2 por ciento de anemia severa.

La anemia de algún tipo en las mujeres de edad fértil llega al 27 por ciento.

CONOCIMIENTO DE VIH/SIDA

El 60 por ciento de las mujeres del departamento de Apurímac ha oído hablar del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). El 37 por ciento de las que han oído hablar del SIDA, conoce alguna forma válida para evitar infectarse.

Con respecto a la protección contra el SIDA y las ETS, declararon en mayor proporción limitando el número de compañeros sexuales 28 por ciento y solamente el 17 por ciento de las mujeres declara haber usado condón en la última relación sexual.



Violencia contra las mujeres y los niños

En el departamento de Apurímac, el 50 por ciento de las mujeres alguna vez unidas ha sido agredida físicamente por su esposo o compañero y el 11 por ciento ha sido agredida físicamente por otras personas.

Del total de mujeres agredidas, el 59 por ciento manifestó que pidió ayuda a alguna persona cercana y menor proporción pidió ayuda a alguna institución especializada 32 por ciento. Las instituciones a donde acuden con mayor frecuencia las mujeres que han sido agredidas son la comisaría y los juzgados.

Las principales razones por las que las mujeres agredidas no buscan ayuda son porque sienten vergüenza y humillación 27 por ciento, piensan que los daños no son serios para denunciar al agresor 22 por ciento y tienen miedo a más agresión 17 por ciento.

Con relación a la violencia ejercida contra los niños por sus padres, el 89 por ciento de las entrevistadas manifestaron que sus cónyuges usan la reprimenda verbal y 62 por ciento usan el castigo físico para corregir a sus hijos. Respecto al tipo de violencia que ejercen las madres contra sus hijos, 88 por ciento de ellas manifestaron que usa la reprimenda verbal como castigo y 58 por ciento lo hace con golpes físicos.

DATOS BÁSICOS APURIMAC

Indicadores Demográficos, 2000 (Instituto Nacional de Estadística e Informática)

Población total (en miles)	427
Mujeres en edad fértil (en miles)	92

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2000

Población de la muestra

Mujeres de 15 a 49 años	1018
Niños nacidos en últimos 5 años	676
Sobrevivientes menores de 5 años	647
Niños vivos de 18-29 meses	142

Características básicas¹

Porcentaje de mujeres actualmente unidas	28.8
Porcentaje con secundaria o más	40.4

Matrimonio y otros determinantes de la fecundidad

Porcentaje de mujeres actualmente unidas	71.1
Porcentaje que han estado unidas alguna vez	77.6
Para mujeres 25-49 años:	
Edad mediana a la primera unión	19.5
Edad mediana al primer nacimiento	20.1
Duración media de la amenorrea (en meses) ²	12.7
Duración media de la abstinencia (en meses) ²	4.6

Fecundidad

Tasa Global de Fecundidad ³	4.2
Nacidos vivos a mujeres 40-49 años	6.3

Preferencias reproductivas

Porcentaje de mujeres actualmente unidas:	
Que no desea tener más hijos (incluyendo las mujeres esterilizadas)	71.3
Que desea postergar el nacimiento siguiente más de 2 años	19.7
Número medio ideal de hijos para las mujeres de 15 a 49 años	2.4

Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos

Porcentaje de las mujeres actualmente unidas:	
Que conoce algún método moderno	96.7
Que actualmente usa un método	63.9
Píldora	3.6
Esterilización femenina	12.1
Esterilización masculina	0.8
DIU	4.7
Condón	4.0
Inyecciones	21.5
Métodos vaginales	0.7
Abstinencia periódica	13.0
Retiro	1.9
Otros métodos tradicionales/folclóricos	1.4

Mortalidad y salud materno-infantil

Tasa de mortalidad infantil ⁴	37.2
Tasa de mortalidad de menores de cinco años ⁴	59.2

Atención materna

Porcentaje de últimos nacimientos cuyas madres recibieron: ⁵	
Atención de un médico, obstetrix, enfermera, auxiliar o sanitario durante el embarazo	89.8
Atención de un médico, obstetrix, enfermera, auxiliar o sanitario durante el parto	55.2

Vacunación

Porcentaje de niños 18 a 29 meses de edad con tarjeta de vacunación	54.2
Porcentaje de niños 18 a 29 meses de edad que ha tenido al menos una dosis de vacuna	99.4
Porcentaje de niños 18 a 29 meses de edad que ha recibido ⁶	
BCG	97.9
DPT (las tres dosis)	85.2
Polio (las tres dosis)	78.9
Antisarampionosa	88.7
Todas las vacunas ⁷	64.8

Prevalencia de enfermedades en menores de 5 años

Porcentaje de niños con diarrea ⁸	21.1
Porcentaje de niños con diarrea tratados con sobres de rehidratación oral SRO	17.5
Porcentaje de niños enfermos con IRA ⁹	8.2

Lactancia infantil y nutrición en la niñez

Duración media de la lactancia (en meses) ²	24.4
Porcentaje de niños menores de 4 meses amamantados	100.0
Porcentaje de niños de 4 a 5 meses amamantados	100.0
Porcentaje de niños de 6 a 9 meses amamantados	97.4
Porcentaje de niños menores de cinco años con desnutrición crónica ¹⁰	43.0

Nutrición de las mujeres en edad fértil

Porcentaje de madres con talla menor de 145 cms	17.4
---	------

- Mujeres en edad fértil
- Estimación con el método de prevalencia-incidencia con los nacimientos en los 36 meses antes de la encuesta
- Tomando como base los nacidos vivos de mujeres de 15 a 49 años durante los tres años que precedieron la encuesta (1997-2000 aproximadamente)
- Defunciones por cada 1.000 nacidos vivos para el período de cinco años precedentes a la encuesta (1995-2000 aproximadamente)
- Tomando como base los nacimientos ocurridos durante los cinco años anteriores a la encuesta
- Información obtenida del carné de vacunación y de la información proporcionada por la madre
- Incluye BCG, tres dosis de polio, tres dosis de DPT, y antisarampionosa
- Niños menores de cinco años cuyas madres declararon que aquellos tuvieron diarrea durante las dos semanas anteriores a la encuesta
- Niños enfermos con tos acompañada de respiración agitada, durante las dos semanas que precedieron la encuesta
- Porcentaje de niños con talla inferior a la esperada para su edad, basado en una distribución estándar.



I. INTRODUCCION

I. INTRODUCCION

1.1 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DE LA ENCUESTA

Antecedentes y Justificación

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del 2000 (ENDES IV o ENDES 2000) es una investigación que se realiza en el marco de la fase IV del Programa Mundial de las Encuestas de Demografía y Salud (DHS). ENDES IV continúa los esfuerzos de la Encuesta Mundial de Fecundidad (1977-1978) y de la Encuesta de Prevalencia de Anticonceptivos (1981), para obtener información actualizada y efectuar análisis del cambio, tendencias y determinantes de la fecundidad, mortalidad y la salud en los países en vías de desarrollo.

En el Perú, con la realización de la Encuesta Demográfica Nacional (EDEN-PERU, 1975) y el levantamiento de las encuestas ENDES I, ENDES II y ENDES III (1986, 1991-1992 y 1996 respectivamente) se ha tenido la oportunidad de conocer aproximadamente cada cinco años, el nivel, tendencia y diferenciales de la fecundidad, mortalidad, prevalencia anticonceptiva y de la salud familiar, conocimiento fundamental para el diseño y orientación de las políticas y programas de población.

En los últimos años, con la ampliación de las actividades y programas de planificación familiar se hace imprescindible contar con información actualizada que permita la evaluación de estos programas que se han venido aplicando en nuestro país en el último decenio.

En esta oportunidad, la ENDES IV realizada en el año 2000, proporcionará

valiosa información sobre tratamiento y prevalencia de las enfermedades diarreicas, las infecciones respiratorias, la vacunación y el estado nutricional de madres y niños. Asimismo, sobre la mortalidad infantil, el conocimiento y actitudes hacia el SIDA y la accesibilidad a los servicios de salud materno-infantil gubernamentales y/o privados.

Objetivos de la Encuesta

El objetivo general de la ENDES 2000 es proveer información actualizada del Perú y sus departamentos sobre la dinámica demográfica y el estado de salud de las madres y niños menores de 5 años, que permita la evaluación y formulación de los programas de población y salud familiar en nuestro país.

Objetivos Específicos

- a) Brindar información actualizada acerca de la salud materna e infantil, prevalencia anticonceptiva, fecundidad, salud y mortalidad en el primer año de vida.
- b) Estudiar las tendencias y cambios en la salud materna e infantil, en prevalencia anticonceptiva, mortalidad y en fecundidad durante los últimos 15 años sobre la base de información de la ENDES IV y encuestas especializadas similares.
- c) Proporcionar al Ministerio de Salud y otras instituciones información concerniente a los patrones de salud materno e infantil, prevalencia de anticonceptivos, mortalidad y fecundidad de la población peruana.
- d) Dar información necesaria para la formulación de planes y programas

educativos sobre planificación familiar y uso de métodos anticonceptivos a nivel nacional y departamental.

- e) Brindar información sobre los factores que influyen el nivel de fecundidad en la población peruana, que permitan efectuar comparaciones a nivel internacional.
- f) Dar información sobre el estado nutricional de las madres y sus niños menores de 5 años, a partir de la evaluación de sus medidas antropométricas: peso y talla en relación con la edad.
- g) Dar información sobre el grado de defensa del organismo de las madres y sus niños menores de 5 años, a partir del examen de su nivel de hemoglobina para determinar si están anémicos o no.
- h) Reforzar la capacidad del INEI para implementar encuestas y analizar la información dentro del marco general del Programa de Encuestas de Demografía y Salud que se realiza a nivel internacional.

1.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS

Población bajo Estudio

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2000) tiene como población objetivo:

- Los hogares particulares y sus miembros: las personas que son residentes habituales y aquellas que no siendo residentes habituales pernoctaron en la vivienda la noche anterior al día de la entrevista.
- Todas las mujeres de 15 a 49 años de edad y sus hijos menores de 5 años.

Diseño y Tamaño de la Muestra para la ENDES 2000

El diseño muestral de la ENDES 2000 es probabilístico, auto ponderado por

departamentos y de áreas, estratificado, multietápico e independiente para cada departamento. El marco muestral utilizado para la ENDES 2000 en la primera etapa de selección proviene de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1993. En la segunda y tercera etapa de selección, el Marco de Unidades Secundarias y Terciarias de Muestreo procede de la Actualización Cartográfica y el Directorio de Viviendas y Establecimientos realizado en 1999 con motivo de los Censos Nacionales del 2000.

Para el Estudio de la Reproducción y Salud Materno Infantil

a. Tamaño muestral a nivel nacional:

- 33,046 hogares particulares seleccionados.
- 29,423 mujeres de 15 a 49 años elegibles para entrevista en hogares seleccionados.

b. Niveles de inferencia:

- Nacional, urbano y rural
- Regiones naturales: Costa, Sierra y Selva
- Lima Metropolitana
- Cada uno de los 24 departamentos del país
- Grandes ciudades y Resto urbano, cada uno como dominio independiente

Cuestionarios y Principales Temas Investigados

En el levantamiento de la ENDES 2000 se aplicaron dos cuestionarios:

- Un cuestionario del hogar por cada vivienda seleccionada
- Un cuestionario individual para cada una de las mujeres entre 15 y 49 años

Cuestionario del Hogar

Parentesco con el jefe del hogar, sexo, edad, cobertura de los seguros de salud,

condición de actividad económica, nivel de educación alcanzado, matrícula escolar en 1999 y 2000, asistencia escolar, y supervivencia y residencia de los padres. Asimismo, el tipo de abastecimiento de agua del hogar, la disponibilidad de servicio sanitario, la posesión de electrodomésticos, de algún medio de transporte, combustible que usan para cocinar, habitaciones del hogar, habitaciones usadas para dormir, material predominante en el piso, pared y techo de la vivienda, prueba de yodo y marca de la sal, y prueba de cloro residual en el agua que utilizan para cocinar.

Cuestionario Individual de Mujeres

En este cuestionario, cuyos temas de investigación están distribuidos en doce secciones, se incluyeron los siguientes tópicos:

Sección 1. Antecedentes de la Entrevistada

Lugar de residencia en la niñez, tiempo de residencia en la localidad actual, mes y año de nacimiento, nivel de educación, asistencia escolar y razones de discontinuidad, alfabetismo, periodicidad en la lectura de periódicos, ver televisión y oír radio e idioma o dialecto materno.

Sección 2. Reproducción

Total de hijos e hijas nacidos vivos, mes y año de nacimiento de cada uno de sus hijos, sobrevivencia de los mismos y edad al fallecer si no sobrevivió. Embarazo actual, embarazos terminados en aborto o nacidos muertos y conocimiento de los días fértiles.

Sección 3. Anticoncepción

Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos y fuentes de suministro: si el uso fue informado, si el método fue elegido, quién decidió el uso del método, opinión respecto a la información recibida cuando recibió el método y razón del no uso de algún método

anticonceptivo para evitar o postergar el embarazo.

Sección 4A. Embarazo, Parto, Puerperio y Lactancia

Atención prenatal y del parto (personal y lugar de atención), cobertura antitetánica, peso del bebé al nacer, control postparto y lactancia materna.

Sección 4B. Inmunización y Salud

Cobertura de las vacunas: BCG, Polio, DPT y Sarampión. Prevalencia y forma de tratamiento de la diarrea y de las infecciones respiratorias agudas. Opinión sobre conocimiento de síntomas que debe tener un niño para decidir llevarlo al establecimiento de salud. Alimentación del niño en los últimos siete días y en las últimas veinticuatro horas.

Sección 5. Nupcialidad

Estado conyugal de la mujer, tiempo de exposición al riesgo del embarazo. Fecha de la última relación sexual, uso del condón y conocimiento de lugares de obtención. Edad a la que tuvo su primera relación sexual.

Sección 6. Preferencias de Fecundidad

Deseo de tener más hijos. Opinión de las no usuarias respecto al uso de métodos anticonceptivos en los próximos doce meses. Número ideal de hijos que le hubiera gustado tener a la madre y opinión de ella respecto al número deseado por su esposo. Cobertura de los mensajes de planificación familiar.

Sección 7. Antecedentes del Cónyuge y Trabajo de la Mujer

Edad, educación, actividad económica del actual o más reciente esposo o compañero. Experiencia laboral de la entrevistada, tipo de remuneración que percibe. Quién cuida a sus hijos menores de 5 años mientras ella trabaja.

Sección 8. El SIDA y Otras Enfermedades Transmitidas Sexualmente (ETS)

ETS que conoce y síntomas que le permiten identificar a una persona con alguna enfermedad de transmisión sexual. Formas de evitar infectarse con el SIDA, autopercepción del riesgo de contraer el SIDA y por qué, opinión respecto al SIDA y las personas infectadas.

Sección 9. Mortalidad Materna

Sexo, edad, total de hijos tenidos y año de la defunción, de ser el caso, de todos los hermanos y hermanas maternas de la entrevistada. Momento de la defunción de las hermanas: Durante el embarazo, el parto o después de un aborto,

Sección 10. Violencia Familiar

Prevalencia de la violencia física y psicológica en mujeres de 15 a 49 años de edad, antecedentes de violencia entre los padres de la entrevistada y forma de corregir u orientar a los hijos cuando se equivocan, a quien pidió ayuda si sufrió acto de violencia y razones por la que no pidió ayuda cuando sufrió acto de violencia.

Sección 11. Peso y Talla

Peso y talla de los niños nacidos desde Enero de 1995 y de sus madres.

Sección 12. Anemia

Nivel de hemoglobina de todas las mujeres de 15 a 49 años y de los nacidos vivos desde Enero de 1995.

El Cuestionario Individual de Mujeres también incluyó el uso de un calendario donde se efectuó un registro mensual detallado de los principales eventos demográficos de la entrevistada, desde Enero de 1995, en cuatro columnas: (1) nacimientos, embarazos y uso de anticonceptivos, (2) motivo de la discontinuidad

de uso anticonceptivo, (3) estado actual y cambio del estado marital, (4) localidad y cambio de residencia.

1.3 ASPECTOS OPERATIVOS DE LA ENCUESTA

Entrenamiento del Personal

Para el entrenamiento del personal de campo se realizaron dos cursos de capacitación. El primero de ellos, dirigido a la formación de las entrevistadoras en el conocimiento de los cuestionarios y de las instrucciones para su aplicación. El segundo curso de capacitación estuvo dirigido a la formación de las supervisoras en la organización y conducción del equipo de trabajo y la revisión y crítica de los cuestionarios.

Recolección de los Datos

La recolección de datos tuvo una duración de cuatro meses. Se inició el 18 de Julio en forma simultánea en los veinticuatro departamentos del país y culminó el 22 de Noviembre del 2000.

El trabajo fue realizado por 29 equipos, cada uno de ellos integrado por siete miembros: una supervisora, una revisora de cédulas, cuatro entrevistadoras y un chofer.

Consistencia y Procesamiento de Datos

La crítica de los cuestionarios se inició en el trabajo de campo, donde la revisora de cuestionarios verificaba la consistencia de la información recogida y posteriormente, lo hacía la supervisora. En la Sede Central los cuestionarios fueron codificados y consistenciados en su cobertura básica teniendo el conglomerado como unidad de trabajo.

La digitación y crítica de los datos (realizado entre el 11 de Agosto y el 6 de Diciembre), se ejecutó con el Sistema Integrado para Análisis de Encuestas (ISSA). El ISSA es un

sistema lógico para micro computadoras diseñado con exclusividad para el Programa de Encuestas de Demografía y Salud (DHS), que permite agilizar el ingreso de la información, crítica, corrección y elaboración de las tabulaciones en encuestas complejas de diseños jerárquicos como la ENDES 2000. Para minimizar los errores los cuestionarios de cada conglomerado fueron digitados dos veces en un cien por ciento.

Ingresados los datos, estos fueron consistenciados en forma automatizada con programas especialmente preparados para ejecución con el ISSA. Una vez detectados los errores, estos fueron evaluados y corregidos por las analistas, en dos vueltas de consistencia, llevando a la revisión de los cuestionarios cuando fue necesario.

1.4 CONTEXTO ECONÓMICO Y POLÍTICAS DE POBLACIÓN Y SALUD

Antes de presentar la información de la ENDES 2000 para cada departamento, se da a continuación una visión general, a nivel nacional, del contexto actual de la economía, de los objetivos y metas de los programas de población y de los programas sociales en favor de la mujer y la niñez, en aspectos relacionados a los temas investigados por la ENDES.

Perú: Economía, Programa Nacional de Población y Programa de Salud al año 2000

Economía

En el periodo de 1990 al 2000, la actividad económica en el país empezó a revertir la situación observada en la década de los

ochenta, la cual se caracterizó por una prolongada crisis económica: contracción significativa de la inversión, aceleración de la inflación, deterioro de los salarios reales, expansión de la informalidad e incremento de la tasa de desempleo.

Con relación al comportamiento del PBI por ramas de actividad en la década del 90, el INEI¹ ha calculado que a nivel nacional ha variado desde -0.4% en 1992 a 1.4 %, en 1999*, presentando su punto más alto en 1994 (12.8%).

Asimismo, como se aprecia en el Cuadro 1.1, a precios básicos de 1994 sin incluir impuestos y derechos de importación, el PBI más alto por actividad económica se registró en las ramas de servicios y comercio (59.3% en 1999).

Cuadro 1.1 Composición del producto bruto interno

Distribución del producto bruto interno (PBI) por tipo de actividad económica, Perú 1999

Actividad	Porcentaje
Agricultura, caza y silvicultura	9,6
Pesca	0,6
Explotación de minas y canteras	6,1
Industrias Manufactureras	16,1
Construcción	2,3
Electricidad, gas y agua	6,1
Comercio	15,6
Productores de servicios gubernamentales	6,9
Otros servicios	36,8

Fuente: INEI, Agregados Macroeconómicos de la Oferta y Demanda Global 1991 - 99

Según datos preliminares del INEI**, entre Enero y Diciembre del 2000, el PBI global ha variado de 5.5% en Enero a -1.8% en Diciembre, respecto a los mismos meses del año anterior. En estos datos se registra que todas las actividades de la economía decrecieron, excepto la actividad agropecuaria que pasó de 1.7% a 7.5%.

¹ Para los cálculos recientes de PBI, el INEI ha tomado como año base 1994, porque se ha considerado que este año es representativo de las características estructurales de la economía, del comportamiento de los precios relativos y porque además en este año se tiene los resultados de la mayor cantidad de información estadística (para mayor información ver INEI, "Agregados macroeconómicos de la Oferta y Demanda Global 1991-1999")

* Valor estimado

** Variación mensual del PBI, 1991-2001; INEI - DTIE-DEIP

Política y Programa Nacional de Población

El Perú cuenta con una Ley de Política Nacional de Población desde el 5 de Julio de 1985 que es antecedida por un conjunto de lineamientos y dispositivos legales de política de población. Destacan entre ellas, el inicio de la regulación jurídica de la anticoncepción en el Código Sanitario que fuera aprobado en 1969, los Lineamientos de Política de Población dados en 1976, la creación del Consejo Nacional de Población en 1980, el inicio de la prestación de Servicios Públicos de Planificación Familiar a cargo del Ministerio de Salud en 1983.

Posteriormente, en 1987 se constituyó la Comisión Presidencial de Población encargada de elaborar el Programa Nacional de Población 1987-1990. Más adelante, en octubre de 1990, se plantea el apoyo político del Gobierno para llevar adelante un Programa de Población, el mismo que orientó la formulación del Programa Nacional de Población 1991-1995 y llevó a la denominación del año 1991 como el Año de la Planificación Familiar.

Plan Nacional de Población 1998-2002

Los lineamientos y estrategias del Plan Nacional de Población 1998-2002 están enmarcados en la tarea de mejorar la calidad de vida de todas las personas, principalmente de los grupos vulnerables. De esta manera, propone como estrategias específicas desarrollar programas en: Población y Pobreza; Educación, Salud Sexual y Reproductiva; Equidad de Género; Adolescentes y Jóvenes, y Población, Medio ambiente y Desarrollo.

Algunas metas propuestas en el mencionado Plan son: generar una demanda adecuada e

informada de servicios de salud sexual y reproductiva usando los medios de comunicación de alcance nacional y local, con una cobertura de 100% de la población peruana y 80% de la población rural; disminuir la mortalidad materna en un 50% respecto a la observada en 1996; mejorar la calidad de atención en el 100% de los servicios públicos de salud reproductiva; contribuir a la reducción de los embarazos no deseados en la población adolescente en un 25% con relación a 1996.

El Plan Nacional de Población 1998-2002* establece que los organismos responsables de formular, ejecutar, coordinar y evaluar los programas de su competencia son: el Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Instituto de Seguridad Social (hoy ESSALUD). El Ministerio de la Presidencia y los gobiernos locales participan en el ámbito regional y local. Participan también los sectores No Gubernamentales y las Universidades. El INEI participa en la recolección, procesamiento y difusión de la información estadística demográfica.

Salud Reproductiva y Programa de Planificación Familiar 1996-2000

La Salud Reproductiva fue definida por la CIPD como "La condición de completo bienestar físico, mental y social que los hombres y las mujeres requieren para desarrollar con seguridad las funciones del proceso de la reproducción durante los periodos de la vida"² y establece que:

- El ejercicio individual del potencial reproductivo en forma responsable, segura, libre y satisfactoria contribuye a una mejor calidad de vida, ayudando a

* Este plan guarda concordancia con la Ley de Política Nacional de Población (Decreto Legislativo N° 346 y su modificatoria Ley N° 26530), la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), y las recomendaciones dadas en la Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing 1995).

2 "Normas del Programa Nacional de Planificación Familiar". Programa de Salud Reproductiva-MINSA, 1999; "Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000"Oferta y Demanda Global 1991-1999")

alcanzar la equidad en el desarrollo social y contribuye al equilibrio de la sociedad con su medio ambiente.

- El cuidado de la salud reproductiva implica también la preservación de una buena salud sexual, cuyo objeto es el desarrollo de la vida y las relaciones interpersonales. Es decir, que los individuos y las familias sean capaces de tener una vida sexual segura, satisfactoria y responsable, libre de temor o contagio de enfermedades de transmisión sexual.

El objetivo General del Programa de Planificación Familiar 1996-2000 es "contribuir a mejorar el estado de la salud reproductiva como acción fundamental para impulsar el desarrollo humano de la población, que permita a los individuos alcanzar el máximo de sus potencialidades y el mejor uso de sus capacidades, mejorando la esperanza y calidad de vida de los hombres y mujeres por igual".

Algunas metas que establece el Programa de Planificación Familiar al 2000 son: disminuir la Tasa de Mortalidad Materna a un nivel no mayor de 100 por 100000 nacidos vivos, elevar a 46 por ciento la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos modernos y seguros en mujeres en edad fértil, para asegurar una Tasa Global de Fecundidad de 2.5 hijos por mujer y reducir en 50% la Tasa de Mortalidad Perinatal.

Programas y Prioridades de Salud

El principal proveedor de servicios de salud es el Estado a través del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Sus líneas de acción son la promoción, protección y recuperación de la salud con tendencia a la gratuidad en las zonas urbano-marginales y rurales, priorizando la atención a la madre y al niño mediante el Programa de Atención Integral de Salud.

Los Lineamientos de Política de Salud 1995-2000 establecen que la población de mayor prioridad de atención son la mujer, los niños y las niñas, especialmente quienes se encuentran en situación vulnerable³.

Algunas metas de los Lineamientos de Política de Salud son:

- Reducir la tasa de mortalidad infantil a 34 por mil nacidos vivos.
- Disminución de la prevalencia de déficit de talla / edad en niños de 0 a 35 meses a menos del 10% en Lima, menos de 30% en zonas urbanas y menos del 40% en zonas rurales.
- Aumentar el porcentaje de niños que reciben lactancia materna exclusiva hasta el cuarto mes de vida, alcanzando 50% o más en zonas urbanas y 65 por ciento en las rurales.
- Mantener la prevalencia de bajo peso al nacer en menos de 10 por ciento en zonas urbanas y menos de 15 por ciento en zonas rurales.
- Disminuir la prevalencia de anemia en niños de 0-35 meses a menos del 30 por ciento en todos los dominios urbanos y menos del 50 por ciento en dominios rurales.
- El 80 por ciento de hogares sepan reconocer la neumonía y busquen asistencia oportuna.

Acciones en Favor de la Mujer

En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing del 8 al 15 de Setiembre de 1995, el Estado peruano se comprometió a asumir políticas a favor de la promoción de los derechos de la mujer. Los objetivos de la Plataforma de las Mujeres de esta Conferencia están enmarcados en el compromiso de mejorar la situación de las mujeres, especialmente de los grupos más necesitados, en las múltiples esferas de la vida

³ Plan Nacional de Acción por la Infancia 1996-2000, Presidencia de la República

personal y social y en su realización plena como ciudadanas.

En respuesta a los compromisos asumidos en Beijing, en 1996 se creó el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH) como ente encargado de promover el desarrollo de la mujer y las familias peruanas⁴.

Estos son algunos compromisos asumidos por el Gobierno Peruano en la Conferencia de Beijing y en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994): mejorar la calidad de la educación y erradicar el analfabetismo en el Perú, particularmente en las mujeres campesinas; erradicar situaciones discriminatorias hacia las niñas, jóvenes, adolescentes y mujeres en el sistema educativo, especialmente en áreas rurales; velar por la vigencia y cumplimiento de la legislación contra toda forma de violencia hacia la mujer; implementar una estrategia integral de salud reproductiva.

Los compromisos asumidos por el Gobierno Peruano en estas conferencias han sido los que han orientado las acciones realizadas en favor de la mujer y es marco orientador del "Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2000-2005" en el que se establece seis áreas de trabajo: educación, salud, violencia, empleo, participación social y política, y comunicación.

Erradicación de la Violencia Contra la Mujer

La violencia es considerada como un problema de salud pública porque atenta contra los derechos fundamentales de las personas, daña la dignidad, autoestima y el desarrollo

social de quienes la sufren. Gracias a la lucha incesante de las organizaciones de mujeres, a los acuerdos de la Conferencia de Beijing y la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), en la década del 90, las acciones para erradicar la violencia contra la mujer y la violencia familiar han tomado mayor importancia política y jurídica.

Algunos intentos por combatir la violencia contra la mujer, en el Perú, se remontan a 1988 cuando se crea la primera Comisaría de Mujeres. En 1993, se promulga la Ley de Violencia Familiar 26260. Esta Ley fue de suma importancia porque en ella se reconoce la violencia familiar como fenómeno social. En 1997, se aprobó el Texto Unico Ordenado de la Ley 26260 y en 1998 se aprobó su Reglamento.

El aumento de la violencia y el mayor número de denuncias de actos violentos de parte de las mujeres, se observan a través del indicador de denuncias registradas. En 1996, se registraron en la Policía Nacional del Perú de Lima Metropolitana 8,192 casos, en 1998 aumentaron a 27,936 y en 1993 las denuncias sobre violencia llegaron a 30,893⁵.

1.5 NIVEL DEPARTAMENTAL

1.5.1 Apurímac: Aspectos Geográficos y Políticos Administrativos

Aspectos Geográficos

Ubicación y Superficie

La altura del territorio del departamento de Apurímac oscila entre 2378 m.s.m. (distrito de Abancay, provincia del mismo nombre) y

⁴ Perú: Informe Nacional sobre la Implementación del Programa de Acción del El Cairo. PROMUDEH, Mesa Tripartita de Seguimiento del CIDP; Lima 1999.

⁵ Compendio de Estadísticas Sociodemográficas 1999-2000; INEI

los 3952 m.s.m. (distrito de Pataypampa en la provincia de Grau). Limita por el norte con los departamentos de Ayacucho y Cusco, por el este con el departamento de Cusco, por el sur con los departamentos de Arequipa y Ayacucho, por el oeste con el departamento de Ayacucho.

Tiene una superficie territorial de 20895,75 km². (1.6% del territorio nacional). Desagregado por provincias le corresponde a: Abancay 3447,13 km², Andahuaylas 3982,56 km², Antabamba 3219,01 km², Aimaraes 4213,07 km², Grau 2197,66 km²; Cotabambas 2589,59 km², Chincheros 1246,77 km².

Relieve y Regiones Naturales

Su territorio es accidentado, valles profundos y agrestes cumbres, alternan con altas mesetas o punas y picos nevados. Entre estos últimos pueden mencionarse: El Inticancha (508 mts.), el Mallmanya (5211 mts.), el Paicacirca (4926 mts.), en la provincia de Grau; Huashuaccasa (5003 mts.), en la provincia de Antabamba; el Suparaura (5115 mts.) y el cerro Cucche (5071 mts.) en la provincia de Aymaraes; y el Ampay (5223 mts.) en la provincia de Abancay.

Los ríos de Apurímac, Pampas, Pachachaca y sus afluentes, han erosionado profundamente el territorio de Apurímac y dado origen a un drenaje que en conjunto sigue una erosión general de sur-norte. Las punas presentan un relieve ondulado típico de estas áreas, que descienden hacia los valles, a lo largo de cuencas torrenciales de gran actividad.

Clima

El clima es variado de acuerdo a los pisos de altitud. Cálido y húmedo en el fondo de los

cañones profundos del Apurímac. Pampas y Pachachaca. Templado y seco en las altitudes medios. Frío y con acentuada sequedad atmosférica en la alta montaña y muy frío en las cumbres nevadas. La variación de las temperaturas es muy significativa y aumenta con la altitud.

Así por ejemplo en Antabamba, a 3,636 m.s.n.m., en el mes de octubre las temperaturas diurnas llegan hasta 25° C y en las noches descienden hasta 3° C. Las precipitaciones son abundantes de diciembre a abril y el período seco con lluvias escasas de mayo a noviembre.

En la época de lluvia, los huaycos, inundaciones y derrumbes son fenómenos de gran frecuencia y afectan constantemente las vías de comunicación.

Hidrografía

El drenaje hidrográfico en el territorio de este departamento tiene una orientación general de sur-norte y todos sus ríos pertenecen a la cuenca del río Apurímac, al que dan sus aguas por la margen izquierda.

Los principales ríos se originan en la cordillera occidental, siendo los más importantes: el Apurímac, que sirve de límite con el departamento de Cusco; el Pampas, que delimita el departamento de Apurímac con el de Ayacucho; el Santo Tomás, que también sirve de límite por el noreste con el departamento de Cusco; el vilcabamba y Pachachaca, cuyas cuencas están íntegramente en el departamento de Apurímac.

Aspectos Políticos Administrativos

El departamento de Apurímac está constituido por 7 provincias y 80 distritos:



Abancay (9 distritos), Andahuaylas (19 distritos), Antabamba (7 distritos), Aymaraes (17 distritos), Cotabambas (6 distritos), Chincheros (8 distritos), Grau (14 distritos).

Población

La población del departamento, estimada al año 2000, es de 426904 habitantes, la cual representa el 2% de la población peruana. La densidad poblacional es de 20.4 habitantes por Km². Según la ENDES 2000, la población que habita el área rural representa aproximadamente el 75.8 por ciento de la población total del departamento.

Economía

El departamento de Apurímac presenta una estructura productiva en el sector primario (agricultura, caza, silvicultura).

15.2 Apurímac: Tamaño de la Muestra de la ENDES 2000

En el departamento de Apurímac, la muestra fue de 1,534 hogares y 1,054 mujeres en edades fértiles. Se obtuvo el 99 por ciento de entrevistas completas en hogares y el 97 por ciento en mujeres.



II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACION

En cada una de las viviendas de la muestra seleccionada para la ENDES 2000 se aplicó el cuestionario del hogar en el cual se registraron las características más importantes de cada uno de los miembros del hogar: relación de parentesco con el jefe del hogar, tipo de residencia (de jure y de facto), sexo, edad, seguro de salud, condición de actividad, nivel de educación alcanzado, matrícula y asistencia escolar, y supervivencia y residencia de los padres. Asimismo, las características estructurales y servicios básicos de la vivienda y la disponibilidad de bienes de consumo duraderos en el hogar. Los datos que aquí se presentan se refieren mayormente a la residencia de facto, para hacerlos comparables con los que suministran los censos de población.

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC

Población por Edad, Sexo y Residencia Urbana-Rural

En el Cuadro 2.1 se presenta la distribución de la población del departamento de Apurímac a partir de los datos obtenidos en el cuestionario de hogar de ENDES 2000. Esta información, constituye el marco de referencia obligado para la adecuada interpretación de los cuadros y análisis que se incluyen en este informe.

Cuadro 2.1 y Gráfico 2.1

Población por edad y sexo

- La población de Apurímac es joven, los menores de 15 años conforman el 42 por ciento de la población del departamento.

- La población en edad de trabajar, 15 a 64 años, es 51 por ciento de la población total del departamento, concentrándose en mayor proporción entre los menores de 40 años.
- Las personas de 65 o más años de edad conforman solamente el 7 por ciento de la población total del departamento; en esta edad, el porcentaje de mujeres (8%) predomina con relación al de los hombres (7%).
- La constitución de la población del departamento es igual en porcentaje tanto para hombres como para mujeres (50% respectivamente)

Composición por edad según área de residencia

- El 76 por ciento de la población de Apurímac habita en el área rural. La proporción de menores de 15 años es mayor en el área rural 43 por ciento, que en el área urbana 38 por ciento.
- El porcentaje de hombres menores de 15 años que vive en el área urbana es menor en 6 puntos porcentuales con relación a los hombres que viven en el área rural (37% y 44% respectivamente); en las mujeres, la diferencia es de (3%).

Mujeres en edad fértil

- Las mujeres en edad fértil (MEF), representan el 20 por ciento de la población total del departamento y el 39 por ciento del total de mujeres. Hay poca


diferencia según el área de residencia: en el área urbana la proporción de mujeres en edad fértil es mayor en 12 puntos

porcentuales que la del área rural (48% y 36% respectivamente).

Cuadro 2.1 Población total de los hogares por edad, sexo y residencia urbana - rural

Distribución porcentual de la población de los hogares por grupo quinquenales, de edad según área de residencia y sexo, Apurímac 2000

Grupos de Edad	Area Urbana			Area Rural			Total		
	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total
0-4	9,9	10,8	10,4	13,4	12,9	13,1	12,5	12,4	12,5
5-9	12,7	11,4	12,0	15,3	16,9	16,1	14,7	15,5	15,1
10-14	14,7	17,4	16,0	15,1	13,0	14,0	15,0	14,1	14,5
15-19	14,2	10,5	12,3	9,1	6,3	7,7	10,3	7,3	8,8
20-24	12,1	9,3	10,7	7,0	6,4	6,7	8,2	7,1	7,7
25-29	6,5	7,2	6,8	5,4	5,6	5,5	5,7	6,0	5,8
30-34	4,3	4,9	4,6	5,9	5,8	5,9	5,6	5,6	5,6
35-39	7,6	7,0	7,3	5,0	5,0	5,0	5,6	5,5	5,6
40-44	4,2	5,2	4,7	3,3	3,1	3,2	3,5	3,6	3,6
45-49	4,6	4,1	4,4	4,0	3,9	3,9	4,1	3,9	4,0
50-54	2,8	2,6	2,7	2,7	4,3	3,5	2,7	3,9	3,3
55-59	2,3	2,6	2,5	3,5	4,1	3,8	3,2	3,7	3,5
60-64	0,2	2,4	1,3	3,0	4,2	3,6	2,3	3,8	3,1
65-69	1,1	0,6	0,8	2,9	3,1	3,0	2,5	2,5	2,5
70-74	1,4	1,7	1,5	1,4	1,8	1,6	1,4	1,8	1,6
75-79	0,5	1,2	0,8	1,6	1,6	1,6	1,3	1,5	1,4
80 +	1,1	1,2	1,2	1,4	2,0	1,7	1,3	1,8	1,6
Sin información /No sabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Número	647	657	1304	2038	2045	4 082	2 685	2 702	5 387



Nivel de Educación y Asistencia a Centros de Enseñanza Regular

El nivel de educación es un indicador importante para medir el grado de desarrollo social y económico de la comunidad y de sus miembros. Estadísticamente está comprobado, por ejemplo, que las mujeres y las parejas mejor educadas tienen mayores probabilidades de planificar su familia y de mejorar el cuidado de salud de los niños.

Los cuadros 2.2 y 2.3 dan una lectura del nivel educativo de los habitantes del departamento de Apurímac; indican también el porcentaje de quienes no tienen ningún nivel educativo.

Cuadros 2.2 y 2.3

Nivel de educación

- La mediana de años de educación, alcanzada por la población de 6 años a más del departamento es de 5 años de estudio en los hombres y 3 años en las mujeres. La diferencia por sexo en la mediana de años de estudio, es similar en el área urbana (2.2) que en el área rural (2.6).
- La mediana de años de estudios de los hombres que residen en el área urbana (8.4) es mayor que la de los hombres del área rural (4.3). E igualmente las mujeres del área urbana tienen más años de estudios que las mujeres del área rural (6.2 y 1.7 años respectivamente).
- En la población de 6 años a más del departamento de Apurímac existe una diferencia de 18 puntos porcentuales entre los hombres (11%) y las mujeres (29%) sin educación. Los mayores porcentajes de personas sin educación se presentan en las mujeres de 35 años a más.
- La educación inicial y primaria, según los especialistas, constituyen las etapas más importantes para el aprendizaje escolar y social de las personas, sin embargo, el departamento de Apurímac sigue presentando altos porcentajes de niños y niñas de 6 a 9 años sin educación: 28 por ciento y 26 por ciento respectivamente.
- A niveles de secundaria completa o más llegan más hombres (18%) que mujeres (11%) aunque en la población de 20 a 29 años existen mayores porcentajes, especialmente en los varones.

Cuadro 2.2 Nivel de educación de la población masculina de 6 años y más

Distribución porcentual de la población masculina de 6 años y más por nivel de educación alcanzado, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Nivel de educación							Total	Número de hombres	Mediana de años
	Sin educación	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Superior	NS/ sin información			
6-9	27,8	71,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	100,0	334	0,8
10-14	0,2	67,7	14,4	17,7	0,0	0,0	0,0	100,0	402	3,9
15-19	0,4	18,4	13,7	55,6	9,0	2,9	0,0	100,0	277	7,5
20-24	0,9	9,5	14,5	30,3	24,9	19,9	0,0	100,0	221	9,5
25-29	0,7	14,5	19,7	19,7	24,3	21,1	0,0	100,0	152	9,5
30-34	4,0	25,5	28,9	10,7	20,1	10,7	0,0	100,0	149	5,7
35-39	4,6	20,5	21,2	15,9	13,2	24,5	0,0	100,0	151	6,8
40-44	4,3	33,0	16,0	11,7	12,8	22,3	0,0	100,0	94	5,8
45-49	6,3	22,5	23,4	11,7	18,9	17,1	0,0	100,0	111	5,9
50-54	12,3	37,0	20,5	12,3	8,2	8,2	1,4	100,0	73	5,0
55-59	27,9	36,0	18,6	3,5	5,8	7,0	1,2	100,0	86	3,5
60-64	38,1	33,3	22,2	4,8	1,6	0,0	0,0	100,0	63	2,3
65+	41,7	29,7	20,0	3,4	3,4	1,1	0,6	100,0	175	2,5
Area de residencia										
Urbana	4,0	24,6	8,4	21,9	16,7	24,2	0,2	100,0	570	8,4
Rural	13,3	42,0	17,8	16,5	7,2	3,1	0,2	100,0	1718	4,3
Total	11,0	37,6	15,5	17,8	9,5	8,3	0,2	100,0	2289	5,1

Nota: Población de facto.

Cuadro 2.3 Nivel de educación de la población femenina de 6 años y más

Distribución porcentual de la población femenina de 6 años y más por nivel de educación alcanzado, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Nivel de educación							Total	Número de mujeres	Mediana de años
	Sin educación	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Superior	NS/ sin información			
6-9	26,2	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	100,0	340	0,7
10-14	1,6	69,5	13,4	15,5	0,0	0,0	0,0	100,0	380	4,1
15-19	1,5	22,2	12,6	53,5	9,6	0,5	0,0	100,0	198	7,2
20-24	4,7	24,5	20,3	17,2	12,5	20,8	0,0	100,0	192	6,1
25-29	11,8	29,2	16,8	10,6	12,4	19,3	0,0	100,0	161	5,5
30-34	18,7	30,0	16,0	11,3	6,7	16,7	0,7	100,0	150	5,1
35-39	27,5	33,6	12,8	6,7	7,4	12,1	0,0	100,0	149	3,3
40-44	29,6	21,4	15,3	9,2	12,2	12,2	0,0	100,0	98	4,9
45-49	42,5	31,1	11,3	6,6	2,8	5,7	0,0	100,0	106	1,9
50-54	58,7	24,0	8,7	4,8	1,0	2,9	0,0	100,0	104	0,0
55-59	68,0	21,0	3,0	3,0	4,0	1,0	0,0	100,0	100	0,0
60-64	82,4	8,8	4,9	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0	102	0,0
65+	87,3	7,8	2,9	0,5	0,5	0,0	1,0	100,0	205	0,0
Area de residencia										
Urbana.	10,0	27,6	11,0	21,2	11,4	18,4	0,5	100,0	572	6,2
Rural	35,3	41,7	10,0	8,6	2,4	1,9	0,1	100,0	1714	1,7
Total	29,0	38,1	10,3	11,7	4,6	6,0	0,2	100,0	2287	2,6

Nota: Población de facto.

Asistencia Escolar

La asistencia escolar de los estudiantes matriculados en un centro de enseñanza regular, presentados en el cuadro 2.4, es importante, para quienes realizan investigaciones sobre deserción escolar ya que los datos fueron recogidos entre julio y noviembre del año 2000, meses potenciales de asistencia escolar.

Cuadro 2.4

- En el departamento de Apurímac se encontró que la población de 6 a 15 años asistía a la escuela o colegio de enseñanza

regular (94 por ciento). Este promedio de asistencia escolar es ligeramente mayor en los varones que en las mujeres (95 y 93 puntos porcentuales respectivamente). Muestra una diferencia de cuatro puntos porcentuales entre el área urbana (96%) y el área rural (92%).

- Entre la población de 16 a 24 años, la asistencia escolar disminuye sensiblemente en el grupo de 16 a 20 años (55%) y baja más entre la población de 21 a 24 años de edad (24%). En el área urbana, estos niveles son más altos 64 y 34 por ciento respectivamente y en el área rural 42 y 7 por ciento para cada caso.

Cuadro 2.4 Asistencia escolar de la población en los hogares

Porcentaje de la población total de los hogares menores de 25 años de edad que asiste a la escuela o a un centro de enseñanza regular por grupos de edad, según sexo y residencia, Apurímac 2000

Grupos de edad	Area de residencia						Total		
	Urbana			Rural					
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total
6-10	96,7	96,3	96,5	95,2	94,0	94,6	95,9	95,0	95,4
11-15	96,3	96,2	96,2	92,2	86,9	89,8	94,2	91,5	92,9
Subtotal 6-15	96,5	96,2	96,4	93,7	90,9	92,3	95,0	93,3	94,2
16-20	62,7	64,8	63,7	47,9	34,3	41,7	56,6	52,3	54,7
21-24	35,0	33,5	34,4	9,1	4,7	6,9	25,9	21,8	24,0
Total	75,1	76,7	75,9	74,3	69,2	71,9	74,7	73,0	73,9

Composición de los Hogares

Las diferentes formas de vida que asumen los individuos en una sociedad, así como las implicancias de esos arreglos, pueden ser analizadas al considerar las características de la composición de los hogares. Se argumenta por ejemplo que ella afecta la distribución de recursos financieros disponibles para los miembros del hogar, la estructura del gasto, la propensión al ahorro, entre otros, así como algunos aspectos emocionales de sus integrantes. El tamaño del hogar o el sexo del jefe del hogar, por ejemplo, están asociados frecuentemente con diferentes niveles de bienestar familiar.

Los cuadros 2.5 y 2.6 hablan de la constitución de los hogares con relación: a la jefatura del hogar, al número de miembros, a la convivencia de los niños y niñas con sus padres, y al número de hogares con niños o niñas adoptados.

Cuadros 2.5 y 2.6

Jefatura y tamaño del hogar

- El 83 por ciento de los hogares del departamento de Apurímac esta jefaturado por un varón. En el área rural y urbana predominan los hogares con jefatura masculina. Los hogares con jefatura femenina a nivel departamental (17%).
- El promedio de miembros por hogar es de 4.2 personas, siendo mayor en las del área urbana (4.6%). En el área urbana, los hogares de 5 miembros tienen el más alto porcentaje (19%), mientras que en el área rural predominan los hogares de 4 a 5 miembros (15%).
- Es importante señalar que 9 por ciento de los hogares alberga entre sus miembros al menos a un hijo adoptado o de crianza;

este porcentaje es mayor en el área urbana (16%).

Condición de residencia familiar de los hijos menores de 15 años

- El mayor porcentaje de los menores de 15 años del departamento, vive con ambos padres (81%), esta característica es mayor en el área rural (82%) que en el área urbana (76%).
- Es importante destacar que entre los niños que viven con uno de sus padres, a pesar de que ambos están vivos el porcentaje de quienes viven solo con la madre (5.9%) es mucho mayor que los que viven sólo con el padre (1%).
- Los niños menores de 15 años que viven en calidad de adoptados, aun cuando alguno de sus padres está vivo, llegan a 6 por ciento en el departamento.

Cuadro 2.5 Composición de los Hogares

Distribución porcentual de los hogares por sexo del jefe del hogar, tamaño del hogar y porcentaje de niños adoptados, según residencia urbana-rural, Apurímac 2000

Características	Área de residencia		Total
	Urbana	Rural	
Sexo del jefe del hogar			
Hombre	81,6	82,9	82,6
Mujer	18,4	17,1	17,4
Total	100,0	100,0	100,0
Miembros usuales del hogar			
0	1,0	0,5	0,6
1	9,4	13,1	12,3
2	11,1	16,8	15,6
3	13,2	13,3	13,3
4	15,6	14,9	15,0
5	19,1	14,7	15,6
6	9,7	12,0	11,5
7	8,3	8,4	8,4
8	6,6	3,2	3,9
9+	5,9	3,1	3,7
Total	100,0	100,0	100,0
Promedio	4,6	4,1	4,2
Porcentaje de hijos adoptados	16,3	6,4	8,6

Nota: Población de jure (sólo habitantes habituales).

Cuadro 2.6 Niños según sobrevivencia de los padres y situación de residencia

Distribución porcentual de la población *de jure* menor de 15 años por sobrevivencia de los padres y su situación de residencia, según características seleccionadas. Apurímac 2000

Características	Niño vive con ambos padres	Niño vive con la madre pero no con el padre		Niño vive con el padre pero no con la madre		Niños de crianza (Niño no vive con ninguno de los padres)					Total huér-fanos	Total de adop-tados	Total	Número de niños	
		Tiene padre vivo	Tiene padre muerto	Tiene madre viva	Tiene madre muerta	Ambos padres vivos	Solo padre vivo	Solo madre viva	Ambos Muertos	Sin inform. Sobre padre - madre					
Edad															
0-2	86,1	10,5	1,6	0,0	0,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,3	1,8	1,3	100,0	382	
3-5	85,4	6,8	3,3	1,2	0,5	2,6	0,0	0,0	0,0	0,2	3,8	2,6	100,0	425	
6-9	81,3	5,4	4,4	0,9	1,3	5,5	0,6	0,3	0,3	0,1	6,8	6,7	100,0	689	
10-14	74,9	3,5	5,3	2,1	2,8	7,9	1,3	0,6	0,3	1,3	10,2	10,1	100,0	793	
Sexo															
Hombre	80,4	6,1	4,0	1,1	1,4	5,1	0,7	0,5	0,2	0,4	6,9	6,5	100,0	1138	
Mujer	80,9	5,6	4,0	1,3	1,6	5,1	0,5	0,1	0,2	0,7	6,3	5,9	100,0	1151	
Area de residencia															
Urbana	75,5	7,8	1,6	1,2	1,0	9,8	1,2	0,8	0,0	1,2	4,6	11,8	100,0	502	
Rural	82,1	5,3	4,7	1,2	1,6	3,8	0,4	0,2	0,2	0,4	7,2	4,6	100,0	1788	
Total	80,6	5,9	4,0	1,2	1,5	5,1	0,6	0,3	0,2	0,6	6,6	6,2	100,0	2290	

Nota: Por convención, niños de crianza son aquellos que no viven con ninguno de los padres biológicos (total de las cuatro columnas bajo el encabezamiento "niños de crianza").

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS

Las características de las viviendas son indicadores importantes para el análisis socioeconómico de los hogares. Las condiciones de los servicios básicos, su disponibilidad y acceso permite analizar, entre otras cosas, la situación de la salud de la familia, especialmente de los niños. La lectura del cuadro 2.7 de los datos recogidos en la ENDES 2000, nos acerca a las condiciones de las viviendas de los hogares de Ayacucho.

Cuadro 2.7

Servicio de electricidad

- Más de la mitad de viviendas del departamento de Apurímac no tienen servicio de electricidad (55%). La diferencia entre los hogares que no cuentan con este servicio, entre el área rural (69%) y el área urbana (4%) es muy alta.

Fuente de agua para beber

- El 41 por ciento del total de viviendas a nivel departamental tienen servicio de agua dentro de la vivienda. La diferencia de los hogares que cuentan con este servicio tanto en el área urbana(86%) y el área rural (29%) es alta.
- Los miembros de hogar y particularmente los niños propensos a enfermedades estomacales y a todas aquellas derivadas por el consumo de aguas no tratadas, también es alto: 51 por ciento de los hogares del departamento consume agua de manantial o de río, en el área rural llega a 65 por ciento.

Servicio sanitario

- El 53 por ciento de los hogares del departamento de Apurímac carece de servicio higiénico de cualquier tipo. En el área urbana la falta de este servicio es de 15 por ciento siendo mucho mayor en el área rural 64 por ciento.

- Los hogares que cuentan con mejores condiciones sanitarias, con inodoro exclusivo dentro de la vivienda, llegan a 16 por ciento a nivel departamental, 58 por ciento en el área urbana y 4 por ciento en el área rural.

Material del piso

- A nivel departamental, los materiales que predominan en el piso de las viviendas, son la tierra o arena (86%) y el cemento o ladrillo (11%). El primero de ellos es el material que predomina (97%) en el piso de las viviendas del área rural y el segundo (42%) el más usado en el área urbana.

Cuadro 2.7 Características de las viviendas y los hogares

Distribución porcentual de los hogares por características seleccionadas de las viviendas, según área de residencia, Apurímac 2000

Características	Residencia		Total
	Área urbana	Área rural	
Luz eléctrica			
Si	95,8	31,4	45,4
No	4,2	68,6	54,6
Total	100,0	100,0	100,0
Fuente de agua para beber			
Dentro de la vivienda	86,1	28,8	41,4
Fuera de la vivienda pero dentro del edificio	10,1	0,8	2,8
Pilón / grifo público / red Pública fuera de la vivienda	2,4	2,3	2,4
Pozo público	0,0	1,1	0,8
Manantial	0,3	55,9	43,8
Rio.	0,3	9,4	7,4
Agua, Lluvia	0,0	0,1	0,1
Otro	0,7	1,5	1,3
Sin información	0,0	0,1	0,1
Total	100,0	100,0	100,0
Tiempo para ir a fuente de agua <15 minutos	98,3	86,9	89,4
Servicio sanitario			
Inodoro exclusivo dentro de la vivienda.	57,6	3,7	15,5
Inodoro común dentro de la vivienda.	12,2	0,2	2,8
Inodoro exclusivo fuera de la vivienda.	0,7	0,2	0,3
Inodoro común fuera de la vivienda	1,7	0,2	0,5
Letrina exclusiva.	12,2	30,4	26,4
Letrina común	0,7	1,3	1,1
No hay servicio	14,9	63,2	52,7
Rio, canal	0,0	0,9	0,7
Total	100,0	100,0	100,0
Principal material del piso			
Tierra, arena	45,5	97,0	85,7
Madera, entablado	9,7	1,0	2,9
Parquet o madera pulida	0,3	0,0	0,1
Locetas, terrazos o similares	1,4	0,0	0,3
Cemento, ladrillo	42,0	2,0	10,8
Otra	1,0	0,0	0,2
Total	100,0	100,0	100,0
Número de hogares	288	1030	1318

Disponibilidad de Bienes de Consumo Duraderos y Medios de Transporte

La posesión de algunos bienes de consumo es indispensable para desarrollarse, para optimizar el uso del tiempo y para estar al día con los avances informáticos y tecnológicos (radio, televisión, computadora). La tenencia de estos bienes, es un indicador importante, también para medir el bienestar familiar.

El cuadro 2.8, permite un acercamiento sobre la posesión de bienes duraderos de los hogares del departamento de Apurímac.


Cuadro 2.8

- El 77 por ciento de los hogares posee radio y 36 por ciento televisión. Otros bienes, como la computadora, por ejemplo, lo tienen menores porcentaje de hogares (1%).
- Entre los medios de transporte con mayores proporciones, se encuentran la bicicleta, especialmente en el área urbana (11%) y en el área rural predomina otro medio de transporte (54%).

Cuadro 2.8 Bienes de consumo duraderos

Porcentaje de hogares con bienes de consumo duraderos específico según área de residencia, Apurímac 2000

Bienes de consumo duradero	Residencia		Total
	Área urbana	Área rural	
Radio	94,4	71,6	76,6
Televisión	83,7	22,0	35,5
Teléfono	21,9	0,0	4,8
Refrigerador	25,0	0,7	6,0
Computadora	3,5	0,0	0,8
Bicicleta	11,1	1,8	3,9
Motocicleta	0,7	0,1	0,2
Carro/camión	13,2	0,7	3,4
Otro medio de transporte	4,9	53,8	43,1
Ninguno de los anteriores	4,2	14,6	12,3
Número de hogares	288	1030	1318



III. CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS MUJERES


III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MUJERES

El propósito de este capítulo es describir la situación de las mujeres en edad reproductiva del departamento de Apurímac. Esta información es de utilidad para entender el contexto de la reproducción y de la salud y para el cálculo de indicadores de la situación de la mujer que se espera que sirvan como punto de referencia para la interpretación de los resultados presentados en el resto de capítulos. Se incluyen las distribuciones porcentuales de las principales características demográficas y socioeconómicas. Las principales características son edad, estado civil, área de residencia y nivel de educación. Igualmente se presenta información sobre alfabetismo, razones para el abandono de los estudios, acceso a los medios de comunicación, situación laboral, y decisiones sobre aspectos específicos o arreglos del hogar.

3.1 ENTREVISTADAS POR EDAD, ESTADO CONYUGAL Y ÁREA DE RESIDENCIA

Gráfico 3.1

- La ENDES 2000, entrevistó en Apurímac a 1018 mujeres de 15 a 49 años. Las entrevistadas se concentran en los primeros grupos de edad fértil: más de la mitad (52%) son menores de 30 años.
- El estado civil es importante por la presencia de las uniones consensuales, lo que puede constituir un problema desde el punto de vista de la estabilidad del hogar y de la protección de la mujer y del niño.



- La proporción de mujeres casadas es 46 por ciento y de convivientes es 25 por ciento. Cerca de la cuarta parte de entrevistadas son mujeres solteras (22%).

3.2 NIVEL DE EDUCACIÓN

Un hecho bastante conocido es que el nivel de educación de las mujeres influye de manera preponderante en sus actitudes y prácticas relacionadas con la salud y el comportamiento reproductivo. Por otro lado, el nivel de educación está positivamente asociado con la situación socioeconómica. Los diferenciales y cambios en los niveles educativos son importantes para explicar las variaciones encontradas en muchas de las variables investigadas, resultados que se presentan más adelante.

Cuadro 3.1 y Gráfico 3.2


- El 44 por ciento de las mujeres entrevistadas tiene algún año de educación primaria, 28 por ciento secundaria, en especial secundaria incompleta (19%) y el 13 por ciento alcanzó nivel superior.
- Se advierten diferencias por edad en cuanto al nivel educativo más alto alcanzado por las mujeres en edades fértiles (MEF). Mientras en el grupo de las más adultas (45-49 años) predominan las mujeres sin educación (37%), en las de 20 a 24 años de edad se incrementa la proporción de las que ya cuentan con primaria completa (23%) y secundaria a más. Y entre las de 15 a 19 se concentran las que llegaron a secundaria incompleta alcanzaron a 54 por ciento, llegaron al nivel superior en mayor proporción las mujeres de 25 a 29 años de edad (20%).
- Según el área de residencia el nivel educativo alcanzado por las MEF también es diferencial. Mientras en el área rural es mayor la proporción de mujeres sin educación (21%) o con primaria (52%), en el área urbana predominan las MEF con secundaria a más.
- Las diferencias por área de residencia se aprecian igualmente al tener en cuenta las medianas de años de estudio. En el área urbana la mediana es de 10 años y en el área rural es de 4 años de estudio.

Cuadro 3.1 Nivel de educación de las mujeres entrevistadas por características seleccionadas

Distribución porcentual de las mujeres en edad fértil por nivel más alto de educación alcanzado, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Sin educación	Nivel de educación					Total	Número de mujeres	Mediana de años
		Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Superior			
Edad									
15-19	0,5	22,6	11,8	54,3	10,2	0,5	100,0	186	7,4
20-24	4,9	24,9	23,2	17,8	11,4	17,8	100,0	185	5,9
25-29	10,1	28,3	17,0	10,7	13,8	20,1	100,0	159	5,7
30-34	19,9	30,1	17,3	11,5	5,1	16,0	100,0	156	5,0
35-39	28,9	33,3	13,3	6,7	4,4	13,3	100,0	135	2,7
40-44	31,2	20,4	12,9	9,7	14,0	11,8	100,0	93	4,6
45-49	37,1	36,2	11,4	4,8	3,8	6,7	100,0	105	2,1
Área de residencia									
Urbana	4,4	14,0	8,2	22,5	18,8	32,1	100,0	293	10,0
Rural	20,8	33,2	18,9	17,4	5,2	4,5	100,0	725	4,2
Total	16,1	27,7	15,8	18,8	9,1	12,5	100,0	1 018	5,4

Gráfico 3.2
Nivel de Educación de las Mujeres en edad Fértil por Área de Residencia y Edad



Cuadros 3.2 y 3.3

Asistencia escolar y alfabetismo

- En el departamento de Apurímac solamente el 40 por ciento de las mujeres de 15 a 24 años de edad estaban estudiando en un centro de enseñanza regular, según la ENDES 2000, porcentaje que es menor al observado en 1996 (43%).
- Las principales causas del abandono escolar, se relacionan con la economía del hogar: la familia necesitaba ayuda, no podían pagar la pensión o necesitaba ganar dinero (25%).
- Los motivos relacionados con la maternidad (quedó embarazada, se casó o tenía que cuidar los niños más pequeños), afectan al 22 por ciento de las mujeres de 15 a 24 años del departamento de Apurímac. Por otro lado, la proporción de mujeres que declaró "no quiso estudiar" fue de 4 por ciento.
- La condición de alfabetismo es de gran importancia a nivel de la mujer y de la sociedad por estar asociada con resultados positivos tales como mejores condiciones de vida.
- Sólo 28 por ciento de las mujeres sin nivel de educación o con educación primaria (59%) pudo leer con facilidad. Asimismo el 32 por ciento de mujeres no puede leer o lee con dificultad una carta o periódico.
- Mientras que en el área urbana el 9 por ciento de las MEF no pueden leer o entender una carta o periódico con facilidad, en el área rural 41 por ciento tiene esa limitación.

Cuadro 3.2 Nivel de educación más alto alcanzado y razones de abandono

Distribución porcentual de las mujeres de 15-24 años por asistencia escolar y razones de abandono de la escuela, según nivel educativo más alto alcanzado, Apurímac 2000

Asiste actualmente/ Razón de abandono	Nivel de educación alcanzado					Total
	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Superior	
Actualmente asiste	13,6	12,3	68,7	32,5	61,8	40,4
Quedó embarazada	17,0	16,9	17,2	15,0	8,8	16,1
Se casó	2,3	9,2	3,7	5,0	2,9	4,4
Tenía que cuidar los niños más pequeños	5,7	1,5	0,7	0,0	0,0	1,9
La familia necesitaba ayuda	34,1	18,5	3,0	0,0	0,0	12,7
No podían pagar la pensión	1,1	0,0	0,7	10,0	2,9	1,9
Enfermedad	1,1	0,0	0,7	0,0	0,0	0,6
Necesitaba ganar dinero	13,6	21,5	3,7	17,5	2,9	10,8
Se graduó/ suficiente estudio	0,0	0,0	0,0	7,5	20,6	2,8
No aprobó examen de ingreso	0,0	1,5	0,0	5,0	0,0	0,8
No quiso estudiar	5,7	9,2	0,7	2,5	0,0	3,6
Escuela muy lejos/ no había escuela	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	1,4
No había maestros en la escuela	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Otra	3,4	0,0	0,7	2,5	0,0	1,4
NS/ Sin información	0,0	1,5	0,0	2,5	0,0	0,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Número	88	65	134	40	34	361

Cuadro 3.3 Alfabetismo por características seleccionadas

Distribución porcentual de las mujeres en edad fértil por nivel más alto de educación alcanzado y por nivel de alfabetismo, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Sin escolaridad o escuela primaria			Sin información	Con educación secundaria o más	Total	Número de mujeres
	No puede leer	Lee con dificultad	Lee fácilmente				
Edad							
15-19	10,2	5,4	17,7	1,6	65,1	100,0	186
20-24	11,9	7,6	33,5	0,0	47,0	100,0	185
25-29	18,9	5,0	31,4	0,0	44,7	100,0	159
30-34	32,1	7,7	27,6	0,0	32,7	100,0	156
35-39	40,7	8,9	25,2	0,7	24,4	100,0	135
40-44	34,4	2,2	28,0	0,0	35,5	100,0	93
45-49	46,7	6,7	31,4	0,0	15,2	100,0	105
Area de residencia							
Urbana	6,1	2,4	17,4	0,7	73,4	100,0	293
Rural	32,9	8,0	31,7	0,3	27,1	100,0	725
Total	25,2	6,4	27,6	0,4	40,4	100,0	1018

3.3 ACCESO A MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN

El acceso a los medios de comunicación es muy importante por que complementa las enseñanzas recibidas en la educación formal y permite la transmisión de conocimientos sobre aspectos de salud, saneamiento ambiental y planificación familiar, aparte que muestra formas de vida y hábitos empleados en otras sociedades, ya sea en series, telenovelas o radionovelas, o artículos periodísticos. Los resultados se presentan en el Cuadro 3.4.

Cuadro 3.4

- En el 2000, el 68 por ciento de las mujeres entrevistadas acceden a algún medio de comunicación masivo al menos una vez por semana, siendo la radio el medio más difundido a nivel del departamento de Apurímac (63%).

- La televisión se ubica en segundo lugar (35%), la mayor proporción de televidentes se encuentran en el área urbana.
- El periódico ocupa un tercer lugar (5%). Las mujeres con mayor nivel de instrucción y las residentes en el área urbana son las que en mayor proporción leen el periódico.
- La mayor proporción de entrevistadas, que no acceden a algún medio masivo de comunicación, son mujeres sin educación (57%) o residen en el área rural (40%).
- Por el contrario, mayor proporción de acceso a cualquier medio de comunicación tienen las mujeres con nivel educativo de secundaria o más.
- En el área rural es notorio el acceso de las mujeres a la radio (56%) en comparación al resto de medios y en segundo lugar la televisión (21%).

Cuadro 3.4 Acceso a los medios masivos de comunicación

Porcentaje de mujeres entrevistadas que leen el periódico o miran televisión por lo menos una vez a la semana o escuchan la radio todos los días, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Medio de comunicación					Número de mujeres
	Ningún medio de comunicación	Periódico o revista: por lo menos una vez por semana	Televisión: por lo menos una vez por semana	Radio: escuchan casi todos los días	Los tres medios	
Edad						
15-19	24,7	5,9	42,5	71,5	2,7	186
20-24	29,7	5,9	37,3	65,4	3,2	185
25-29	29,6	4,4	35,2	64,2	2,5	159
30-34	34,0	7,1	34,6	60,9	4,5	156
35-39	41,5	5,2	29,6	53,3	4,4	135
40-44	30,1	5,4	32,3	65,6	3,2	93
45-49	41,9	1,9	31,4	52,4	1,9	105
Area de residencia						
Urbana	13,7	11,3	70,6	78,5	8,9	293
Rural	39,8	2,9	21,2	56,3	1,0	725
Nivel de educación						
Sin educación	56,7	0,0	13,4	39,0	0,0	164
Primaria	41,1	2,0	20,8	56,0	0,7	443
Secundaria	16,5	7,7	52,3	76,8	4,6	285
Superior	5,5	18,1	77,2	85,0	13,4	127
Total	32,3	5,3	35,4	62,7	3,2	1018

3.4 SITUACIÓN LABORAL

Al igual que en muchos países, los cambios económicos, sociales y culturales en la sociedad peruana han condicionado que la mujer tenga que trabajar fuera del hogar, situación que influye en el desarrollo de los hijos, en la integración del hogar y en la salud de la mujer, al tener que desempeñar múltiples funciones.

La ENDES 2000 cubre los siguientes temas:

- Trabajo de la entrevistada en los últimos doce meses, tipo actual de empleo y continuidad.
- Tipo de ocupación de las mujeres, categorías de ocupación y si recibe o no remuneración en dinero.

Cuadros 3.5 y 3.6

Situación Laboral

- El 59 por ciento de las mujeres en edad fértil se encontraba trabajando y otro 5 por ciento, si bien no trabaja en la actualidad había laborado en los 12 meses anteriores a la entrevista.
- Más de un cuarto de las mujeres 27 por ciento trabaja en forma permanente. Alcanzando mayores proporciones en las de 40 a 44 años de edad (40%); entre las convivientes; aquellas que tienen entre 3 a 4 hijos; las que tienen educación superior y las residentes del área urbana (38%).

Cuadro 3.5 Trabajo en los últimos 12 meses y tipo actual de empleo, según características seleccionadas

Distribución porcentual de las mujeres según si trabajan o no actualmente, por continuidad en el trabajo y según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	No trabaja actualmente		Trabaja actualmente			Total	Número de mujeres
	No trabajó en los últimos 12 meses	Si trabajó en los últimos 12 meses	Trabaja durante todo el año	Trabaja por temporada	Ocasionalmente		
Edad							
15-19	50,5	10,2	16,1	14,0	9,1	100,0	186
20-24	42,2	5,9	21,6	20,5	9,7	100,0	185
25-29	25,8	6,3	28,9	29,6	9,4	100,0	159
30-34	36,5	3,2	30,1	25,0	4,5	100,0	156
35-39	34,1	1,5	31,9	24,4	7,4	100,0	135
40-44	26,9	3,2	39,8	24,7	5,4	100,0	93
45-49	23,8	2,9	33,3	33,3	6,7	100,0	105
Estado conyugal							
Soltera	43,2	9,7	22,0	15,9	9,3	100,0	227
Casada	37,4	2,7	27,3	26,4	5,9	100,0	473
Conviviente	34,9	6,0	31,7	18,3	8,7	100,0	252
Divorciada, separada, viuda	4,5	4,5	28,4	50,7	11,9	100,0	67
Número de hijos vivos							
0	42,7	10,8	23,7	13,3	9,5	100,0	241
1-2	36,8	4,2	27,7	22,9	8,4	100,0	310
3-4	31,1	3,4	31,1	28,2	5,9	100,0	238
5+	32,6	2,6	26,5	30,9	7,0	100,0	230
Área de residencia							
Urbana	37,5	8,2	37,9	8,9	7,2	100,0	293
Rural	35,3	4,0	23,0	29,6	8,0	100,0	725
Nivel de educación							
Sin educación	37,2	2,4	23,2	27,4	9,1	100,0	164
Primaria	31,6	5,9	21,9	31,8	8,6	100,0	443
Secundaria	46,0	6,3	24,2	17,2	6,3	100,0	285
Superior	26,8	3,9	58,3	4,7	6,3	100,0	127
Total	35,9	5,2	27,3	23,7	7,8	100,0	1018

- El trabajo estacional de las MEF a nivel nacional se presenta en mayor proporción en Apurímac (24%).

Tipo de Ocupación de las mujeres

- El 52 por ciento de las mujeres que trabajan se dedican a labores agrícolas, la mayoría de ellas en tierra propia (33%). Un 48 por ciento de las mujeres se dedican a labores no agrícolas, la mayoría de ellas como trabajadoras del comercio o servicios (24%).
- Según características sociodemográficas de las mujeres que se dedican a labores agrícolas en tierra propia, destacan

mayores proporciones entre las mujeres de 45 a 49 años de edad (48%), entre las divorciadas, separada y viudas (44%), entre las que tienen de 5 a más hijos (48%) y entre las que tienen educación primaria o menos educativo (46% respectivamente).

- Contrariamente, las mayores proporciones de mujeres que se dedican a labores no agrícolas, como comercio o servicios, se presentan en las mujeres con las siguientes características: en las de 25-29 (30%), en las casadas (27%), en las de 1 a 4 hijos (27%), en las residentes en el área urbana y las que tienen nivel educativo de secundaria.

Cuadro 3.6 Tipo de ocupación de las mujeres, según características seleccionadas

Distribución porcentual de las mujeres que trabajan por tipo de ocupación agrícola y no agrícola, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Empleo agrícola				Empleo no agrícola				Hogar y domésticos	Total	Número de mujeres
	Tierra propia	Tierra de la familia	Tierra alquilada	Tierra de otros	Profes./ Técnicos/ Administrad.	Oficinista	Comercio y servicios	Trabajo manual			
Edad											
15-19	15,1	24,7	0,0	13,7	0,0	0,0	16,4	5,5	24,7	100,0	73
20-24	30,2	12,5	0,0	8,3	10,4	2,1	28,1	4,2	4,2	100,0	96
25-29	29,6	4,6	1,9	4,6	13,9	2,8	29,6	4,6	7,4	100,0	108
30-34	35,1	10,6	1,1	9,6	13,8	2,1	22,3	5,3	0,0	100,0	94
35-39	34,9	9,3	1,2	8,1	15,1	3,5	25,6	1,2	1,2	100,0	86
40-44	36,9	9,2	1,5	3,1	10,8	3,1	29,2	4,6	1,5	100,0	65
45-49	48,1	10,4	0,0	5,2	9,1	1,3	16,9	3,9	3,9	100,0	77
Estado conyugal											
Soltera	14,0	15,9	0,0	10,3	15,0	0,9	19,6	5,6	18,7	100,0	107
Casada	41,3	4,9	0,7	6,4	10,2	2,5	26,9	4,2	2,5	100,0	283
Conviviente	25,0	23,0	2,0	5,4	9,5	3,4	25,0	2,0	4,1	100,0	148
Divorciada, separada, viuda	44,3	3,3	0,0	13,1	9,8	0,0	19,7	6,6	3,3	100,0	61
Número de hijos vivos											
0	13,4	14,3	0,0	11,6	17,0	0,9	19,6	6,3	17,0	100,0	112
1-2	29,0	12,0	1,1	5,5	14,2	3,8	27,3	3,3	3,3	100,0	183
3-4	36,8	7,1	1,3	5,8	11,0	1,9	27,1	4,5	4,5	100,0	155
5+	47,7	12,1	0,7	8,7	2,0	1,3	21,5	3,4	2,0	100,0	149
Area de residencia											
Urbana	3,1	0,0	0,6	0,6	22,6	7,5	49,1	3,8	11,9	100,0	159
Rural	43,4	15,2	0,9	10,0	6,6	0,2	15,5	4,3	3,6	100,0	440
Nivel de educación											
Sin educación	45,9	23,5	0,0	14,3	0,0	0,0	9,2	2,0	4,1	100,0	98
Primaria	45,8	14,4	0,7	9,0	0,4	0,0	22,4	4,0	3,2	100,0	277
Secundaria	16,9	2,9	1,5	4,4	7,4	2,9	41,9	8,1	14,0	100,0	136
Superior	1,1	0,0	1,1	0,0	61,4	10,2	20,5	1,1	3,4	100,0	88
Total	32,7	11,2	0,8	7,5	10,9	2,2	24,4	4,2	5,8	100,0	598

Cuadro 3.7

Empleador y formas de remuneración de las mujeres que trabajan, según características seleccionadas

- De la mayoría de mujeres que trabajan por cuenta propia (58%); el 44 por ciento recibe dinero por su trabajo, el 15 por ciento no recibe dinero. El 18 por ciento de las mujeres en edad fértil trabaja para algún miembro de la familia, y

mayormente sin pago 15 por ciento. En tanto que las trabajadoras dependientes llegan a 24 por ciento.

- En el área urbana, la proporción de mujeres que trabajan en forma independiente o por cuenta propia (48%) es mayor que las trabajadoras dependientes o que trabajan para otra persona (40%). En el área rural destacan las mujeres que trabajan por cuenta propia (62%).

Cuadro 3.7 Empleador y forma de remuneración de las mujeres que trabajan, según características seleccionadas

Distribución porcentual de mujeres que trabajan por tipo de empleador y forma de pago, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Trabaja por cuenta propia		Trabaja para otra persona (no familiar)		Trabaja para un familiar		Total	Número de mujeres
	Recibe dinero	No recibe dinero	Recibe dinero	No recibe dinero	Recibe dinero	No recibe dinero		
Edad								
15-19	16,4	11,0	31,5	1,4	5,5	34,2	100,0	73
20-24	45,8	9,4	25,0	0,0	5,2	14,6	100,0	96
25-29	49,1	13,9	24,1	0,9	3,7	8,3	100,0	108
30-34	46,8	13,8	19,1	1,1	2,1	16,0	100,0	94
35-39	40,7	22,1	25,6	0,0	0,0	11,6	100,0	86
40-44	58,5	9,2	20,0	0,0	3,1	9,2	100,0	65
45-49	45,5	23,4	16,9	0,0	0,0	14,3	100,0	77
Área de residencia								
Urbana	45,9	2,5	39,6	0,0	5,0	6,3	100,0	159
Rural	42,7	19,1	17,3	0,7	2,0	18,2	100,0	440
Nivel de educación								
Sin educación	38,8	17,3	14,3	0,0	2,0	27,6	100,0	98
Primaria	53,1	18,8	8,3	0,0	2,5	17,0	100,0	277
Secundaria	43,4	12,5	27,9	2,2	4,4	9,6	100,0	136
Superior	19,3	2,3	72,7	0,0	2,3	3,4	100,0	88
Ocupación								
Agrícola	36,4	27,2	8,0	0,6	2,9	24,9	100,0	313
No agrícola	51,4	1,0	39,9	0,3	2,8	4,2	100,0	286
Total	43,6	14,7	23,2	0,5	2,8	15,0	100,0	598

3.5 DECISIONES SOBRE ASPECTOS IMPORTANTES EN EL HOGAR

En la ENDES 2000 se hicieron preguntas para medir el grado de autonomía de la mujer, en cuanto a su participación en la toma de decisiones en el hogar, administración de los ingresos y contribución de la entrevistada a los gastos del hogar, información sobre la persona que toma decisiones específicas como el

cuidado de su salud, compras grandes en el hogar, compras diarias del hogar, visitas a los amigos o familiares y que comida cocinar diariamente. Asimismo, sobre la opinión de las entrevistadas respecto a si está de acuerdo que una mujer se niegue a tener relaciones sexuales con su marido en situaciones que afectan su salud e integridad moral, temas que se presentan a continuación.

Cuadro 3.8

- Aproximadamente la mitad (49%) deciden ellas mismas en que gastar el dinero que ganan. Las mayores proporciones de mujeres con esta característica se presentan entre las menores de 20 años, entre las mujeres solteras (89%), sin hijos (80%), en las residentes del área urbana (58%) y las que tienen nivel de educación superior (59%).
- Gran proporción de mujeres que trabajan (85%) contribuyen al sostenimiento del

hogar, atendiendo al menos una parte de sus gastos: 21 por ciento menos de la mitad, 44 por ciento más de la mitad y un 20 por ciento la totalidad de gastos del hogar.

- La proporción de mujeres que trabajan y contribuyen al sostenimiento del hogar es mayor en las mujeres de 35-44 años de edad, entre las divorciadas, separadas y viudas, en las residentes del área urbana y entre las de grupos extremos de educación.

Cuadro 3.8 Persona que decide cómo gastar los ingresos y gastos del hogar que paga la entrevistada, según características seleccionadas

Distribución porcentual de mujeres con remuneración en dinero por persona que decide como gastarlo y proporción de gastos del hogar que paga la entrevistada, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Persona que decide como gastar el dinero			Total	Proporción de gastos del hogar que paga la entrevistada				Total	Número de mujeres
	Solo la entrevistada decide	Junto con alguien más	Alguien más decide		Casi nada	Menos de la mitad	La mitad o más	Todo		
Edad										
15-19	79,5	15,4	5,1	100,0	38,5	23,1	30,8	7,7	100,0	39
20-24	50,7	43,8	4,1	100,0	16,4	32,9	42,5	8,2	100,0	73
25-29	38,6	51,8	9,6	100,0	14,5	22,9	44,6	18,1	100,0	83
30-34	45,3	43,8	9,4	100,0	14,1	15,6	48,4	21,9	100,0	64
35-39	54,4	35,1	10,5	100,0	8,8	14,0	50,9	26,3	100,0	57
40-44	47,2	49,1	3,8	100,0	9,4	17,0	41,5	32,1	100,0	53
45-49	39,6	58,3	2,1	100,0	10,4	18,8	41,7	29,2	100,0	48
Estado conyugal										
Soltera	88,7	5,6	4,2	100,0	22,5	25,4	42,3	9,9	100,0	71
Casada/ conviviente	33,3	58,2	8,1	100,0	14,8	21,5	45,8	17,8	100,0	297
Divorciada, separada, viuda	85,7	12,2	2,0	100,0	6,1	12,2	32,7	49,0	100,0	49
Número de hijos vivos										
0	80,3	14,5	3,9	100,0	23,7	27,6	42,1	6,6	100,0	76
1-2	46,7	46,7	6,7	100,0	14,1	20,0	48,1	17,8	100,0	135
3-4	34,5	57,5	7,1	100,0	14,2	22,1	39,8	23,9	100,0	113
5+	44,1	47,3	8,6	100,0	10,8	16,1	43,0	30,1	100,0	93
Área de residencia										
Urbana	57,6	36,1	5,6	100,0	12,5	16,7	50,0	20,8	100,0	144
Rural	44,3	48,0	7,3	100,0	16,5	23,4	40,3	19,8	100,0	273
Nivel de educación										
Sin educación	53,7	44,4	1,9	100,0	11,1	13,0	35,2	40,7	100,0	54
Primaria	38,4	50,3	10,2	100,0	17,5	26,6	38,4	17,5	100,0	177
Secundaria	56,3	39,8	3,9	100,0	16,5	20,4	49,5	13,6	100,0	103
Superior	59,0	34,9	6,0	100,0	10,8	15,7	53,0	20,5	100,0	83
Total	48,9	43,9	6,7	100,0	15,1	21,1	43,6	20,1	100,0	417

Nota: El total incluye 0.5% sin información.

Cuadro 3.9 y Gráfico 3.3

Control de los ingresos para la contribución a los gastos del hogar

- El 54 por ciento de las mujeres (casadas o convivientes) comparten con el esposo o compañero la decisión del monto a usar,

de la remuneración de la mujer, para destinarlos a los gastos del hogar.


- La proporción de mujeres no unidas que deciden ellas mismas en que se gasta el dinero (89%), es mayor que en la mujeres casadas o convivientes(37%).

Cuadro 3.9 Control de los ingresos para la contribución a los gastos del hogar

Distribución porcentual de las mujeres unidas que reciben remuneración en dinero por persona que decide como utilizarlo, según proporción de gastos del hogar sufragados por la mujer, Apurímac 2000.

Contribución a los gastos del hogar	Actualmente unidas					Total	Número de mujeres
	Sólo la entrevistada	Junto con el esposo/compañero	Junto con alguien más	Sólo el esposo/compañero decide	Otra persona		
Proporción de gastos del hogar que paga la entrevistada							
Casi nada	28,3	65,2	2,2	2,2	2,2	100,0	46
Menos de la mitad	34,8	58,0	0,0	7,2	0,0	100,0	69
La mitad o más	38,4	54,8	0,7	4,8	0,7	100,0	146
Todo	44,4	38,1	1,6	14,3	1,6	100,0	63
Total	37,3	53,7	0,9	6,8	0,9	100,0	324

Nota: El total incluye el 0.4% sin información.



Cuadros 3.10 y 3.10a

Decisiones en el Hogar

- En el departamento de Apurímac, las mujeres unidas, en una mayor proporción que las mujeres no unidas, deciden ellas mismas sobre aspectos cotidianos del hogar: el cuidado de su salud (65% vs. 54%), compras para las necesidades diarias del hogar (42% vs. 24%), que comida se debe cocinar (86% vs. 28%).
- Sin embargo las mujeres no unidas en mayor proporción que las unidas, deciden ellas mismas sobre la visita a familiares y amigos (46% vs. 17%).
- Las grandes compras del hogar generalmente lo decide la entrevistada junto con su cónyuge (72%).

Cuadro 3.10 Decisiones en el hogar

Distribución porcentual de las mujeres por persona que toma las decisiones específicas del hogar, por estado marital según tipo de decisión, Apurímac 2000

Tipo de decisión	Actualmente unidas						Total	Número de mujeres
	Sólo la entrevistada decide	Junto con el esposo/compañero	Junto con alguien más	Solo el esposo/compañero decide	Otra persona	Nadie		
El cuidado de su salud	65,1	17,4	1,0	15,4	0,9	0,1	100,0	763
Las grandes compras del hogar	11,0	72,1	1,7	11,9	2,7	0,5	100,0	763
Compras para las necesidades diarias del hogar	41,8	42,9	1,7	6,5	3,0	4,1	100,0	763
Visitar a familia, amigos o parientes	16,9	70,4	0,9	9,6	1,7	0,5	100,0	763
Qué comida se debe cocinar cada día	86,3	6,5	3,7	0,7	2,9	0,0	100,0	763

Cuadro 3.10a Decisiones en el hogar

Distribución porcentual de las mujeres por persona que toma las decisiones específicas del hogar, por estado marital según tipo de decisión, Apurímac 2000

Tipo de decisión	No unidas				Total	Número de mujeres
	Sólo la entrevistada decide	Junto con alguien más	Otra persona	Nadie		
El cuidado de su salud	53,7	21,6	24,7	0,0	100,0	255
Las grandes compras del hogar	17,3	20,4	58,0	3,9	100,0	255
Compras para las necesidades diarias del hogar	23,5	19,2	55,3	2,0	100,0	255
Visitar a familia, amigos o parientes	46,3	15,7	37,6	0,4	100,0	255
Qué comida se debe cocinar cada día	27,8	21,2	50,2	0,8	100,0	255

Cuadro 3.11

Última Palabra en decisiones del hogar según características seleccionadas

- El 57 por ciento de las mujeres en edad fértil, tienen la última palabra en todas las decisiones del hogar que le fueron consultadas, proporción que es mayor en el área urbana (61%) que en el área rural (56%).

- Según características seleccionadas de las entrevistadas, las mayores proporciones de mujeres que ellas tienen la última palabra se presentan entre las de 25 a más años de edad entre las alguna vez unidas, las que tienen un hijo a más, entre las mujeres sin educación y las que cuentan con educación superior y en aquellas que les pagan en dinero, alcanzando valores superiores al 60 por ciento de su respectivo grupo poblacional.

Cuadro 3.11 Última palabra en decisiones del hogar según características seleccionadas

Porcentaje de mujeres que dicen que ellas solas o conjuntamente con alguien tienen la última palabra en decisiones específicas del hogar, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Sola o con otra persona tiene la última palabra en:					Tiene la última palabra en todas las anteriores decisiones	No tiene la última palabra en ninguna de ellas	Número de mujeres
	El cuidado de su salud	Las grandes compras del hogar	Compras para las necesidades diarias del hogar	El visitar a familia, amigos o parientes	Que comida se debe cocinar cada día			
Edad								
15-19	66,1	31,2	36,6	53,8	41,9	23,1	22,0	186
20-24	86,5	71,9	73,0	81,6	84,3	54,6	2,7	185
25-29	83,6	81,8	81,8	87,4	95,6	60,4	0,6	159
30-34	82,7	85,9	88,5	89,7	96,8	68,6	0,0	156
35-39	88,9	90,4	94,1	89,6	96,3	74,1	0,0	135
40-44	82,8	86,0	89,2	89,2	98,9	69,9	0,0	93
45-49	83,8	83,8	83,8	93,3	98,1	66,7	1,0	105
Estado conyugal								
Soltera.	72,7	31,7	36,6	57,3	44,1	22,0	18,5	227
Casada/ conviviente	83,2	85,4	87,2	88,6	97,2	67,0	0,6	724
Divorciada, separada, viuda	92,5	80,6	80,6	89,6	85,1	68,7	3,0	67
Número de hijos vivos								
0	72,6	37,8	41,1	59,8	48,5	25,3	17,4	241
1-2	85,5	82,3	84,5	86,1	90,6	65,2	1,6	310
3-4	81,1	86,1	86,1	87,4	98,3	66,0	0,4	238
5+	85,7	84,3	88,3	92,6	100,0	70,4	0,0	230
Area de residencia								
Urbana	87,4	72,0	77,8	84,6	77,1	61,1	5,1	293
Rural	79,1	73,6	74,5	80,4	87,6	55,5	4,5	725
Nivel de educación								
Sin educación	79,9	78,7	83,5	84,8	95,1	61,6	1,2	164
Primaria	79,0	74,9	77,2	81,5	90,3	56,2	4,3	443
Secundaria	82,5	63,9	62,8	75,4	70,2	53,0	8,8	285
Superior	89,8	80,3	87,4	92,1	83,5	63,8	1,6	127
Trabajo actual								
No trabaja	80,7	70,2	72,1	81,4	80,9	56,3	6,4	419
Trabaja por dinero	88,7	79,4	81,8	85,6	88,2	64,0	0,7	417
Trabaja sin paga/ dinero	66,3	65,2	68,5	73,5	84,5	43,1	9,9	181
Sin información	*	*	*	*	*	*	*	2
Total	81,5	73,1	75,5	81,6	84,6	57,1	4,7	1018

*: Menos de 20 casos.

Cuadro 3.12

Razones específicas para rehusar relaciones sexuales con el esposo

- Gran proporción de las entrevistadas en el departamento de Apurímac están de acuerdo en que una mujer se niegue a tener relaciones sexuales con su marido cuando ella tiene alguna restricción, como: "está cansada o no está de humor" (78%), "ha tenido recientemente un parto" (85%),
- El porcentaje de entrevistadas que está de acuerdo con todas las razones indicadas es de 65 por ciento. Siendo mayor en las residentes del área urbana (80%) , en las mujeres con educación secundaria o superior (74% y 91%) y en las que trabajan y le pagan en dinero (79%).


"ella sabe que el esposo tiene relaciones con otras mujeres" (87%), o cuando tiene conocimiento que su marido "tiene una ETS" (71%).

Cuadro 3.12 Razones específicas para rehusar relaciones sexuales con el esposo

Porcentaje de mujeres que están de acuerdo en que una esposa se niegue a tener relaciones sexuales con el esposo, por razones específicas, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Razones que justifican que esposa se niegue a tener relaciones sexuales				Está de acuerdo con todas la razones	No está de acuerdo con ninguna razón	Número de mujeres
	Ella cansada, no está dispuesta	Dio a luz recientemente	El esposo tiene relaciones con otras mujeres	Sabe que esposo tiene ETS			
Edad							
15-19	65,1	69,9	77,4	66,7	58,1	22,0	186
20-24	86,5	90,3	90,8	71,4	68,6	8,1	185
25-29	86,2	93,1	94,3	83,0	75,5	3,8	159
30-34	82,1	89,1	89,1	72,4	66,0	9,0	156
35-39	74,1	86,7	86,7	65,9	60,0	9,6	135
40-44	79,6	84,9	87,1	67,7	64,5	10,8	93
45-49	67,6	82,9	83,8	70,5	55,2	11,4	105
Estado conyugal							
Soltera	70,5	74,4	80,6	72,7	65,2	19,4	227
Casada/ conviviente	80,0	87,7	88,6	70,9	64,4	8,6	724
Divorciada, separada, viuda	76,1	92,5	92,5	71,6	62,7	7,5	67
Número de hijos vivos							
0	72,2	75,9	80,5	72,2	64,7	18,3	241
1-2	83,9	90,3	91,3	74,5	69,7	7,1	310
3-4	79,8	88,2	88,7	71,4	64,3	7,6	238
5+	72,6	84,3	86,5	66,1	57,4	11,7	230
Area de residencia							
Urbana	87,7	91,5	94,9	85,3	80,2	5,1	293
Rural	73,6	82,5	83,9	65,7	58,1	13,2	725
Nivel de educación							
Sin educación	56,7	72,6	72,0	45,7	36,0	21,3	164
Primaria	75,2	83,3	85,6	68,2	61,2	12,6	443
Secundaria	85,6	89,1	93,0	80,0	74,4	6,7	285
Superior	95,3	98,4	98,4	96,1	90,6	0,8	127
Trabajo actual							
No trabaja	70,4	78,3	81,9	62,3	55,1	16,5	419
Trabaja por dinero	86,3	92,3	93,5	85,6	79,4	5,0	417
Trabaja sin paga/ dinero	74,6	84,0	84,5	60,2	52,5	11,6	181
Sin información	*	*	*	*	*	*	2
Decisiones en las cuales una mujer tiene la ultima palabra							
0	47,9	52,1	58,3	39,6	35,4	39,6	48
1-2	74,7	77,3	84,0	72,7	65,3	15,3	150
3-4	77,0	90,0	90,8	79,1	67,4	6,3	239
5+	81,1	87,8	88,7	70,4	65,5	9,3	581
Total	77,6	85,1	87,0	71,3	64,5	10,9	1018

*: Menos de 20 casos.



IV. FECUNDIDAD

IV. FECUNDIDAD

La fecundidad es una de las variables demográficas más importantes para evaluar la tendencia de crecimiento de la población. Esta variable ha venido descendiendo sistemáticamente en el Perú, pero su nivel es todavía elevado en el departamento de Apurímac, en donde las condiciones de vida son deprimidas. La reducción de la fecundidad es considerada importante como parte de la estrategia para la disminución de la mortalidad infantil y materna.

En la ENDES 2000 se recolectó información detallada sobre el comportamiento reproductivo de la mujer. Para cada entrevistada se cuenta con datos sobre la historia de nacimientos: el número de hijos nacidos vivos, la fecha de nacimiento y el sexo de cada uno de los hijos, su condición de supervivencia al momento de la entrevista y la edad al morir de los fallecidos. Esta información permite obtener estimaciones de los niveles actuales y las tendencias de la fecundidad y la mortalidad.

Este capítulo consta de cinco secciones. En la primera se describe la fecundidad actual, sus diferenciales según las características de la entrevistada y las tendencias durante los últimos quince años (1986-2000). Luego, se analiza la fecundidad acumulada en términos del promedio de hijos nacidos vivos y sobrevivientes de todas las mujeres y de aquellas actualmente unidas (casadas o convivientes al momento de la encuesta). Las secciones tres y cuatro examinan dos variables claves en el estudio de la fecundidad: intervalos entre nacimientos y la edad al primer nacimiento. La última sección describe las características más importantes

relacionadas con la fecundidad de las adolescentes.

4.1 NIVELES, TENDENCIAS Y DIFERENCIALES DE LA FECUNDIDAD

La estimación del nivel de fecundidad más reciente está referida a los tres años precedentes a la encuesta (1997-2000) por lo que los resultados así obtenidos estarían centrados a inicios de 1999. Es conveniente el empleo de un periodo de referencia de tres años porque así se atenúan las fluctuaciones aleatorias que pueden afectar los valores anuales, se reducen los errores muestrales al tener una muestra de mayor tamaño y se evitan los sesgos por el olvido de hechos ocurridos mucho tiempo atrás.

En el cuadro 4.1 se presentan las tasas de fecundidad por edad y por área de residencia. Un indicador sintético de los niveles de fecundidad que facilita las comparaciones es la tasa global de fecundidad (TGF). La TGF combina las tasas de fecundidad de todos los grupos de edad durante un período determinado y puede ser interpretada como el promedio de hijos nacidos vivos que tendrían las mujeres durante toda su vida reproductiva, si las tasas de fecundidad por edad obtenidas en la encuesta se mantuviesen invariables en el tiempo. Otros indicadores calculados en el cuadro 4.1 son la tasa de fecundidad general (TFG), la cual muestra el número de nacimientos que actualmente ocurren, en promedio, por cada mil mujeres de 15 a 49 años y la tasa bruta de natalidad (TBN), la cual indica el número de nacimientos que ocurren al año, en promedio, por cada mil personas.

Cuadro 4.1

- El departamento de Apurímac es uno de los que presenta un nivel alto de fecundidad, mientras para el total del país la tasa global de fecundidad es 2.9 hijos por mujer, para el departamento de Apurímac es de 4.2. En el área urbana esta tasa es de 3.2 hijos por mujer, siendo mayor en el área rural 4.7 hijos por mujer.
- Las tasas de fecundidad por edad, en promedio, son relativamente bajas al comienzo de la vida reproductiva pero alcanzan su mayor nivel en el grupo de 20 a 24 años de edad y descienden marcadamente a partir de los 40 años de edad.
- La tasa de fecundidad por edad más alta tanto en el área urbana y rural la tienen las mujeres de 20 a 24 años (175 y 236 nacimientos por mil respectivamente).
- La tasa bruta de natalidad (TBN) es de 26 nacimientos por cada mil habitantes, presentando un nivel más bajo en el área urbana (24 por mil) que en el área rural (26 por mil).

Cuadro 4.1 Niveles de fecundidad

Tasas específicas por edad, tasas acumuladas de fecundidad y tasa bruta de natalidad para los tres años que precedieron la encuesta, por área de residencia, Apurímac 2000

Grupo de edad e indicador	Área de Residencia		Total
	Urbana	Rural	
Edad			
15-19	55	148	119
20-24	175	236	217
25-29	144	201	186
30-34	134	163	156
35-39	109	111	110
40-44	12	43	33
45-49	18	30	27
Indicador			
Tasa global de fecundidad ^{1/}	3,2	4,7	4,2
Tasa general de fecundidad ^{2/}	110	165	149
Tasa bruta de natalidad ^{3/}	23,7	26,0	25,7

¹ La tasa global está expresada en nacimientos por mujer

² La tasa de fecundidad general (nacimientos divididos por número de mujeres de 15-49) está expresada en nacimientos por 1,000 mujeres.

³ La tasa bruta de natalidad está expresada en nacimientos por 1,000 habitantes

Los diferenciales en las tasas globales de fecundidad, la paridez completa (promedio de nacidos vivos en mujeres de 40 a 49 años) y el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años embarazadas, se presentan en el cuadro 4.2, por lugar de residencia y nivel de educación.

Cuadro 4.2

Fecundidad por características seleccionadas

- El nivel de fecundidad, presenta marcadas diferencias según el nivel educativo de la mujer y el área de residencia.

- La diferencia existente entre el área urbana y rural, se manifiesta también en el porcentaje de mujeres actualmente embarazadas: en el área urbana, 6 por ciento de mujeres en edades fértiles estaban embarazadas al momento de la encuesta frente a 8 por ciento del área rural.
- En las cifras mostradas en el cuadro 4.2, se evidencia que la fecundidad y la educación tienen una relación inversa, la TGF de las mujeres con educación primaria (4.8 hijos por mujer) es mayor a la de las mujeres con educación superior (2.9 hijos por mujer).
- De modo similar, al observar el número medio de hijos de las mujeres de 40 a 49 años de edad, que indica la fecundidad al término de la vida reproductiva, se aprecia gran diferencia entre los grupos extremos de educación.

Cuadro 4.2 Fecundidad y paridez según lugar de residencia y educación

Tasa global de fecundidad, porcentaje de mujeres embarazadas y número promedio de hijos nacidos vivos de mujeres de 40-49 años, según lugar de residencia y nivel de educación, Apurímac 2000

Características	Tasa global de fecundidad 15-49	Porcentaje de mujeres actualmente embarazadas 15-49	Número promedio de nacidos vivos de mujeres 40-49
Area de residencia			
Urbana	3,2	5,8	5,2
Rural	4,7	7,6	6,7
Nivel de educación			
Sin educación	4,3	6,1	7,0
Primaria	4,8	8,8	6,9
Secundaria	3,2	4,9	4,8
Superior	2,9	7,1	3,1
Total	4,2	7,1	6,3

El cuadro 4.3 muestra las tasas de fecundidad por edad para varios quinquenios anteriores a la encuesta, lo que permite apreciar si ha habido cambios en los niveles de fecundidad a través del tiempo. Algunas tasas no reflejan la experiencia de todas las mujeres en ciertos grupos de edad en los quinquenios señalados. Para observar la experiencia completa del grupo de 45 a 49 años en los cinco años anteriores a la encuesta, por ejemplo, hubiese sido necesario entrevistar a mujeres de 50 a 54 años en ENDES 2000.

Cuadro 4.3

- En el departamento de Apurímac, al comparar los quinquenios anteriores a la Encuesta (0-4 y 10-14 años) se observa que la mayor disminución de la fecundidad ocurrió en las mujeres de 30 a 34 años, grupo en los que el número de nacimientos disminuyó en 38 por ciento.

Cuadro 4.3 Fecundidad por edad para varios quinquenios anteriores a la encuesta

Tasas específicas de fecundidad para períodos quinquenales que precedieron la encuesta, por edad de la madre, Apurímac 2000

Edad de la madre ¹	Años antes de la encuesta		
	0-4	5-9	10-14
15-19	124	133	151
20-24	213	291	303
25-29	197	295	308
30-34	167	255	268
35-39	125	195	190
40-44	64	122	-
45-49	34	-	-

¹ Tasa de fecundidad por mil mujeres

-: No aplicable

4.2 FECUNDIDAD ACUMULADA

En esta sección se examina el número promedio de hijos tenidos por mujer, indicador frecuentemente usado en el análisis del comportamiento reproductivo de una población. En las mujeres de mayor edad, este promedio indica la fecundidad acumulada en los últimos 20 a 25 años, así también como la descendencia completa promedio.

El cuadro 4.4 contiene la distribución porcentual de todas las mujeres en edad fértil y de aquellas actualmente en unión, por el número de hijos tenidos según la edad actual. Para entender mejor la evolución de la fecundidad acumulada se presta mayor atención a la información de las mujeres que actualmente viven en unión conyugal.

Cuadro 4.4

Hijos nacidos vivos y sobrevivientes

- El total de mujeres entrevistadas de 15 a 49 años del departamento de Apurímac, tiene un promedio de 3.1 hijos nacidos vivos y las mujeres actualmente unidas 4.0.
- La proporción de mujeres sin hijos disminuye conforme avanza la edad de igual modo el promedio de hijos nacidos vivos aumenta con la edad de la mujer, tanto para el total de mujeres (0.2 para las de 15 a 19 años a 6.8 para las de 45 a 49) como para las actualmente unidas (0.9 para las mujeres de 15 a 19 a 6.7 para las de 45-49).
- Si se compara el número medio de hijos de las mujeres en unión y el del total de mujeres, se aprecia que es mayor el correspondiente a las mujeres unidas, evidenciando el impacto de la nupcialidad.

Cuadro 4.4 Número de nacidos vivos y sobrevivientes de las mujeres entrevistadas, según edad

Distribución porcentual de todas las mujeres y las mujeres en unión, por número de hijos nacidos vivos y promedio de hijos nacidos vivos y sobrevivientes, según edad, Apurímac 2000

Edad	Número de hijos nacidos vivos											Total	Número de mujeres	Promedio de nacidos vivos	Promedio de hijos vivos
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+				
	TODAS LAS MUJERES														
15-19	81,7	17,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	186	0,2	0,2
20-24	27,0	38,9	23,8	7,6	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	185	1,2	1,1
25-29	8,8	21,4	21,4	24,5	15,1	5,7	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	159	2,5	2,2
30-34	4,5	11,5	12,8	18,6	18,6	14,7	12,8	5,1	0,6	0,6	0,0	100,0	156	3,7	3,3
35-39	4,4	3,0	5,9	8,1	14,1	11,1	16,3	17,0	8,9	5,2	5,9	100,0	135	5,5	4,6
40-44	2,2	5,4	5,4	11,8	14,0	12,9	9,7	6,5	14,0	6,5	11,8	100,0	93	5,7	4,6
45-49	2,9	0,0	5,7	4,8	13,3	7,6	9,5	17,1	12,4	6,7	20,0	100,0	105	6,8	5,7
Total	23,0	16,2	11,7	10,7	10,2	6,6	6,5	5,4	3,8	2,1	3,9	100,0	1 018	3,1	2,7
	MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS														
15-19	17,6	76,5	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	34	0,9	0,9
20-24	9,2	44,3	32,1	10,7	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	131	1,6	1,4
25-29	4,4	17,8	23,7	28,1	16,3	5,9	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	135	2,7	2,5
30-34	2,2	7,4	14,0	19,9	19,9	16,2	13,2	5,9	0,7	0,7	0,0	100,0	136	3,9	3,5
35-39	0,8	1,7	5,1	8,5	14,4	11,9	18,6	19,5	9,3	4,2	5,9	100,0	118	5,8	4,9
40-44	0,0	2,5	4,9	12,3	13,6	13,6	11,1	7,4	16,0	6,2	12,3	100,0	81	6,1	4,9
45-49	2,2	0,0	5,6	4,4	15,6	6,7	11,1	18,9	10,0	6,7	18,9	100,0	90	6,7	5,6
Total	4,1	16,8	15,2	14,2	13,2	8,4	8,8	7,4	4,7	2,3	4,7	100,0	724	4,0	3,5

4.3 INTERVALO ENTRE NACIMIENTOS

Otro aspecto relacionado con los niveles y tendencias en la fecundidad tiene que ver con el tiempo transcurrido entre los nacimientos (espaciamento de los hijos). La ocurrencia en la población de intervalos intergenésicos de mayor duración no sólo puede significar menor número de promedio de hijos, sino también cambios en la distribución de este número a lo largo del periodo reproductivo. El cuadro 4.5 contiene la distribución de nacimientos para los cinco años anteriores a la ENDES 2000 por intervalo desde el nacido vivo previo según algunas características de las madres.

Cuadro 4.5

- El intervalo intergenésico más frecuente con el que han ocurrido los nacimientos en los últimos cinco años en el departamento de Apurímac, es de 24 a 35 meses (34%). La mediana del intervalo, es decir, el valor por debajo del cual ha ocurrido el 50 por ciento de los nacimientos es 34 meses; la misma que aumenta con la edad, y con el nivel de educación : a mayor nivel educativo, mayor intervalo entre nacimientos.

Cuadro 4.5 Intervalos entre nacimientos

Distribución porcentual de los nacimientos en los cinco años anteriores a la encuesta por número de meses desde el nacimiento anterior, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Número de meses desde el nacimiento anterior					Total	Mediana del intervalo	Número de nacimientos
	7-17	18-23	24-35	36-47	48 +			
Edad								
15-19	*	*	*	*	*	*	*	2
20-29	7,2	19,1	40,2	14,4	19,1	100,0	28,8	209
30-39	4,8	11,0	31,7	15,4	37,0	100,0	37,4	227
40 +	5,9	10,3	25,0	23,5	35,3	100,0	41,0	68
Orden de nacimiento								
2-3	6,4	16,1	29,8	14,7	33,0	100,0	34,6	218
4-6	4,3	13,9	38,5	17,1	26,2	100,0	33,3	187
7 +	8,9	11,9	35,6	16,8	26,7	100,0	33,5	101
Sexo del nacimiento anterior								
Hombre	6,3	12,1	34,3	15,5	31,8	100,0	34,4	239
Mujer	6,0	16,5	34,1	16,5	27,0	100,0	33,4	267
Sobrevivencia del nacimiento								
Anterior todavía vivo	4,4	14,0	34,3	17,0	30,3	100,0	34,7	458
Murió	22,9	18,8	33,3	6,2	18,8	100,0	24,5	48
Area de residencia								
Urbana	7,0	14,0	20,9	12,8	45,3	100,0	43,0	86
Rural	6,0	14,5	36,9	16,7	26,0	100,0	32,7	420
Nivel de educación								
Sin educación	9,0	9,0	35,1	16,2	30,6	100,0	34,7	111
Primaria	3,5	16,3	40,3	15,2	24,7	100,0	31,4	283
Secundaria	8,1	14,9	24,3	23,0	29,7	100,0	39,0	74
Superior	13,2	15,8	5,3	7,9	57,9	100,0	55,0	38
Total	6,1	14,4	34,2	16,0	29,2	100,0	33,9	505

* Menos de 20 casos

Excluyen los nacimientos de primer orden.

4.4 EDAD DE LA MADRE AL NACIMIENTO DEL PRIMER HIJO

La edad de la mujer cuando comienza su vida reproductiva constituye uno de los factores demográficos determinantes de la fecundidad de una población. En el cuadro 4.6 se presenta, para cada grupo de edad, el porcentaje de mujeres nulíparas y la proporción de mujeres a diferentes edades al tener el primer hijo. De esta distribución se puede calcular la mediana al primer nacimiento. Este indicador se presenta en el cuadro 4.7 para mostrar las diferencias en el inicio de la procreación para distintos subgrupos poblacionales, según lugar de residencia y nivel de educación.

Cuadro 4.6

Edad al primer nacimiento

- En el departamento de Apurímac, la mediana al nacimiento del primer hijo ha cambiado poco en los últimos 25 años. En este departamento las mujeres empiezan a tener hijos a edades más tempranas que en el total del país e incluso tiende a disminuir: la mediana de edad al primer nacimiento paso 20.6 en las mujeres más adultas a 19.6 años en las más jóvenes.

Cuadro 4.6 Edad al primer nacimiento

Distribución porcentual de las mujeres entrevistadas por edad al primer nacimiento, según edad actual, Apurímac 2000

Edad actual	Mujeres sin hijos	Edad al primer nacimiento						Total	Número de mujeres	Edad mediana al primer nacimiento
		<15	15-17	18-19	20-21	22-24	25 +			
15-19	81,7	0,0	11,8	6,5	0,0	0,0	0,0	100,0	186	-
20-24	27,0	1,1	23,2	23,2	17,8	7,6	0,0	100,0	185	-
25-29	8,8	0,6	23,3	32,7	16,4	14,5	3,8	100,0	159	19,6
30-34	4,5	1,9	21,2	20,5	21,8	14,1	16,0	100,0	156	20,5
35-39	4,4	6,7	24,4	25,9	14,8	12,6	11,1	100,0	135	19,4
40-44	2,2	4,3	14,0	22,6	18,3	20,4	18,3	100,0	93	21,1
45-49	2,9	2,9	24,8	15,2	18,1	15,2	21,0	100,0	105	20,6

- No disponible pues menos del 50 por ciento de las mujeres han tenido un nacimiento antes de la edad inferior del intervalo

Cuadro 4.7

Edad mediana al primer nacimiento por características seleccionadas

- En el departamento de Apurímac, la mediana de edad al primer nacimiento entre las mujeres de 25 a 49 años es 20 años.

- Las características que muestran claramente que la mediana de edad al primer nacimiento aumentan, es la educación y el área de residencia. A mayor nivel educativo es mayor la mediana de edad al primer nacimiento: 20 años para las que no tienen educación y 25 para las de educación superior. Y en las residentes del área urbana es mayor que en las residentes del área rural (21.6 y 19.8 respectivamente).

Cuadro 4.7 Edad mediana al primer nacimiento

Edad mediana al primer nacimiento entre las mujeres de 25-49 años, por edad actual, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Edad actual					Mujeres 25-49
	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
Área de residencia						
Urbana	22,0	23,0	21,0	22,2	21,5	21,6
Rural	19,3	20,3	19,2	20,7	20,3	19,8
Nivel de educación						
Sin educación	19,7	20,4	18,7	19,6	20,8	19,6
Primaria	18,7	19,8	19,2	20,5	20,3	19,4
Secundaria	19,7	20,7	18,8	21,5	20,5	20,3
Superior	23,0	24,5	25,8	25,3	22,5	24,5
Total	19,6	20,5	19,4	21,1	20,6	20,1

Nota: Las medianas para el grupo 20-24 no se calcularon porque menos de la mitad de las mujeres han tenido un hijo antes de cumplir 20 años.

4.5 FECUNDIDAD EN ADOLESCENTES

Para efectos de este informe, se considera como adolescentes a las mujeres de 15 a 19 años. La conducta reproductiva de las adolescentes es de reconocida importancia, no

sólo por las consecuencias de los embarazos no deseados (abortos, frustración, deserción escolar, etc.), sino también por las consecuencias económicas y de salud que ocasiona tanto en la madre como en el niño. Si bien es cierto que los embarazos a temprana edad forman parte

de la cultura de algunas regiones y grupos sociales, para la gran mayoría de mujeres no son deseados. Muchos de estos embarazos terminan en aborto, poniendo en peligro la vida de la adolescente, o en el abandono a la madre y al niño por parte del padre.

En el cuadro 4.8 se muestra los porcentajes de mujeres de 15-19 años con al menos un hijo nacido vivo o que estaba embarazada por primera vez al momento de la encuesta, según características seleccionadas.

Cuadro 4.8 y 4.9

Fecundidad en adolescentes

- En el departamento de Apurímac, el 18 por ciento de las mujeres de 15 a 19 años ya son madres y 2 por ciento esta embarazada con el primer hijo.
- Hay diferencias según el área de residencia, las mujeres del área rural que ya son madres (25%), superan en 19 puntos porcentuales a las del área urbana (6%).

Cuadro 4.8 Fecundidad en adolescentes

Porcentaje de adolescentes (15-19 años) que ya son madres o que están embarazadas por primera vez, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Porcentaje de adolescentes		Total alguna vez embarazadas	Número de adolescentes
	Ya son madres	Están embarazadas con el primer hijo		
Edad				
15	0,0	0,0	0,0	36
16	2,9	0,0	2,9	34
17	16,3	2,3	18,6	43
18	25,6	2,3	27,9	43
19	50,0	6,7	56,7	30
Área de residencia				
Urbana	6,2	3,1	9,4	64
Rural	24,6	1,6	26,2	122
Nivel de educación				
	*	*	*	1
Primaria	26,6	3,1	29,7	64
Secundaria	14,2	1,7	15,8	120
Superior	*	*	*	1
Total	18,3	2,2	20,4	186


*: Menos de 20 casos.

- El 17 por ciento de las adolescentes tiene un hijo nacido vivo y uno por ciento dos o más hijos. Concentrándose los porcentajes entre las que tienen 19 años: un hijo (43%), dos hijos o más (7%).

Cuadro 4.9 Número de hijos en adolescentes

Distribución porcentual de adolescentes (15 a 19 años) por número de hijos, según edades simples, Apurímac 2000

Edad	Número de hijos			Total	Número promedio de hijos	Número de adolescentes
	0	1	2+			
15	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	36
16	97,1	2,9	0,0	100,0	0,0	34
17	83,7	16,3	0,0	100,0	0,2	43
18	74,4	25,6	0,0	100,0	0,3	43
19	50,0	43,3	6,7	100,0	0,6	30
Total 2000	81,7	17,2	1,1	100,0	0,2	186



V. PLANIFICACION FAMILIAR

U. PLANIFICACION FAMILIAR

El estudio de la prevalencia de la anticoncepción es de particular importancia no sólo porque es el determinante próximo más importante de la fecundidad, sino por la utilización práctica que pueden hacer de esta información los administradores de los programas de planificación familiar y los responsables de la formulación de políticas de población y salud. El adecuado conocimiento del nivel de uso y de la composición de los métodos anticonceptivos empleados permite evaluar también la efectividad de los programas desarrollados en el pasado reciente e identificar a los grupos con escaso acceso a los servicios de orientación, comercialización o distribución de métodos de planificación familiar.

En la primera parte de este capítulo se analizan las condiciones previas para el uso de alguna forma de planificación familiar, como el conocimiento de métodos anticonceptivos. En la segunda parte se analiza el uso pasado y actual de métodos, las fuentes de suministro, las razones de abandono y las tasas de discontinuación. Finalmente, se consideran factores del no uso de anticonceptivos, las intenciones futuras de uso y las actitudes hacia la planificación familiar.

5.1 CONOCIMIENTOS DE MÉTODOS

De manera similar que en la ENDES 1991-1992 y la ENDES 1996, la ENDES 2000 incluyó una sección completa sobre conocimiento y uso de métodos de planificación familiar. Para medir el conocimiento se preguntó a la entrevistada sobre qué métodos conocía o había oído hablar para demorar o evitar que la mujer quede embarazada. Por cada método no mencionado se le leyó el nombre, se hizo una breve descripción y se indagó nuevamente si

había oído hablar de él. Cabe precisar que en la encuesta, "conocer" no significa necesariamente que la mujer tenga un buen nivel de información sobre el método; basta con que por lo menos lo conozca de nombre, o tenga una idea de cómo se emplea. Los niveles de conocimiento de métodos específicos de planificación familiar se muestran en el cuadro 5.1. El conocimiento de métodos en general y modernos en particular se detalla en el cuadro 5.2 para las mujeres unidas por características seleccionadas.

Cuadro 5.1

Conocimiento de métodos anticonceptivos por nivel de experiencia de las mujeres actualmente unidas y no unidas

- Gran proporción de mujeres en edades fértiles, en el departamento de Apurímac, conoce o ha oído hablar de métodos anticonceptivos, el 95 por ciento de mujeres en edades fértiles y 94 por ciento de los métodos modernos. En las actualmente unidas las proporciones son mayores de 97 por ciento para cualquier método y similar porcentaje para los modernos.
- Las mujeres en edad fértil sin experiencia sexual también tienen conocimiento de métodos pero en menor proporción, el 86 por ciento conoce o ha oído hablar de algún método anticonceptivo, siendo igual la proporción de mujeres que conoce método moderno.
- El promedio de métodos anticonceptivos conocidos es de 7 métodos en todas las mujeres y 7.4 en las actualmente unidas.

- Los métodos modernos más conocidos por el total de las mujeres entrevistadas en el departamento de Apurímac son el inyectable (91%), la píldora (88%), el dispositivo intrauterino y la esterilización femenina (ambos 85%). Entre las unidas, el inyectable y la píldora (94% y 91% respectivamente) alcanzan mayores proporciones y luego están las esterilización femenina y el DIU con

similares porcentajes (88% y 87%).

- Los métodos menos conocidos son: el MELA en todas las subpoblaciones consideradas en el cuadro, seguido del Norplant y la esterilización masculina. Entre los métodos tradicionales, el menos conocido es el retiro, especialmente en las solteras sin experiencia sexual.

Cuadro 5.1 Conocimiento de métodos específicos entre las mujeres entrevistadas

Porcentaje de mujeres que conocen algún método anticonceptivo, por nivel de exposición, según métodos específicos, Apurímac 2000

Método anticonceptivo	Nivel de exposición				
	Todas la mujeres	Mujeres actualmente unidas	Mujeres no unidas		
			Sexualmente activas ¹	No activas sexualmente	Sin experiencia sexual ²
Cualquier método	94,8	97,4	100,0	90,8	85,7
Cualquier método moderno	94,3	96,7	100,0	90,8	85,7
Modernos					
Píldora	88,0	90,6	94,1	87,2	76,8
DIU	84,7	87,4	94,1	83,5	72,6
Inyección	91,3	94,2	100,0	89,0	79,2
Espuma/ jalea	55,5	57,8	82,4	56,0	42,9
Condón masculino	77,2	79,0	94,1	71,6	71,4
Esterilización femenina	84,9	88,0	100,0	84,4	70,2
Esterilización masculina	66,0	69,4	82,4	61,5	53,0
Norplant	33,0	35,0	41,2	34,9	22,0
Amenorrea por lactancia (MELA)	30,5	34,2	29,4	26,6	17,3
Tradicionales	61,3	65,0	76,5	56,9	47,0
Abstinencia periódica	57,2	60,3	76,5	52,3	45,2
Retiro	28,9	32,0	41,2	27,5	14,9
Otros	7,6	9,0	0,0	4,6	4,2
Tradicional y folclórico	64,4	68,6	76,5	58,7	48,8
Promedio de métodos conocidos	7,0	7,4	8,4	6,8	5,7
Número de mujeres	1018	724	17	109	168

¹ Mujeres no en unión que han tenido relaciones en los 30 días que precedieron la encuesta

² Mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales

Cuadro 5.2

Conocimiento de métodos por características sociodemográficas de las mujeres actualmente unidas

- Gran proporción de las mujeres actualmente unidas, independientemente de su edad, nivel de educación o lugar

de residencia, conoce o ha oído hablar de algún método anticonceptivo.

- El mayor porcentaje de las mujeres unidas que conoce algún método y alguno moderno se concentra entre las de 25 a 29 años (100% y 99%) y el menor porcentaje entre las de 45 a 49 años (91% y 89%).

- Con respecto al área de residencia no hay diferencia amplia en las mujeres unidas que habitan el área urbana del departamento que conocen algún método y las que habitan el área rural (99 % y 97% respectivamente).
- El conocimiento de algún método y alguno moderno entre las que tienen educación secundaria o superior es universal, superando a las que no tienen ningún nivel educativo.

Cuadro 5.2 Conocimiento de métodos en las mujeres en unión, por características seleccionadas

Porcentaje de mujeres en unión que conoce algún método y porcentaje que conoce por lo menos un método moderno, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Conoce algún método	Conoce métodos modernos ¹	Número de mujeres
Edad			
15-19	94,1	94,1	34
20-24	97,7	97,7	131
25-29	100,0	99,3	135
30-34	98,5	98,5	136
35-39	98,3	97,5	118
40-44	97,5	96,3	81
45-49	91,1	88,9	90
Area de residencia			
Urbana	99,4	98,9	180
Rural	96,7	96,0	544
Nivel de educación			
Sin educación	94,9	93,4	137
Primaria	96,6	95,8	355
Secundaria	100,0	100,0	152
Superior	100,0	100,0	81
Total	97,4	96,7	724

¹ Incluye la píldora, el DIU, la Esterilización femenina y masculina, las inyecciones, los métodos vaginales, Norplant y el Condón.

5.2 USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

La información que se presenta a continuación permitirá conocer el uso anterior y actual de métodos anticonceptivos con el objeto de evaluar la práctica pasada y actual. A todas las mujeres que declararon conocer algún método se les preguntó si lo habían usado alguna vez.

El uso pasado

Los resultados por grupos de edad y por método se presentan en el cuadro 5.3, para todas las mujeres en el panel superior y para las mujeres actualmente unidas en el segundo panel.

Cuadro 5.3

- Alrededor de dos tercios del total de mujeres entrevistadas en el departamento de Apurímac ha usado alguna vez un método anticonceptivo (66%). La proporción que ha usado alguno moderno es 54 por ciento y entre ellos predomina la inyección (34%), el uso de métodos tradicionales por esta población es menor (33%) y se trata especialmente de la abstinencia periódica o ritmo (29%).
- En la población de las mujeres actualmente unidas del departamento, el 85 por ciento ha usado algún método anticonceptivo alguna vez. Cualquier

método moderno ha sido usado por el 69 por ciento de este grupo de mujeres y los métodos tradicionales por el 42 por ciento.

- El método moderno de mayor uso alguna vez fue el inyectable (45%) y de los métodos tradicionales, el más usado fue el ritmo o abstinencia periódica (36%).

Cuadro 5.3 Uso alguna vez de métodos anticonceptivos específicos entre las mujeres entrevistadas

Distribución porcentual de las mujeres entrevistadas por método usado alguna vez, según edad y nivel de exposición, Apurímac 2000

Edad	Métodos modernos											Tradicionales y folclóricos					Número de mujeres
	Cualquier método	Total métodos modernos	Píldora	DIU	Inyección	Espumajalea	Condón masculino	Esterilización femenina	Esterilización masculina	Norplant	MELA	Cualquier método tradicional	Abstinencia periódica	Retiro	Otro	Cualquier método tradicional o folclórico	
Edad	TODAS LAS MUJERES																
15-19	18,3	17,2	2,7	1,6	11,3	0,5	4,8	0,0	0,0	0,0	1,1	6,5	5,9	2,7	0,0	6,5	186
20-24	65,4	54,1	13,0	7,0	36,2	1,6	14,1	2,2	0,0	0,0	1,6	26,5	21,6	10,3	1,6	28,1	185
25-29	83,0	70,4	26,4	11,3	43,4	7,5	25,2	8,2	0,0	0,6	1,9	46,5	44,0	15,1	3,1	48,4	159
30-34	85,9	67,3	24,4	17,9	47,4	5,8	14,1	14,1	0,6	0,6	3,8	46,8	39,7	16,7	3,8	48,7	156
35-39	83,0	70,4	23,0	14,1	44,4	8,1	15,6	19,3	1,5	0,7	3,0	40,0	34,8	11,9	4,4	42,2	135
40-44	78,5	64,5	28,0	19,4	37,6	7,5	11,8	19,4	3,2	0,0	3,2	35,5	34,4	9,7	3,2	38,7	93
45-49	67,6	41,0	13,3	11,4	17,1	5,7	12,4	7,6	1,0	0,0	1,9	40,0	33,3	14,3	9,5	47,6	105
Total	66,4	53,7	17,7	10,9	33,8	4,8	13,9	8,9	0,7	0,3	2,3	33,1	29,1	11,2	3,2	35,3	1 018
Edad	MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS																
15-19	79,4	76,5	11,8	8,8	55,9	2,9	14,7	0,0	0,0	0,0	5,9	20,6	20,6	5,9	0,0	20,6	34
20-24	79,4	67,2	16,0	9,9	48,9	2,3	14,5	3,1	0,0	0,0	1,5	29,0	22,9	12,2	2,3	31,3	131
25-29	89,6	77,0	30,4	12,6	49,6	7,4	26,7	9,6	0,0	0,0	1,5	50,4	47,4	16,3	3,7	52,6	135
30-34	93,4	73,5	27,2	20,6	52,9	6,6	14,7	15,4	0,7	0,0	4,4	50,7	42,6	18,4	4,4	52,9	136
35-39	89,0	75,4	24,6	16,1	45,8	9,3	17,8	21,2	1,7	0,8	3,4	44,1	38,1	13,6	5,1	46,6	118
40-44	85,2	71,6	29,6	22,2	43,2	7,4	12,3	22,2	3,7	0,0	3,7	35,8	34,6	9,9	3,7	39,5	81
45-49	71,1	41,1	12,2	11,1	17,8	6,7	12,2	7,8	1,1	0,0	2,2	42,2	34,4	15,6	11,1	51,1	90
Total	85,1	69,2	23,0	14,9	45,1	6,3	16,8	12,1	1,0	0,1	2,9	41,5	36,3	14,2	4,6	44,7	724

Prevalencia Actual del Uso de Métodos

A todas las mujeres que habían usado métodos y que no estaban embarazadas en el momento de la entrevista se les preguntó si ellas o el esposo o compañero estaban usando en la actualidad algún método para evitar un embarazo. A partir de esta información se puede evaluar el uso actual de métodos anticonceptivos. La prevalencia del uso de anticonceptivos según la edad de la mujer se presenta en el cuadro 5.4 para el total de entrevistadas (panel superior) y para las mujeres en unión legal o consensual en el momento de la entrevista (segundo panel).

Cuadro 5.4

Uso actual de métodos anticonceptivos

- Pese a que en el departamento de Apurímac el uso de métodos anticonceptivos se ha incrementado, este departamento aún no registra porcentajes altos con relación al resto de departamentos. En el uso actual de cualquier método anticonceptivo por las mujeres actualmente unidas, registra 64 por ciento y en el uso de algún método moderno 48 por ciento. El uso de cualquier método tradicional para este grupo de mujeres es de 15%.

- El uso actual de cualquier método anticonceptivo es más alto en las mujeres unidas (64%) que en el total de mujeres entrevistadas (48%). En el uso actual de algún método moderno, el porcentaje de las actualmente unidas es 48 por ciento y el del total de mujeres es 36 por ciento.
- El inyectable es el método moderno preferido por 16 por ciento del total de mujeres y 22 por ciento de las actualmente unidas. Entre los métodos tradicionales, el preferido es la abstinencia periódica: por 10 por ciento del total de mujeres y 13% de las actualmente unidas.
- Según la edad de la mujer, el uso actual de métodos para el total de mujeres se concentra en las de 35 a 39 años (66%). Para las mujeres actualmente unidas en el grupo de 15 a 19 años (77%). El método moderno con mayor porcentaje de uso por estos dos grupos es el inyectable (15% y 53% respectivamente). Las mujeres actualmente unidas de 45 a 49 años son las que en menor proporción usan algún método, para el total de mujeres es de 15 a 19 años.
- En el uso de métodos tradicionales, el más alto porcentaje se concentra en la abstinencia periódica, sobre todo entre las mujeres de 45 a 49 años (17% en el total de mujeres y 20% en las actualmente unidas).

Cuadro 5.4 Uso actual de métodos anticonceptivos específicos entre las mujeres entrevistadas

Distribución porcentual de las mujeres entrevistadas por método usado actualmente, según edad y nivel de exposición, Apurímac 2000

Edad	Cualquier método	Métodos modernos									Tradicionales y folclóricos				No usa actualmente	Total	Número de mujeres
		Total métodos modernos	Píldora	DIU	Inyección	Condón masculino	Esterilización femenina	Esterilización masculina	Norplant	MELA	Algún método tradicional	Abstinencia periódica	Retiro	Algún método folclórico			
Edad	TODAS LAS MUJERES																
15-19	16,7	15,1	0,5	1,6	10,8	1,6	0,0	0,0	0,0	0,5	1,6	1,6	0,0	0,0	83,3	100,0	186
20-24	47,0	35,7	2,7	3,8	23,2	3,2	2,2	0,0	0,0	0,5	10,3	8,6	1,6	1,1	53,0	100,0	185
25-29	53,5	42,8	4,4	5,7	18,9	5,0	8,2	0,0	0,6	0,0	10,7	9,4	1,3	0,0	46,5	100,0	159
30-34	62,2	46,2	4,5	2,6	21,8	1,3	14,1	0,6	0,6	0,6	15,4	12,8	2,6	0,6	37,8	100,0	156
35-39	65,9	46,7	2,2	3,0	14,8	4,4	19,3	0,7	0,7	1,5	17,8	15,6	2,2	1,5	34,1	100,0	135
40-44	60,2	48,4	4,3	5,4	11,8	4,3	19,4	3,2	0,0	0,0	10,8	10,8	0,0	1,1	39,8	100,0	93
45-49	41,9	19,0	0,0	1,9	4,8	3,8	7,6	1,0	0,0	0,0	19,0	17,1	1,9	3,8	58,1	100,0	105
Total	48,0	35,5	2,6	3,3	16,0	3,2	8,9	0,6	0,3	0,5	11,5	10,1	1,4	1,0	52,0	100,0	1 018
Edad	MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS																
15-19	76,5	70,6	2,9	8,8	52,9	2,9	0,0	0,0	0,0	2,9	5,9	5,9	0,0	0,0	23,5	100,0	34
20-24	59,5	46,6	3,1	5,3	31,3	3,1	3,1	0,0	0,0	0,8	11,5	9,2	2,3	1,5	40,5	100,0	131
25-29	60,7	49,6	5,2	6,7	22,2	5,9	9,6	0,0	0,0	0,0	11,1	9,6	1,5	0,0	39,3	100,0	135
30-34	69,1	51,5	5,1	2,9	25,0	1,5	15,4	0,7	0,0	0,7	16,9	14,0	2,9	0,7	30,9	100,0	136
35-39	71,2	50,0	2,5	3,4	14,4	5,1	21,2	0,8	0,8	1,7	19,5	16,9	2,5	1,7	28,8	100,0	118
40-44	69,1	55,6	4,9	6,2	13,6	4,9	22,2	3,7	0,0	0,0	12,3	12,3	0,0	1,2	30,9	100,0	81
45-49	47,8	21,1	0,0	2,2	5,6	4,4	7,8	1,1	0,0	0,0	22,2	20,0	2,2	4,4	52,2	100,0	90
Total	63,9	47,6	3,6	4,7	21,5	4,0	12,1	0,8	0,1	0,7	14,9	13,0	1,9	1,4	36,1	100,0	724

Diferenciales en los Niveles de Uso Actual

El cuadro 5.5 detalla los niveles de uso de métodos entre las mujeres en unión según ciertas características seleccionadas, incluyendo ciertos

indicadores del estatus de la mujer. En los párrafos que siguen debe tenerse en cuenta que se trata solamente de mujeres casadas o unidas en el momento de la entrevista, a quienes se esta llamando actualmente unidas.

Cuadro 5.5

Uso actual de métodos anticonceptivos entre las mujeres unidas según características seleccionadas

- Los mayores niveles en el uso de métodos anticonceptivos en el departamento de Apurímac se registran entre las residentes del área urbana, en mujeres que tienen educación superior y en las que tienen a tres hijos sobrevivientes.
- El uso de algún método anticonceptivo por las mujeres actualmente unidas del área urbana supera al uso de las residentes del área rural en 13 puntos porcentuales. Por otro lado, en el área rural, el 39 por ciento de las mujeres actualmente unidas no usan ningún tipo de método.
- Los métodos específicos más usados en el área urbana son: el inyectable (20%) el ritmo (19%), y la esterilización femenina (12%). Los métodos más usados en el área rural, son también: el inyectable (22%), la esterilización femenina (12%) y el ritmo
- El uso de métodos anticonceptivos está relacionado, al nivel educativo. En el departamento de Apurímac, se observa que 74 por ciento de las mujeres con nivel superior de educación usa algún método frente a 53 por ciento de las que no tienen nivel educativo alguno. Las que tienen estudios hasta el nivel de secundaria superan en el uso de métodos a las que sólo tienen primaria en 7 puntos porcentuales (70% y 63% respectivamente). Según el número de hijos vivos, el mayor porcentaje de las usuarias de algún método se registra entre las que tienen hijos (sobre 60%).
- Llama la atención que el mayor porcentaje de usuarias de la abstinencia periódica se encuentra entre las que tienen educación secundaria y superior (19 y 17 por ciento para cada caso).

Cuadro 5.5 Uso actual de métodos anticonceptivos entre las mujeres en unión

Distribución porcentual de las mujeres en unión por método usado actualmente, según características seleccionadas e indicadores de estatus de la mujer, Apurímac 2000

Características	Cualquier método	Métodos modernos									Tradicionales y folclóricos				No usa actualmente	Total	Número de mujeres
		Total métodos modernos	Píldora	DIU	Inyección	Condón masculino	Esterilización femenina	Esterilización masculina	Norplant	MELA	Algún método tradicional	Abstinencia periódica	Usando algún método folclórico				
Área de residencia																	
Urbana	73,3	52,8	3,9	5,6	20,0	8,9	11,7	1,7	0,0	1,1	20,6	18,9	1,7	0,0	26,7	100,0	180
Rural	60,7	45,9	3,5	4,4	22,0	2,4	12,3	0,6	0,2	0,6	13,0	11,0	2,0	1,8	39,3	100,0	544
Nivel de educación																	
Sin educación	52,6	41,6	1,5	2,9	23,4	0,0	12,4	0,0	0,7	0,7	8,0	8,0	0,0	2,9	47,4	100,0	137
Primaria	63,4	48,2	3,7	4,8	21,1	2,3	14,4	1,1	0,0	0,8	13,5	11,3	2,3	1,7	36,6	100,0	355
Secundaria	69,7	48,0	3,9	5,3	21,1	6,6	9,9	1,3	0,0	0,0	21,7	19,1	2,6	0,0	30,3	100,0	152
Superior	74,1	54,3	6,2	6,2	21,0	13,6	6,2	0,0	0,0	1,2	19,8	17,3	2,5	0,0	25,9	100,0	81
Número de hijos vivos																	
Ninguno	35,3	17,6	0,0	0,0	14,7	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	17,6	14,7	2,9	0,0	64,7	100,0	34
1 hijo	64,8	48,8	5,6	7,2	31,2	4,0	0,0	0,0	0,0	0,8	16,0	14,4	1,6	0,0	35,2	100,0	125
2 hijos	64,4	48,5	3,0	6,8	25,8	3,0	8,3	0,0	0,0	1,5	12,9	9,8	3,0	3,0	35,6	100,0	132
3 hijos	68,6	53,7	5,0	6,6	20,7	7,4	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0	13,2	0,8	0,8	31,4	100,0	121
4+ hijos	64,5	47,6	2,9	2,6	16,9	3,2	19,2	1,9	0,3	0,6	15,3	13,4	1,9	1,6	35,5	100,0	313
Total	63,9	47,6	3,6	4,7	21,5	4,0	12,1	0,8	0,1	0,7	14,9	13,0	1,9	1,4	36,1	100,0	724

Número de Hijos al Iniciar el Uso de Anticonceptivos

El análisis de la relación entre el número de hijos vivos que tenían las mujeres cuando usaron por primera vez un método para distintas cohortes (cuadro 5.6) permite conocer cuán temprano en la vida reproductiva de las mujeres se adopta la planificación familiar. Al analizar esta información debe recordarse que para las cohortes jóvenes el proceso todavía no ha concluido.

Cuadro 5.6

Número de hijos al iniciar el uso de anticonceptivos

- En el departamento de Apurímac, el 82 por ciento de mujeres alguna vez unidas ha usado algún método. El porcentaje mayor empezó a usarlos recién después de tener cuatro o más hijos (26%) y más de un quinto con el primer hijo (22%). Entre las que aún no tienen hijos el uso de la anticoncepción alcanza al 10 por ciento,

Cuadro 5.6 Número de hijos al usar métodos por primera vez

Distribución porcentual de las mujeres alguna vez unidas por número de hijos sobrevivientes al usar anticoncepción por primera vez, según edad actual, Apurímac 2000

Edad actual	Nunca ha usado métodos	Número de hijos al usar por primera vez					Sin información	Total	Mediana No hijos al primer uso	Número de mujeres
		0	1	2	3	4+				
15-19	24,3	24,3	45,9	5,4	0,0	0,0	0,0	100,0	0,3	37
20-24	23,6	17,1	37,1	17,1	4,3	0,7	0,0	100,0	0,6	140
25-29	13,7	16,4	30,8	19,9	10,3	8,9	0,0	100,0	0,9	146
30-34	10,1	8,1	21,6	17,6	13,5	28,4	0,7	100,0	1,8	148
35-39	12,7	2,4	11,1	12,7	6,3	54,0	0,8	100,0	4,0	126
40-44	20,9	1,1	11,0	15,4	12,1	39,6	0,0	100,0	3,0	91
45-49	31,7	3,8	5,8	11,5	5,8	40,4	1,0	100,0	4,0	104
Total	18,3	9,7	22,2	15,5	8,3	25,5	0,4	100,0	1,6	791

Conocimiento del Período Fértil

El conocimiento que tenga la mujer sobre la fisiología reproductiva provee una herramienta básica para el éxito en el uso de los llamados métodos naturales (ritmo y MELA). En el departamento de Apurímac este conocimiento es de particular importancia porque el ritmo ocupa el segundo lugar en uso (13% por mujeres unidas). Para evaluar este conocimiento, en la ENDES 2000 se preguntó a todas las mujeres en que momento del ciclo menstrual creían que existe mayor riesgo de quedar embarazadas.

Cuadro 5.7

- El 78 por ciento de las mujeres usuarias del ritmo o abstinencia periódica, conoce que los días centrales o a mitad del ciclo menstrual son los días de mayor riesgo para que una mujer pueda quedar embarazada.
- Entre las mujeres no usuarias del ritmo, cerca de tres cuartos (71%) tiene un conocimiento inadecuado o no conoce cuál es el momento de mayor riesgo durante el período menstrual para que una mujer pueda quedar embarazada.

Cuadro 5.7 Conocimiento del período fértil

Distribución porcentual de las mujeres usuarias y no usuarias de abstinencia periódica por conocimiento del período fértil durante el ciclo ovulatorio, Apurímac 2000

Percepción del período fértil	Abstinencia periódica		
	Son usuarias actualmente	No son usuarias	Todas las mujeres
Justo antes de la menstruación	0,0	0,5	0,5
Durante la menstruación	0,0	1,7	1,6
Justo después de la menstruación	8,7	1,6	2,4
En la mitad del ciclo	77,7	29,4	34,2
En cualquier momento	1,0	13,6	12,4
Otra	8,7	2,3	2,9
No sabe	3,9	50,7	45,9
Total	100,0	100,0	100,0
Número de mujeres	103	915	1 018

Fuente de Suministro de Métodos Modernos

Para evaluar adecuadamente el grado de conocimiento sobre el uso de anticonceptivos, es importante conocer los lugares y medios por los que las usuarias los han conseguido. Los resultados para las principales fuentes de abastecimiento de métodos modernos se presentan en el gráfico 5.1. A las usuarias de estos métodos se les preguntó si recibieron cierta información específica cuando se les prescribió

el método: que la esterilización es irreversible, sobre los efectos secundarios del método y si fueron informadas sobre otros métodos alternativos que podían usar. Los resultados de estas preguntas se presentan en el cuadro 5.8.

Cuadro 5.8 y Gráficos 5.1 y 5.2

- Al igual que para el total del país, en el departamento de Apurímac la principal fuente de suministro de métodos anticonceptivos modernos es el sector

Cuadro 5.8 Fuente de suministro para métodos modernos

Distribución porcentual de usuarias actuales de métodos modernos específicos por fuente de suministro, según método, Apurímac 2000

Fuente de suministro	Método moderno							Total
	Píldora	DIU	Inyección	Condón masculino	Esterilización femenina	Norplant	Esterilización masculina	
Sector Público	96,3	97,1	98,8	81,8	95,6	*	*	96,1
Hospital MINSA	25,9	26,5	18,4	15,2	70,3	*	*	33,1
Centro de salud MINSA	14,8	32,4	19,6	15,2	12,1	*	*	18,5
Puesto de salud MINSA	44,4	32,4	58,3	33,3	0,0	*	*	36,1
Promotor de salud MINSA	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	*	*	0,3
Hospital de ESSALUD	11,1	5,9	1,8	18,2	11,0	*	*	7,3
Policlínico/centro/posta de ESSALUD	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	*	*	0,3
Campaña / feria / jornada	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	*	*	0,6
Sector Privado	0,0	2,9	0,0	15,2	3,3	*	*	2,5
Clínica privada	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	*	*	0,6
Farmacia	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	*	*	1,4
Consultorio médico particular	0,0	2,9	0,0	0,0	1,1	*	*	0,6
Otro Sector Privado	3,7	0,0	0,0	0,0	1,1	*	*	0,6
Clínica/Posta de PF ONG	3,7	0,0	0,0	0,0	1,1	*	*	0,6
Otro	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	*	*	0,3
Sin información	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	*	*	0,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	*	*	100,0
Número de mujeres	27	34	163	33	91	3	6	357



*: Menos de 20 casos.

público (96%). Así, la gran mayoría de usuarias de algún método moderno se provee de anticonceptivos en ese sector principalmente en establecimientos del Ministerio de Salud (MINSA). El porcentaje de mujeres que acude al sector privado para proveerse de métodos es mínimo (3%).

- Con relación al tipo de método, el mayor porcentaje de métodos hormonales

(inyectable y píldora) los suministran los puestos y centros de salud del MINSA.

- El método quirúrgico (esterilización femenina) en la medida que necesita especial cuidado y recursos especializados no se realizan en los puestos de salud. Las usuarias de estos métodos fueron intervenidas en hospitales y en Centros de Salud MINSA.



Cuadro 5.9

- En el departamento de Apurímac, del total de usuarias de métodos modernos, el 94% manifiesta haber recibido información sobre los efectos secundarios del método que usa. El 93 por ciento recibió información de lo que tendría que hacer si experimenta tales efectos y similar porcentaje recibió información sobre otros métodos. Cabe resaltar, que el once por ciento de las que han sido esterilizadas manifiesta que no fueron informadas sobre la permanencia (método definitivo) del método.
- Quienes manifiestan haber recibido información sobre los efectos secundarios en mayor proporción son las usuarias de DIU (97%); además, recibieron información sobre lo que tienen que hacer si experimentan dichos efectos y, sobre otros métodos en similar proporción (93%). Las usuarias de inyección fueron informadas sobre los efectos secundarios y sobre otros métodos en proporciones similares (95%), y 92 por ciento también fueron informadas sobre qué hacer si se presentan estos efectos.
- A pesar de la importancia de los métodos quirúrgicos por ser definitivos, las mujeres que han sido esterilizadas registran las menores proporciones de haber recibido información sobre otros métodos (86%).
- Las mujeres del área rural en mayor porcentaje que las del área urbana, recibieron información sobre los efectos secundarios del método prescrito; pero a mayor porcentaje de usuarias residentes en el área urbana que en área rural le informaron sobre otros métodos (95% y 93%).
- Las mujeres con educación superior son las mejores informadas con respecto a la permanencia de la esterilización, efectos secundarios del método y sobre qué hacer si se presentan estos efectos y otros métodos.

Cuadro 5.9 Información suministrada durante la prescripción de métodos modernos

Porcentaje de usuarias de métodos modernos que fueron informadas de ciertas características del método prescrito, incluyendo efectos secundarios, qué hacer en estos casos y métodos alternativos, por tipo de método y características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Tipo de información suministrada			
	La esterilización es permanente ¹	Sobre los efectos secundarios del método usado ²	Que hacer si hay efectos secundarios ³	Información sobre otros métodos ²
Métodos				
Píldora	-	91,7	95,5	100,0
DIU	-	96,7	93,1	93,3
Inyección	-	94,8	92,4	94,8
Norplant	-	66,7	100,0	100,0
Esterilización femenina	89,0	91,5	94,4	86,4
Esterilización masculina	100,0	-	-	-
Área de residencia				
Urbana	92,0	91,4	92,5	94,8
Rural	88,9	94,3	93,5	92,9
Nivel de educación				
Sin educación	82,4	86,4	89,5	84,1
Primaria	89,7	94,4	94,8	93,0
Secundaria	94,1	94,1	89,6	98,0
Superior	100,0	100,0	96,9	100,0
Total	89,7	93,7	93,3	93,3
Número de mujeres	97	269	252	269

¹ Solamente para usuarias de esterilización

² Solamente para usuarias de esterilización, píldora, DIU, inyección, Norplant y vaginales. Solo se incluyen usuarias a partir de Enero de 1995.

³ Solamente para usuarias de esterilización femenina, píldora, DIU, inyección, vaginales, Norplant y a quienes se les informó de efectos secundarios. Sólo se incluyen usuarias a partir de Enero de 1995.

- No aplicable

5.3 DISCONTINUACIÓN DEL USO DE MÉTODOS Y USO FUTURO

Razones de discontinuación de uso de métodos anticonceptivos

El calendario de eventos incluido en la entrevista individual permitió registrar la razón de abandono de los métodos de planificación familiar empleados. Con el fin de conocer las razones que llevaron a las mujeres a suspender el uso de métodos se elaboró el cuadro 5.10. Debe recordarse que la distribución no es de mujeres sino de segmentos de uso.

Cuadro 5.10

- La principal razón para la discontinuación de los segmentos de uso de métodos han sido los efectos secundarios (27%). La segunda razón importante es haber quedado embarazada mientras estaba usando el método (21%).
- Las mayor proporción de falla corresponde a la abstinencia periódica (50%), existiendo relación con el desconocimiento de las mujeres sobre los días de mayor riesgo para quedar embarazadas.

Cuadro 5.10 Razones de discontinuación de métodos anticonceptivos

Distribución porcentual de segmentos de uso de métodos anticonceptivos en los cinco años antes de la encuesta, por razón de discontinuación, según método, Apurímac 2000

Razón de discontinuación	Píldora	DIU	Inyección	Espuma, Jalea	Condón masculino	Abstinencia periódica	Retiro	MELA	Otra	Todos los métodos ¹
Quedó embarazada mientras lo usaba	3,6	10,9	4,0	*	20,7	50,3	(26,1)	(4,8)	*	21,0
Quería quedar embarazada	13,3	17,4	11,9	*	19,0	19,8	(17,4)	(0,0)	*	15,4
Esposo desaprueba	0,0	0,0	1,7	*	10,3	0,6	(8,7)	(0,0)	*	2,2
Efectos secundarios	55,4	39,1	52,5	*	0,0	0,0	(0,0)	(0,0)	*	26,5
Razones de salud	0,0	10,9	2,8	*	0,0	0,0	(0,0)	(0,0)	*	2,0
Acceso y disponibilidad	4,8	2,2	7,3	*	3,4	0,0	(0,0)	(0,0)	*	3,3
Quería método más efectivo	7,2	8,7	5,6	*	19,0	17,4	(26,1)	(71,4)	*	14,2
Incómodo de usar	4,8	2,2	0,0	*	3,4	1,2	(0,0)	(0,0)	*	1,7
Sexo poco frecuente/marido ausente	6,0	2,2	2,8	*	5,2	1,8	(13,0)	(4,8)	*	3,5
Fatalista	0,0	0,0	7,3	*	0,0	0,0	(0,0)	(0,0)	*	2,2
Dificultad para embarazarse/ menopáusica	0,0	0,0	0,0	*	0,0	3,0	(8,7)	(0,0)	*	1,2
Disolución matrimonial/separada	0,0	4,3	0,6	*	10,3	1,2	(0,0)	(0,0)	*	1,8
Otra	0,0	2,2	0,6	*	1,7	1,2	(0,0)	(9,5)	*	1,2
Sin información	4,8	0,0	2,8	*	6,9	3,6	(0,0)	(9,5)	*	3,8
Total	100,0	100,0	100,0	*	100,0	100,0	100,0	100,0	*	100,0
Número de segmentos discontinuados	83	46	177	12	58	167	23	21	11	598

Nota: Se incluyen los segmentos de uso 3-63 meses antes de la entrevista. Los segmentos iniciados antes de este período se excluyen del análisis.

*: Menos de 20 casos.

(): Entre 20 y 24 casos.

- La discontinuación de los segmentos de uso a causa de los efectos secundarios, le

corresponden en mayor porcentaje a la píldora (55%) y a la inyección (53%).

Intenciones de uso en el Futuro

A las mujeres que conocían o habían oído hablar de los métodos, pero no estaban usando ninguno, se les preguntó sobre sus intenciones de uso futuro de algún método anticonceptivo. Si la respuesta era afirmativa se preguntó si pensaba usar en los próximos 12 meses o después, y cual método pensaba usar. En el cuadro 5.11 se presentan las intenciones de uso para aquellas mujeres que no usan actualmente y en el gráfico 5.3 el porcentaje de métodos preferidos en el futuro. En el gráfico 5.4 las razones de no uso para quienes no intentan usar.

Cuadro 5.11 y Gráfico 5.3

Intenciones de uso de métodos en el futuro

- El 65 por ciento de las mujeres actualmente unidas no usuarias de métodos tiene la intención de usar alguno en el futuro. Las que no tienen intención de ser usuarias llegan a 26 por ciento.
- En el gráfico 5.3, se observa que la inyección (43%) y la abstinencia periódica (12%) son los métodos de mayor preferencia en las mujeres que tienen intención de usarlos en el futuro.

Cuadro 5.11 Uso futuro de anticoncepción entre mujeres que no usan actualmente

Distribución porcentual de mujeres en unión que no usan actualmente métodos anticonceptivos por intención de uso futuro, según número de hijos sobrevivientes, Apurímac 2000

Intención futura	Número de hijos sobrevivientes ¹					Total
	0	1	2	3	4+	
Intentará usar más tarde	*	69,2	79,6	79,5	54,1	64,9
Insegura de la intención	*	15,4	9,3	7,7	6,6	9,2
No tiene intención de usar	*	15,4	11,1	12,8	38,5	25,6
Total	*	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Número de mujeres	8	39	54	39	122	262

*: Menos de 20 casos.

¹ Incluye el embarazo actual

Gráfico 5.3

Preferencia de Métodos para Uso Futuro en mujeres que no usan actualmente
(Porcentaje de mujeres)





Gráfico 5.4

Razones para no usar métodos anticonceptivos

- En el departamento de Apurímac, el mayor porcentaje de mujeres entrevistadas
- El acceso y la disponibilidad de los métodos solo llega al 2 por ciento.

argumenta que no usa métodos anticonceptivos por la dificultad para embarazarse (45%).

Gráfico 5.4
Razones para no usar métodos anticonceptivos
(Porcentaje de mujeres)



5.4 MENSAJES SOBRE PLANIFICACIÓN FAMILIAR: EXPOSICIÓN Y ACEPTABILIDAD

A continuación de la sección sobre intenciones de uso de anticonceptivos, en ENDES 2000 se incluyeron preguntas referentes a mensajes sobre planificación familiar escuchados en los 12 meses antes de la entrevista y el medio a través del cual fueron escuchados (radio y/o televisión). En el cuadro 5.12 se presentan los resultados detallados según medio de comunicación por edad, lugar de residencia y nivel de educación. El tipo de contacto de las no usuarias con proveedores de planificación familiar se detalla en el cuadro 5.13

Cuadro 5.12

Exposición a mensajes sobre planificación familiar en radio y/o televisión y en medios escritos

- El 31 por ciento de mujeres entrevistadas ha escuchado mensajes de planificación familiar tanto por radio como por televisión. El 20 por ciento de las entrevistadas ha escuchado mensajes sobre el tema solamente por radio y tres por ciento sólo por la televisión.
- Los mayores porcentajes de mujeres que han escuchado mensajes por ambos

medios son las de 20 a 24 años (37%). Entre las que han escuchado los mensajes sólo por radio el mayor porcentaje lo tienen de 25 a 29 años.

- Las mujeres habitantes en el área rural que han escuchado mensajes por ambos medios es menor en 43 puntos porcentuales que las del área urbana; sin embargo, han escuchado mensajes sobre planificación familiar sólo por radio un porcentaje mayor entre las del área rural que las del área urbana (24% y 11% respectivamente).

- Según nivel de educación, el mayor porcentaje de las mujeres que ha escuchado mensajes sobre planificación familiar por ambos medios se concentra en las que tienen educación superior (76%).
- El 22 por ciento de entrevistadas en el departamento de Apurímac los vió o leyó en medios escritos, en mayor proporción las que residen en el área urbana (48%) y las de educación superior (67%).

Cuadro 5.12 Exposición a mensajes de planificación familiar en medios de comunicación

Distribución porcentual de mujeres entrevistadas de acuerdo a si han escuchado mensajes de planificación familiar en la radio o en la televisión (TV) en los 12 meses anteriores a la encuesta; y porcentaje de mujeres que han estado expuestas a mensajes en medios escritos, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Ha escuchado mensajes en radio o televisión					Porcentaje que vió mensajes en medios escritos	Número de mujeres
	Escuchó en la radio y en la TV	Solo por la radio	Sólo por la TV	No ha escuchado	Total		
Edad							
15-19	31,2	14,0	4,3	50,5	100,0	26,3	186
20-24	37,3	17,8	2,2	42,2	100,0	24,9	185
25-29	30,8	28,9	5,7	34,0	100,0	24,5	159
30-34	28,2	24,4	4,5	42,9	100,0	17,3	156
35-39	31,9	20,0	0,0	48,1	100,0	18,5	135
40-44	33,3	14,0	2,2	49,5	100,0	22,6	93
45-49	18,1	20,0	3,8	58,1	100,0	13,3	105
Area de residencia							
Urbana	61,1	10,6	7,2	20,8	100,0	48,1	293
Rural	18,5	23,8	1,8	55,6	100,0	11,0	725
Nivel de educación							
Sin educación	9,1	17,7	1,2	72,0	100,0	1,2	164
Primaria	15,6	26,9	1,6	55,8	100,0	7,2	443
Secundaria	46,3	15,1	6,7	31,9	100,0	35,8	285
Superior	76,4	10,2	4,7	7,1	100,0	66,9	127
Total	30,7	20,0	3,3	45,6	100,0	21,7	1 018

Nota: El total incluye 0.4 por ciento sin información.

Cuadro 5.13

Contacto de las no usuarias con los proveedores de planificación familiar

- El 61% de mujeres no usuarias de métodos anticonceptivos no ha tenido contacto con un trabajador de planificación familiar en los doce meses anteriores a la encuesta. De las mujeres que tuvieron contacto (39%); el 23 por ciento fue en su domicilio

y 16 por ciento en un establecimiento de salud.

- Entre las mujeres que no han tenido contacto con un trabajador de planificación familiar las mayores proporciones se encuentran entre las que tienen 15 a 19 años de edad (84%) y 45 a 49 años (79%), viven en el área urbana (76%) y tienen nivel educativo de secundaria a más (73%).

- Los mayores porcentajes de mujeres que fueron visitadas por un trabajador de planificación familiar en su domicilio en los doce meses anteriores a la encuesta y discutieron sobre el tema, se presentan entre las mujeres de 25 a 29 años (32%).
- Entre las mujeres que han visitado a un trabajador de planificación familiar en un establecimiento de salud, las mayores proporciones se presentan en las mujeres de 30 a 34 (29%).

Cuadro 5.13 Contacto de mujeres no usuarias con proveedores de planificación familiar

Distribución porcentual de mujeres que no usan anticoncepción según si han sido visitadas o no por un trabajador de planificación familiar (TPF) o si hablaron sobre PF con un empleado de un establecimiento de salud (ES) en los 12 meses anteriores a la encuesta, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Característica	Fue visitada por TPF			No fue visitada por TPF			Total	Porcentaje sin contacto con proveedores de PF ²	Número de mujeres
	Visitó ES		No visitó establecimiento de salud	Visitó ES		No visitó establecimiento de salud			
	Si discutió PF ¹	No discutió PF ¹		Si discutió PF ¹	No discutió PF ¹				
Edad									
15-19	3,9	2,6	5,2	4,5	32,9	51,0	100,0	83,9	155
20-24	17,3	3,1	3,1	27,6	14,3	34,7	100,0	49,0	98
25-29	32,4	0,0	10,8	20,3	12,2	24,3	100,0	36,5	74
30-34	22,0	3,4	11,9	28,8	8,5	25,4	100,0	33,9	59
35-39	17,4	2,2	0,0	21,7	21,7	37,0	100,0	58,7	46
40-44	8,1	2,7	8,1	18,9	13,5	48,6	100,0	62,2	37
45-49	8,2	4,9	3,3	4,9	29,5	49,2	100,0	78,7	61
Area de residencia									
Urbana	4,1	1,4	4,1	14,9	29,1	46,6	100,0	75,7	148
Rural.	18,3	3,1	6,5	16,8	18,1	37,2	100,0	55,2	382
Nivel de educación									
Sin educación	11,0	3,3	7,7	19,8	14,3	44,0	100,0	58,2	91
Primaria	22,2	2,8	7,1	15,1	16,5	36,3	100,0	52,8	212
Secundaria	9,3	2,3	4,1	15,7	29,7	39,0	100,0	68,6	172
Superior	5,5	1,8	3,6	16,4	23,6	49,1	100,0	72,7	55
Total	14,3	2,6	5,8	16,2	21,1	39,8	100,0	60,9	529

¹ Habló con personal médico sobre planificación familiar.

² No fue visitada por un trabajador de planificación familiar y no visitó una institución de salud; o si la visitó, no habló con personal de la institución sobre planificación familiar.

Discusión Sobre la Planificación Familiar entre Parejas

En la ENDES 2000 también se preguntó por el número de veces que las entrevistadas conversaron sobre planificación familiar con el esposo o compañero (cuadro 5.14) y sobre la percepción de ellas de la actitud de su pareja conyugal respecto a las planificación familiar (cuadro 5.15).

Cuadro 5.14

- Alrededor de tres cuartos de las mujeres unidas que usan métodos anticonceptivos

por decisión propia, ha dialogado alguna vez con su esposo o compañero sobre planificación familiar durante el último año. La mayor proporción de ellas una o dos veces (66%). Las mujeres de 20-24 años son las que en mayor proporción dialogaron una o dos veces con sus esposos sobre planificación familiar (76%).

- Con respecto a las mujeres que nunca han discutido el tema con su pareja, las mayores proporciones corresponden a las de 40 a 49 años (sobre 40% en cada grupo).

Cuadro 5.14 Discusión de planificación familiar entre parejas

Distribución porcentual de mujeres actualmente unidas cuyos esposos no participaron en la decisión del uso del método actual y que conocen un método anticonceptivo, por el número de veces que han discutido planificación familiar con el esposo o compañero, según edad actual, Apurímac 2000

Edad	Número de veces que discutió planificación familiar				Total	Número de mujeres
	Nunca	Una o dos veces	Con más frecuencia	Sin información		
15-19	*	*	*	*	*	9
20-24	15,2	75,8	9,1	0,0	100,0	66
25-29	15,9	73,9	5,8	4,3	100,0	69
30-34	15,9	73,0	9,5	1,6	100,0	63
35-39	31,7	60,3	6,3	1,6	100,0	63
40-44	40,5	51,4	5,4	2,7	100,0	37
45-49	42,3	48,1	7,7	1,9	100,0	52
Total	24,8	65,5	7,8	1,9	100,0	359

*: Menos de 20 casos.

Cuadro 5.14

Percepción de las mujeres de la actitud de sus parejas sobre la planificación familiar

- En el departamento de Apurímac, el 89 por ciento de las mujeres actualmente unidas que usan algún método por propia decisión aprueba que las parejas usen la planificación familiar. Una proporción

importante considera que el esposo o compañero también aprueba el uso de métodos anticonceptivos (67%).

- La proporción de mujeres que aprueban la planificación familiar pero piensan que su pareja no la aprueba es más frecuente en las de edades entre 40 a 44 años (22%), las residentes en el área rural (17%), las mujeres con educación superior (23%).

Cuadro 5.15 Percepción de las mujeres con relación a la actitud de sus cónyuges sobre la planificación familiar

Distribución porcentual de mujeres cuyos esposos no participaron en la decisión del uso del método actual y que conocen un método anticonceptivo, por la actitud de la mujer hacia la planificación familiar y la percepción que tiene de la actitud del cónyuge hacia la planificación familiar; y porcentaje de casos en que uno de ellos aprueba, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Característica	La mujer aprueba			La mujer desaprueba		La mujer no está segura	Total	Uno de ellos aprueba		Número de mujeres
	Y el cónyuge también aprueba	Pero el cónyuge desaprueba	Ella no conoce actitud del cónyuge	Y el cónyuge desaprueba	Ella no conoce actitud del cónyuge			La mujer aprueba	El cónyuge aprueba ¹	
Edad										
15-19	*	*	*	*	*	*	100,0	*	*	9
20-24	78,8	12,1	1,5	1,5	0,0	6,1	100,0	92,4	80,3	66
25-29	75,4	14,5	4,3	2,9	0,0	2,9	100,0	94,2	75,4	69
30-34	74,6	17,5	3,2	0,0	1,6	3,2	100,0	95,2	74,6	63
35-39	60,3	20,6	4,8	0,0	0,0	14,3	100,0	85,7	63,5	63
40-44	45,9	21,6	13,5	0,0	2,7	16,2	100,0	81,1	45,9	37
45-49	53,8	13,5	9,6	3,8	0,0	19,2	100,0	76,9	61,5	52
Área de residencia										
Urbana	70,9	15,2	5,1	0,0	1,3	7,6	100,0	91,1	73,4	79
Rural	65,7	16,8	5,4	1,8	0,4	10,0	100,0	87,9	67,5	280
Nivel de educación										
Sin educación	50,0	9,5	8,1	1,4	1,4	29,7	100,0	67,6	55,4	74
Primaria	67,4	18,5	6,7	1,7	0,0	5,6	100,0	92,7	68,5	178
Secundaria	79,1	14,9	1,5	1,5	0,0	3,0	100,0	95,5	80,6	67
Superior	75,0	22,5	0,0	0,0	2,5	0,0	100,0	97,5	75,0	40
Total	66,9	16,4	5,3	1,4	0,6	9,5	100,0	88,6	68,6	359

¹ Incluye mujeres en la categoría "mujer no está segura" pero que conoce la actitud del esposo

*: Menos de 20 casos.

***VI. OTROS
DETERMINANTES
DE LA
FECUNDIDAD***

VI. OTROS DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD

En este capítulo se analizan otros determinantes próximos a la fecundidad, diferentes de la anticoncepción, como son la nupcialidad, la actividad sexual, la duración de la amenorrea de postparto, la abstinencia de postparto y la no susceptibilidad al riesgo de embarazo asociada con la amenorrea y la abstinencia. Dentro del tópico de la nupcialidad, se analiza primero en este capítulo la formación de uniones legales o consensuales, lo cual se considera como un indicador básico de la exposición al riesgo de embarazo y cuyas características tienen implicaciones sobre el curso de la fecundidad.

También es de particular importancia la estructura y la edad a la primera unión como una primera indicación del comienzo de la vida reproductiva. Seguidamente se estudia el concepto de exposición al riesgo de embarazo dentro del marco de exposición a las relaciones sexuales. Posteriormente se analizan los períodos de infertilidad postparto para distintos subgrupos poblacionales, bien sea por amenorrea o por abstinencia de postparto como factores que, en ausencia del uso de la anticoncepción, constituyen el determinante más importante de los intervalos entre nacimientos.

6.1 ESTADO CONYUGAL ACTUAL

En la sección sobre nupcialidad de ENDES 2000 se preguntó a cada mujer si había estado casada o unida alguna vez, y en caso afirmativo, cual era su estado conyugal en el momento de la entrevista. En el cuadro 6.1 se presenta la distribución de mujeres en edad fértil según estado conyugal, por edad de la mujer, área

de residencia y nivel de educación. El cuadro 6.2 presenta la distribución porcentual de las mujeres no unidas por tipo de relación sexual y el cuadro 6.3 muestra la edad a la primera unión conyugal, que constituye una primera aproximación al comienzo de la exposición al riesgo de embarazo y al inicio de la vida reproductiva y tiene por lo tanto un efecto importante sobre la fecundidad porque cuanto más joven forme pareja la mujer, mayor será su tiempo de exposición y mayor su potencial de hijos a lo largo de su vida. En condiciones extremas hipotéticas se ha estimado como promedio una tasa de fecundidad natural de 15 hijos por mujer. La prolongación de la soltería y el celibato reducen este potencial e influyen en la disminución de los niveles de fecundidad en una población.

Cuadro 6.1

- El 71 por ciento de las mujeres en edad fértil (MEF) vive en estado de unión conyugal: el 46 por ciento son casadas y el 25 por ciento convivientes.
- Entre los 15-49 años de edad, el 22 por ciento del total de mujeres en edad fértil, son solteras. La proporción de solteras es mayor en el área urbana (34%) que en el área rural (18%).
- El 4 por ciento de las MEF han disuelto su unión conyugal, por divorcio o separación. Las mayores disoluciones por separación se presentan entre las de 25 a 29 años de edad (7%).

Cuadro 6.1 Estado conyugal actual

Distribución porcentual de las mujeres entrevistadas por estado conyugal actual, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Edad	Estado conyugal de las mujeres entrevistadas						Total	Número de mujeres
	Solteras	Casadas	Convivientes	Viudas	Divorciadas	Separadas		
Edad								
15-19	80,1	4,3	14,0	0,0	0,0	1,6	100,0	186
20-24	24,3	25,9	44,9	1,1	0,0	3,8	100,0	185
25-29	8,2	47,2	37,7	0,0	0,0	6,9	100,0	159
30-34	5,1	63,5	23,7	3,2	0,0	4,5	100,0	156
35-39	6,7	75,6	11,9	2,2	0,0	3,7	100,0	135
40-44	2,2	69,9	17,2	6,5	1,1	3,2	100,0	93
45-49	1,0	72,4	13,3	10,5	0,0	2,9	100,0	105
Area de residencia								
Urbana	34,1	40,6	20,8	2,0	0,3	2,0	100,0	293
Rural	17,5	48,8	26,3	2,9	0,0	4,5	100,0	725
Nivel de educación								
Sin educación	4,3	61,6	22,0	7,3	0,0	4,9	100,0	164
Primaria	14,2	56,0	24,2	2,5	0,0	3,2	100,0	443
Secundaria	41,4	27,4	26,0	0,4	0,0	4,9	100,0	285
Superior	30,7	36,2	27,6	2,4	0,8	2,4	100,0	127
Total	22,3	46,4	24,7	2,6	0,1	3,8	100,0	1 018

Cuadro 6.2

- Las mujeres nunca unidas y las alguna vez unidas pero no al momento de la encuesta, presentan bajos porcentajes al declarar que tienen pareja sexual regular (5% vs. 8%).
- El porcentaje de mujeres nunca unidas que tiene un compañero sexual regular es

mayor entre las mujeres con educación superior (20%) y las residentes en el área urbana (11%).

- El porcentaje de mujeres alguna vez unidas que tiene un compañero sexual regular es mayor entre las mujeres y las residentes en el área rural (9%) y sin educación (19%).

Cuadro 6.2 Tipo de relación sexual de las mujeres no unidas

Distribución porcentual de las mujeres no unidas por tipo de relación sexual, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Nunca unidas			Alguna vez unidas			Total	Número de mujeres
	Compañero regular	Compañero ocasional	Sin compañero	Compañero regular	Compañero ocasional	Sin compañero		
Edad								
15-19	2,0	2,6	93,4	2,0	0,0	0,0	100,0	152
20-24	18,5	3,7	61,1	9,3	0,0	7,4	100,0	54
25-29	(8,3)	(0,0)	(45,8)	(16,7)	(0,0)	(29,2)	(100,0)	24
30-34	(0,0)	(5,0)	(35,0)	(40,0)	(0,0)	(20,0)	(100,0)	20
35-39	*	*	*	*	*	*	*	17
40-44	*	*	*	*	*	*	*	12
45-49	*	*	*	*	*	*	*	15
Area de residencia								
Urbana	10,6	1,8	76,1	5,3	0,0	6,2	100,0	113
Rural	2,2	3,3	64,6	9,4	1,1	19,3	100,0	181
Nivel de educación								
Sin educación	0,0	0,0	25,9	18,5	0,0	55,6	100,0	27
Primaria	1,1	2,3	68,2	10,2	2,3	15,9	100,0	88
Secundaria	4,5	2,3	82,0	3,8	0,0	7,5	100,0	133
Superior	19,6	6,5	58,7	8,7	0,0	6,5	100,0	46
Total	5,4	2,7	69,0	7,8	0,7	14,3	100,0	294

*: Menos de 20 casos.

(): Entre 20 y 24 casos.

6.2 EDAD A LA PRIMERA UNIÓN CONYUGAL

La edad a la primera unión constituye una primera aproximación al comienzo de la exposición al riesgo de embarazo y al inicio de la vida reproductiva, tiene por lo tanto un efecto importante sobre la fecundidad porque cuanto más joven forma pareja la mujer, mayor será su tiempo de exposición y mayor su potencial de hijos a lo largo de su vida. En condiciones extremas hipotéticas se ha estimado como promedio una tasa de fecundidad natural de 15 hijos por mujer. La prolongación de la soltería y celibato reducen este potencial e influyen en la disminución de los niveles de fecundidad en una población.

Cuadros 6.3 y 6.4

- En el departamento de Apurímac la edad mediana a la primera unión conyugal de las mujeres de 25 a 49 años de edad es 19.5 años, este indicador casi no ha variado en los últimos 25 años.
- La edad mediana a la primera unión conyugal de las mujeres de 25 a 49 es mayor en las que tienen mayor nivel educativo y en las residentes en áreas urbanas.

Cuadro 6.3 Edad a la primera unión por edad actual de las mujeres

Porcentaje de las mujeres entrevistadas que se unió antes de los 15, 18, 20, 22, y 25 años y edad mediana a la primera unión, según grupos de edad actual, Apurímac 2000

Edad actual	Porcentaje de mujeres que se unió antes de cumplir					Porcentaje que nunca ha estado en unión	Número de mujeres	Edad mediana a la primera unión
	15	18	20	22	25			
15-19	0,5	-	-	-	-	80,1	186	-
20-24	4,3	31,9	56,8	-	-	24,3	185	19,4
25-29	6,3	36,5	59,7	78,6	87,4	8,2	159	19,2
30-34	7,1	28,2	51,3	67,9	83,3	5,1	156	19,9
35-39	8,9	37,8	57,0	71,9	83,7	6,7	135	19,1
40-44	8,6	33,3	52,7	68,8	82,8	2,2	93	19,6
45-49	9,5	33,3	52,4	65,7	81,9	1,0	105	19,7
Total 20-49	7,1	33,4	55,3	71,2	82,2	9,4	832	19,5
Total 25-49	7,9	33,8	54,9	71,1	84,1	5,1	647	19,5

- Menos del 50 por ciento de las mujeres entrevistadas se ha unido antes de cumplir la edad inferior del intervalo

Cuadro 6.4 Edad mediana a la primera unión

Edad mediana a la primera unión entre las mujeres alguna vez unidas, por edad actual, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Edad actual					Total mujeres 25-49
	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
Area de residencia						
Urbana	21,8	21,7	21,1	21,5	20,8	21,4
Rural	18,4	19,7	18,5	19,2	18,8	18,9
Nivel de educación						
Sin educación	19,0	19,5	18,1	18,5	20,4	18,8
Primaria	17,7	19,0	18,6	18,8	18,9	18,5
Secundaria	19,6	21,0	19,3	21,7	18,8	20,0
Superior	23,0	23,9	25,0	23,3	24,5	23,9
Total	19,2	19,9	19,1	19,6	19,7	19,5

6.3 EDAD A LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL

Como se sabe, la edad a la primera unión no necesariamente coincide con el comienzo de las relaciones sexuales. La proporción de mujeres que han tenido relaciones hasta ciertas edades exactas (15,18,20,22 y 25) se presentan en el cuadro 6.5, según la edad al momento de la entrevista. La edad mediana a la primera relación por edad de la mujer según lugar de residencia y nivel educativo se presenta en el cuadro 6.6. Se pueden comparar estos resultados con el cuadro 6.4 sobre la edad a

la primera unión para concluir si los diferenciales de la edad a la primera relación sexual entre categorías educacionales y por lugar de residencia son casi tan importantes como en el caso de la edad a la primera unión.

Cuadros 6.5 y 6.6

- La edad mediana a la primera relación sexual de las mujeres de 25 a 49 años de edad es de 17.8 años, alrededor de 2 años menos que su edad mediana a la primera unión conyugal.

Cuadro 6.5 Edad a la primera relación sexual por edad actual de las mujeres

Porcentaje de mujeres entrevistadas que tuvo su primera relación antes de los 15, 18, 20, 22 y 25 años y edad mediana a la primera relación, según edad actual, Apurímac 2000

Edad actual	Porcentaje que tuvo la primera relación sexual antes de cumplir					Porcentaje que nunca ha tenido relaciones	Número de entrevistadas	Edad mediana a la primera relación
	15	18	20	22	25			
15-19	3,2	-	-	-	-	72,6	186	-
20-24	7,0	42,7	75,7	-	-	11,9	185	-
25-29	11,9	52,8	76,1	87,4	94,3	1,9	159	17,8
30-34	14,7	48,1	66,0	82,1	90,4	1,9	156	18,1
35-39	13,3	58,5	78,5	83,7	90,4	3,0	135	17,3
40-44	15,1	48,4	74,2	83,9	93,5	0,0	93	18,1
45-49	19,0	50,5	69,5	78,1	89,5	1,0	105	17,9
Total 20-49	12,8	49,8	73,5	83,4	90,6	4,0	832	18,0
Total 25-49	14,5	51,9	72,8	83,3	91,7	1,7	647	17,8

- Menos del 50 por ciento de las mujeres entrevistadas ha tenido su primera relación antes de cumplir la edad inferior del intervalo.

Cuadro 6.6 Edad mediana a la primera relación sexual

Edad mediana a la primera relación entre las mujeres alguna vez unidas, por edad actual, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Edad actual						Total 20-49
	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
Area de residencia							
Urbana	18,7	19,0	18,9	18,0	18,1	17,3	18,5
Rural	18,2	17,4	17,6	17,2	18,1	18,1	17,7
Nivel de educación							
Sin educación	-	18,7	16,4	17,1	17,3	17,2	17,3
Primaria	17,4	16,9	18,1	16,9	17,6	17,7	17,3
Secundaria	18,6	18,1	18,4	16,5	18,4	18,3	18,3
Superior	19,9	20,0	20,4	23,5	22,8	21,5	-
Total	18,4	17,8	18,1	17,3	18,1	17,9	18,0

- Menos del 50 por ciento de las mujeres entrevistadas ha tenido su primera relación antes de cumplir la edad inferior del intervalo.

- La edad mediana a la primera relación sexual es menor en el área rural (17.7) y entre las mujeres con primaria o sin educación (17.3 en cada grupo).
- Sólo el 4 por ciento de las mujeres 20-49 años de edad nunca ha tenido relaciones. Este porcentaje disminuye conforme avanza la edad.

6.4 ACTIVIDAD SEXUAL PREVIA Y RECIENTE

La probabilidad de una mujer de quedar embarazada está en función a su frecuencia de relaciones sexuales en ausencia de protección anticonceptiva. En esta sección se discuten los resultados con relación a la experiencia y actividad sexual de las mujeres en edad fértil. Se presenta información sobre tal frecuencia como un refinamiento de la medición de la exposición al riesgo de embarazo, según diversas características, incluyendo edad, duración de la unión, lugar de residencia, nivel de educación y método anticonceptivo usado en la actualidad. El cuadro se ha elaborado sobre la base de todas las mujeres en edad fértil y presenta la proporción global sexualmente activa en las últimas cuatro semanas; y para aquellas sin actividad sexual, la duración de la abstinencia, según sea el postparto o no. Los comentarios que siguen están referidos solamente a las mujeres que alguna vez han tenido relaciones sexuales.

Cuadro 6.7

- El 84 por ciento de las mujeres en edad fértil ha tenido relaciones sexuales alguna vez en su vida. En las cuatro semanas que precedieron al día de la entrevista, 62 por ciento estuvo activa sexualmente y la mayoría de las que no tuvieron actividad sexual fue por un motivo diferente al parto.
- La actividad sexual reciente es menor entre las mujeres de 15-19 años (20%) pero aumenta con la edad, al 79 por ciento entre las mujeres de 35-39 años de edad.
- La actividad sexual según la duración de la unión tiene un nivel mayor entre las mujeres con 10 a 24 años de unión, alrededor del 81 por ciento de este grupo estaban activas sexualmente en las cuatro semanas que precedieron la encuesta. Cuando la unión conyugal es de 25 años a más el nivel de actividad sexual de las mujeres disminuye.
- La mayoría de las mujeres sexualmente activas en las 4 últimas semanas usan métodos anticonceptivos (64%).
- La actividad sexual reciente según área de residencia es mayor en el área rural en 15 puntos porcentuales que en el área urbana.

Cuadro 6.7 Actividad sexual reciente

Distribución porcentual de las mujeres entrevistadas por actividad sexual en las 4 semanas que precedieron la encuesta; y entre aquellas no activas, tipo y duración de abstinencia, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Sexualmente activa en últimas 4 semanas	Sin actividad sexual en últimas 4 semanas				Sin información	Nunca tuvo relaciones	Total	Número de mujeres
		En abstinencia (de postparto)		En abstinencia (no postparto)					
		0-1 años	2 ó + años	0-1 años	2 ó + años				
Edad									
15-19	19,9	3,8	0,5	3,2	0,0	0,0	72,6	100,0	186
20-24	61,1	7,0	2,7	14,1	1,6	1,6	11,9	100,0	185
25-29	74,2	3,1	1,3	13,2	5,0	1,3	1,9	100,0	159
30-34	78,2	3,8	2,6	9,0	2,6	1,9	1,9	100,0	156
35-39	78,5	4,4	0,7	8,9	3,0	1,5	3,0	100,0	135
40-44	74,2	3,2	2,2	11,8	6,5	2,2	0,0	100,0	93
45-49	65,7	0,0	0,0	18,1	13,3	1,9	1,0	100,0	105
Duración de la unión									
0-4	79,0	7,0	3,2	9,6	0,0	1,3	0,0	100,0	157
5-9	79,0	4,2	1,2	12,0	3,0	0,6	0,0	100,0	167
10-14	80,8	2,7	0,0	11,0	3,4	2,1	0,0	100,0	146
15-19	81,1	4,1	0,8	7,4	5,7	0,8	0,0	100,0	122
20-24	81,4	1,0	1,0	11,3	2,1	3,1	0,0	100,0	97
25+	67,0	1,0	1,0	16,5	12,6	1,9	0,0	100,0	103
Nunca unidas	5,7	4,8	2,2	9,3	3,1	0,9	74,0	100,0	227
Area de residencia									
Urbana	51,5	5,1	0,3	15,0	4,1	0,7	23,2	100,0	293
Rural	66,5	3,4	1,9	9,0	3,7	1,7	13,8	100,0	725
Nivel de educación									
Sin educación	70,1	2,4	3,0	11,6	7,3	1,8	3,7	100,0	164
Primaria	70,0	4,1	1,6	9,5	2,5	2,0	10,4	100,0	443
Secundaria	46,3	4,2	1,1	9,1	3,9	0,7	34,7	100,0	285
Superior	60,6	4,7	0,0	17,3	3,9	0,0	13,4	100,0	127
Método anticonceptivo actual									
Ningún método	35,8	6,6	2,8	14,0	7,0	2,1	31,7	100,0	529
Píldora	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	27
DIU	91,2	0,0	0,0	5,9	0,0	2,9	0,0	100,0	34
Esterilización	94,8	0,0	0,0	4,1	1,0	0,0	0,0	100,0	97
Abstinencia periódica	86,4	0,0	0,0	12,6	0,0	1,0	0,0	100,0	103
Otro	89,9	2,2	0,0	7,0	0,4	0,4	0,0	100,0	228
Total	62,2	3,9	1,5	10,7	3,8	1,4	16,5	100,0	1 018

6.5 INFERTILIDAD POSTPARTO

El riesgo de embarazo inmediatamente después del nacimiento de un hijo depende en parte de la práctica de la lactancia y de la duración de la abstinencia sexual postparto. En la ENDES 2000 se preguntó a todas las mujeres que habían tenido un hijo en los 5 años anteriores a la encuesta si continuaban amamantando al último hijo, si habían reiniciado las relaciones sexuales y si habían tenido su menstruación.

También se averiguó la duración de la lactancia, de la abstinencia y de la amenorrea.

Con esta información es posible realizar estimaciones de la duración de la amenorrea, de la abstinencia postparto y del período de no susceptibilidad al riesgo de embarazo, según el tiempo transcurrido, en meses, desde el nacimiento del último hijo.

Cuadro 6.8

- En el departamento de Apurímac, la amenorrea postparto tiene una duración promedio de 14 meses, para el 50 por ciento de las madres se presentó hasta en 11.4 meses después del parto. Por otro

lado, la abstinencia postparto dura en promedio 5 meses. pero la mitad de las madres reinició su actividad sexual a los 2 meses (1.8 mes).

- El período de insusceptibilidad al riesgo de embarazo desde el nacimiento del hijo anterior en promedio es de 15 meses, mientras que la mediana se sitúa en 11.5 meses.

Cuadro 6.8 Amenorrea, abstinencia e insusceptibilidad de postparto

Porcentaje de niños nacidos en los últimos tres años cuyas madres están en amenorrea, abstinencia o insusceptibilidad de postparto, Apurímac 2000

Indicadores	En amenorrea	En abstinencia	En insusceptibilidad ¹	Número de nacimientos
Total	35,8	13,1	39,7	383
Mediana	11,4	1,8	11,5	-
Promedio aritmético	13,5	5,1	14,8	-
Promedio P/I	12,7	4,6	14,1	-

¹ Incluye las madres que están bien en amenorrea de postparto, en abstinencia o en ambas.

Cuadro 6.9

- La duración mediana de la amenorrea postparto en las madres es mayor en el grupo de 30 años a más (12.1 meses), en las residentes del área rural (11.7 meses) y en las madres con educación primaria (14.9 meses).
- La duración mediana de la abstinencia postparto es mayor entre las madres con nivel educativo de primaria y las residentes del área urbana. Siendo similar por grandes grupos de edad.

- Las diferencias en la duración mediana de la insusceptibilidad postparto por nivel educativo son marcadas. La mediana de insusceptibilidad postparto en las madres con educación primaria, es mayor que en las madres con educación secundaria (14.9 meses vs.9.3 meses).
- La duración mediana de la insusceptibilidad postparto en el área rural es de 12 meses y en el área urbana 11 meses. Entre las madres menores de 30 años es alrededor de 10 meses y para las de 30 años a más alrededor de 13 meses.

Cuadro 6.9 Duración mediana de insusceptibilidad de postparto

Duración mediana en meses de la amenorrea, abstinencia e insusceptibilidad de postparto para las madres de nacimientos en los tres años antes de la encuesta, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Amenorrea	Abstinencia	Insusceptibilidad	Número de nacimientos
Edad				
<30	10,3	1,8	10,3	242
30+	12,1	1,8	12,5	141
Área de residencia				
Urbana	11,0	5,0	11,0	80
Rural	11,7	1,5	12,0	303
Nivel de educación				
Sin educación	3,8	0,5	11,8	59
Primaria	14,9	2,1	14,9	197
Secundaria	9,3	1,9	9,3	84
Superior	9,6	1,8	9,9	43
Total	11,4	1,8	11,5	383

6.6 EXPOSICIÓN AL RIESGO DE EMBARAZO ENTRE LAS MUJERES DE 30 Y MÁS AÑOS

A partir de cierta edad, la exposición al riesgo de embarazo disminuye rápidamente como resultado de la menopausia, la infertilidad terminal y la abstinencia prolongada.

- **Infertilidad terminal:** definida como la ausencia de nacimientos vivos en los últimos cinco años entre mujeres que estuvieron continuamente en unión y que no usaron alguna forma de anticoncepción.
- **Abstinencia prolongada:** definida como la ausencia de relaciones sexuales en los últimos tres años entre mujeres en unión.
- **Menopausia:** definida para este análisis como 1) las mujeres que reportan directamente ser menopáusicas y 2) la ausencia del período menstrual durante 6 meses entre mujeres que no están ni

embarazadas ni en amenorrea de postparto.

Como la menopausia es quizás el indicador más importante de la terminación de la exposición al riesgo de embarazo, en el cuadro 6.10 se presentan las estimaciones para el departamento de Apurímac entre las mujeres de 30 y más años utilizando la definición inmediata anterior.


Cuadro 6.10

- El 19 por ciento de las mujeres de 30 a 49 años se encuentra en menopausia, es decir, no están embarazadas ni en amenorrea de postparto y su último período menstrual ocurrió hace 6 meses o más.
- La proporción de mujeres en menopausia aumenta rápidamente conforme avanza la edad: desde 6 por ciento entre las mujeres de 35 a 39 años hasta el 65 por ciento entre las mujeres de 48-49 años de edad.

Cuadro 6.10 Terminación de exposición al riesgo de embarazo: menopausia

Porcentaje de mujeres de 30 y más años de edad clasificadas como menopáusicas, Apurímac 2000

Edad	Porcentaje	Número
30-34	12,2	115
35-39	5,6	107
40-41	7,0	43
42-43	22,2	27
44-45	21,1	38
46-47	36,8	38
48-49	65,1	43
Total	19,2	411



VII. PREFERENCIAS DE FECUNDIDAD

VII. PREFERENCIAS DE FECUNDIDAD

En los capítulos anteriores se presentaron los resultados del análisis de la información recolectada en ENDES 2000 sobre los determinantes próximos de la fecundidad: la planificación familiar (Capítulo 5), la nupcialidad y exposición al riesgo de embarazo (Capítulo 6). En el presente capítulo se presentan los resultados sobre las preferencias reproductivas de las mujeres a tres niveles:

Información en cuanto al deseo de hijos en general y para las mujeres que desean más hijos y el tiempo que les gustaría esperar antes de tener otro hijo. Esta información permite clasificar a las mujeres en dos grupos: las que desean espaciar y las que desean limitar los nacimientos. Estos resultados son de relevancia para el estudio de la demanda total e insatisfecha de servicios de planificación familiar.

Información recolectada sobre el tamaño ideal de la familia, o el promedio ideal de hijos, que al compararse con el promedio de nacidos vivos permite obtener una primera idea del exceso de fecundidad prevalente en el país.

Información sobre la fecundidad deseada en los años inmediatamente anteriores a la encuesta, como indicador del grado de cumplimiento de las preferencias reproductivas. El complemento, la fecundidad no deseada, permite estimar el posible impacto que la prevención de esos nacimientos podría tener sobre las necesidades de planificación familiar y las tasas de fecundidad.

7.1 EL DESEO DE MÁS HIJOS

Durante mucho tiempo, los administradores de programas de planificación familiar se preocuparon únicamente por las

mujeres que deseaban limitar la fecundidad, prestando muy poca atención a aquéllas que deseaban espaciar los nacimientos. Se reconoce ya que hay un grupo grande de mujeres que quieren espaciar, especialmente si se tiene en cuenta que los nacimientos muy seguidos inciden en la salud y bienestar de la madre y los hijos. Por lo tanto, en la ENDES 2000 se ha preguntado a aquellas mujeres que deseaban más hijos, cuánto tiempo les gustaría esperar para tener otro (o tener el primero para aquéllas sin hijos). Específicamente, a las nulíparas se les preguntó si deseaban tener hijos; al resto, si deseaban más hijos. A aquéllas que deseaban más hijos se les preguntó cuánto tiempo deseaban esperar para tener el próximo. El análisis detallado de la información, junto con los datos referentes al uso o no de anticonceptivos, permite estudiar la necesidad insatisfecha de planificación familiar tanto para espaciar la descendencia como para limitarla.

La distribución de las mujeres en unión de acuerdo con el deseo o no de más hijos se presenta en el Cuadro 7.1 por número de hijos sobrevivientes. La misma distribución, pero por grupos de edad se presenta en el Cuadro 7.2.

Cuadro 7.1

Preferencias de fecundidad por número de hijos sobrevivientes

- En el departamento de Apurímac más de la mitad de las mujeres actualmente unidas no quiere tener más hijos (58%), si se adiciona las esterilizadas (13%), se obtiene que 7 de cada 10 no desean más hijos. El deseo de tener un hijo antes de los próximos dos años es expresado por 4 por ciento de mujeres unidas. El 20 por

ciento desea tener un hijo, pero desea esperar 2 años o más. Las indecisas sobre sus preferencias, las infértiles y las que desean un hijo pero no saben cuando tenerlo alcanzan a 5%.

- El deseo de no tener más hijos aumenta rápidamente con la paridez. Así sin considerar las esterilizadas más del 60 por ciento de las mujeres que no quieren tener

más hijos se encuentra entre quienes ya tienen de 2 a más hijos vivos. Cerca de tres cuartas partes de las que tienen de 6 a más hijos expresan, también, el deseo de culminar su paridez (73%).

- Por otro lado, el mayor porcentaje de las mujeres que desea tener hijos pero desea esperar dos años o más ya tiene uno.

Cuadro 7.1 Preferencias de fecundidad por número de hijos sobrevivientes

Distribución porcentual de mujeres actualmente casadas/unidas por preferencias de fecundidad, según número de hijos vivos, Apurímac 2000

Preferencia	Número de hijos sobrevivientes ¹							Total mujeres 15-49
	0	1	2	3	4	5	6+	
No desea más	(5,0)	15,0	71,2	83,6	90,7	94,4	91,0	71,3
No quiere más	(5,0)	15,0	63,3	69,7	69,4	70,8	72,9	58,3
Esterilizadas	(0,0)	0,0	7,9	13,9	21,3	23,6	18,1	13,0
Desea más, indecisa o infecunda	95,0	85,0	28,8	16,4	9,3	5,6	0,9	28,7
Desea tener otro pronto ²	(55,0)	9,2	4,3	0,0	1,9	0,0	0,0	4,1
Desea tener otro más tarde ³	(25,0)	72,5	20,1	13,1	4,6	1,4	0,7	19,7
Desea tener otro pero no sabe cuando	(5,0)	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Indecisa	(0,0)	1,7	0,7	0,0	0,0	1,4	0,0	0,6
Infértil	(10,0)	1,7	2,2	3,3	2,8	2,8	8,3	3,9
Total	(100,0)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Número de mujeres	20	120	139	122	108	72	144	724

¹ Incluye el embarazo actual ² Desea otro hijo antes o dentro de los próximos 2 años ³ Desea esperar dos o más años
(): Entre 20 y 24 casos.

Cuadro 7.2

Preferencias de fecundidad por edad

- La mayor proporción de mujeres que no quiere tener más hijos sin considerar las esterilizadas se registra entre las de 45 a 49 años (68%), seguido de las mujeres de 35 a 39 años de edad (67%); las menores proporciones de las mujeres unidas que no desean más hijos, están representadas por las más jóvenes de 15 a 19 años (18%). Se advierte una mayor

proporción de mujeres esterilizadas entre las de 35 a 44 años.

- Por otro lado, la proporción de mujeres que desea tener un hijo pronto (antes de los próximos dos años) es mayor entre las mujeres de 15 a 19 años de edad (12%) seguido por las de 20 a 29 años (5% y 4% respectivamente).
- Conforme avanza la edad de las mujeres el deseo de esperar dos años o más para tener un hijo va disminuyendo.

Cuadro 7.2 Preferencia de fecundidad por edad actual de las mujeres

Distribución porcentual de las mujeres en unión por deseo de más hijos, según edad actual de las mujeres, Apurímac 2000

Preferencia	Edad actual							Total mujeres 15-49
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
No desea más	17,6	48,9	67,4	82,4	88,9	86,4	76,7	71,3
No quiere más	17,6	45,8	57,8	66,2	66,9	60,5	67,8	58,3
Esterilizadas	0,0	3,1	9,6	16,2	22,0	25,9	8,9	13,0
Desea más, indecisa o infecunda	82,4	51,1	32,6	17,6	11,1	13,6	23,3	28,7
Desea tener otro pronto ¹	11,8	5,3	4,4	2,9	3,4	2,5	3,3	4,1
Desea tener otro más tarde ²	67,6	45,0	26,7	12,5	4,2	3,7	0,0	19,7
Desea tener otro pero no sabe cuando	2,9	0,0	0,0	0,7	0,8	0,0	0,0	0,4
Indecisa	0,0	0,8	1,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,6
Infértil	0,0	0,0	0,0	0,7	2,5	7,4	20,0	3,9
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Número de mujeres	34	131	135	136	118	81	90	724

¹ Desea otro hijo antes de dos años ² Desea esperar dos años o más**Cuadro 7.3**Mujeres que no desean más hijos por características seleccionadas

- En el departamento de Apurímac, la mayoría de las mujeres en unión no desea tener más hijos, incluyendo a las esterilizadas (71%). Este deseo es mayor entre las mujeres del área rural (72%) que
- entre las del área urbana (69%). En ambas áreas las mujeres unidas que no desean tener más hijos se incrementan según el número de hijos vivos.
- Las mayores diferencias en el deseo de tener más hijos en el futuro, se observa en las que no tienen nivel de educación en comparación a las que tienen nivel superior (85% y 56%).

Cuadro 7.3 Mujeres que no desean más hijos, según características seleccionadas

Porcentaje de mujeres en unión que no desean más hijos o que están esterilizadas, por número de hijos sobrevivientes según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Número de hijos sobrevivientes ¹							Total mujeres 15-49
	0	1	2	3	4	5	6+	
Área de residencia								
Urbana	0,0	16,7	66,7	90,0	95,5	88,9	93,3	68,9
Rural	6,7	14,3	73,0	81,5	89,5	96,3	90,4	72,1
Nivel de educación								
Sin educación	0,0	40,0	77,8	85,7	89,5	92,9	89,8	84,7
Primaria	16,7	17,4	73,2	80,0	90,6	95,1	90,3	75,2
Secundaria	0,0	9,5	62,9	94,7	95,0	93,8	100,0	58,6
Superior	0,0	14,8	75,0	80,0	80,0	100,0	100,0	55,6
Total	5,0	15,0	71,2	83,6	90,7	94,4	91,0	71,3

Nota: Incluye mujeres cuyo esposo o compañero está esterilizado

¹ Incluye el embarazo actual

7.2 LA NECESIDAD INSATISFECHA Y LA DEMANDA DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

En la sección anterior se indicó que la proporción de mujeres que desean espaciar los nacimientos y/o limitar la familia, puede considerarse, en principio, como un indicador de la demanda potencial por servicios de planificación familiar. Una mejor aproximación al análisis de la necesidad de planificación familiar se presenta en esta sección. Primero se calcula la llamada necesidad insatisfecha de planificación familiar, tanto para espaciar como para limitar, a la cual se le agrega la estimación de mujeres que en la actualidad usan métodos, para obtener así la demanda total de planificación familiar.

La Necesidad Insatisfecha de Planificación Familiar

Para los cálculos de esta sección, no se consideran con necesidad insatisfecha de planificación familiar las siguientes categorías de mujeres:

- Mujeres que no están actualmente en unión.
- Mujeres que están practicando la planificación familiar.
- Mujeres actualmente embarazadas o amenorréicas que estaban empleando alguna forma de anticoncepción cuando quedaron embarazadas.
- Mujeres actualmente embarazadas o amenorréicas cuyo último embarazo fue deseado.
- Mujeres infértiles, es decir, aquéllas sin hijos nacidos vivos en los últimos cinco años a pesar de haber estado en unión y no haber usado la anticoncepción.
- Mujeres fértiles que desean un hijo durante los próximos 2 años.

Necesidad insatisfecha para limitar:

- Mujeres actualmente embarazadas o amenorréicas cuyo último embarazo no fue deseado.

- Mujeres fértiles que no están ni embarazadas ni amenorréicas y que manifestaron que no desean más hijos.

Necesidad insatisfecha para espaciar:

- Mujeres actualmente embarazadas o amenorréicas cuyo último embarazo sí fue deseado, pero más tarde.
- Mujeres fértiles que no están ni embarazadas ni amenorréicas y que manifestaron que sí desean más hijos pero prefieren esperar por lo menos dos años.

La Demanda Total de Planificación Familiar

Los niveles de necesidad insatisfecha revelan sólo en parte el potencial de la demanda de planificación familiar. La información de ENDES 2000 permite estimar la demanda total de tales servicios, tanto para espaciar como para limitar. La demanda total incluye tres componentes:

- Las mujeres con necesidad insatisfecha de planificación familiar;
- Las mujeres que actualmente están usando métodos anticonceptivos (necesidad satisfecha).
- Las mujeres embarazadas o amenorréicas que quedaron embarazadas mientras usaban un método (falla de método).

Las estimaciones de la necesidad insatisfecha, la demanda satisfecha y la demanda total de planificación familiar (para espaciar, para limitar y total) se presentan en el Cuadro 7.4 para diferentes niveles de exposición de las mujeres, por características seleccionadas.

Cuadro 7.4

Necesidad insatisfecha de planificación familiar

- El 13 por ciento de las mujeres en unión del departamento de Apurímac tiene necesidad insatisfecha de planificación

familiar: 8 por ciento para limitar el número de hijos y 5 por ciento para espaciarlos.

- La necesidad insatisfecha para las mujeres en unión por grupo de edad, alcanza su proporción más alta entre las mujeres de 20-24 años (19%), en similar proporción para espaciar como para limitar la fecundidad. En cambio entre las de 30 años a más la mayor proporción de necesidad insatisfecha es para limitar la fecundidad.
- La necesidad insatisfecha de planificación familiar por área de residencia para las mujeres en unión es mayor en el área rural, tanto para limitar como para espaciar el número de hijos.

- Entre las mujeres en unión la necesidad insatisfecha es mayor en mujeres con educación primaria (15%) dicha proporción es tres veces mayor que en las que tienen estudios superiores (5%).

Demanda total de planificación familiar

- La demanda total de planificación familiar es alta en el departamento de Apurímac (82%), el 56 por ciento es para limitar el tamaño de la familia y 26 por ciento para espaciar los nacimientos.
- El nivel de demanda total aumenta en las mujeres de 30 a 34 años, especialmente para limitar. Mientras que la demanda total para espaciar el número de hijos disminuye con la edad, la demanda para limitar aumenta.

Cuadro 7.4 Necesidad de servicios de planificación familiar para las mujeres en unión, según características seleccionadas

Porcentaje de mujeres en unión con necesidad insatisfecha de planificación familiar y demanda total de planificación familiar, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Necesidad <i>insatisfecha</i> ¹			Necesidad <i>satisfecha</i> ² (uso de métodos)			Demanda total ³			Demanda satisfecha (porcentaje) ⁴	Número de mujeres en unión
	Para espaciar	Para limitar	Total	Para espaciar	Para limitar	Total	Para espaciar	Para limitar	Total		
Edad											
15-19	11,8	0,0	11,8	64,7	11,8	76,5	76,5	11,8	88,2	86,7	34
20-24	9,9	9,2	19,1	38,2	21,4	59,5	51,9	32,1	84,0	77,3	131
25-29	7,4	7,4	14,8	20,7	40,0	60,7	35,6	48,9	84,4	82,5	135
30-34	5,1	8,1	13,2	11,8	57,4	69,1	22,8	66,9	89,7	85,2	136
35-39	2,5	7,6	10,2	4,2	66,9	71,2	8,5	78,8	87,3	88,3	118
40-44	0,0	12,3	12,3	4,9	64,2	69,1	6,2	79,0	85,2	85,5	81
45-49	0,0	5,6	5,6	2,2	45,6	47,8	2,2	52,2	54,4	89,8	90
Área de residencia											
Urbana	2,8	3,9	6,7	23,3	50,0	73,3	29,4	55,6	85,0	92,2	180
Rural	5,9	9,2	15,0	15,6	45,1	60,7	25,1	56,3	81,5	81,5	544
Nivel de educación											
Sin educación	1,5	11,7	13,1	2,2	50,4	52,6	7,3	65,7	73,0	82,0	137
Primaria	5,1	9,6	14,6	15,8	47,6	63,4	24,2	58,6	82,8	82,3	355
Secundaria	8,6	4,6	13,2	27,6	42,1	69,7	41,4	47,4	88,8	85,2	152
Superior	4,9	0,0	4,9	32,1	42,0	74,1	38,3	45,7	84,0	94,1	81
Total	5,1	7,9	13,0	17,5	46,3	63,9	26,2	56,1	82,3	84,3	724

¹ Necesidad insatisfecha para **limitar**: mujeres embarazadas o amenorréicas cuyo último embarazo **no fue deseado** y mujeres fértiles que no están ni embarazadas ni amenorréicas **que no desean más hijos**. Necesidad insatisfecha para **espaciar**: mujeres actualmente embarazadas o amenorréicas cuyo último embarazo **si fue deseado, pero más tarde** y mujeres fértiles que no están ni embarazadas ni amenorréicas que si desean más hijos pero **prefieren esperar** por lo menos dos años.

² La *necesidad satisfecha para espaciar* se refiere a las mujeres que usan algún método de planificación familiar porque desean espaciar los nacimientos (respondieron que desean tener más hijos o están indecisas al respecto). La *necesidad satisfecha para limitar* se refiere a aquellas mujeres que están usando porque desean limitar los nacimientos (respondieron que no desean más hijos).

³ La *demanda total* incluye mujeres embarazadas o amenorréicas que quedaron embarazadas mientras usaban un método (falta de método).

⁴ $[(\text{Necesidad satisfecha}) + (\text{falta de método})] / (\text{demanda total})$.

- La demanda total en el área urbana es algo mayor a la del área rural (85% Vs. 82%).
- Los mayores niveles de la demanda total se presentan entre las mujeres con educación secundaria (89%).
- Del total de mujeres unidas con necesidad de planificación familiar, el 84 por ciento de ellas tiene satisfecha dicha necesidad. Este nivel es mayor entre las mujeres que habitan el área urbana (92%) y entre las que tienen estudios superiores (94%).

7.3 NÚMERO IDEAL DE HIJOS

En las secciones anteriores se analizó el deseo futuro de más hijos, el cual obviamente, está influenciado por el número de hijos ya tenidos. También, se preguntó en la entrevista por el número ideal de hijos, independientemente de la situación actual; es decir, el número de hijos que a la mujer le hubiera gustado tener si ella pudiera comenzar de nuevo su vida reproductiva.

Usualmente existe una alta asociación entre el número ideal y el real de hijos tenidos, especialmente en las mujeres de mayor edad. Por una parte, las parejas que desean familias numerosas terminan con buen número de hijos; por otra, al responder en la encuesta a la pregunta correspondiente, las mujeres pueden ajustar su descendencia ideal a la real, en un proceso de racionalización. La distribución de las mujeres entrevistadas en la ENDES 2000 por el número ideal de hijos, según el número de hijos sobrevivientes se presenta en el cuadro 7.5. En este cuadro se presenta, además, el promedio ideal para todas las mujeres y para las actualmente unidas.

Es posible también que las mujeres con alta paridez, sean en promedio de más edad, que las que tienen familia pequeña; esto no sólo

debido al menor tiempo de exposición al riesgo del embarazo, sino también a los cambios en las actitudes en las generaciones más jóvenes con respecto a la planificación familiar y sobre los roles de los miembros del hogar.

Cuadros 7.5 y 7.6

Número ideal y promedio ideal de hijos sobrevivientes

- El número promedio ideal de hijos para todas las entrevistadas en el departamento de Apurímac es 2.4 y en las mujeres unidas es 2.6.
- El promedio ideal de hijos tiende a incrementarse con el número de hijos sobrevivientes, en las dos poblaciones consideradas.

Número medio ideal de hijos por características seleccionadas

- El número medio ideal de hijos aumenta con la edad de la entrevistada, desde 1.8 hijos en las mujeres de 15 a 19 años a 2.9 entre las que tienen 45-49 años.
- En las mujeres del área rural, el promedio ideal de hijos tiende a ser mayor que en las del área urbana a partir de los 25-29 años y finalmente llega a 2.5 y 2.2 respectivamente.
- En lo que se refiere al promedio ideal de hijos por nivel de educación, en el departamento de Apurímac, se observa que las mujeres con nivel superior presentan el promedio ideal de hijos más bajo (2.2 hijos), mientras que en las que no tienen ningún nivel educativo, el promedio ideal de hijos supera al promedio total del departamento (2.8 hijos).

Cuadro 7.5 Número ideal y promedio ideal de hijos

Distribución porcentual de mujeres entrevistadas por número ideal de hijos y promedio ideal para todas las mujeres entrevistadas y para las actualmente en unión, según número de hijos sobrevivientes, Apurímac 2000

Número ideal y promedio ideal	Número de hijos sobrevivientes ¹							Total mujeres 15-49
	0	1	2	3	4	5	6+	
Número de hijos								
0	9,5	2,4	1,3	1,6	1,7	4,0	1,9	3,6
1	15,3	12,2	6,5	6,3	5,9	4,0	5,6	8,9
2	59,5	72,6	60,8	37,8	33,1	36,0	23,1	48,6
3	9,5	9,8	20,3	30,7	12,7	26,7	25,0	17,9
4	2,7	1,2	5,9	20,5	33,9	16,0	26,3	13,4
5	0,5	0,0	1,3	0,0	2,5	8,0	3,1	1,7
6+	0,0	0,6	0,0	1,6	4,2	0,0	3,8	1,4
Respuestas no numéricas	3,2	1,2	3,9	1,6	5,9	5,3	11,3	4,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Número de mujeres	222	164	153	127	118	75	160	1 018
Promedio ideal de hijos ²								
Promedio para todas las mujeres	1,8	2,0	2,3	2,7	3,0	2,7	3,0	2,4
Número de mujeres	215	162	147	125	111	71	142	972
Promedio para las actualmente unidas	2,1	2,1	2,3	2,7	3,1	2,7	3,1	2,6
Número de mujeres unidas	20	119	133	120	101	68	127	687

¹ Incluye el embarazo actual.

² Excluye las entrevistadas que dieron respuesta no numérica.

Cuadro 7.6 Promedio ideal de hijos, según característica seleccionadas

Promedio ideal de hijos para todas las mujeres entrevistadas, por edad, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Edad de la mujer							Total mujeres 15-49
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
Area de residencia								
Urbana	1,9	2,1	2,1	2,3	2,6	2,7	2,6	2,2
Rural	1,8	2,1	2,6	2,7	2,9	2,9	3,1	2,5
Nivel de educación								
Sin educación	2,0	2,1	2,5	2,9	3,0	2,9	2,9	2,8
Primaria	1,6	2,1	2,7	2,7	2,9	2,6	2,9	2,4
Secundaria	2,0	2,0	2,3	2,7	2,9	3,3	2,7	2,3
Superior	2,0	2,2	2,0	2,1	2,2	2,5	3,6	2,2
Total	1,8	2,1	2,4	2,6	2,8	2,8	2,9	2,4

7.4 PLANIFICACIÓN DE LA FECUNDIDAD

Para cada hijo nacido en los cinco años anteriores a la encuesta y para el embarazo actual, cuando era aplicable, se preguntó a la mujer si ese embarazo en particular, fue planeado o lo hubiera deseado para algún tiempo posterior o definitivamente fue un embarazo no deseado. A diferencia de la información ya presentada sobre deseo futuro de más hijos o tamaño ideal de la familia, las

preguntas sobre fecundidad deseada se refieren al pasado y por lo tanto conllevan riesgos de memoria y de veracidad o de racionalización de la respuesta frente a hechos ya consumados y de trascendencia afectiva. A pesar de estas limitaciones, es posible obtener un indicador del grado de éxito logrado por la pareja en el control reproductivo en los años recientes. La información también es útil para calibrar el efecto sobre la fecundidad de la prevención de los nacimientos no deseados, aunque éstos probablemente estén subestimados.

En el Cuadro 7.7 se presenta la distribución de todos los nacimientos ocurridos durante los cinco años antes de la encuesta, más los embarazos actuales, de acuerdo a las intenciones reproductivas de la mujer al momento de embarazarse, según orden del nacimiento y edad de la madre al nacimiento.

Cuadro 7.7

Planificación de la fecundidad

- En el Departamento de Apurímac, la proporción de los nacimientos ocurridos en los cinco años precedentes a la

encuesta, no deseados en ese momento, sino que hubieran querido ser postergados es de 31 por ciento y el de los no deseados es 28 por ciento.

- El porcentaje de hijos no deseados aumenta con el orden de nacimiento y la edad de la madre al nacimiento del hijo.
- El mayor porcentaje de mujeres que desearon tener al hijo en el momento de su concepción, se presenta en el nacimiento del primer hijo (55%), luego va disminuyendo a medida que va aumentando el orden de nacimientos.

Cuadro 7.7 Planificación de la fecundidad

Distribución porcentual de los nacimientos en los cinco años que precedieron la encuesta y embarazos actuales, por intención reproductiva de la madre, según edad de la madre y orden de nacimiento, Apurímac 2000

Edad de la madre y orden del nacimiento	Intención reproductiva			Total	Número de nacimientos ¹
	Lo quería entonces	Lo quería después	No quería más		
Orden de nacimiento					
1	55,1	42,2	2,7	100,0	187
2	51,4	37,0	11,6	100,0	138
3	48,2	32,1	19,6	100,0	112
4+	25,6	20,2	54,2	100,0	312
Edad al nacimiento					
<19	47,4	44,7	7,9	100,0	114
20-24	46,5	39,5	14,0	100,0	215
25-29	42,5	25,1	32,3	100,0	167
30-34	40,0	25,2	34,8	100,0	135
35-39	28,9	14,5	56,6	100,0	76
40-44	15,2	15,2	69,7	100,0	33
45-49	*	*	*	*	9
Total	41,1	30,6	28,3	100,0	748

Nota: **Orden de nacimiento** incluye el embarazo actual.

¹ Número de nacimientos más embarazos actuales

*: Menos de 20 casos.

7.5 TASAS DE FECUNDIDAD DESEADA

Con el fin de medir el impacto de los nacimientos no planeados sobre el nivel de la fecundidad, se obtiene una tasa global de fecundidad considerando solamente los nacimientos deseados. Las tasas de fecundidad

deseada están basadas en los nacimientos ocurridos en los 36 meses anteriores a la encuesta, excluyendo el mes de la entrevista¹. Las tasas de fecundidad deseada expresan el nivel de fecundidad que teóricamente resultaría si todos los nacimientos no deseados pudiesen ser prevenidos.

¹ Para la definición de si el nacimiento fue deseado o no, se sigue el método de Lightbourne (1985), mediante el cual un nacimiento se considera deseado si el número de hijos sobrevivientes en el momento del embarazo es menor que el número ideal de hijos tal como lo informó la entrevistada.

Cuadro 7.8 y Gráfico 7.1

Tasas de fecundidad deseada


- En el departamento de Apurímac, la tasa global de fecundidad real es mayor a la tasa global de fecundidad deseada. Puesto que la tasa global de fecundidad sería de 2.5 hijos en promedio por mujer si todos los nacimientos no deseados pudiesen ser prevenidos. Como a la fecha
- no lo son, la tasa global observada es de 4.2 hijos en promedio por mujer; es decir, 1.7 hijos más que los deseados.
- Si todos los nacimientos no deseados pudiesen ser prevenidos, las mayores reducciones en el nivel de fecundidad se darían entre las mujeres con educación primaria y en las mujeres que residen en el área rural (2.1 hijos respectivamente).

Cuadro 7.8 Fecundidad deseada y observada

Tasa global de fecundidad (TGF) deseada y observada para los tres años que precedieron a la encuesta, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	TGF	
	Deseada	Observada
Area de residencia		
Urbana	2,2	3,2
Rural	2,6	4,7
Nivel de educación		
Sin educación	2,3	4,3
Primaria	2,7	4,8
Secundaria	2,3	3,3
Superior	2,3	2,9
Total	2,5	4,2

Nota: Las tasas se calcularon a partir de los nacimientos ocurridos a las mujeres de 15-49 años durante el período de 1-36 meses antes de la encuesta. Las tasas globales de fecundidad son las mismas presentadas en el cuadro 4.2.



VIII. MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ

VIII. MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ

Al igual que en las ENDES anteriores, en la ENDES 2000 se obtuvo la historia de nacimientos de cada una de las mujeres entrevistadas, en la que se averiguó el sexo, fecha de nacimiento, edad actual y la condición de sobrevivencia de cada hijo e hija nacidos vivos. En el caso de los nacidos vivos que fallecieron, se registró la edad a la que ocurrió el deceso, con tres variantes:

- En días para niños que murieron en el primer mes de vida
- En meses para los que perecieron entre 1 y 23 meses
- En años para los que fallecieron después de cumplir los 2 años

8.1 MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ

Los datos recolectados en las historias de nacimientos permiten calcular para períodos determinados, las siguientes probabilidades de morir:¹

Mortalidad Neonatal: Probabilidad de morir durante el primer mes de vida (MN).

Mortalidad Infantil: Probabilidad de morir durante el primer año de vida (1q0).

Mortalidad post- infantil: Probabilidad condicional de morir entre el primero y el quinto aniversario (4q1).

Mortalidad en la niñez: Probabilidad de morir antes de cumplir 5 años (5q0).

Al igual que las otras variables demográficas, la mortalidad está sujeta a errores de declaración. La confiabilidad de las estimaciones de la mortalidad depende de los niveles de omisión de hijos que fallecieron al poco tiempo de nacer, especialmente cuando la defunción ocurrió bastante tiempo antes de la encuesta. Es importante, de igual manera, la calidad diferencial de la declaración de las fechas de nacimiento de hijos sobrevivientes e hijos muertos. Otro error que puede ocurrir es la declaración errónea de la fecha de defunción del hijo. En encuestas de otros países se ha observado una tendencia en las madres a redondear hacia un año (12 meses) la edad del hijo al morir, aún cuando el niño hubiera fallecido no exactamente a los 12 meses sino en meses próximos a esa edad. Este redondeo hace que en el mes 12 se produzca una gran concentración de defunciones. Cuando el traslado de las muertes ocurridas a los 10 u 11 meses de vida hacia el año, es grande, se origina una subestimación de la mortalidad infantil y la sobreestimación de la mortalidad de la niñez. En el caso de la ENDES 2000, al igual que en las ENDES anteriores, no hay evidencias significativas de desplazamientos de edades al fallecer informadas para los menores de 1 año hacia los 12 meses o más en las declaraciones referidas a los 5 años anteriores a la encuesta.

¹ Las estimaciones de mortalidad no son tasas sino probabilidades calculadas siguiendo los procedimientos estándar de tablas. Para cada período calendario se tabulan las muertes y las personas expuestas para los intervalos de edad en meses: 0, 1-2, 3-5, 6-11, 12-23, 24-35, 36-47, 48-59, para luego calcular probabilidades de sobrevivencia en cada intervalo de edad. Finalmente se calculan las probabilidades de morir multiplicando las respectivas probabilidades de sobrevivir y restando de 1. Una descripción detallada del método para calcular las probabilidades de morir se encuentra en Rutstein (1984).

Niveles y Tendencias de la Mortalidad Infantil y en la Niñez

En el cuadro 8.1 se presentan estimaciones de la mortalidad infantil y en la niñez para varios quinquenios anteriores a la ENDES 2000, calculadas a partir de la historia de nacimientos y defunciones obtenida en las entrevistas a mujeres de 15 a 49 años de edad.

Cuadro 8.1

- De cada 1000 niños que nacieron en el departamento de Apurímac durante 1995-2000, murieron 37 antes de cumplir su primer año de vida. La tasa de mortalidad infantil evidencia una reducción de 62 por ciento respecto a la estimada para el período 1990-95 (99 por mil).
- La reducción de la mortalidad durante el primer año de vida ha sido mayor en el período postneonatal, es decir entre el
- segundo y el onceavo mes de vida, al pasar de 46 defunciones por cada mil nacidos vivos en el quinquenio 1990-1995 a 11 en el quinquenio 1995-2000, para una reducción del 76 por ciento. La mortalidad neonatal, por otra parte disminuyó en 50 por ciento al pasar de 53 a 26 defunciones por cada mil nacidos vivos.
- La probabilidad de que un niño muera, en el departamento de Apurímac antes de cumplir los 5 años de vida ha disminuido de 123 a 59 defunciones por mil nacidos vivos en los quinquenios 1990-95 y 1995-2000, disminución que es del orden de 52 por ciento.
- La disminución de la mortalidad en la niñez, entre los dos últimos períodos quinquenales, ha sido mayor en los menores de un año (62%) que entre los menores de 5 años (52%).

Cuadro 8.1 Mortalidad infantil y en la niñez para varios quinquenios

Mortalidad infantil y en la niñez para varios quinquenios anteriores a la encuesta, Apurímac 2000

Años antes de la encuesta	Neonatal (MN)	Postneonatal (MPN)	Infantil (1q0)	Post infantil (4q1)	En la niñez (5q0)
0-4	26,3	10,9	37,2	22,9	59,2
5-9	53,1	45,9	98,9	26,7	123,0
10-14	70,3	36,5	106,8	43,6	145,7
15-19	57,0	64,2	121,2	40,8	157,0
20-24	70,4	87,0	157,5	79,4	224,4

8.2 DIFERENCIALES DE LA MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ

Para el análisis de los diferenciales de la mortalidad es recomendable ampliar el período de referencia hacia los 10 años anteriores a la encuesta, especialmente a nivel departamental.

Cuadro 8.2

- La tasa de mortalidad infantil y de la niñez es menor para los niños de madres con educación superior.

- La tasa de mortalidad infantil es mayor en los niños que en las niñas (86 y 56 respectivamente). Según el orden de nacimiento la tasa de mortalidad infantil es mayor cuando el orden de siete a más.
- Cuando se analizan los resultados por edad de la madre al nacer el hijo se encuentra alto riesgo de mortalidad para niños de madres de 40 a 49 años (84 por mil).
- Comparando la mortalidad infantil entre los niños de las madres de 40 a 49 años y las menores de 20 años se observa una diferencia de 27 fallecidos menores de un año.
- En el análisis según la amplitud del tiempo transcurrido entre un nacimiento y otro (intervalo de nacimiento) se aprecia otro aspecto en el que se vinculan estrechamente la fecundidad y la mortalidad infantil. Cuando el intervalo es corto, el tiempo disponible para la recuperación de la madre es también corto, es poco el tiempo que puede dispensar para el cuidado del hijo, fomentando inclusive una corta lactancia que afecta la nutrición del niño. Los resultados confirman que el riesgo de muerte es mayor cuando el intervalo es menor a 2 años (157 por mil). Este riesgo de mortalidad es más de 4 veces mayor que el observado cuando el intervalo es de por lo menos cuatro años (34 por mil).

Cuadro 8.2 Mortalidad infantil y en la niñez en los diez años anteriores a la encuesta, según características seleccionadas

Tasas de mortalidad infantil y en la niñez para los diez años anteriores a la encuesta, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Neonatal (MN)	Postneonatal (MPN) ¹	Infantil (1q0)	Post infantil (4q1)	En la niñez (5q0)
Sexo del niño					
Hombre	50,1	36,3	86,4	26,0	110,2
Mujer	32,0	23,7	55,7	23,6	78,0
Edad de la madre al nacimiento					
<20	23,3	33,4	56,7	36,1	90,8
20-29	36,8	33,6	70,4	19,6	88,6
30-39	55,7	21,9	77,6	31,2	106,4
40-49	55,6	28,4	84,0	0,0	84,0
Orden del nacimiento					
Primer nacimiento	19,6	27,7	47,3	36,9	82,5
2-3	39,5	34,9	74,4	13,4	86,8
4-6	48,3	30,5	78,8	28,4	104,9
7+	58,0	23,0	81,1	25,0	104,0
Nivel de Educación					
Sin Educación	54,7	34,7	89,4	24,8	112,0
Primaria	41,5	35,0	76,5	28,9	103,2
Secundaria	28,6	19,7	48,3	21,8	69,0
Superior	25,0	4,3	29,3	0,0	29,3
Intervalo con nacimiento previo					
<2	87,7	69,0	156,8	29,6	181,7
2 años	35,5	14,6	50,1	18,3	67,4
3 años	34,4	13,7	48,1	17,0	64,3
4 años y más	19,6	14,0	33,6	18,2	51,2
Total	41,0	30,0	71,0	24,7	93,9

¹ Calculada como la diferencia entre la tasa de mortalidad infantil y la neonatal

8.3 LA MORTALIDAD PERINATAL

La distinción entre un nacido muerto y una muerte neonatal no es fácil de hacer y requiere que la madre recuerde a menudo síntomas de vida después del parto. Las causas de mortinatos y de muertes neonatales están correlacionadas y si solo se examina una de ellas se puede subestimar el nivel de la mortalidad perinatal. En la ENDES 2000 se recolectó información sobre mortinatos a partir de enero de 1995, en el calendario de eventos incluido al final del cuestionario. En el cuadro 8.3 se detallan los resultados, se incluye el número de nacidos muertos (muertes fetales en embarazos de 7 ó más meses de duración), las

muertes neonatales tempranas (aquellas ocurridas entre nacidos vivos durante la primera semana), el número de embarazos de 28 semanas o más de gestación y la tasa de mortalidad perinatal. Esta se calcula como la suma de nacidos muertos y las muertes neonatales tempranas dividida por los embarazos de 7 ó más meses de duración.

Cuadro 8.3

Mortalidad perinatal para los cinco años anteriores a la encuesta

- La tasa de mortalidad perinatal es de 25 defunciones por mil embarazos de 7 o más meses de duración.

Cuadro 8.3 Mortalidad perinatal, según características seleccionadas

Número de nacidos muertos y tasa de mortalidad perinatal para los cinco años anteriores a la encuesta, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Número de nacidos muertos ¹	Número de muertes neonatales tempranas ²	Tasa de mortalidad perinatal	Número de embarazos de 7 y más meses de duración
Edad de la madre al nacimiento				
<20	0	1	27,0	38
20-29	0	1	8,9	116
30-39	0	2	41,9	66
40-49	1	1	*	14
Intervalo con el embarazo previo				
1er embarazo	0	1	18,0	58
<15 meses	0	1	*	7
15-26 meses	0	1	24,2	57
27-38 meses	0	1	7,6	45
39+ meses	1	1	25,4	68
Nivel de educación				
Sin educación	0	1	42,0	41
Primaria	1	2	25,1	124
Secundaria	0	1	14,9	46
Superior	0	1	(14,5)	24
Total	1	5	25,0	235

*: Menos de 20 casos.

(): Entre 20 y 24 casos.

- La mortalidad perinatal en el caso de las madres que tenían de 20 a 29 años al momento del nacimiento es especialmente baja (9 por mil) en comparación a los otros grupos de edad.
- Los niveles más bajos de mortalidad los presentan las mujeres que tuvieron un intervalo de 27 a 38 meses con el nacimiento previo (8 por mil).
- La madre tiene menos de 18 años al momento de nacimiento del niño.
- La madre tiene 35 o más años al momento de nacimiento del niño.
- El intervalo intergenésico es menor de 24 meses.
- El orden de nacimiento es mayor de 3.

8.4 GRUPOS DE ALTO RIESGO REPRODUCTIVO

El estudio de la mortalidad también puede emprenderse a través de las categorías de alto riesgo de mortalidad en la población, no solo desde el punto de vista de los niños nacidos vivos sino desde el punto de vista del grupo de mujeres cuyos hijos se encuentran en categorías de alto riesgo de mortalidad en el futuro. El cuadro 8.4 contiene el porcentaje de niños nacidos en los últimos 5 años en grupos de alto riesgo de mortalidad y el porcentaje de mujeres en unión en riesgo de concebir un niño con alto riesgo de mortalidad, según categorías. La razón de riesgo en la segunda columna del cuadro 8.4; se define como el cociente entre: (1) la proporción de niños muertos en los últimos 5 años entre aquellos nacidos en una categoría específica de riesgo y (2) la proporción de niños muertos entre aquellos nacidos de mujeres en ninguna categoría de riesgo elevado. Los primeros nacimientos de mujeres de 18 y 34 años constituyen una categoría especial de riesgo no evitable.

Normalmente se consideran como de riesgo elevado los nacimientos que ocurren en las siguientes condiciones:

Tomando en cuenta estos grupos se construyen categorías especiales de riesgo combinando dos o más de ellos. Por otro lado, las mujeres se asignan a una categoría dada dependiendo de la situación en que se encontrarían en el momento del nacimiento del niño si éste fuese concebido en el mes de la entrevista.

Cuadro 8.4

Categorías de alto riesgo reproductivo

- Más de la mitad de los nacimientos de los últimos cinco años (56%) en el departamento de Apurímac, ocurrieron en alguna condición de alto riesgo reproductivo. Estos niños tendrían más del doble de riesgo de morir en los primeros cinco años de vida con respecto a los hijos de madres con ninguna categoría de riesgo elevado.
- El 34 por ciento del total de nacimientos que ocurrieron en alto riesgo reproductivo son nacimientos de orden mayor a 3 (22%), o nacimientos de madres mayores de 34 años y al mismo tiempo de orden mayor a 3 (12%).

Cuadro 8.4 Categorías de alto riesgo reproductivo


Porcentaje de niños nacidos en los cinco años anteriores a la encuesta en categorías de riesgo elevado de mortalidad y porcentaje de mujeres en unión en riesgo de concebir un hijo con riesgo elevado de mortalidad, por categoría de riesgo, Apurímac 2000

Categoría de riesgo	Porcentaje de nacimientos	Razón de riesgo	Porcentaje de mujeres en unión
En ninguna categoría de riesgo elevado	23,6	1,0	31,9
Categoría de Riesgo Inevitable ¹	20,1	1,2	3,6
Total en Categoría de Riesgo Elevado	56,3	2,2	64,6
<i>En una sola categoría de riesgo elevado</i>	35,5	2,0	26,1
Madre menor de 18 años (Edad<18)	5,2	1,1	0,1
Madre mayor de 34 años (Edad>34)	1,3	0,0	3,2
Intervalo de nacimiento <24 meses (IN< 24)	6,9	5,1	8,3
Orden de nacimiento mayor de 3 (ON >3)	22,0	1,3	14,5
<i>En varias categorías de riesgo</i>	20,8	2,6	38,5
Edad <18 & IN de <24 ²	0,3	0,0	0,1
Edad >34 & IN<24	0,0	-	0,1
Edad >34 & ON >3	12,4	3,3	28,7
Edad >34 & IN <24 & ON >3	2,5	2,4	3,2
IN <24 & ON >3	5,6	1,1	6,3
Total	100,0	-	100,0
Número de nacimientos	676	-	724

¹Incluye los primeros nacimientos a mujeres entre 18 y 34 años

² Incluye las categorías combinadas edad <18 y ON >3

- : No aplicable



IX. SALUD MATERNO INFANTIL

IX. SALUD MATERNO INFANTIL

Los problemas de salud materno-infantil merecen preferente atención en el Perú debido a su estructura demográfica con predominancia de niños. Los niveles de fecundidad son todavía altos en comparación con otros países vecinos, son altos también la prevalencia de enfermedades endémicas y el rebrote de otras que habían casi desaparecido. Los cuadros de morbilidad infantil están muy relacionados con las condiciones de vida, la contaminación ambiental y con algunos patrones culturales que tienen que ver con la forma como se valora la vida de un niño, y por otro, con el papel que se le reconoce a la mujer en la vida nacional.

En el Perú no hay estadísticas continuas que permitan ver de manera confiable la evolución de la salud de la población; más bien el panorama se ha agravado en los últimos años con los recortes del gasto público en términos reales, que han ocasionado un deterioro de los servicios estadísticos del Ministerio de Salud y de los organismos vinculados con el sector social en general. La ENDES 2000 contiene una cantidad apreciable de información sobre aspectos relacionados con la salud materno-infantil que permite llenar, en parte, el vacío existente.

En este capítulo se presentan los resultados referidos a temas tales como: la atención prenatal, la asistencia durante el parto, el cuidado post parto, la cobertura de las vacunas, y la prevalencia y tratamiento de ciertas enfermedades, especialmente la diarrea e infecciones de las vías respiratorias. El objetivo básico es el de identificar los grupos más vulnerables y así contribuir para la planificación de los programas de salud materno-infantil.

9.1 ATENCIÓN PRENATAL Y ASISTENCIA EN EL PARTO

La cobertura y calidad de la atención prenatal y durante el parto constituyen factores estrechamente ligados a la salud materno-infantil y son, por lo tanto, elementos que deben ser tomados en cuenta al evaluar la situación general de salud del país. En ENDES 2000 se les preguntó a las mujeres si ciertas situaciones eran para ella un gran problema o no en caso de que se enfermara y quisiera recibir tratamiento médico. También se averiguó, para los últimos nacimientos ocurridos en los cinco años precedentes a la encuesta, si la madre había recibido el toxoide antitetánico y si había tenido atención prenatal y durante el parto, al igual que el lugar de ocurrencia del parto.

Atención Prenatal

Los resultados a las preguntas sobre la percepción de problemas en el acceso a los servicios de salud se presentan en el Cuadro 9.1 por características seleccionadas. En el Cuadro 9.2 se presenta la distribución porcentual de los últimos nacimientos en los cinco años que precedieron la encuesta, por tipo de cuidado prenatal, según edad de la madre y orden de nacimiento, al igual que por lugar de residencia y nivel de educación. El contenido de la atención (tipo de servicios) se detalla en el Cuadro 9.3. En el Gráfico 9.1 se presenta información sobre las visitas prenatales y los meses de embarazo a la primera visita.

Cuadro 9.1

Percepción del acceso a servicios como un gran problema

- El 80 por ciento de las mujeres entrevistadas tiene al menos un problema para buscar consejo o tratamiento médico. El problema económico "conseguir dinero para el tratamiento" (72%) es el motivo principal por el cual el mayor porcentaje de mujeres del departamento de Apurímac tienen dificultad para acceder a los servicios de salud. Asimismo, problemas referente a la falta de personal femenino de salud y la accesibilidad geográfica (la "distancia al establecimiento de salud", (37% para cada caso) y la "dificultad en el transporte", para acceder a establecimientos de salud (32%), son problemas que presentan importante porcentaje de mujeres.
- El problema de orden económico es reportado por 80 por ciento o más entre las mujeres con 5 o más hijos, las divorciadas, separadas, las que residen en el área rural, entre las que no tienen educación y las que no reciben remuneración por su trabajo.
- El problema de confianza "no hay personal de salud femenino", es más frecuente entre las mujeres de 15 a 19 años (58%), sin hijos (55%), solteras (56%), las residentes en el área rural (42%), entre las que tienen educación primaria y las que trabajan sin paga (40% para ambos casos).

Cuadro 9.1 Percepción del acceso a los servicios de salud como un gran problema

Porcentaje de mujeres que percibieron el acceso a los servicios de salud como un gran problema, por tipo de problema y características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Tipo de problema de acceso a los servicios de salud							Por lo menos un problema	Número de mujeres
	Saber donde ir	Conseguir permiso para ir	Conseguir dinero para el tratamiento	La distancia al establecimiento de salud	Tener que tomar transporte	No querer ir sola	No hay personal de salud femenino		
Edad									
15-19	30,1	35,5	68,8	37,1	34,9	45,2	57,5	81,2	186
20-29	25,0	14,0	70,9	31,4	28,5	21,5	34,6	78,5	344
30-39	21,6	12,4	73,5	37,1	30,2	18,2	31,3	79,7	291
40-49	29,3	13,6	75,3	44,4	35,4	20,7	28,8	79,8	198
Número de hijos vivos									
0	28,2	32,0	64,7	32,8	32,4	41,9	55,2	78,8	241
1-2	22,3	12,9	68,7	31,3	26,5	18,4	29,4	75,8	310
3-4	26,9	12,6	75,2	38,7	31,5	17,6	30,3	80,3	238
5+	27,0	13,0	81,3	45,7	37,4	22,6	33,9	84,8	230
Estado conyugal									
Soltera	28,6	30,0	66,5	30,8	29,1	41,0	55,5	78,9	227
Casada	24,4	13,5	72,3	37,4	31,6	20,1	31,0	78,5	724
Divorciada, separada, viuda	31,3	16,4	89,6	47,8	38,8	19,4	34,3	94,0	67
Área de residencia									
Urbana	10,6	12,3	52,6	15,4	14,0	16,4	23,5	63,5	293
Rural	32,0	19,4	80,0	45,2	38,6	28,1	42,0	86,1	725
Nivel de educación									
Sin educación	25,0	13,4	87,2	56,7	43,9	26,2	34,1	88,4	164
Primaria	30,0	16,7	79,5	39,1	36,3	27,5	40,4	84,7	443
Secundaria	22,8	21,4	65,6	28,4	24,2	24,6	38,2	76,1	285
Superior	18,9	15,7	41,7	20,5	15,0	13,4	23,6	58,3	127
Trabajo actual									
No trabaja	18,6	16,1	63,7	27,0	22,1	18,9	35,5	69,1	366
Trabaja por dinero	30,0	17,7	72,4	34,1	31,3	23,9	36,5	81,4	457
Trabaja sin paga	29,7	19,0	87,7	60,5	49,7	37,9	39,5	95,4	195
Total	25,8	17,4	72,1	36,6	31,5	24,7	36,7	79,6	1 018

Nota: No se calcula la distribución para menores de 25 años

Cuadro 9.2 y Gráficos 9.1 , 9.1a

Cuidado prenatal

- El 91 por ciento de los últimos nacimientos menores de cinco años recibió asistencia prenatal. El 47 por ciento de atenciones prenatales fueron realizadas por profesionales de salud, el 43 por ciento por enfermeras o técnicos (incluyendo a promotores de salud).
- Con relación a la atención prenatal según área de residencia, cabe resaltar que el mayor porcentaje de mujeres del área urbana es atendida por obstetrices o médicos (80%), mientras que en el área rural la asistencia por este personal llega a 39 por ciento en tanto que 50 por ciento es atendida por técnicos de la salud.
- Con respecto al nivel de educación se observa que a medida que el nivel aumenta, el porcentaje de mujeres que se atiende, ya sea por médicos y obstetrices, también aumenta, en cambio 22 por ciento de las mujeres que no tienen nivel educativo no reciben atención, proporción que es algo más del triple de las mujeres con educación superior.

Cuadro 9.2 Atención prenatal para los menores de cinco años

Distribución porcentual de últimos nacimientos en los cinco años que precedieron la encuesta, por persona que proporcionó el cuidado prenatal, según características seleccionadas, Apurímac 2000



Características	Persona que proporcionó atención prenatal ¹				No recibió atención prenatal	Sin Información	Total	Número de nacimientos
	Médico	Obstetriz	Enfermera/ Sanitario/ Promotora	Otra				
Edad de la madre al nacimiento								
<20	18,7	37,3	34,7	1,3	8,0	0,0	100,0	75
20-34	11,7	34,6	45,2	0,9	7,3	0,3	100,0	341
35+	12,6	30,5	40,0	2,1	14,7	0,0	100,0	95
Orden del nacimiento								
Primer nacimiento	17,4	43,9	30,3	0,8	7,6	0,0	100,0	132
2-3	14,9	36,4	40,3	1,9	6,5	0,0	100,0	154
4-5	10,0	29,0	55,0	0,0	6,0	0,0	100,0	100
6+	8,0	25,6	48,8	1,6	15,2	0,8	100,0	125
Área de residencia								
Urbana	26,7	53,3	11,4	0,0	8,6	0,0	100,0	105
Rural	9,4	29,3	50,7	1,5	8,9	0,2	100,0	406
Nivel de educación								
Sin educación	4,5	15,9	54,5	2,3	21,6	1,1	100,0	88
Primaria	10,6	33,5	49,2	0,8	5,9	0,0	100,0	254
Secundaria	14,3	43,8	33,9	1,8	6,3	0,0	100,0	112
Superior	33,3	47,4	12,3	0,0	7,0	0,0	100,0	57
Número de decisiones en que la mujer tiene la última palabra								
0	*	*	*	*	*	*	*	6
1-2	14,0	24,0	50,0	2,0	10,0	0,0	100,0	50
3-4	15,0	31,6	43,6	0,0	9,8	0,0	100,0	133
5+	11,5	37,3	41,0	1,6	8,4	0,3	100,0	322
Número de razones que justifican que esposa se niegue a tener relaciones								
0	6,8	22,7	45,5	2,3	22,7	0,0	100,0	44
1-2	9,8	12,2	65,9	0,0	12,2	0,0	100,0	41
3-4	13,8	37,6	40,1	1,2	7,0	0,2	100,0	426
Total	12,9	34,2	42,7	1,2	8,8	0,2	100,0	510

Nota: Las estimaciones se refieren a los nacimientos en el período 0-59 meses que precedieron la encuesta, incluyéndose así los nacimientos en el mes de la entrevista. Sólo se incluye el último nacimiento de la mujer.

¹ Si la entrevistada mencionó más de una fuente de atención, se considera sólo la más calificada

*: Menos de 20 casos.

- Por otro lado, entre las madres de los nacidos vivos en los últimos 5 años que no recibieron atención prenatal destacan las mujeres de 35 años y más de edad, las que tienen de 6 a más hijos.
- Para el 73 por ciento, de los nacidos vivos en los cinco años precedentes a la encuesta las madres tuvieron de 4 a más visitas prenatales. El 80 por ciento de las primeras visitas prenatales fueron antes de los seis meses.



Cuadro 9.3

Contenido de la atención

- Las acciones más frecuentes en la atención prenatal son el control del peso, la medición de la barriga (altura uterina) y
- El control del peso, medición de la altura uterina en la atención prenatal y el control

de la presión arterial (98% en cada una). Al 86 por ciento de las madres le explicaron los síntomas o complicaciones del embarazo.

de la presión arterial aumentan según avanza la edad de las mujeres y es mayor en las que tienen educación secundaria a más o entre las residentes del área urbana.

- Entre las mujeres a quienes le explicaron sobre los síntomas y complicaciones del embarazo, en su mayoría son las de 20 a 34 años, las que cuentan con embarazos

de primer orden y las que tienen educación superior.

- A cinco de cada seis madres le aplicaron la vacuna antitetánica, dos de cada tres recibió pastillas de hierro. A un 41 por ciento le tomaron muestra de orina y a 38 por ciento le tomaron muestra de sangre.

Cuadro 9.3 Contenido de la atención prenatal para menores de 5 años

Porcentaje de últimos nacimientos en los 5 años anteriores a la encuesta para quienes las madres recibieron atención prenatal durante el embarazo, por contenido de la atención y características seleccionadas. Apurímac 2000

Características	Contenido de la atención								Número de nacimientos
	Le explicaron síntomas y complicaciones	La pesaron	Le midieron la barriga	Le tomaron presión arterial	Le tomaron muestra de orina	Tomaron muestra de sangre	Le pusieron la vacuna contra el tétano	Recibió pastillas de hierro	
Edad de la madre al nacimiento									
<20	82,6	95,7	94,2	94,2	42,0	40,6	79,7	63,8	69
20-34	88,6	98,4	98,4	98,1	43,2	40,0	87,0	68,3	315
35+	77,8	100,0	100,0	98,8	32,1	28,4	81,5	63,0	81
Orden del nacimiento									
1	95,1	99,2	98,4	97,5	55,7	52,5	85,2	73,8	122
2-3	85,4	97,9	97,2	97,9	49,3	43,8	84,7	63,9	144
4-5	79,8	97,9	97,9	96,8	29,8	31,9	85,1	68,1	94
6+	81,0	98,1	99,0	98,1	22,9	19,0	84,8	61,0	105
Area de residencia									
Urbana.	89,6	100,0	99,0	100,0	79,2	74,0	85,4	68,8	96
Rural	84,8	97,8	97,8	97,0	31,2	28,7	84,8	66,1	369
Nivel de educación									
Sin educación.	77,9	97,1	97,1	92,6	25,0	19,1	83,8	61,8	68
Primaria.	84,1	97,9	97,1	97,5	31,8	31,4	85,4	66,5	239
Secundaria.	91,4	100,0	100,0	100,0	54,3	43,8	85,7	67,6	105
Superior	92,5	98,1	100,0	100,0	77,4	81,1	83,0	71,7	53
Total	85,8	98,3	98,1	97,6	41,1	38,1	84,9	66,7	465

Nota: Las estimaciones se refieren a los nacimientos en el período 1-59 meses que precedieron la encuesta, excluyéndose así los nacimientos en el mes de la encuesta. Sólo se incluye el último nacimiento de la mujer

Toxoide Antitetánico

Las condiciones de higiene e inmunización que rodean el parto, sobre todo en lo que se refiere a los instrumentos utilizados para el corte del cordón umbilical, especialmente en el área rural, hacen que en el departamento de Apurímac sea necesaria la aplicación de la vacuna antitetánica durante la gestación, para prevenir al niño de contraer el tétanos neo-natal

al momento del alumbramiento. Sin embargo, los resultados de encuestas anteriores permitieron concluir que, de manera general, en el país no había una política de aplicación de la vacuna antitetánica, a menos que las mujeres no estuviesen enteradas de su objetivo al momento de su aplicación. Se concluyó entonces que por dichas razones era importante identificar los grupos de riesgo para orientar las campañas y reducir así la morbi-mortalidad infantil.

Como parte de la información sobre las condiciones de salud de los menores de cinco años, en la ENDES 2000 se preguntó a las madres si ellas recibieron una vacuna contra el tétanos durante la etapa de la gestación. En el Cuadro 9.4 se presenta la información de acuerdo con el número de dosis para grandes grupos de edad de las madres, orden de nacimiento, lugar de residencia y nivel de educación.

Cuadro 9.4

Vacunación contra el tétanos neonatal

- Entre los nacimientos de los 5 años anteriores a la ENDES 2000, el 85 por

ciento recibió protección contra el tétanos neonatal mientras la madre estaba embarazada, la mayoría de ellas con dos dosis o más (59%). Entre los embarazos de alto riesgo por edad u orden de nacimiento, los menos protegidos son los hijos de madres mayores de 34 años y los niños de orden 6 ó más: el 19 por ciento y el 17 por ciento de ellos, respectivamente, no recibió protección contra el tétano neonatal.

- Según nivel educativo, la proporción de nacimientos cuya madre recibió la vacuna antitetánica es mayor entre las madres con educación secundaria (86%).

Cuadro 9.4 Vacuna contra el tétanos neonatal

Distribución porcentual de últimos nacimientos en los cinco años que precedieron la encuesta por número de vacunas del toxoide tetánico durante el embarazo, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Número de vacunas contra el tétano				Total	Número de nacimientos
	Ninguna	Una dosis	Dos dosis o más	No sabe/ Sin información		
Edad de la madre al nacimiento						
<20	14,0	23,7	57,0	5,4	100,0	93
20-34	14,4	23,5	61,1	1,0	100,0	298
35+	18,9	24,3	55,4	1,4	100,0	74
Orden del nacimiento						
Primer nacimiento	15,0	23,1	59,4	2,5	100,0	160
2-3	16,8	26,7	54,2	2,3	100,0	131
4-5	10,5	21,1	67,1	1,3	100,0	76
6+.	16,5	22,7	59,8	1,0	100,0	97
Area de residencia						
Urbana	14,6	21,9	61,5	2,1	100,0	96
Rural	15,2	24,1	58,8	1,9	100,0	369
Nivel de educación						
Sin educación	16,2	23,5	55,9	4,4	100,0	68
Primaria	14,6	23,0	60,7	1,7	100,0	239
Secundaria	14,3	25,7	60,0	0,0	100,0	105
Superior	17,0	22,6	56,6	3,8	100,0	53
Total	15,1	23,7	59,4	1,9	100,0	465

Nota: Las estimaciones se refieren a los nacimientos en los 1-59 meses que precedieron la encuesta. Solamente se incluyen los últimos nacimientos a madres que recibieron control prenatal.

9.2 ASISTENCIA DEL PARTO

Lugar de Ocurrencia del Parto

La información sobre el lugar de ocurrencia del parto para los últimos nacimientos en los cinco años anteriores a la ENDES 2000 se resume en el Cuadro 9.5 por características seleccionadas: edad de la madre, orden de nacimiento, lugar de residencia, nivel de educación y número de visitas prenatales.

Cuadro 9.5

Lugar de ocurrencia del parto

- El 50 por ciento de los últimos nacimientos menores de cinco años fueron partos domiciliarios y el 49 por ciento ocurrió en un servicio de salud.

- El porcentaje de últimos nacimientos ocurridos en el domicilio es mayor en las madres de 35 años a más de edad al nacimiento del hijo y entre los nacimientos de sexto o mayor orden de nacimiento.
- Dicho porcentaje es mayor, también en el área rural (60%) y en las mujeres sin nivel educativo (77%).
- Entre los nacimientos ocurridos en un servicio de salud; los más altos porcentajes se encuentran entre las madres menores de 20 años (53%), cuando el nacimiento ha sido el primero (74%), nacimientos de madres que viven en el área urbana (89%) y nacimientos de madres que tienen educación superior (97%).

Cuadro 9.5 Lugar del parto para los nacimientos en los últimos cinco años

Distribución porcentual de últimos nacimientos en los cinco años que precedieron la encuesta, por lugar de ocurrencia del parto, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	En servicio de salud	En la casa	Otro lugar	Total	Número de nacimientos
Edad de la madre al nacimiento					
<20	53,3	46,7	0,0	100,0	75
20-34	50,7	48,7	0,6	100,0	341
35+	41,1	58,9	0,0	100,0	95
Orden del nacimiento					
Primer nacimiento	73,5	26,5	0,0	100,0	132
2-3	50,6	48,7	0,6	100,0	154
4-5	39,0	60,0	1,0	100,0	100
6+	30,4	69,6	0,0	100,0	125
Area de residencia					
Urbana	88,6	11,4	0,0	100,0	105
Rural	39,2	60,3	0,5	100,0	406
Nivel de educación					
Sin educación	22,7	77,3	0,0	100,0	88
Primaria	40,6	58,7	0,8	100,0	254
Secundaria	66,1	33,9	0,0	100,0	112
Superior	96,5	3,5	0,0	100,0	57
Número de visitas prenatales					
Ninguna	24,4	73,3	2,2	100,0	45
1-3 visitas	29,1	70,9	0,0	100,0	86
4+ visitas	57,3	42,4	0,3	100,0	375
No sabe/sin información	*	*	*	*	5
Total	49,3	50,3	0,4	100,0	510

Nota: Las estimaciones se refieren a los nacimientos en los 1-59 meses que precedieron la encuesta. Solamente se incluyen los últimos nacimientos a madres que recibieron control prenatal.

*: Menos de 20 casos.

Tipo de Asistencia Durante el Parto

Cuadro 9.6

En el Cuadro 9.6 se presenta la distribución porcentual de nacimientos que ocurrieron en los cinco años que precedieron a la encuesta, por tipo de asistencia durante el parto, según edad de la madre al nacimiento, orden de nacimiento, atención prenatal, indicadores de autonomía de la mujer, lugar de residencia y educación.

Tipo de atención durante el parto

- El 38 por ciento de nacimientos fueron atendidos por profesionales de la salud y el 17 por ciento por enfermeras o técnicos de la salud.

Cuadro 9.6 Atención durante el parto para los menores de cinco años de edad, por características seleccionadas

Distribución porcentual de nacidos en los cinco años que precedieron la encuesta, por persona que proporcionó la atención durante el parto según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Asistencia durante el parto ¹					No recibió atención durante el parto	Sin información	Total	Número de nacimientos
	Médico	Obstetriz	Enfermera/ Sanitario/ Promotora	Comadrona/ Partera	Pariente/ otro				
Edad de la madre al nacimiento									
<20	22,5	14,4	13,5	27,0	21,6	0,9	0,0	100,0	111
20-34	24,3	14,5	18,6	23,9	18,0	0,4	0,2	100,0	456
35+	20,0	15,5	15,5	28,2	17,3	3,6	0,0	100,0	110
Orden del nacimiento									
1	36,3	21,6	12,9	17,0	11,7	0,6	0,0	100,0	171
2-3	26,1	15,1	19,3	20,6	18,3	0,5	0,0	100,0	218
4-5	13,3	13,3	21,5	28,9	22,2	0,7	0,0	100,0	135
6+	13,7	7,2	15,7	37,3	22,9	2,6	0,7	100,0	153
Area de residencia									
Urbana	51,5	32,8	3,7	5,2	5,2	0,7	0,7	100,0	134
Rural	16,4	10,1	20,6	30,0	21,7	1,1	0,0	100,0	542
Nivel de educación									
Sin educación	11,0	5,9	14,4	31,4	34,7	2,5	0,0	100,0	118
Primaria	15,7	10,7	19,9	32,9	19,9	0,6	0,3	100,0	356
Secundaria	32,1	25,4	19,4	11,9	9,7	1,5	0,0	100,0	134
Superior	66,7	29,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	69
Número de decisiones en que la mujer tiene la última palabra²									
0	*	*	*	*	*	*	*	*	8
1-2	9,6	11,0	21,9	30,1	27,4	0,0	0,0	100,0	73
3-4	25,6	12,2	12,8	26,1	22,8	0,6	0,0	100,0	180
5+	24,8	16,6	18,5	23,8	14,7	1,4	0,2	100,0	416
Número de razones que justifican que esposa se niegue a tener relaciones³									
0	9,5	11,1	25,4	23,8	28,6	1,6	0,0	100,0	63
1-2	12,0	2,0	28,0	40,0	16,0	2,0	0,0	100,0	50
3-4	25,9	16,1	15,4	23,9	17,6	0,9	0,2	100,0	563
Número de visitas prenatales⁴									
Ninguna	17,8	11,1	6,7	37,8	24,4	2,2	0,0	100,0	45
1-3 visitas	14,0	12,8	11,6	27,9	32,6	1,2	0,0	100,0	86
4+ visitas	30,7	17,3	21,1	18,4	11,7	0,8	0,0	100,0	375
No se pregunto	13,3	10,2	13,9	36,1	24,7	1,2	0,6	100,0	166
No sabe/sin información	*	*	*	*	*	*	*	*	5
Total	23,3	14,6	17,3	25,1	18,5	1,0	0,1	100,0	676

Nota: Las estimaciones se refieren a los nacimientos en el período 0-59 meses que precedieron la encuesta, incluyéndose así los nacimientos en el mes de la entrevista. Se incluyen todos los nacimientos en los cinco años.

¹ Si la entrevistada mencionó más de una fuente de atención, se considera sólo la más calificada

² Decisiones: el cuidado de su salud, compras grandes del hogar, compras para necesidades diarias, visitas a familia/amigos, la comida del día.

³ Razones: sabe que él tiene ETS, sabe que él tiene otra mujer, parto reciente, estar casada o no estar de humor.

⁴ Sólo se hizo la pregunta para los últimos nacimientos

*: Menos de 20 casos.

- Vale resaltar que a pesar que en el departamento de Apurímac, el mayor porcentaje de nacimientos de los 5 años anteriores a la encuesta han tenido control prenatal por profesionales de la salud, sin embargo y 25 por ciento de nacimientos fueron atendidos por una partera empírica y 19 por ciento por una pariente u otra persona.
- La atención del parto por un pariente u otra persona fue mayor en las mujeres menores de 20 años edad al tener el hijo, en los nacimientos de sexto orden o más, en las mujeres que habitan el área rural (22%) y en las que no tienen educación (35%).

Características del Parto

En la ENDES 2000 se preguntó, para cada nacimiento ocurrido después de enero de 1995, sobre el peso al nacer y si el nacimiento fue por cesárea. Los resultados se presentan en el Cuadro 9.7 y en el Cuadro 9.8 se detallan las complicaciones durante el parto según el tipo de atención, para últimos nacidos vivos menores de 5 años.

Cuadro 9.7

Características del parto: nacimientos por cesárea

- Sólo el 6 por ciento del total de nacimientos de los últimos 5 años fue por cesárea. Los nacimientos por cesárea son más frecuentes cuando la madre tiene de 20 a

34 años al nacer el hijo; así también, el porcentaje de estos nacimientos es mayor en los primogénitos, en las madres del área urbana y en las que tienen educación superior.

Características del parto: peso del niño al nacer

- El 67 por ciento de los nacidos vivos en los últimos 5 años fue pesado al nacer, esta proporción es mayor en los hijos de las mujeres que tienen el primer hijo, las que viven en el área urbana y tienen nivel de instrucción superior.
- Aproximadamente 6 por ciento de los nacimientos ocurridos en los últimos cinco años tendrían bajo peso al nacer, es decir, menos de 2 kilos y medio. El menor porcentaje de niños con bajo peso al nacer son los que ocupan el sexto o más orden de nacimiento (4%), los hijos de las mujeres de edades extremas (5% para cada caso), y en los hijos de las mujeres sin educación (3%), en tanto que el área de residencia no establece gran diferencia.
- La mayor proporción de nacidos vivos en los últimos 5 años que no fueron pesados al nacer corresponde: a aquellos de madres menores de 20 años de edad a los nacimientos de 6º orden o más, a hijos de madres residentes en el área rural y a hijos de madres que no tienen nivel de educación.
- El 56 por ciento de los niños nacidos vivos en los últimos cinco años tendrían un peso igual ó mayor a 2 kilos y medio.

Cuadro 9.7 Características del parto: nacimientos por cesárea y peso al nacer para los menores de cinco años

Porcentaje de partos por cesárea, y distribución porcentual de todos los nacimientos por peso al nacer de los menores de 5 años, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Porcentaje de nacimiento por cesárea	Distribución porcentual por peso al nacer				Total	Número de nacimientos
		No fue pesado	<2.5 kg.	2.5+ kg.	No sabe/sin información		
Edad de la madre al nacimiento							
<20	5,4	40,5	4,5	51,4	3,6	100,0	111
20-34	7,2	30,5	7,2	58,8	3,5	100,0	456
35+	2,7	39,1	4,5	50,9	5,5	100,0	110
Orden del nacimiento							
1	10,5	25,1	5,3	66,1	3,5	100,0	171
2-3	8,7	30,3	6,4	60,1	3,2	100,0	218
4-5	3,0	32,6	10,4	54,1	3,0	100,0	135
6+	0,7	48,4	3,9	41,8	5,9	100,0	153
Area de residencia							
Urbana	15,7	8,2	6,7	82,8	2,2	100,0	134
Rural	3,9	39,8	6,3	49,7	4,2	100,0	542
Nivel de educación							
Sin educación	1,7	61,9	2,5	28,8	6,8	100,0	118
Primaria	3,1	36,5	6,7	53,1	3,7	100,0	356
Secundaria	7,5	17,9	8,2	70,1	3,7	100,0	134
Superior	27,5	0,0	7,2	92,8	0,0	100,0	69
Total	6,2	33,5	6,4	56,3	3,8	100,0	676

Nota: Las estimaciones se refieren a los nacimientos en el período 0-59 meses que precedieron la encuesta, incluyéndose así los nacimientos en el mes de la entrevista. Se incluyen todos los nacimientos.

Cuadro 9.8Complicaciones durante el parto

- El 39 por ciento de los nacimientos ocurridos en los últimos cinco años tuvo alguna complicación durante el parto, siendo las más frecuentes el "parto prolongado" (27%) el "sangrado excesivo" (20%) en menores proporciones, la fiebre alta con sangrado vaginal (10%). En menor proporción se presentó las "convulsiones" (4%) u otras.
- Los que tuvieron atención prenatal y a la vez tuvieron atención durante el parto tuvieron complicaciones en mayor proporción que el resto (45%).
- El tipo de complicación es variado, para los últimos nacidos vivos en los cinco años anteriores a la encuesta, los que tuvieron atención prenatal y atención en el parto la complicación más frecuente fue parto prolongado (33%).

Cuadro 9.8 Complicaciones durante el parto

Últimos nacimientos en los cinco años anteriores a la encuesta: Porcentaje de madres que tuvieron complicaciones durante el parto, según atención prenatal y durante el parto, Apurímac 2000

Cuidado médico materno	Complicación durante el parto ¹					Ninguna complicación	Número de nacidos vivos ²
	Parto prolongado	Sangrado excesivo	Fiebre alta con sangrado vaginal	Convulsiones	Otras		
Prenatal y parto	32,6	21,0	12,9	5,6	5,2	55,4	233
Prenatal	21,4	17,9	8,3	2,8	5,5	66,2	145
Parto	28,3	15,2	6,5	0,0	2,2	60,9	46
Ninguno	21,8	20,7	5,7	1,1	4,6	66,7	87
Total	27,2	19,6	9,8	3,5	4,9	60,9	510

Nota: La atención se refiere a aquella recibida por médico, obstetriz, enfermera, partera entrenada; o a la

¹ Las entrevistadas pueden presentar más de una complicación

² Incluye los nacimientos en el mes de la entrevista; clínica, centro o puesto de salud

9.3 CUIDADO POSTNATAL DE LAS MADRES

En la ENDES 2000 se averiguó si, como consecuencia del parto, la madre tuvo problemas durante los 40 días siguientes al parto, tales como sangrado intenso de la vagina, desmayo o pérdida de conciencia, fiebre, temperatura alta o escalofríos, infección de los senos, dolor y ardor al orinar, flujos o líquidos vaginales o pérdida involuntaria de orina. A quienes tuvieron por lo menos uno de los problemas se les preguntó si recibieron atención médica. Los resultados se presentan en los Cuadros 9.9 (problemas postnatales) y 9.10 (atención médica) para el último nacimiento de cada mujer. Para quienes no tuvieron el nacimiento en una institución de salud, el Cuadro 9.11 detalla el momento del primer control postnatal.

Cuadro 9.9

Problemas experimentados durante el postparto

- En el departamento de Apurímac, los problemas de salud más frecuentes que se presentaron durante los 40 días después del parto fueron: dolor al orinar (20%), "fiebre alta o escalofríos" y "flujos vaginales" (16% en cada uno) "infección de los senos" y "desmayo" en similar porcentaje (9%). En menor proporción se dieron casos de: "sangrado intenso por la vagina" (8%) y "pérdida de orina" (7%).
- Tanto el dolor al orinar como la fiebre o escalofríos y los flujos vaginales, fueron los problemas post natales más frecuentes entre las madres de 35 a más años de edad y en las madres de los hijos del sexto orden o más y en las residentes en el área rural.

Cuadro 9.9 Problemas postnatales por características seleccionadas

Entre los últimos nacimientos en los cinco años antes de la encuesta, porcentaje para quienes las madres tuvieron problemas durante los 40 días después del parto, según característica seleccionadas, Apurímac 2000

Característica	Tipo de problema postnatal							Número de nacimientos
	Sangrado intenso por la vagina	Desmayo o pérdida de conciencia	Fiebre alta/escalofríos	Infección de los senos	Dolor/ardor al orinar	Flujos o líquidos vaginales	Pérdida involuntaria de orina	
Edad de la madre al nacimiento								
<20	5,3	4,0	14,7	8,0	20,0	17,3	4,0	75
20-34	6,7	8,8	15,0	8,5	19,1	13,5	6,5	341
35+	13,7	12,6	21,1	13,7	22,1	22,1	9,5	95
Orden del nacimiento								
Primer nacimiento	6,1	4,5	15,2	12,1	19,7	15,9	6,1	132
2-3	4,5	5,2	11,7	6,5	16,2	11,0	3,9	154
4-5	7,0	14,0	19,0	9,0	20,0	16,0	8,0	100
6+.	14,4	13,6	20,0	10,4	24,0	20,8	9,6	125
Area de residencia								
Urbana.	2,9	4,8	10,5	9,5	15,2	9,5	4,8	105
Rural	9,1	9,9	17,5	9,4	20,9	17,2	7,1	406
Nivel de educación								
Sin educación.	10,2	9,1	13,6	8,0	17,0	6,8	5,7	88
Primaria.	8,3	10,6	18,1	7,5	19,7	19,7	6,3	254
Secundaria.	6,3	6,3	15,2	13,4	21,4	12,5	8,9	112
Superior	5,3	5,3	12,3	12,3	21,1	17,5	5,3	57
Total	7,8	8,8	16,0	9,4	19,8	15,7	6,7	510

Nota: Las estimaciones se refieren a los nacimientos en el período 0-59 meses que precedieron la encuesta, incluyéndose así los nacimientos en el mes de la entrevista. Sólo se incluye el último nacimiento de la mujer.

Cuadro 9.10

Atención recibida para alguno de los problemas experimentados durante el postparto

- El porcentaje de atenciones postnatales en el departamento de Apurímac es de 51 por ciento. Las mujeres de 20 a 34 años fueron las que mayor atención médica postnatal recibieron.
- En los últimos nacimientos ocurridos en los cinco años anteriores a la encuesta, los problemas que con mayor frecuencia recibieron atención médica fueron: infección de los senos (65%), sangrado intenso por la vagina (63%), fiebre o escalofríos (62%), desmayo (60%) y dolor al orinar (51%).
- Por otro lado, la pérdida involuntaria de la orina y flujos vaginales, presentados durante el postparto son las complicaciones que en menor porcentaje recibió atención médica (50 y 49%, respectivamente).
- La atención médica a las madres por "infección de los senos" fue más frecuente en las menores de 20 años (83%), en los nacimientos de primer orden (88%) y en las mujeres que tienen educación superior (86%). Estos mismos subgrupos de población tuvieron mayor porcentaje de atención para los problemas de fiebre o escalofríos, dolor al orinar, flujos vaginales ó pérdida de orina durante el período de referencia.

Cuadro 9.10 Atención médica para los problemas postnatales

Entre los últimos nacimientos en los cinco años antes de la encuesta para quienes las madres tuvieron problemas postnatales específicos, porcentaje que recibió atención médica, según característica seleccionadas, Apurímac 2000

Característica	Tipo de problema postnatal							Total con algún tratamiento
	Sangrado intenso por la vagina	Desmayo o pérdida de conciencia	Fiebre alta/escalofríos	Infección de los senos	Dolor/ardor al orinar	Flujos o líquidos vaginales	Pérdida involuntaria de orina	
Edad de la madre al nacimiento								
<20	50,0	66,7	72,7	83,3	53,3	61,5	66,7	50,0
20-34	65,2	63,3	64,7	72,4	49,2	45,7	54,5	54,1
35+	61,5	50,0	50,0	38,5	52,4	47,6	33,3	41,9
Orden del nacimiento								
Primer nacimiento	75,0	83,3	90,0	87,5	76,9	66,7	75,0	67,3
2-3	42,9	62,5	55,6	60,0	32,0	52,9	33,3	41,7
4-5	42,9	42,9	47,4	55,6	30,0	25,0	50,0	44,2
6+	72,2	64,7	56,0	46,2	56,7	46,2	41,7	49,1
Area de residencia								
Urbana	66,7	80,0	63,6	60,0	62,5	60,0	60,0	54,8
Rural	62,2	57,5	62,0	65,8	48,2	47,1	48,3	50,0
Nivel de educación								
Sin educación	22,2	50,0	25,0	28,6	26,7	33,3	40,0	24,0
Primaria	71,4	59,3	60,9	68,4	46,0	38,0	43,8	52,3
Secundaria	85,7	71,4	82,4	66,7	62,5	71,4	50,0	51,2
Superior	66,7	66,7	85,7	85,7	75,0	80,0	100,0	77,8
Total	62,5	60,0	62,2	64,6	50,5	48,8	50,0	50,8

Nota: Las estimaciones se refieren a los nacimientos en el período 0-59 meses que precedieron la encuesta, incluyéndose así los nacimientos en el mes de la entrevista. Sólo se incluye el último nacimiento de la mujer.

Cuadro 9.11

Asistencia postnatal y persona que brindó la atención postnatal

- En el departamento de Apurímac, las madres de más de 3 de cada 10 de los últimos nacimientos ocurridos en los 5 años anteriores a la encuesta que no tuvieron lugar en un establecimiento, no tuvieron control postnatal (36%).
- De los nacimientos que no fueron atendidos en un establecimiento de salud pero cuyas madres sí tuvieron atención postnatal (64%), el mayor porcentaje fue atendido por enfermeras, sanitarios o promotores (43%).
- Las madres de los nacidos vivos que no recibieron atención postnatal, se caracterizan por haber tenido de 35 a más años al nacer el hijo (46%), ser madres de nacimientos del sexto orden o mayor (41%). La menor proporción de madres que no recibieron atención postnatal fueron las de nivel secundario.

Cuadro 9.11 Proveedores de atención posnatal para los menores de cinco años

Distribución porcentual de últimos nacimientos que no ocurrieron en establecimientos de salud por persona que proporcionó la atención postnatal, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Característica	Persona que proporcionó atención postnatal ¹				No tuvo control postnatal	Total	Número de nacimientos
	Médico	Obstetriz	Enfermera	Comadrona			
Edad de la madre al nacimiento							
<20	5,7	11,4	42,9	5,7	34,3	100,0	35
20-34	4,2	12,5	45,8	4,8	32,7	100,0	168
35+	8,9	7,1	35,7	1,8	46,4	100,0	56
Orden del nacimiento							
Primer nacimiento	2,9	11,4	57,1	5,7	22,9	100,0	35
2-3	6,6	13,2	34,2	6,6	39,5	100,0	76
4-5	1,6	8,2	55,7	3,3	31,1	100,0	61
6+	8,0	11,5	36,8	2,3	41,4	100,0	87
Número de decisiones en que la mujer tiene la última palabra							
0	*	*	*	*	*	*	4
1-2	6,7	3,3	46,7	3,3	40,0	100,0	30
3-4	5,7	11,4	44,3	4,3	34,3	100,0	70
5+	5,2	12,9	41,3	4,5	36,1	100,0	155
Número de razones que justifican que esposa se niegue a tener relaciones							
0	0,0	3,2	22,6	6,5	67,7	100,0	31
1-2	6,5	19,4	25,8	3,2	45,2	100,0	31
3-4	6,1	11,2	49,2	4,1	29,4	100,0	197
Area de residencia							
Urbana	*	*	*	*	*	*	12
Rural	5,3	10,9	43,7	4,5	35,6	100,0	247
Nivel de educación							
Sin educación	4,4	5,9	33,8	5,9	50,0	100,0	68
Primaria	4,0	12,6	47,0	2,6	33,8	100,0	151
Secundaria	13,2	15,8	47,4	5,3	18,4	100,0	38
Superior	*	*	*	*	*	*	2
Total	5,4	11,2	43,2	4,2	35,9	100,0	259

Nota: Las estimaciones se refieren a los nacimientos en el período 0-59 meses que precedieron la encuesta, incluyéndose así los nacimientos en el mes de la entrevista. Sólo se incluye el último nacimiento de la mujer.

¹ Si la entrevistada mencionó más de una fuente de atención, se considera sólo la más calificada

*: Menos de 20 casos.

9.4 SÍNTOMAS QUE LLEVAN A BUSCAR AYUDA MÉDICA

A las madres con niños menores de cinco años viviendo con ellas se les preguntó por los síntomas que consideraban como razones para llevar al niño a un establecimiento de salud inmediatamente. Las razones mencionadas incluyen: el niño no puede beber o lactar, se pone más enfermo, le da fiebre, diarrea o vómito, tiene respiración agitada, tiene dificultad para respirar o tiene deposiciones con sangre. Los resultados se presentan en el Cuadro 9.12.

Cuadro 9.12

- Los síntomas que alarman con mayor frecuencia a las madres para que lleven a sus niños inmediatamente a un establecimiento de salud son la presencia

de fiebre, diarrea o vómito (81%). Otros síntomas que ellas señalan en proporción importante es si "se pone más enfermo" (45%). La "respiración rápida" (20%) y "dificultad para respirar" (14%). Son síntomas mencionados por menores proporciones de madres para llevar a los niños menores de 5 años a un establecimiento de salud y menos aún si "hace deposiciones con sangre" (5%). "come o bebe poco"(3%) ó "no puede beber o lactar" (2%).

- La presencia de "fiebre, diarrea y vómito" como síntomas de alarma para que las madres los lleven a un establecimiento de salud, es mayor en madres de que alcanzaron educación superior (90%). También es expresado con mayor frecuencia en las madres cuyos hijos son de 6 a 11 meses (88%) en similar

Cuadro 9.12 Síntomas que conllevan a la madre a buscar ayuda médica inmediata

Porcentaje de madres con niños menores de 5 años de edad que viven con ella, por los síntomas que considera como razón para llevar su niño a un establecimiento de salud inmediatamente, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Característica	No puede beber o lactar	Se pone más enfermo	La da fiebre/diarrea/vómito	Tiene respiración rápida	Tiene dificultad para respirar	Tiene deposición con sangre	Come o bebe poco	No sabe/ sin información	Número de madres
Edad del niño									
<6 meses	6,9	24,1	69,0	24,1	17,2	6,9	3,4	13,8	29
6-11 meses	6,3	37,5	87,5	21,9	15,6	3,1	0,0	6,3	32
12-23 meses	0,0	42,4	87,1	17,6	17,6	4,7	3,5	0,0	85
24-35 meses	3,4	54,5	78,4	17,0	12,5	6,8	2,3	2,3	88
36-47 meses	0,8	43,9	80,5	22,0	15,4	4,1	1,6	0,8	123
48-59 meses	2,1	49,0	80,7	18,6	9,0	4,8	3,4	0,0	145
Sexo del niño									
Hombre	2,0	46,1	80,7	18,9	11,8	5,1	3,1	2,0	254
Mujer	2,4	44,8	81,5	20,2	15,3	4,8	2,0	1,6	248
Orden del nacimiento									
Primer nacimiento	1,8	44,0	81,9	19,9	10,8	2,4	1,2	3,6	166
2-3	4,2	39,4	81,7	24,6	22,5	7,0	2,8	2,1	142
4-5	1,1	56,3	81,6	21,8	12,6	5,7	3,4	0,0	87
6+.	0,9	46,7	78,5	10,3	6,5	5,6	3,7	0,0	107
Area de residencia									
Urbana.	3,8	45,2	88,5	36,5	25,0	5,8	0,0	1,0	104
Rural	1,8	45,5	79,1	15,1	10,6	4,8	3,3	2,0	398
Nivel de educación									
Sin educación.	0,0	49,4	75,3	9,4	4,7	4,7	3,5	2,4	85
Primaria.	1,6	45,8	80,1	13,5	12,7	4,4	2,4	1,6	251
Secundaria.	5,5	45,9	83,5	29,4	14,7	5,5	3,7	2,8	109
Superior	1,8	36,8	89,5	42,1	28,1	7,0	0,0	0,0	57
Total	2,2	45,4	81,1	19,5	13,5	5,0	2,6	1,8	501

porcentaje para los de 12 a 23 meses (87%) y en las residentes del área urbana (89%).

- El motivo "se pone más enfermo" es expresado con mayor frecuencia en las madres cuyos hijos son: de 24 a 35 meses de edad (55%), de 4° a 5° orden de nacimiento (56%) y madres que no tienen nivel de educación (49%). La diferencia entre las que habitan en el área urbana y rural es mínima (45% y 46% respectivamente).

9.5 VACUNACIÓN

En ENDES 2000 se averiguó también sobre la historia de vacunación de los menores de cinco años. Se prestó atención a vacunas contra las enfermedades que configuran los principales cuadros de morbilidad infantil: tuberculosis (BCG); difteria, tos ferina y tétanos (DPT); polio; y sarampión.

A las entrevistadas que tuvieron hijos nacidos vivos en el período de los últimos 5 años se les solicitó mostrar la tarjeta de vacunaciones de cada uno de ellos a fin de registrar las vacunas que el niño había recibido y las fechas en que habían sido administradas. Cuando la madre no tenía la tarjeta, o por algún motivo no la mostraba, la encuestadora indagaba por si el niño había recibido o no las vacunas. Obviamente, los datos captados por este último medio son menos confiables, por estar sujetos a posibles errores de memoria y declaración. Al respecto, durante la recolección de información en las ENDES se ha descubierto que una gran proporción de tarjetas no obran en poder de la madre porque las escuelas, postas médicas o los centros de asistencia alimentaria,

las conservan como medida de control. Por otro lado, se debe señalar que las tarjetas de vacunaciones constituyen fuentes de datos sólo de mediana calidad porque son utilizadas fundamentalmente para fines de control administrativo y quienes las llenan no tienen los cuidados necesarios para asegurar su aprovechamiento para propósitos estadísticos.¹

Vacunación en Cualquier Momento

Para poder evaluar la situación reciente de la cobertura de las vacunaciones es necesario estandarizar a la población infantil en cuanto a sus edades. Hasta hace poco se utilizaban los niños de 12 a 23 meses como punto de referencia, pero debido a cambios recientes en el esquema de vacunación contra el sarampión, para la ENDES 2000 se ha escogido a los niños de 18-29 meses, porque se supone que a esa edad ya se deben haber recibido todas las vacunas, incluyendo la del sarampión. La información para estos niños se presenta en los Cuadros 9.13 a 9.14. En el Cuadro 9.13 se presentan, para cada vacuna, los resultados generales de cobertura en cualquier momento según la fuente de información. El Cuadro 9.14 presenta los niveles de vacunación en cualquier momento por características seleccionadas: sexo, orden de nacimiento, lugar de residencia y nivel educativo de la madre.

Cuadro 9.13

Vacunaciones por fuente de información

- El 65 por ciento de niños de 18 a 29 meses recibieron todas las vacunas, información recogida a través de la tarjeta de vacunación (48%) y por la madre (17%).

¹ En Endes 2000 fue común encontrar que las 3 dosis de las vacunas múltiples tenían la misma fecha de aplicación; ello se debía a que en los casos de tarjetas perdidas, el personal de la vacunación registraba la fecha en que aplicaba la vacuna y la repetía para las dosis que, según la madre, el niño ya hubiera recibido.

Cuadro 9.13 Vacunaciones en cualquier momento para los niños de 18-29 meses según fuente de información

Entre los niños de 18-29 meses de edad, porcentaje de niños que han recibido vacunas específicas en cualquier momento, según si la información proviene de la madre o del carné de vacunación, Apurímac 2000

Fuente de información	DPT ¹				Polio				Antisaram- pionosa	Todas las vacunas	Número de niños
	BCG	DPT 1	DPT 2	DPT 3	Al nacer	Polio 1	Polio 2	Polio 3			
Total	97,9	98,6	94,4	85,2	65,5	100,0	90,8	78,9	88,7	64,8	142
Según carné	54,2	54,2	53,5	52,8	50,7	54,2	54,2	53,5	48,6	47,9	77
Informe de la madre	43,7	44,4	40,8	32,4	14,8	45,8	36,6	25,4	40,1	16,9	65

¹ La cobertura de DPT para niños sin carné se asume la misma que para Polio, sobre la cual se preguntó específicamente a las madres.

Cuadro 9.14

Vacunaciones según sexo y orden de nacimiento, lugar de residencia y educación

- La mayor proporción de niños que recibieron todas las vacunas son las hijas mujeres (72%), los nacimientos de 1° orden (76%), y los residentes en el área rural (65%).

- Con relación a la cobertura promedio de las vacunas, el 98 por ciento de los niños de 18 a 29 meses han recibido la BCG, 99 por ciento la DPT1 y la totalidad la Polio1. Las proporciones de la tercera dosis DPT decaen (del 99% con DPT1 a 85% con DPT3). La polio1 fue recibida por el 100 por ciento, bajando considerablemente en la tercera dosis a 79 por ciento. En tanto que 89 por ciento fue vacunado contra el sarampión y el 66 por ciento recibió dosis de polio al nacer.

Cuadro 9.14 BCG, DPT, Polio y Sarampión: vacunación en cualquier momento de los niños de 18-29 meses, por sexo del niño y orden de nacimiento

Entre los niños de 18-29 meses de edad, porcentaje con carné de vacunación visto por la entrevistadora y porcentaje que recibió vacunas específicas en cualquier momento, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Característica	DPT ¹				Polio				Anti- saram- pionosa	Todas las vacunas ²	Porcentaje con tarjeta de vacunación	Número de niños
	BCG	DPT 1	DPT 2	DPT 3	Al nacer	Polio 1	Polio 2	Polio 3				
Sexo del niño												
Hombre	98,7	97,4	92,2	83,1	63,6	100,0	89,6	75,3	84,4	58,4	54,5	77
Mujer	96,9	100,0	96,9	87,7	67,7	100,0	92,3	83,1	93,8	72,3	53,8	65
Orden de nacimiento												
Primer nacimiento	100,0	100,0	94,7	89,5	78,9	100,0	89,5	81,6	94,7	76,3	60,5	38
2-3	98,0	98,0	96,0	84,0	68,0	100,0	92,0	76,0	94,0	58,0	50,0	50
4-5	(100,0)	(95,2)	(90,5)	(85,7)	(42,9)	(100,0)	(90,5)	(76,2)	(71,4)	(61,9)	(38,1)	21
6+	93,9	100,0	93,9	81,8	60,6	100,0	90,9	81,8	84,8	63,6	63,6	33
Area de residencia												
Urbana	(95,2)	(100,0)	(95,2)	(90,5)	(85,7)	(100,0)	(76,2)	(61,9)	(100,0)	(61,9)	(47,6)	21
Rural	98,3	98,3	94,2	84,3	62,0	100,0	93,4	81,8	86,8	65,3	55,4	121
Nivel de educación												
Sin educación	93,3	100,0	90,0	83,3	66,7	100,0	90,0	80,0	86,7	60,0	63,3	30
Primaria	98,7	98,7	96,0	84,0	62,7	100,0	92,0	78,7	86,7	61,3	54,7	75
Secundaria	(100,0)	(100,0)	(95,7)	(87,0)	(69,6)	(100,0)	(87,0)	(82,6)	(95,7)	(78,3)	(52,2)	23
Superior	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14
Total	97,9	98,6	94,4	85,2	65,5	100,0	90,8	78,9	88,7	64,8	54,2	142

Nota: La información proviene del carné de vacunación o del informe de la madre

¹ La cobertura de DPT para niños sin carné se asume la misma que para Polio, sobre la cual se preguntó específicamente a las madres.

² Excluye Polio al nacer pero incluye Sarampión.

*: Menos de 20 casos.

(): Entre 20 y 24 casos.

Vacunación a la Edad Apropiaada

La evolución de la cobertura de vacunación en los últimos 4 años se presenta en el cuadro 9.15. En el cuadro se muestra los porcentajes de niños vacunados a las edades apropiadas. Se entiende por "edad apropiada" el primer año de vida para la aplicación de la BCG, DPT y polio; y cualquier momento durante los primeros 18 meses de vida para la antisarampionosa. De esta manera se puede estudiar, que tanto se ha avanzado en la aplicación de las vacunas en los momentos recomendados, pues su retraso ocasiona que los niños de todas maneras corran los riesgos de contraer las enfermedades en cuestión.

Cuadro 9.15

Vacunaciones a la edad apropiada

- En los últimos cinco años, la inmunización de los niños a la edad apropiada tuvo un ligero incremento año a año en casi todos los tipos de vacunas recomendadas. La BCG pasó de 97 por ciento en los niños de 48 a 59 meses a 100 por ciento en los niños de 18 a 23 meses. La primera dosis de la DPT paso de 99 por ciento a 100 por ciento en las mismas cohortes de edad. Tuvieron incrementos más amplios la polio al nacer 42 por ciento a 77 por ciento, sarampión de 76 por ciento a 85 por ciento para los niños de 48 a 59 y los de 18 a 23 meses respectivamente.
- En el departamento de Apurímac, el porcentaje de niños que ha recibido las dosis recomendadas en el primer año de vida alcanza a 55 por ciento.

Cuadro 9.15 BCG, DPT, Polio y Sarampión: niños vacunados a la edad apropiada

Entre los niños de 18-59 meses de edad, porcentaje con carné de vacunación visto por la entrevistadora y porcentaje que recibió cada vacuna a la edad apropiada, según el carné de vacunación o el informe de la madre, por edad, Apurímac 2000

Edad actual	DPT ¹				Polio				Antisarampionosa	Todas las vacunas ²	Ninguna	Porcentaje con tarjeta de vacunación	Número de niños
	BCG	DPT 1	DPT 2	DPT 3	Al nacer	Polio 1	Polio 2	Polio 3					
18-23 meses	100,0	100,0	96,0	86,7	77,3	100,0	97,3	85,3	85,3	70,7	0,0	70,7	75
24-35 meses	97,5	97,5	89,2	80,0	60,8	98,3	81,7	73,3	85,4	58,6	0,0	41,7	120
36-47 meses	96,1	95,3	87,9	77,7	58,3	93,7	79,4	61,6	90,2	56,7	1,6	38,6	127
48-59 meses	97,3	99,3	84,3	64,6	41,8	97,9	78,4	52,7	76,3	39,8	0,7	23,3	146
Total	97,4	97,9	89,1	76,4	56,8	97,2	82,8	66,4	85,4	55,1	0,6	39,7	468

¹ La cobertura de DPT para niños sin carné se asume la misma que para Polio, sobre la cual se preguntó específicamente a las madres.

² Excluye Polio al nacer pero incluye Sarampión.

9.6 ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS

Junto con la diarrea y la desnutrición, las infecciones respiratorias agudas constituyen una de las principales causas de mortalidad en la infancia y la niñez en los países del Tercer Mundo. Por este motivo se considera importante medir su prevalencia e indagar acerca de las medidas que las madres toman en presencia de esta enfermedad. Para ello, en ENDES 2000

se preguntó a las entrevistadas si sus hijos habían tenido tos en las últimas 2 semanas. Si los niños habían padecido un episodio de tos, se preguntó si durante tal episodio el niño había mostrado dificultad en respirar o lo hacía con rapidez como síntomas de infección respiratoria aguda del tracto inferior (IRA).

En el Cuadro 9.16 se presenta información sobre la prevalencia y tratamiento de infecciones respiratorias agudas. Los

resultados se presentan por edad y sexo del niño, orden de nacimiento, lugar de residencia y nivel de educación. Debe recordarse que la información obtenida en ENDES 2000 corresponde al período comprendido entre el 18 de Julio y el 22 de Noviembre del 2000.

Cuadro 9.16 y Grafico 9.2

Prevalencia y tratamiento de las infecciones respiratorias agudas

- El 8 por ciento de los menores de cinco años presentó síntomas de infección respiratoria aguda (IRA) durante las dos semanas anteriores a la encuesta.
- La infección respiratoria aguda es menos frecuente entre los niños de 24 a 35 meses

(4%) y entre los de 48 a 59 meses (5%) y alcanza mayor frecuencia entre los niños de 12 a 23 meses de edad (13%).

- Asimismo, las IRA son más frecuentes en las niños que ocupan el 1° orden de nacimiento (10%) y en los niños de las madres con educación secundaria (12%).
- Según el sexo del niño y área de residencia, las infecciones respiratorias agudas se presentan en forma similar (8% para cada caso).
- En el departamento de Apurímac, el 74% de la población de los menores de cinco años que tuvieron tos y respiración agitada fueron llevados a un servicio de salud.

Cuadro 9.16 Prevalencia de infecciones respiratorias agudas para los menores de cinco años

Entre los niños menores de cinco años, porcentaje que estuvo enfermo con tos acompañada de respiración agitada durante las dos semanas que precedieron la encuesta, por características seleccionadas, Apurímac 2000

Característica	Prevalencia infección respiratoria aguda ¹	Total número de niños < de cinco años
Edad del niño		
<6 meses	11,3	62
6-11 meses	8,8	57
12-23 meses	13,2	136
24-35 meses	4,2	120
36-47 meses	8,7	127
48-59 meses	4,8	146
Sexo del niño		
Hombre	8,0	325
Mujer	8,4	323
Orden de nacimiento		
Primer nacimiento	10,2	166
2-3	7,2	208
4-5	8,3	133
6+	7,1	141
Área de residencia		
Urbana	7,7	130
Rural	8,3	517
Nivel de educación		
Sin educación	9,1	110
Primaria	6,8	340
Secundaria	12,3	130
Superior	5,9	68
Total	8,2	647

Nota: Las estimaciones se refieren a los niños nacidos en el período de 1-59 meses que precedieron la encuesta, excluyéndose así los nacidos en el mes de la entrevista.

¹ Tos con respiración agitada o rápida.





Gráfico 9.3

Razones para no llevar a un niño con IRA a un establecimiento de salud

- Las principales razones por la que las madres no llevan a sus niños a

un establecimiento de salud cuando tienen IRA son: porque la madre "sabe que hacer" (43%), "no pudo pagar" y "no era necesario" (21%). En menor proporción declararon no tener tiempo (7%).



9.7 PREVALENCIA Y TRATAMIENTO DE LA DIARREA

Es un hecho generalmente reconocido que en los países del Tercer Mundo la diarrea es muy prevalente y constituye una de las principales causas de muerte en los niños. En América Latina se sabe que la diarrea es la causa más frecuente de muerte por infección entre los menores de cinco años. Por otro lado, se ha podido constatar que la terapia de rehidratación oral, ya sea la solución casera con azúcar, agua y sal o los sobres de rehidratación, constituyen un medio efectivo y barato de impedir la muerte de los niños por deshidratación.

Uno de los objetivos de ENDES 2000 fue recolectar información sobre episodios de diarrea en las últimas dos semanas, entre los hijos actualmente vivos menores de 5 años de las mujeres entrevistadas, y también acerca del conocimiento para el cuidado y el tratamiento que recibieron los niños que habían sufrido algún episodio. Asimismo, sobre lo que hace usualmente la madre con las deposiciones del hijo menor cuando no usa el baño o letrina, comportamiento que repercute en las condiciones de higiene y de salud en el hogar.

Prevalencia de la Diarrea

La prevalencia de diarrea por edad, sexo del niño y orden de nacimiento, lugar de residencia y nivel de educación se detalla en el Cuadro 9.17.

Cuadro 9.17

Prevalencia de diarrea por edad, sexo y orden de nacimiento

- El 21 por ciento de los niños menores de 5 años, en el departamento de Apurímac, tuvieron diarrea en las dos semanas anteriores a la encuesta. Este problema, afectó en mayor porcentaje a los que tienen de 6 a 11 meses de edad (39%) y a los de 24 a 35 meses (33%).

- La prevalencia de la diarrea por sexo a nivel nacional es mayor en los niños que en las niñas, en el departamento de Apurímac esta situación es similar, la prevalencia de diarrea para los niños es más alta que para las niñas (24 y 19 por ciento, respectivamente).
- Según el área de residencia, la prevalencia de diarrea es similar en los niños que habitan el área urbana (22%) que los que habitan el área rural (21%).
- La diarrea tiene menor prevalencia entre los hijos de madres sin educación (19%) y es mayor en los hijos de madres con educación superior (24%).

Cuadro 9.17 Prevalencia de diarrea para los menores de cinco años

Entre los niños menores de cinco años, porcentaje que tuvo diarrea en las dos semanas que precedieron la encuesta, por características seleccionadas, Apurímac 2000

Característica	Todo tipo de diarrea	Número de niños
Edad del niño		
<6 meses	12,9	62
6-11 meses	38,6	57
12-23 meses	28,7	136
24-35 meses	33,3	120
36-47 meses	13,4	127
48-59 meses	7,5	146
Sexo del niño		
Hombre	23,7	325
Mujer	18,6	323
Área de residencia		
Urbana.	21,5	130
Rural	21,0	517
Nivel de educación		
Sin educación.	19,1	110
Primaria.	20,6	340
Secundaria.	23,1	130
Superior	23,5	68
Total	21,1	647

Nota: Las estimaciones se refieren a los niños nacidos en el período de 1-59 meses que precedieron la encuesta, excluyéndose así los nacidos en el mes de la entrevista.

Conocimiento del Cuidado de la Diarrea

En el Perú, como en la mayoría de los países latinoamericanos, se han llevado a cabo campañas para promover el conocimiento y uso de los sobres de sales de rehidratación oral. De igual forma para el otorgamiento de más cantidad de líquidos y de sólidos durante la diarrea. Al igual que en ENDES anteriores, en ENDES 2000 se consideró importante evaluar la cobertura de ese conocimiento entre las madres de niños menores de 5 años, que son aquellas que más probablemente necesitarán recurrir a esa terapia. El conocimiento de las sales y de las prácticas adecuadas de tratamiento para prevenir la deshidratación se detalla en el Cuadro 9.18.

Cuadro 9.18

Conocimiento de terapias de rehidratación oral y aplicación del patrón adecuado de alimentación para el cuidado de la diarrea

- El 73 por ciento de las madres de niños menores de cinco años conocen los paquetes de sales de rehidratación oral (SRO). Esta proporción es mayor en las madres mayores de 20 años.
- El conocimiento de las SRO es también más frecuente en las madres de los niños de segundo a quinto orden de nacimiento (76%), en las residentes del área urbana (86%) y directamente proporcional al nivel de educación de las madres, en las que alcanzaron superior (98%).

Cantidad de líquidos y sólidos que dieron al niño con diarrea

- Mas de 6 de cada 10 niños con diarrea recibieron líquidos en la cantidad recomendada (64%), en menos cantidad recibió el 18 por ciento y la misma cantidad de lo habitual el 16 por ciento.
- Los niños que mayor cantidad de líquido recibieron cuando estuvieron con diarrea, fueron los de segundo a tercer orden de nacimiento (68%) y los residentes en el área urbana (82%).
- Los alimentos sólidos presentan proporciones diferentes a la ingesta de líquidos en los niños con diarrea. En el departamento de Apurímac, se encontró que a 55 por ciento de los niños se le dio menor cantidad de alimentos sólidos que lo habitual, la misma cantidad a 26 por ciento, en mayor cantidad a 13 por ciento y a 7 por ciento no se les dio alimentos sólidos durante el episodio de diarrea.
- Las menores proporciones de niños que recibieron menos cantidad de alimentos sólidos corresponden a los de madres de 20 a 34 años al tener el hijo (50%), a los de segundo a tercer orden (40%), los residentes del área rural (51%) y los hijos de las mujeres con educación secundaria (50%).

Cuadro 9.18 Conocimiento de SRO y aplicación del patrón adecuado de alimentación para el cuidado de la diarrea por características seleccionadas

Porcentaje de madres con nacimiento en los cinco años anteriores a la encuesta que conocen de SRO y distribución porcentual de niños con diarrea según cantidad de alimentos recibidos durante la diarrea, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Característica	Conoce SRO		Cantidad de líquidos y de sólidos recibidos durante la diarrea									
	Porcentaje que conoce SRO	Número de madres	Cantidad de líquidos				Cantidad de sólidos				Total	Número de niños
			Nada	Menos cantidad	Misma cantidad	Más cantidad	Nada	Menos cantidad	Misma cantidad	Más cantidad		
Edad de la madre al nacimiento												
<20	35,3	34	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16
20-34	75,4	342	2,1	16,7	17,7	63,5	4,2	50,0	28,1	17,7	100,0	96
35+	74,8	135	4,0	16,0	8,0	72,0	12,0	68,0	20,0	0,0	100,0	25
Orden del nacimiento												
Primer nacimiento	67,6	170	0,0	17,5	17,5	65,0	7,5	57,5	25,0	10,0	100,0	40
2-3	76,2	143	2,6	10,5	18,4	68,4	7,9	39,5	36,8	15,8	100,0	38
4-5	75,9	87	3,2	25,8	12,9	58,1	0,0	64,5	12,9	22,6	100,0	31
6+.	73,0	111	3,6	21,4	14,3	60,7	10,7	60,7	25,0	3,6	100,0	28
Area de residencia												
Urbana.	85,7	105	0,0	3,6	14,3	82,1	0,0	67,9	25,0	7,1	100,0	28
Rural	69,2	406	2,8	22,0	16,5	58,7	8,3	51,4	25,7	14,7	100,0	109
Nivel de educación												
Sin educación.	58,0	88	(4,8)	(23,8)	(14,3)	(57,1)	(4,8)	(66,7)	(23,8)	(4,8)	(100,0)	21
Primaria.	69,7	254	2,9	24,3	18,6	54,3	7,1	52,9	24,3	15,7	100,0	70
Secundaria.	77,7	112	0,0	6,7	16,7	76,7	10,0	50,0	30,0	10,0	100,0	30
Superior	98,2	57	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16
Total	72,6	510	2,2	18,2	16,1	63,5	6,6	54,7	25,5	13,1	100,0	137

Nota: Las estimaciones se refieren a los niños nacidos en el período de 1-59 meses que precedieron la encuesta, excluyéndose así los nacimientos en el mes de la entrevista.

SRO: incluye sólo las sales de rehidratación oral. El patrón adecuado de alimentación: en comparación con prácticas corrientes.

*: Menos de 20 casos.

(): Entre 20 y 24 casos.

Cuadro 9.19

Tratamiento de la diarrea por edad, sexo y orden de nacimiento

- El 53 por ciento de los niños que tuvieron diarrea fueron llevados a un servicio de salud para su tratamiento. El 69 por ciento de los niños recibió Terapia de Rehidratación Oral SRO, RCR o incremento de líquidos, la mayor proporción de niños que recibieron este tratamiento según el sexo son las niñas (75%) y los que viven en el área urbana (86%).
- A 48 por ciento de los niños se les dio remedios caseros no recomendados en un

servicio de salud; la mayor frecuencia de este tipo de remedios fue proporcionada a los niños hombres (49%), a los de sexto orden a más de nacimiento (54%) y los residentes del área rural (50%).

Forma de eliminación de las deposiciones de los niños

Para analizar los niveles y diferencias en la forma cómo las madres eliminan las deposiciones de su menor hijo de cinco años de edad, en el Cuadro 9.20 se presenta, según características seleccionadas, la distribución de las madres entrevistadas por forma de eliminación de las deposiciones.

Cuadro 9.19 Tratamiento de diarrea para los menores de cinco años

Entre los menores de cinco años que tuvieron diarrea en las últimas dos semanas, porcentaje llevado a un servicio o proveedor de salud, porcentaje que recibió terapia de rehidratación oral (TRO) y porcentaje que recibió otros tratamientos, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Característica	Porcentaje llevado a proveedor o servicio de salud ¹	Porcentaje con terapia de rehidratación oral (TRO)					Porcentaje que recibió otros tratamientos		Ningún tratamiento	Número de niños con diarrea
		Sobres de rehidratación ²	Solución casera	Sobres o solución casera ²	Aumento de líquidos en general	Total que recibió TRO	Pastillas jarabes	Remedio casero/ Otros remedios		
Sexo del niño										
Hombre	51,9	18,2	14,3	28,6	58,4	64,9	15,6	49,4	9,1	77
Mujer	53,3	16,7	16,7	28,3	70,0	75,0	31,7	46,7	13,3	60
Orden de nacimiento										
Primer nacimiento	55,0	17,5	20,0	25,0	65,0	70,0	20,0	50,0	10,0	40
2-3	63,2	18,4	13,2	28,9	68,4	71,1	36,8	47,4	10,5	38
4-5	54,8	22,6	6,5	29,0	58,1	71,0	12,9	41,9	16,1	31
6+	32,1	10,7	21,4	32,1	60,7	64,3	17,9	53,6	7,1	28
Area de residencia										
Urbana.	42,9	21,4	25,0	39,3	82,1	85,7	17,9	42,9	7,1	28
Rural	55,0	16,5	12,8	25,7	58,7	65,1	23,9	49,5	11,9	109
Nivel de educación										
Sin educación	(33,3)	(4,8)	(19,0)	(23,8)	(57,1)	(61,9)	(9,5)	(52,4)	(9,5)	21
Primaria	58,6	18,6	10,0	27,1	54,3	62,9	30,0	44,3	14,3	70
Secundaria	53,3	26,7	23,3	40,0	76,7	80,0	10,0	46,7	10,0	30
Superior	*	*	*	*	*	*	*	*	*	16
Total	52,6	17,5	15,3	28,5	63,5	69,3	22,6	48,2	10,9	137

Nota: La terapia de rehidratación oral (TRO) incluye la solución preparada con sobres de sales, Pedialite, el suero preparado en casa o el aumento de líquidos.

Las estimaciones se refieren a los niños vivos nacidos en el período 1-59 meses que precedieron la encuesta, excluyéndose por lo tanto a los nacidos en el mes de la entrevista.

¹ Incluye hospitales, centros y puestos de salud, promotores y médicos privados.

² Incluye Pedialite.

*: Menos de 20 casos.

(): Entre 20 y 24 casos.

Cuadro 9.20

- Más de siete de cada diez madres no desechan las deposiciones de su menor hijo de manera apropiada (71%): 56 por ciento la tira en el patio o campo, 11 por ciento lo barre con agua, 2 por ciento lo bota en la basura, 1 por ciento no hace nada y sólo el 29 por ciento usa el inodoro o letrina.
- La proporción de madres que desecha las deposiciones adecuadamente es mayor entre las que habitan en el área urbana y las que tienen nivel superior (59% y 56% respectivamente).

Cuadro 9.20 Eliminación de las deposiciones de los niños

Distribución porcentual de las madres de niños menores de 5 años de edad por la forma utilizada para eliminar las deposiciones del hijo menor, según características seleccionadas incluyendo tipo de servicio sanitario utilizado en el hogar, Apurímac 2000

Característica	Deposiciones desechadas		Deposiciones no desechadas				Otras respuestas	Total	Número de madres
	Siempre usa inodoro/ letrina	Las tira en inodoro/ letrina	Las tira en patio/ campo	Las barre con agua	Las bota en la basura	No hace nada			
Area de residencia									
Urbana	28,8	29,8	14,4	21,2	5,8	0,0	0,0	100,0	104
Rural	12,8	8,3	66,3	7,8	1,3	1,3	2,3	100,0	398
Nivel de educación									
Sin educación	16,5	7,1	63,5	5,9	1,2	2,4	3,5	100,0	85
Primaria	13,9	11,2	62,5	7,6	2,0	1,2	1,6	100,0	251
Secundaria	12,8	14,7	49,5	19,3	1,8	0,0	1,8	100,0	109
Superior	31,6	24,6	24,6	14,0	5,3	0,0	0,0	100,0	57
Servicio Sanitario									
No tiene	3,7	1,2	80,2	7,9	2,5	2,1	2,5	100,0	242
Letrina propia	24,8	19,0	44,4	9,8	1,3	0,0	0,7	100,0	153
Letrina Compartida	*	*	*	*	*	*	*	*	7
Sanitario	35,1	34,0	9,6	18,1	3,2	0,0	0,0	100,0	94
Otro	*	*	*	*	*	*	*	*	6
Total	16,1	12,7	55,6	10,6	2,2	1,0	1,8	100,0	501

Nota: Madres con un niño menor de cinco años que vive con ella.

*: Menos de 20 casos.

*X. LACTANCIA Y
NUTRICION DE
NIÑOS Y MADRES*

X. LACTANCIA Y NUTRICION DE NIÑOS Y MADRES

Los patrones de alimentación del niño influyen en su estado nutricional, el que a su vez condiciona su potencial de desarrollo y crecimiento. En este sentido, la práctica de la lactancia materna provee a los infantes de nutrientes adecuados y les brinda inmunización para un gran número de enfermedades comunes en la infancia. Sin embargo, el inicio temprano de la complementación alimentaria sin las medidas de higiene y esterilización adecuadas, limita los beneficios de la lactancia materna, al ponerse al niño en contacto con sustancias contaminantes en el ambiente. Los hábitos de lactancia y alimentación complementaria están, pues, muy relacionados con los riesgos de enfermedad y muerte y con el grado de nutrición.

Por otro lado, la duración y la intensidad de la lactancia en el periodo de postparto, influyen en el intervalo entre nacimientos y los niveles de fecundidad resultantes, los que a su vez, condicionan las posibilidades de sobrevivencia de los hijos futuro de las madres.

Asimismo, la alimentación inadecuada y la prevalencia e incidencia de enfermedades infecciosas son determinantes más importantes que los factores genéticos en el crecimiento de los infantes. Por ello, la desnutrición infantil es una de las variables más sensibles a las condiciones de vida.

En este capítulo se analiza la información relacionada con el estado nutricional de los niños menores de cinco años en el departamento de Apurímac y de una de sus variables determinantes, como la práctica de alimentación

de los niños, incluyendo la lactancia, el uso de biberón y el complemento con otras comidas. En ENDES 2000 las madres fueron interrogadas sobre la práctica de la lactancia, su inicio, frecuencia y el uso de alimentación complementaria de cada hijo nacido vivo desde enero de 1995. Los resultados constituyen las cuatro primeras secciones de este capítulo. En la quinta sección se presenta la información antropométrica sobre peso y talla de todos los niños nacidos durante este mismo periodo y en la sexta los indicadores relacionados con la nutrición materna. En la última sección se analizan los resultados de la prueba de anemia en la submuestra de niños y mujeres.

10.1 INICIACION DE LA LACTANCIA

El cuadro 10.1 contiene, para los niños nacidos en los cinco años anteriores a la ENDES 2000, el porcentaje que alguna vez lactó, el porcentaje que empezó a lactar dentro de la primera hora y el porcentaje que empezó durante el primer día de nacido, es decir, el momento después del nacimiento en el cual se inicia la lactancia, por características seleccionadas incluyendo el lugar de residencia. También se incluye el porcentaje de niños que en los tres primeros días de nacidos recibieron otro alimento antes de la leche materna. El inicio temprano de la complementación alimentaria no es recomendable pues así se reduce la leche materna y se exponen a los niños a ciertos patógenos, aumentando el riesgo de infecciones, especialmente las enfermedades diarreicas.

Cuadro 10.1

Lactancia inicial

- En el departamento de Apurímac, 99 por ciento de los niños nacidos en los últimos 5 años anteriores a la ENDES 2000, ha lactado alguna vez.
- El 73 por ciento de los niños empezó a lactar dentro de la primera hora de nacido, 94 por ciento durante el primer día de nacido y 7 por ciento recibió alimentos antes de la lactancia.
- Los niños cuyas madres tienen educación primaria registran los más altos porcentajes entre aquellos que iniciaron la lactancia en la primera hora de nacido (79%).
- Según el área de residencia, 74 por ciento de los niños nacidos en los cinco años anteriores a la encuesta, cuyas madres habitan el área rural, iniciaron la lactancia durante la primera hora de nacidos, superando en 3 puntos porcentuales, a los del área urbana (71%).
- Entre los niños que recibieron alimentos diferentes a la leche materna antes de la lactancia (7%), destacan los porcentajes de los hijos varones (8%), los hijos de madres que viven en el área urbana (9%), los hijos de mujeres que tienen educación secundaria o superior (13% para ambos) y además, aquellos que fueron asistidos al nacer por médicos (13%) y por los que nacieron en un establecimiento de salud (8%).

Cuadro 10.1 Lactancia inicial para niños menores de cinco años

Porcentaje de niños nacidos en los cinco años anteriores a la encuesta, que recibió lactancia en algún momento; que empezó a lactar dentro de la hora siguiente de haber nacido y que empezó la lactancia durante el primer día de nacido, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Porcentaje que alguna vez lactó	Empezó a lactar		Recibió alimentos antes de empezar a lactar ²	Número de niños
		Dentro de la primera hora	Durante el primer día de nacido ¹		
Sexo del niño					
Hombre	98,8	72,1	93,5	8,2	341
Mujer	98,8	74,1	94,6	6,5	336
Área de residencia					
Urbana	99,3	71,4	96,2	9,0	134
Rural	98,7	73,5	93,5	7,0	542
Educación de la madre					
Sin educación	96,6	72,8	91,2	7,6	118
Primaria	99,4	78,5	96,0	4,2	356
Secundaria	99,3	62,4	90,2	12,7	134
Superior	98,6	66,2	95,6	13,0	69
Asistencia al parto					
Médico	99,4	59,9	91,7	12,7	158
Obstetriz	100,0	87,9	99,0	4,0	99
Enfermera/ sanitario/ promotor	98,3	75,7	94,8	4,3	117
Comadrona/ partera	97,1	78,8	94,5	6,5	170
Familiar/ otro	100,0	68,8	91,2	5,6	125
Nadie	*	*	*	*	7
Sin información	*	*	*	*	1
Lugar del parto					
Establecimiento de salud	100,0	70,6	95,6	7,5	252
En la casa	98,4	74,3	92,9	7,0	257
Otra	*	*	*	*	2
No se preguntó	97,6	74,7	93,2	7,8	166
Total	98,8	73,1	94,0	7,4	676

Nota: Las estimaciones se refieren a todos los nacidos en los 5 años que precedieron la encuesta, sin importar si estaban vivos o no en el momento de la encuesta.

¹ Incluye los niños que empezaron la lactancia dentro de la primera hora de nacidos

² Niños a quienes se les dio algún alimento diferente de la leche materna durante los primeros tres días de nacidos antes de que la madre empezara a amamantarlo regularmente.

*: Menos de 20 casos.

10.2 LACTANCIA Y ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA SEGÚN EDAD DEL NIÑO

El conocimiento de la prevalencia de la lactancia, y el inicio de la alimentación complementaria son importantes desde el punto de vista de la salud infantil porque permiten conocer en que momento los niños empiezan a ser expuestos al riesgo de contraer ciertas enfermedades por ingerir agua, que generalmente no es de buena calidad, u otras sustancias, sin tomar las precauciones adecuadas. Organizaciones internacionales y nacionales recomiendan que la leche materna sea el alimento exclusivo durante los primeros seis meses de vida.

A partir de información sobre la situación de la lactancia en las 24 horas antes de la encuesta, en el cuadro 10.2 se presenta la distribución porcentual de los niños sobrevivientes por meses transcurridos desde el nacimiento: si están lactando o no, si están lactando de forma exclusiva o si reciben sólo agua o complementación alimenticia. Se detalla la prevalencia de la alimentación con biberón por la edad del niño.

Cuadro 10.2

Tipo de lactancia por edad del niño

- Al momento de la encuesta, todos los niños menores de 4 meses estaban siendo amamantados y con lactancia exclusiva el 95 por ciento. La lactancia combinada con líquidos o leche no materna alcanza al 5 por ciento de niños de esta edad.
- Después de los 5 meses la lactancia disminuye, así el 97 por ciento de los niños de 6 a 9 meses estaban siendo amantados al momento de la encuesta. Sólo el 8 por ciento de este grupo de niños lacta exclusivamente.
- La ingesta de otros líquidos, además de la leche materna en los niños de esta edad en el departamento de Apurímac es 8 por ciento y 82 por ciento recibe alimentos suplementarios.
- El uso del biberón es mayor en 6 puntos porcentuales en los de 6 a 9 meses en comparación a los menores de 4 meses (7% y 13% respectivamente).

Cuadro 10.2 Situación de lactancia para niños menores de tres años

Distribución porcentual de niños sobrevivientes menores de tres años, por condición de lactancia en las 24 horas que precedieron la encuesta y porcentaje que recibió alimentación con biberón, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Edad en meses	No están lactando	Lactan exclusi- vamente	Lactan y reciben			Total	Alimen- tación con biberón	Número de niños
			Líquidos (agua/ jugos)	Leche no materna	Suple- mentos			
Edad 0-9 meses								
<4	0,0	95,1	2,4	2,4	0,0	100,0	7,3	41
4 a 5	0,0	90,5	4,8	4,8	0,0	100,0	9,5	21
6 a 9	2,6	7,7	7,7	0,0	82,1	100,0	12,8	39
Edad 0-36 meses								
0-1	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	5,0	20
2-3	0,0	90,5	4,8	4,8	0,0	100,0	9,5	21
4-5	0,0	90,5	4,8	4,8	0,0	100,0	9,5	21
6-7	5,9	17,6	17,6	0,0	58,8	100,0	5,9	17
8-9	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	18,2	22
10-11	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	11,8	17
12-13	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	11,1	18
14-15	8,7	0,0	0,0	0,0	91,3	100,0	26,1	23
16-17	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	10,5	19
18-19	40,9	0,0	0,0	0,0	59,1	100,0	13,6	22
20-21	42,9	0,0	0,0	0,0	57,1	100,0	42,9	14
22-23	45,5	0,0	0,0	0,0	54,5	100,0	12,1	33
24-25	65,2	0,0	0,0	0,0	34,8	100,0	8,7	23
26-27	71,4	0,0	0,0	0,0	28,6	100,0	4,8	21
28-29	75,0	0,0	0,0	0,0	25,0	100,0	8,3	12
30-31	83,3	0,0	0,0	0,0	16,7	100,0	16,7	24
32-33	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	12,5	8
34-35	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	14,3	7

Nota: Los niños clasificados como "lactan y reciben sólo agua" no reciben otros alimentos. Los suplementos pueden ser sólidos o semisólidos.

10.3 DURACIÓN DE LA LACTANCIA SEGÚN CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS

El cuadro 10.3 presenta para los niños menores de tres años la duración mediana de la lactancia, edad en la cual todavía están siendo amamantados el 22 por ciento de los niños; y el porcentaje de menores de seis meses que fueron amamantados por seis o más veces durante las 24 horas precedentes a la entrevista. De igual manera, se incluye el promedio aritmético de duración de la lactancia y, para efectos de comparación con otras encuestas, el promedio de duración de la lactancia calculada con método de prevalencia/incidencia: número de madres lactando (prevalencia) dividido por el promedio mensual de nacimientos (incidencia).

Al igual que en las encuestas anteriores, en la ENDES 2000 también se ha prestado atención a la frecuencia o intensidad de la lactancia, hecho que está muy relacionado con el reinicio de la menstruación, y el consiguiente riesgo de concepción. La intensidad o frecuencia diaria de amamantamiento (al igual que el uso o no del biberón) son determinantes de la cantidad de leche producida en la glándula mamaria y de la duración de amenorrea postparto.

Cuadro 10.3 y Gráfico 10.1

Duración mediana de la lactancia

- En el departamento de Apurímac, el tiempo promedio de duración de la

lactancia en los niños menores de tres años es de 24 meses. La duración mediana de la lactancia es ligeramente menor al tiempo promedio de duración observado 22.1 meses.

- La duración mediana del amamantamiento es ligeramente mayor en las niñas (24.5 meses) que en los niños (21.1 meses).
- La duración mediana de la lactancia exclusiva, es de 5.7 meses: es similar en los niños y niñas (5.4 y 5.8 meses respectivamente).

Intensidad de la lactancia

- La intensidad con la que se da la lactancia, como ya se dijo anteriormente, es importante para mejorar la producción de la leche de la madre y como método anticonceptivo para las amenorreícas. En el departamento de Apurímac, el 97 por ciento de los niños menores de seis meses recibió leche materna por lo menos seis veces en el día anterior a la entrevista, frecuencia de toma que se ajusta a las recomendaciones médicas sobre el particular.
- La frecuencia de amamantamiento es mayor en el día que en la noche (8 y 4 veces respectivamente).

Cuadro 10.3 Duración de la lactancia para niños menores de tres años

Duración de la lactancia, en meses, entre niños menores de tres años, por tipo de lactancia; según características seleccionadas, Apurímac 2000


Características	Duración mediana en meses (menores de 3 años)			
	Lactancia total	Lactancia exclusiva (sólo pecho)	Sólo pecho o pecho y agua ¹	Número de niños
Sexo del niño				
Hombre	21,1	5,4	6,1	175
Mujer	24,5	5,8	6,1	167
Area de residencia				
Urbana	18,5	5,1	5,3	74
Rural	23,6	5,9	6,4	268
Educación de la madre				
Sin educación	23,8	3,8	3,8	55
Primaria	21,9	6,1	6,5	174
Secundaria	19,6	5,5	5,8	74
Superior	17,6	4,5	6,5	39
Total	22,1	5,7	6,1	342
Promedio para todos los niños	23,6	6,4	6,8	-
P/I para todos los niños.	24,4	6,3	6,9	-

Nota: Las medianas y promedios aritméticos se calcularon a partir de las distribuciones por edad previamente suavizadas.

- : No aplicable

¹ Bien lactancia exclusiva, o sólo agua, alimentos a base de agua o jugos (lactancia predominante)

Grafico 10.1
Intensidad de la lactancia en niños menores de 6 meses



10.4 TIPO DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA SEGÚN MESES DESDE EL NACIMIENTO

La alimentación complementaria o ablactancia, es tal vez uno de los eventos de mayor vulnerabilidad en el estado nutricional de los niños menores de tres años; por tal razón, la importancia que adquieren los alimentos como tal, la consistencia y el proceso de su iniciación, es una característica definitiva en el análisis del estado nutricional del niño. Esta situación se torna crítica cuando hay impedimentos o dificultades para que el niño tome leche materna durante los primeros 4 a 6 meses de vida. Pero en el departamento de Apurímac debido al número de casos, sólo se presenta en el Gráfico, el porcentaje de niños lactantes y no lactantes, que recibieron en las últimas 24 horas, distintos tipos de comidas: alimentos líquidos, sólidos, semisólidos y alimentos hechos con aceite o mantequilla.

La siguiente información sobre micronutrientes se incluye en el Cuadro 10.4: entre los niños menores de 3 años de edad que viven con la madre, aquellos que recibieron vitamina "A" vía alimentos complementarios. Se registra, también, el porcentaje de madres que recibieron vitamina "A" después del parto, y de hierro durante el embarazo. Además, se incluye información sobre las madres que sufrieron de ceguera nocturna durante el embarazo, por características seleccionadas y situación de la lactancia.

Gráfico 10.2a y 10.2b

Tipos de comidas recibidas en las 24 horas antes de la encuesta por niños que lactan

- En el departamento de Apurímac, el 65 por ciento de niños menores de 3 años

que están lactando consumió otro líquidos.

- Con relación al consumo de alimentos sólidos o semisólidos, el mayor consumo de éstos en las últimas 24 horas por los menores de tres años que están lactando fueron: tubérculos y plátanos (67%) granos y cereales (64%) frutas y vegetales (52%); mientras que los alimentos ricos en proteínas (carne, pescado, pollo y huevos), tan importantes para los niños de esta edad, fueron consumidos solamente por 50 por ciento de los niños.
- El consumo de vitamina A por los lactante menores de tres años en las últimas 24 horas es de 44 por ciento y más de 3 de cada 10 niños menores de tres años consume alimentos ricos en grasas (36%).
- El 65 por ciento de los niños de esa edad que esta lactando consume otro líquido, el 39 por ciento otras leches y/o sus derivados.

Tipos de comidas recibidas en las 24 horas antes de la encuesta por niños que no lactan

- El 89 por ciento de los niños que no lactan consumen otros líquidos, el 79 por ciento otras leches y/o sus derivados.
- Los alimentos ricos en vitamina A son consumidos por el 64 por ciento de los niños y los alimentos ricos en grasas por el 53 por ciento.
- El 99 por ciento consume alimentos sólidos o semisólidos, tubérculos y plátanos (95%), granos y cereales (91%). Los otros alimentos son nombrados en menores proporciones.

Gráfico 10.2a
Porcentaje de Menores de Tres Años por
Tipo de Comidas Recibidas





Gráfico 10.2b
Porcentaje de Menores de Tres Años por
Tipo de Comidas Recibidas



Cuadro 10.4

Micronutrientes

- Más de 6 de cada diez niños menores de tres años recibieron alimentos ricos en vitamina A (65%). La mayor proporción de estos niños son los de 12 a 15 meses (90%).
- Dicha proporción es mayor también en los niños de orden de nacimiento de 6 a más (77%), o los residentes en el área urbana (78%) que en el área rural (61%).
- Las madres del 25 por ciento de los menores de tres años recibieron vitamina A después del parto. Los mayores porcentajes se encuentran entre las madres

de los niños menores de 6 meses (45%), en las niñas (26%), en los de primer orden o cuarto a quinto orden de nacimiento (28% en cada caso), en los del área rural (27%) y en las madres con 15 a 19 años de edad (41%).

- De otro lado, las madres de 5 por ciento de los menores de 3 años tuvieron ceguera

nocturna y diurna durante el embarazo y un 20 por ciento recibieron hierro por 90 días durante la etapa de gestación.

- El porcentaje de niños cuya madre tuvo ceguera nocturna ó diurna y tomó hierro es mayor entre los niños menores de 6 meses y los residentes del área urbana.

Cuadro 10.4 Micronutrientes

Porcentaje de niños vivos menores de 3 años de edad que: viven con la madre y recibieron vitamina A, a través de alimentos suplementarios; de niños cuyas madres recibieron vitamina A y hierro, y cuyas madres sufrieron de ceguera nocturna durante el embarazo, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Porcentaje de menores de 3 años		Porcentaje de menores de 3 años para quienes la madre: ¹			Número de último nacido vivo
	Recibió alimentos ricos en vitamina A	Niños que viven con la madre	Recibió vitamina A después del parto	Ceguera diurna y nocturna durante el embarazo ²	Tomó hierro por 90 días durante el embarazo	
Edad del niño						
<6 meses	0,0	62	45,3	7,8	35,9	64
6-9 meses	69,2	39	28,2	5,1	23,1	39
10-11 meses	*	17	*	*	*	17
12-15 meses	90,2	41	30,2	7,0	20,9	43
16-23 meses	81,8	88	21,6	2,3	15,9	88
24-35 meses	77,9	95	13,3	5,1	11,2	98
Sexo del niño						
Hombre	64,6	175	24,4	6,7	17,8	180
Mujer	65,3	167	26,0	3,0	23,1	169
Orden del nacimiento						
1	63,6	99	28,4	2,9	15,7	102
2-3	60,0	105	20,8	1,9	22,6	106
4-5	61,8	68	28,4	13,4	22,4	67
6+	77,1	70	24,3	4,1	21,6	74
Área de residencia						
Urbana	78,4	74	20,0	5,3	22,7	75
Rural	61,2	268	26,6	4,7	19,7	274
Edad de la madre						
15-19	62,5	32	41,2	0,0	17,6	34
20-24	57,1	98	24,0	3,0	24,0	100
25-29	63,0	81	24,7	6,2	21,0	81
30-34	71,9	64	21,9	6,2	18,7	64
35-39	73,9	46	25,0	4,2	18,7	48
40-44	*	13	*	*	*	13
45-49	*	8	*	*	*	9
Total	64,9	342	25,2	4,9	20,3	349

¹ Sólo se incluye el último nacimiento de la mujer

² Ceguera nocturna. Incluye las mujeres que sólo tuvieron dificultad con la visión durante la noche (excluye las que tuvieron dificultad durante el día)

*: Menos de 20 casos.

10.5 NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS

Peso para la edad o desnutrición global (o general) Dado que el estado nutricional de los niños está estrechamente asociado a su morbilidad y mortalidad, en la ENDES 2000 se incluyó un módulo de antropometría, en el cual se obtuvo el peso y la talla de las madres y sus niños menores de 5 años, siguiendo las normas internacionales y utilizando instrumentos de precisión.

De la información sobre peso y talla se han calculado los siguientes índices:

- Talla para la edad o desnutrición crónica
- Peso para la talla o desnutrición aguda (emaciación)

La evaluación del estado nutricional se hace comparando la población en estudio con el patrón tipo establecido como población de referencia por el Centro Nacional para Estadísticas de Salud (NCHS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC). El patrón internacional es útil porque facilita la comparación entre poblaciones y subgrupos en un momento dado o a través del tiempo. Una ventaja adicional consiste en la disponibilidad de un patrón "normalizado" en el sentido de que la media y la mediana de las distribuciones coinciden. La proporción de niños que están por debajo de dos desviaciones estándar con respecto a esta población de referencia se utiliza como indicador del nivel de desnutrición en la población en estudio. Por supuesto que en cualquier población existe una variación natural en peso y talla, variación que aproxima los porcentajes encontrados en la distribución normal, la cual incluye 2.3 por ciento por debajo de 2 desviaciones estándar.

Prevalencia de la Desnutrición Crónica

Los niveles de desnutrición crónica, es decir, retardo en el crecimiento en talla para la edad o retardo en el crecimiento, se determina al comparar la talla del niño con la esperada para su edad y sexo. Los niveles de desnutrición crónica en niños próximos a cumplir los cinco

años (48-49 meses, por ejemplo), son un indicador de los efectos acumulativos del retraso en el crecimiento.

Prevalencia de la Desnutrición Aguda o Emaciación

El peso para la talla es un indicador de desnutrición reciente, conocido también como desnutrición aguda o emaciación, que mide el efecto del deterioro en la alimentación y de la presencia de enfermedades en el pasado inmediato. Se diría que obedece a situaciones de coyuntura.

Prevalencia de la Desnutrición Global o General

El peso para la edad es considerado como un indicador general de la desnutrición, pues no diferencia la desnutrición crónica, que se debería a factores estructurales de la sociedad, de la aguda, que corresponde a pérdida de peso reciente.

Los resultados se presentan en el Cuadro 10.5 por edad del niño, sexo y orden de nacimiento; y en el Cuadro 10.6 por lugar de residencia y educación de la madre.

Cuadros 10.5 y 10.6

Talla para la edad o desnutrición crónica

- En el departamento de Apurímac más de dos quintos de los niños menores de 5 años (43%) adolecerían de desnutrición crónica, es decir, retardo en el crecimiento en talla para la edad. La desnutrición severa afecta a 14 por ciento de esta población.
- La desnutrición crónica afecta más a los niños (45%) que a las niñas (41%); aumenta con la edad del niño, concentrándose entre los de 48 a 59 meses (59%), seguido por los de 16 a 23 meses (57%). Según el orden de nacimiento los de 6° y más orden de nacimiento son los más afectados (57%) y cuando el intervalo entre nacimientos es de 24 a 47 meses (54%).

- La desnutrición crónica afecta en mayor proporción a los niños del área rural (50%), que a los del área urbana (15%), y a los niños de madres sin educación o con educación primaria (52% y 53% respectivamente).

Peso para la talla o desnutrición aguda

- La falta de peso para la talla o desnutrición aguda, sólo afecta a 2 por ciento de los niños en el departamento de Apurímac; este tipo de desnutrición es un indicador de desnutrición reciente por efecto del deterioro de la alimentación y/o de la presencia de enfermedades en el pasado reciente.

Peso para la edad o desnutrición general

- El peso para la edad es un indicador

general de la desnutrición, no diferencia la desnutrición crónica, que se debería a factores estructurales de la sociedad, de la desnutrición aguda, que corresponde a pérdida de peso reciente. Es muy útil para detectar cambios en el estado nutricional de niños que están siendo vistos en forma continua.

- El 12 por ciento de los niños menores de cinco años tienen un peso deficiente para su edad. La desnutrición general es mayor en los niños de 16 a 23 meses (21%), en los de orden de nacimiento de 6° a más (20%), entre los de intervalo menor de 24 meses o de 24 a 47 (16%), así como en los niños cuyas madres residen en el área rural (15%) y entre los niños de madres con menores niveles de educación (17% y 16%).

Cuadro 10.5 Indicadores de desnutrición para niños menores de cinco años, según características seleccionadas

Porcentaje de niños menores de cinco años, clasificados como desnutridos según tres indicadores antropométricos: talla para la edad, peso para la talla y peso para la edad, por características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Porcentaje con desnutrición crónica (Talla para la edad)		Porcentaje con desnutrición aguda (Peso para la talla)		Porcentaje con desnutrición global (Peso para la edad)		Número de niños
	Severa ¹	Total ²	Severa ¹	Total ²	Severa ¹	Total ²	
Edad del niño							
<6 meses	3,5	5,3	1,8	1,8	0,0	0,0	57
6-9 meses	5,6	19,4	0,0	0,0	2,8	8,3	36
10-11 meses	*	*	*	*	*	*	17
12-15 meses	5,1	30,8	0,0	0,0	2,6	5,1	39
16-23 meses	16,7	56,7	0,0	2,2	2,2	21,1	90
24-35 meses	17,9	45,5	0,0	0,9	3,6	17,0	112
36-47	9,3	44,9	0,0	1,7	0,8	7,6	118
48-59	21,8	58,6	0,8	4,5	2,3	15,8	133
Sexo del niño							
Hombre	13,5	44,8	0,3	3,4	3,0	12,5	297
Mujer	13,8	41,3	0,3	0,7	1,0	12,1	305
Orden del nacimiento							
1	8,4	31,6	0,6	1,3	0,6	5,2	155
2-3	12,8	42,0	0,0	0,0	1,6	11,7	188
4-5	13,5	45,2	0,8	4,0	3,2	14,3	126
6+	21,1	55,6	0,0	3,8	3,0	19,5	133
Intervalo de nacimiento							
Primer nacimiento	8,4	31,6	0,6	1,3	0,6	5,2	155
<24 meses	21,5	51,6	0,0	4,3	1,1	16,1	93
24-47 meses	17,3	53,8	0,0	2,2	3,1	16,0	225
48+ meses	7,8	31,8	0,8	0,8	2,3	11,6	129
Total	13,6	43,0	0,3	2,0	2,0	12,3	601

Nota: Las estimaciones se refieren a los niños nacidos en el período 3-59 meses anteriores a la encuesta (se excluyen los menores de 3 meses).

Cada índice se expresa en términos del número de desviaciones estándar (DE) de la media del patrón internacional utilizado por NCHS/CDC/OM.

Los niños se clasifican como desnutridos si están 2 o más desviaciones estándar (DE) por debajo de la media de la población de referencia.

¹ Niños que están 3 DE o más por debajo de la medida.

² Niños que están 2 DE o más por debajo de la medida. Incluye los niños que están 3 DE o más por debajo de la medida.

*: Menos de 20 casos.

Cuadro 10.6 Indicadores de desnutrición para niños menores de cinco años

Entre los niños menores de cinco años, porcentaje clasificado como desnutrido según tres indicadores antropométricos: talla para la edad, peso para la talla y peso para la edad, por características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Porcentaje con desnutrición crónica (Talla para la edad)		Porcentaje con desnutrición aguda (Peso para la talla)		Porcentaje con desnutrición global (Peso para la edad)		Número de niños
	Severa ¹	Total ²	Severa ¹	Total ²	Severa ¹	Total ²	
Area de residencia							
Urbana	2,7	15,0	0,9	1,8	0,0	2,7	113
Rural	16,2	49,5	0,2	2,0	2,5	14,5	488
Educación de la madre							
Sin educación	17,1	52,4	1,0	4,8	1,9	17,1	105
Primaria	18,5	52,5	0,0	1,9	3,2	16,2	314
Secundaria	4,9	28,7	0,0	0,0	0,0	3,3	122
Superior	0,0	6,6	1,6	1,6	0,0	1,6	61
Total	13,6	43,0	0,3	2,0	2,0	12,3	601

Nota: Las estimaciones se refieren a los niños nacidos en el período 3-59 meses anteriores a la encuesta (se excluyen los menores de 3 meses). Cada índice se expresa en términos del número de desviaciones estándar (DE) de la media del patrón internacional utilizado por NCHS/CDC/OMS. Los niños se clasifican como desnutridos si están 2 o más desviaciones estándar (DE) por debajo de la media de la población de referencia.

¹ Niños que están **3 DE o más** por debajo de la medida.

² Niños que están **2 DE o más** por debajo de la medida. Incluye los niños que están **3 DE o más** por debajo de la medida.

10.6 NUTRICIÓN DE LAS MUJERES

La situación nutricional de las mujeres antes y durante el embarazo es uno de los determinantes de los riesgos de mortalidad materna y de las posibilidades de desarrollo del feto, la mortalidad intrauterina, la duración del embarazo, las complicaciones del parto, la mortalidad perinatal e infantil y el bajo peso al nacimiento. El estado de nutrición de una mujer está condicionado, a su vez, por su balance energético (relación entre el consumo de calorías y el gasto de energías), su estado de salud, el tiempo transcurrido desde el último nacimiento así como de la duración de la lactancia.

Las medidas antropométricas son herramientas profusamente empleadas para aproximarse a los niveles de nutrición. Por esta razón ENDES 2000 registró las medidas básicas de estatura y peso de todas las mujeres entrevistadas.

Estatura de las Mujeres en Edad Fértil

La estatura de la mujer es un indicador indirecto de su situación social puesto que refleja el efecto acumulado en el tiempo de variables genéticas y ambientales tales como alimentación, salud, factores psicológicos, educación, ingresos, número y espaciamiento entre hermanos, entre otras.

En mujeres de 15 a 49 años la talla es particularmente importante, pues se ha encontrado asociación entre talla materna y peso del niño al nacimiento, supervivencia infantil, mortalidad materna, complicaciones del embarazo y parto, y duración de lactancia materna¹. Por el hecho de haber finalizado el crecimiento físico, una sola medición de la estatura de la mujer es suficiente para valorar de manera bastante confiable el estado nutricional en lo referente al crecimiento lineal.

La información general sobre la distribución porcentual de las madres según la estatura y las medidas se aprecian en el cuadro 10.7.

¹ Panamerican Health Organization. *Maternal nutrition and pregnancy outcomes: anthropometric assessment*. PAHO No. 526. Washington, 1991; y Goodhart R, Shils M. *editors. Modern nutrition in health and disease*. Lea and Febiger. Philadelphia, 1980.

Cuadro 10.7

La talla como indicador de la situación nutricional de las mujeres

- La estatura o talla promedio de la madre del departamento de Apurímac, es de 150 centímetros.
- El 17 por ciento de las MEF tiene una estatura por debajo de los 145 centímetros. Este grupo de mujeres puede ser considerado como madres con mayor riesgo de experimentar complicaciones en el embarazo, mortalidad intrauterina, perinatal o infantil.
- El mayor porcentaje de las madres con talla menor a 145 centímetros se encuentran en el área rural (20%). Asimismo, la frecuencia es mayor entre las mujeres sin nivel de educación (29%) que entre las de educación superior (6%).

Cuadro 10.7 La talla como indicador del estado nutricional de las mujeres

Promedio de talla y porcentaje de las mujeres entrevistadas con talla menor de 145 centímetros, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Característica	Talla promedio en cms.	Porcentaje con menos de 145 cms.	Número de mujeres
Edad			
15-19	150,7	10,3	184
20-24	150,5	16,6	181
25-29	150,3	14,3	154
30-34	149,2	20,4	152
35-39	149,8	17,7	130
40-44	148,6	25,0	92
45-49	149,0	24,3	103
Área de residencia			
Urbana	151,6	10,1	288
Rural	149,2	20,3	707
Educación de la madre			
Sin educación	148,5	28,8	160
Primaria	149,1	21,2	434
Secundaria	150,6	10,1	276
Superior	152,6	5,6	126
Total	149,9	17,4	995

Peso y Masa Corporal de las Mujeres

El estado nutricional de la mujer antes del embarazo es un determinante de la culminación del parto y del bajo peso al nacer de los hijos. Los riesgos de parto prematuro son menores en mujeres con buen peso antes de la gestación. Asimismo, la ganancia de peso durante la gestación es un buen indicador del grado de desarrollo del niño, pero para ello es importante conocer el peso de base. Este conocimiento es también esencial debido a que las mujeres muy delgadas necesitan ganar mucho más peso durante la gestación que aquellas normales, para asegurar un embarazo viable y

posibilidades de sobrevivencia superiores para los hijos. En general el peso antes de la gestación es un buen pronóstico del bajo peso al nacer y de la mortalidad infantil.

En la ENDES 2000 se registró el peso de todas las mujeres entrevistadas. Como el peso es muy sensible a la edad y sobre todo a la estatura, para medir adecuadamente su papel como indicador es conveniente controlarlo según la talla. Una forma de hacerlo es utilizar la relación Peso/Talla, pero para lo cual se requieren tablas de referencia (para las mujeres, estas tablas aún están en proceso de definición).

Una medida alternativa es el Índice de Masa Corporal (IMC), para el cual hay diferentes fórmulas. La más usada es el Índice de Quetelet, definido como el cociente del peso (expresado en Kg.) y el cuadrado de la talla (expresado en metros).

Este índice permite medir la delgadez o la obesidad controlando la talla y provee información acerca de las reservas de energía. Una de sus ventajas radica en que no requiere de una tabla de referencia, aunque su validez como indicador de riesgo aún está en discusión. Aún así, se ha encontrado relación entre el IMC, el bajo peso al nacer y la mortalidad perinatal.

El índice está influenciado por la edad de la madre, el tiempo de lactancia y el tiempo transcurrido desde el nacimiento anterior; por esta razón, se han excluido de los cálculos a las mujeres embarazadas y a quienes tuvieron un nacimiento en los dos meses anteriores a la encuesta.

El International Dietary Energy Consultative Group recomienda utilizar el valor 18.5 como punto de corte, lo que indicaría, a modo de

ejemplo, que una mujer de 1.47 m de estatura estaría en el grupo de riesgo si su peso fuera menor que 40 Kg. y en el caso de quienes midieran 1.60, estarían en riesgo aquellas con peso inferior a 47.4 Kg.

La distribución porcentual y las medidas resumen para el peso y el índice de masa corporal se detalla en el Cuadro 10.8.

Cuadro 10.8

Peso y masa corporal como indicadores de la situación nutricional de las madres

- El Índice de Masa Corporal de las mujeres en el departamento de Apurímac, utilizando la fórmula de Quetelet, es de 24.6 Tomando el punto de corte (18.5), sólo 1 por ciento de las mujeres tendrían una masa corporal deficiente.
- El índice de masa corporal mayor o igual a 25 (41%), es mayor en: las mujeres de 40 a 44 años (60%), en el área urbana (44%) y entre las que tienen nivel de educación superior (47%).

Cuadro 10.8 El índice de Masa Corporal como indicador de la situación nutricional de las madres, según características seleccionadas

Entre las mujeres que tuvieron un hijo en los cinco años que precedieron la encuesta, promedio y porcentaje con índice de masa corporal menor de 18.5, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Promedio del IMC	Porcentaje con IMC menor de 18.5	Porcentaje con IMC mayor o igual a 25.0	Número de mujeres
Edad				
15-19	23,5	0,6	25,7	179
20-24	23,8	0,7	29,1	148
25-29	24,3	0,0	38,9	131
30-34	25,0	0,7	44,0	134
35-39	25,1	1,6	46,7	122
40-44	26,1	0,0	59,6	89
45-49	25,6	1,0	57,3	103
Área de residencia				
Urbana	25,0	0,4	44,4	266
Rural	24,4	0,8	39,1	639
Educación de la madre				
Sin educación	24,7	0,7	44,9	147
Primaria	24,6	0,8	39,7	385
Secundaria	24,4	0,4	36,9	260
Superior	24,7	0,9	46,5	114
Total	24,6	0,7	40,6	905

Nota: El cuadro incluye sólo mujeres que tuvieron un hijo en los cinco años anteriores a la encuesta. Se excluyen además las mujeres embarazadas y aquellas que tuvieron un hijo en los 2 meses.

10.7 ANEMIA EN NIÑOS Y MUJERES

Introducción

La anemia es una condición en la cual la sangre carece de suficientes glóbulos rojos, de hemoglobina, o es menor en volumen total. La hemoglobina es un compuesto de proteína que contiene hierro y se produce en los glóbulos rojos de los seres humanos, su medición es reconocida como el criterio clave para la prueba de anemia en mujeres y niños, y su deficiencia indica que existe una deficiencia de hierro. Si bien, se han identificado muchas causas de la anemia, la deficiencia nutricional debido a una falta de cantidades específicas de hierro en la alimentación diaria constituye la gran mayoría del número total de casos de anemia. De este modo, la prueba de hemoglobina puede aceptarse como indicador indirecto del estado nutricional de las mujeres y niños.

La anemia con un nivel de hemoglobina por debajo de 12.0 g/dl (11.0 para mujeres embarazadas) está asociada con un decrecimiento en la capacidad de trabajo de las mujeres y en su desempeño mental, y probablemente con reducción en la resistencia contra las infecciones.

Las mujeres anémicas son menos tolerantes a la pérdida de sangre durante el parto, particularmente cuando los niveles de hemoglobina descienden a menos de 8.0 g/dl. En casos más severos de anemia, las mujeres experimentan fatiga y un incremento del ritmo cardíaco en reposo. La tensión proveniente del parto, el aborto espontáneo y otras complicaciones mayores pueden resultar en la muerte materna.

Una detección temprana de la anemia nutricional puede ayudar a prevenir complicaciones severas durante el embarazo y el parto. El empleo de hierro suplementario para mujeres con deficiencia de hierro y la fortificación de alimentos puede mejorar la salud materno infantil en general.

Si bien no existe información completa y actualizada sobre la deficiencia de hierro en el Perú, varios estudios a nivel local indican que la anemia es una condición prevalente en niños y mujeres en edad fértil en el Perú. Entre éstas, las mujeres embarazadas constituyen el grupo más afectado.

Prueba de Anemia

La prueba para determinar anemia por deficiencia de hierro (anemia ferropénica) en mujeres y niños ha constituido uno de los mayores esfuerzos en la ENDES 2000. En el departamento de Apurímac, la prueba de anemia se realizó para todos los niños menores de 5 años y para todas las mujeres entre los 15-49 años.

La prueba de hemoglobina se efectuó en una muestra de sangre capilar con el principal objetivo de determinar el nivel de deficiencia de hierro en algunas sub-poblaciones de mujeres en edad fértil y los niños menores de cinco años.

Los resultados aquí presentados, servirán de base para el desarrollo de políticas de salud pública para la prevención y manejo de la anemia, como estrategia de intervención para mejorar la salud de las madres y niños.

La anemia es definida como una concentración de hemoglobina que es inferior al intervalo de confianza del 95 por ciento entre individuos saludables y bien nutridos de la misma edad, sexo y tiempo de embarazo. Se han establecido diferentes puntos de corte para bebés y niños menores de 6 años, para mujeres embarazadas según el tiempo de gestación, y para mujeres no embarazadas.

La hemoglobina puede medirse en forma fotométrica luego de una conversión a ciametmoglobina. Este principio ha sido aceptado por el Comité Internacional para la Estandarización en Hematología como un método para la detección de hemoglobina.

Recientemente ha sido desarrollada una técnica simple y confiable para la detección fotométrica de hemoglobina utilizando el sistema HemoCue®. Esta técnica es usada ampliamente en varios países. Por las anteriores razones, la técnica del HemoCue® ha sido escogida como el método básico para la medición de la hemoglobina en la ENDES 2000.

La clasificación de la anemia en severa, moderada o leve se hace con los siguientes puntos de corte para las mujeres de 15-49 y los niños de 6-59 meses:

Anemia severa: < 7.0 g/dl

Anemia moderada: 7.0-9.9 g/dl

Anemia leve: 10.0-11.9/g/dl (10.0-10.9 para las mujeres embarazadas y para los niños).

El nivel de hemoglobina en la sangre requerido depende de la presión parcial de oxígeno en la atmósfera. Como el Perú es un país donde un gran número de personas viven a alturas donde la presión de oxígeno es reducida en comparación con la del nivel del mar, se requiere un ajuste a las mediciones de hemoglobina para poder evaluar el estado de anemia, es decir el nivel mínimo requerido de hemoglobina dada la disponibilidad de oxígeno en la atmósfera. Hay dos formas de ajuste para la evaluación del estado de anemia: cambiando los límites de los niveles mínimos de hemoglobina según la elevación sobre el nivel del mar o llevando a nivel del mar la medición observada. Esto se hace restando de la medición el incremento que se observa en la hemoglobina como resultado de vivir a mayores alturas. La segunda alternativa es la más utilizada y es la que será empleada aquí.

El aumento en los niveles de hemoglobina con la altura fue estudiado en Perú en 1945 por Hurtado. También ha sido estudiado en los Estados Unidos por el Pediatric Nutrition Surveillance System (CDCPNSS) y en el Ecuador por Dirren y colaboradores. Los ajustes basados en estos estudios están expresados en un cuadro de valores (Hurtado) o en fórmulas cuadráticas (CDCPNSS y Dirren et al)². Comparaciones realizadas para la preparación de este informe muestran una gran coherencia entre las tres variaciones de ajuste, dando confianza en el utilizado para las observaciones de la ENDES 2000.

Para este informe se ha adoptado la fórmula de CDCPNSS. Las mediciones iniciales del nivel de hemoglobina han sido llevadas a nivel del mar con el siguiente procedimiento:

Nivel ajustado = nivel observado - ajuste por altura

Ajuste = $-0.032 \cdot (\text{alt}) + 0.022 \cdot (\text{alt} \cdot \text{alt})$

donde (alt) es: $[(\text{altura en metros})/1,000] \cdot 3.3$

Resultados

Los resultados se presentan en el Cuadro 10.9 para mujeres y en el Cuadro 10.10 para niños. En el Cuadro 10.11 se relaciona la anemia de los niños con la anemia de las madres.

Cuadro 10.9

- El 27 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años de edad del departamento de Apurímac padece de algún grado de anemia. En la ENDES 2000 se encontró que más de la quinta parte de mujeres (23%) tiene anemia leve y 5 por ciento presenta anemia moderada.

2 Las referencias básicas utilizadas son: World Health Organization. Nutritional Anemia. WHO Technical Report Series No. 405. Geneva, 1968; CDC. Criteria for Anemia in Children and Childbearing Age Women. MMWR. 38:400-404; Dallman P.R., Siimes M.A. & Stekel A. Iron Deficiency in Infancy and Childhood. Am J Clin Nutr 33:86-118, 1980; Dallman P.R., Yip R. & Johnson C. Prevalence and Causes of Anemia in the United States, 1976 to 1980. Am J Clin Nutr 39:437-445, 1984; Dirren H., Logman H.G.M., Barcaly D.V. & Freire W.B. Altitude Adjustment for Hemoglobin. Europ J Clin Nutr 48:625-632, 1994; Hurtado A., Merino C., Delgado E. Influence of Anorexia on the Hemopoietic Activity. Arch Intern Med 75:284-323, 1945.

- La anemia es más frecuente entre las mujeres de 45-49 años de edad (47%) y entre las mujeres que tienen de 4 a 5 hijos (41%).
- Según el área de residencia, las mujeres que habitan el área rural presentan mayor

porcentaje de casos de anemia (29%) que las que residen el área urbana (22%). Así también, la proporción de anemia entre las mujeres sin educación es más frecuente que en los otros niveles de educación (32%).

Cuadro 10.9 Prevalencia de anemia en mujeres

Prevalencia de anemia en mujeres por tipo de anemia, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Distribución porcentual de mujeres con prueba de anemia				Número de mujeres sin prueba de anemia	Total de mujeres
	Mujeres con anemia		Mujeres sin anemia	Total		
	Anemia moderada	Anemia leve				
Edad						
15-19	4,2	14,6	81,2	100,0	48	52
20-24	2,8	19,4	77,8	100,0	36	36
25-29	2,7	16,2	81,1	100,0	37	39
30-34	8,1	27,0	64,9	100,0	37	41
35-39	0,0	33,3	66,7	100,0	30	37
40-44	(8,7)	(13,0)	(78,3)	(100,0)	23	24
45-49	6,7	40,0	53,3	100,0	30	32
Paridez						
No tiene hijos	1,6	17,2	81,2	100,0	64	68
1	3,0	24,2	72,7	100,0	33	35
2-3	4,7	18,6	76,7	100,0	43	48
4-5	6,8	34,1	59,1	100,0	44	45
6+	7,0	22,8	70,2	100,0	57	65
Embarazo y lactancia						
Embarazada	(9,1)	(31,8)	(59,1)	(100,0)	22	23
Lactando	11,1	17,8	71,1	100,0	45	49
Ambas	*	*	*	*	1	1
Ninguna	2,3	23,1	74,6	100,0	173	188
Usa DIU						
Si	*	*	*	*	8	8
No	4,3	23,2	72,5	100,0	233	253
Área de residencia						
Urbana	3,6	18,2	78,2	100,0	55	66
Rural	4,8	24,2	71,0	100,0	186	195
Educación de la madre						
Sin educación	9,1	22,7	68,2	100,0	44	50
Primaria	2,8	25,7	71,6	100,0	109	115
Secundaria	6,1	21,2	72,7	100,0	66	71
Superior	(0,0)	(13,6)	(86,4)	(100,0)	22	25
Total	4,6	22,8	72,6	100,0	241	261

Nota: Anemia moderada: 7.0-9.9 g/dl; anemia leve: 10.0-11.9 g/dl (10.0-10.9 para las mujeres embarazadas).

*: Menos de 20 casos.

(): Entre 20 y 24 casos.

Cuadros 10.10 y 10.11

- Cerca de la mitad de los menores de cinco años en el departamento de Apurímac sufren de algún grado de anemia. Ésta es más frecuente entre las niñas que en los niños (48 % y 46% respectivamente) en los de cuarto a quinto orden y en los residentes en el área rural.

- De anemia leve sufre el 25 por ciento de los menores de cinco años y 20 por ciento de anemia moderada, llegando solo al 2 por ciento de anemia severa.
- Existe cierta relación entre el estado de anemia de la madre y el de sus niños. Cuando ellas no tienen anemia, el 55 por ciento de niños no tienen anemia.

Cuadro 10.10 Prevalencia de anemia en niños menores de 5 años

Prevalencia de anemia en niños 6-59 meses, por tipo de anemia, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Distribución porcentual de mujeres con prueba de anemia						Número de niños sin prueba de anemia	Total de niños
	Niños con anemia			Niños sin anemia	Total	Número de niños		
	Anemia severa	Anemia moderada	Anemia leve					
Edad								
6-9	*	*	*	*	*	9	0	9
10-11	*	*	*	*	*	4	2	6
12-15	*	*	*	*	*	5	2	7
16-23	(0,0)	(26,1)	(39,1)	(34,8)	(100,0)	23	2	25
24-35	2,9	20,6	29,4	47,1	100,0	34	2	36
36-47	2,7	5,4	29,7	62,2	100,0	37	1	38
48-59	0,0	23,3	3,3	73,3	100,0	30	6	36
Sexo del niño								
Hombre	1,3	15,4	29,5	53,8	100,0	78	8	86
Mujeres	3,1	26,6	18,7	51,6	100,0	64	7	71
Orden del nacimiento								
1	6,3	18,8	25,0	50,0	100,0	32	1	33
2-3	0,0	18,9	24,3	56,8	100,0	37	4	41
4-5	2,9	22,9	22,9	51,4	100,0	35	5	40
6+	0,0	21,1	26,3	52,6	100,0	38	5	43
Intervalo de nacimiento								
Primer nacimiento	6,3	18,8	25,0	50,0	100,0	32	1	33
<24 meses	(0,0)	(31,8)	(0,0)	(68,2)	(100,0)	22	2	24
24-47 meses	0,0	19,6	25,5	54,9	100,0	51	6	57
48+ meses	2,7	16,2	37,8	43,2	100,0	37	6	43
Zona de residencia								
Urbana	0,0	11,1	22,2	66,7	100,0	27	6	33
Rural	2,6	22,6	25,2	49,6	100,0	115	9	124
Educación de la madre								
Sin educación	3,7	37,0	22,2	37,0	100,0	27	4	31
Primaria	2,6	14,3	23,4	59,7	100,0	77	7	84
Secundaria	0,0	22,2	29,6	48,1	100,0	27	3	30
Superior	*	*	*	*	*	11	1	12
Total	2,1	20,4	24,6	52,8	100,0	142	15	157

Nota: Anemia severa: 7.0 g/dl, anemia moderada: 7.0-9.9 g/dl, anemia leve: 10.0-11.9/g/dl (10.0-10.9 para las mujeres embarazadas).

*: Menos de 20 casos.


(): Entre 20 y 24 casos.

Cuadro 10.11 Prevalencia de anemia en niños menores de 5 años y de sus madres

Prevalencia de anemia en niños 6-59 meses por tipo de anemia, según la prevalencia de anemia de sus madres, Apurímac 2000

Mujeres/niños	Niños con anemia			Niños sin anemia	Total	Número de casos
	Anemia severa	Anemia moderada	Anemia leve			
Mujeres con anemia	3,8	15,4	34,6	46,2	100,0	36
Moderada	*	*	*	*	*	10
Leve	3,8	15,4	34,6	46,2	100,0	26
Mujeres sin anemia	1,9	20,2	23,1	54,8	100,0	104
Total niños	2,1	20,4	24,6	52,8	100,0	142

*: Menos de 20 casos.



XI. CONOCIMIENTO DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS

XI. CONOCIMIENTO DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS

En la mayoría de los países en desarrollo, las enfermedades de transmisión sexual (ETS) ocupan el segundo lugar entre las causas de enfermedad de las mujeres en edad reproductiva, después de las relacionadas con la maternidad. La mayoría de las ETS que sufren, son infecciones del aparato reproductivo. Si se incluyen las relacionadas con el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), esas enfermedades representan casi el 15 por ciento de las muertes. Los grupos más susceptibles son las mujeres, especialmente las jóvenes.

Si bien el SIDA es de reciente aparición en el Perú, se estima que más de 100,000 personas estarán infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) para el año 2,000. La magnitud del problema, la rápida propagación del VIH/SIDA, la inexistencia de cura para la enfermedad y la relación entre ETS e infección por VIH confirman la importancia de monitorear el conocimiento de la población sobre el problema, la percepción de los riesgos y formas de transmisión y prevención.

El impacto individual, social y económico de la infección VIH/SIDA la convierte en la peor epidemia de la era moderna, pues en un futuro próximo, no existirán presupuestos públicos capaces de proveer insumos, equipos y personal necesarios para atender a los enfermos con las complicaciones propias del estadio SIDA.

Por esas y otras razones, la ENDES 2000 incluyó una sección para indagar sobre el conocimiento general de las mujeres acerca de las enfermedades transmitidas sexualmente: conocimiento de las distintas enfermedades, si las entrevistadas han adquirido enfermedades en los doce meses anteriores a la encuesta, búsqueda de tratamiento o consejo. Con

relación al SIDA, cual fue la principal fuente de información en el caso de haber oído hablar de la enfermedad, qué debe hacerse para evitar contraer el SIDA, si una persona puede tener la enfermedad aunque parezca saludable y si cree que el SIDA puede transmitirse de una madre infectada al niño y en que momento.

Igualmente se les pidió a las mujeres opinar sobre los derechos de las personas infectadas por SIDA a trabajar o llevar una vida en comunidad. También se hicieron preguntas sobre la conducta sexual en los últimos 12 meses (número y tipo de parejas sexuales y uso del condón).

11.1 CONOCIMIENTO DE VIH/SIDA Y FORMAS DE EVITAR EL CONTAGIO

A las mujeres se les preguntó si habían oído hablar de la infección por VIH y de una enfermedad llamada SIDA. A quienes respondieron afirmativamente se les preguntó de cuál fuente de información aprendió más sobre el SIDA y si había algo que una persona puede hacer para evitar infectarse con el virus. Los resultados generales se presentan en las Cuadros 11.1 y 11.2, mientras que en el Cuadro 11.3 se presentan en forma detallada las fuentes de conocimiento.

Cuadro 11.1

Conocimiento de VIH/SIDA

- En el departamento de Apurímac, el conocimiento sobre la existencia del VIH/SIDA alcanza al 60 por ciento del total de mujeres entrevistadas, un poco menos de un cuarto lo conoce pero no sabe como evitarlo (23%) y 37 por ciento de las

entrevistadas conoce alguna forma válida de evitar infectarse con el VIH/SIDA.

29 por ciento conoce una forma válida y 9 por ciento dos o más.

- Los porcentajes que indican menor conocimiento de la existencia del VIH/SIDA se observan en las mujeres de 30 a 49 años, en las casadas o convivientes y en las residentes en el área rural. Según el nivel educativo, en el grupo de mujeres sin educación el desconocimiento es considerable (82%).
- Con relación a las posibles formas de evitar infectarse con el virus que causa el SIDA, en el departamento de Apurímac,
- Entre las formas válidas destaca "limitando el número de compañeros sexuales" (28%), en cambio la respuesta "mediante el uso del condón" alcanzó menor porcentaje (17%).
- La prevención del VIH/SIDA limitando el número de compañeros sexuales, alcanza mayores proporciones entre las mujeres residentes en áreas urbanas (39%), en las solteras que han tenido relaciones sexuales (37%), pero sobre todo en las que estudiaron superior (63%).

Cuadro 11.1 Conocimiento del VIH/SIDA en general por parte de las mujeres entrevistadas y conocimiento particular de formas válidas y específicas de evitar el VIH/SIDA

Distribución porcentual de mujeres por conocimiento del VIH/SIDA y de formas válidas de evitar el VIH/SIDA; porcentaje de mujeres con conocimiento de formas específicas de evitar el VIH/SIDA, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Característica	No sabe como se puede evitar		Si sabe como se puede evitar		Total	Conocimiento específico ¹		Número de mujeres
	No conoce VIH/SIDA	Conoce VIH/SIDA pero no sabe como evitar VIH/SIDA	Conoce una forma	Conoce dos o más formas		Mediante el uso de condón	Limitando el número de compañeros ²	
Edad								
15-19	33,3	26,3	28,5	11,8	100,0	22,0	28,0	186
20-24	35,1	19,5	37,3	8,1	100,0	22,7	30,3	185
25-29	31,4	24,5	34,0	10,1	100,0	18,2	35,2	159
30-39	47,4	21,0	24,4	7,2	100,0	14,1	24,7	291
40-49	45,5	23,7	24,2	6,6	100,0	11,6	25,8	198
Estado civil								
Casada/Conviviente	43,7	20,8	27,9	7,6	100,0	14,8	28,0	724
Divorciada, separada, viuda	41,8	32,8	19,4	6,0	100,0	11,9	19,4	67
Soltera, ha tenido relaciones	20,3	20,3	49,2	10,2	100,0	32,2	37,3	59
Soltera/ no ha tenido relaciones	28,6	28,0	30,4	13,1	100,0	25,0	29,2	168
Area de residencia								
Urbana	10,9	23,2	49,1	16,7	100,0	42,3	38,6	293
Rural	51,4	22,6	20,8	5,2	100,0	7,2	24,0	725
Nivel de educación								
Sin educación	81,7	11,0	6,1	1,2	100,0	1,2	7,3	164
Primaria	53,5	26,2	18,3	2,0	100,0	4,7	16,9	443
Secundaria	11,9	30,5	43,2	14,4	100,0	28,8	42,1	285
Superior	0,0	8,7	63,8	27,6	100,0	55,9	63,0	127
Total	39,7	22,8	28,9	8,5	100,0	17,3	28,2	1 018

¹ Conocimiento de formas específicas de importancia programática

² "Pareja mutuamente fiel" o no tener muchas parejas sexuales

Cuadro 11.2 y Gráfico 11.1

Conocimiento de formas de evitar contagio

- No tener más de una pareja fue mencionado por 34 por ciento de mujeres como una forma de evitar el VIH/SIDA. Sobre todo por el 42 por ciento de mujeres con nivel educativo superior.

- Factores de alto riesgo, como son tener relaciones sexuales con prostitutas (9%), evitar sexo con personas que tienen muchas parejas (7%), el evitar relaciones homosexuales (3%) y abstenerse de tener relaciones sexuales (1%), fueron mencionados en porcentajes muy bajos por las entrevistadas.


Cuadro 11.2 Conocimiento de formas para evitar el contagio entre las mujeres con conocimiento de VIH/SIDA

Mujeres con conocimiento del SIDA: porcentaje que conocen formas para evitar el VIH/SIDA y porcentaje con desinformación, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Característica	Formas de evitar el SIDA										Número de mujeres		
	Abste-nerse	Usar condón	No tener muchas parejas sexuales	Ser pareja mutua-mente fiel	Evitar sexo con personas pro-miscuas	Evitar sexo con prosti-tutas	Evitar sexo homo-sexual	No compartir jeringas o navajas de afeitar	Otras formas	No sabe que hacer		No sabe si se puede evitar	No hay forma de evitar
Edad													
15-19	4,0	33,1	34,7	12,9	4,8	12,9	4,0	8,9	28,2	4,8	17,7	3,2	124
20-24	0,8	35,0	28,3	24,2	8,3	10,8	3,3	24,2	35,8	4,2	17,5	1,7	120
25-29	0,9	26,6	33,9	30,3	5,5	9,2	2,8	14,7	22,9	1,8	23,9	1,8	109
30-39	0,0	26,8	36,6	19,0	9,2	5,9	2,0	17,6	29,4	5,2	22,2	3,3	153
40-49	0,0	21,3	36,1	21,3	4,6	9,3	2,8	9,3	26,9	6,5	25,9	3,7	108
Estado civil													
Casada/Conviviente	0,5	26,2	35,0	25,0	5,9	7,8	2,2	13,5	25,2	4,4	24,0	2,0	408
Divorciada, separada, viuda	0,0	20,5	33,3	5,1	10,3	5,1	0,0	10,3	25,6	7,7	28,2	5,1	39
Soltera, ha tenido relaciones	0,0	40,4	34,0	21,3	14,9	12,8	6,4	29,8	40,4	2,1	12,8	0,0	47
Soltera/ no ha tenido relaciones	4,2	35,0	30,8	13,3	5,0	15,0	5,0	16,7	37,5	5,0	13,3	5,8	120
Area de residencia													
Urbana	2,3	47,5	26,1	28,4	10,0	13,8	3,1	24,5	42,5	3,4	10,0	2,7	261
Rural	0,3	14,7	39,9	15,9	4,2	6,2	2,8	8,2	18,7	5,4	29,7	2,8	353
Nivel de educación													
Sin educación	0,0	6,7	30,0	10,0	6,7	0,0	0,0	0,0	13,3	0,0	43,3	6,7	30
Primaria	1,5	10,2	29,1	12,6	4,4	5,8	1,0	3,9	12,1	8,3	37,4	4,4	206
Secundaria	1,6	32,7	34,7	21,5	6,4	11,6	3,2	13,1	30,3	4,0	16,3	2,0	251
Superior	0,0	55,9	41,7	37,0	11,0	13,4	6,3	40,9	56,7	0,8	0,0	0,8	127
Total	1,1	28,7	34,0	21,2	6,7	9,4	2,9	15,1	28,8	4,6	21,3	2,8	613

Nota: No se muestran los porcentajes para "evitar picaduras de mosquitos" y "evitar besos"

Gráfico 11.1
Conocimiento de Formas de Evitar el VIH/SIDA



Cuadro 11.3

Fuentes de conocimiento

- En el departamento de Apurímac, las fuentes principales de información son la televisión o radio, el 52 por ciento y el 49 por ciento de mujeres que conocen el VIH/SIDA mencionaron esas fuentes, respectivamente. Luego, se encuentran las mujeres que mencionan un trabajador de salud (37%). Un quinto mencionó como fuente de información a la escuela o charlas en similares proporción. La mención de otras fuentes alcanzan a menores porcentajes de mujeres.
- A la televisión se refieren en mayor proporción las mujeres de 25 a 29 años, las residentes en el área urbana, las que tienen educación superior y las mujeres solteras que han tenido relaciones sexuales.
- Las mujeres que mencionan en más de 50 por ciento como fuente principal de información la radio son las de 25 años a más, las actualmente unidas y las unidas alguna vez, las residentes del área urbana y las que alcanzaron educación superior.

Cuadro 11.3 Fuente de conocimiento de VIH/SIDA

Porcentaje de mujeres que conocen VIH/SIDA y entre las mujeres que conocen porcentaje por fuente, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Característica	Conoce SIDA	Número de mujeres	Fuente de conocimiento											Número mujeres conoce SIDA
			Radio	TV	Periódico/Revista	Pan-fletos/Afiches	Trabajador de salud	Escuela	Amigos/Parientes	Lugar de trabajo	Audio visuales/Películas	Charlas	Otras fuentes	
Edad														
15-19	66,7	186	38,7	42,7	15,3	7,3	22,6	56,5	15,3	1,6	2,4	14,5	2,4	124
20-24	64,9	185	45,0	50,0	18,3	12,5	42,5	26,7	18,3	0,8	2,5	15,0	3,3	120
25-29	68,6	159	53,2	64,2	20,2	5,5	35,8	9,2	11,0	0,9	0,9	22,0	2,8	109
30-39	52,6	291	56,2	52,3	24,2	3,3	40,5	4,6	15,0	2,0	1,3	27,5	1,3	153
40-49	54,5	198	52,8	53,7	12,0	4,6	40,7	1,9	19,4	4,6	0,9	23,1	1,9	108
Estado civil														
Casada/Conviviente	56,3	724	51,7	53,9	17,9	5,9	40,2	7,1	15,2	1,7	1,2	22,1	2,0	408
Divorciada, separada, viuda	58,2	67	53,8	43,6	15,4	2,6	35,9	7,7	12,8	0,0	0,0	28,2	5,1	39
Soltera, ha tenido relaciones	79,7	59	48,9	68,1	19,1	12,8	40,4	38,3	17,0	0,0	2,1	21,3	2,1	47
Soltera/ no ha tenido relaciones	71,4	168	40,0	43,3	20,8	7,5	22,5	59,2	18,3	4,2	3,3	13,3	2,5	120
Area de residencia														
Urbana	89,1	293	58,2	74,3	30,7	9,2	33,0	26,4	19,2	2,7	3,4	18,8	3,1	261
Rural	48,6	725	42,8	36,0	9,3	4,5	39,1	14,7	13,3	1,4	0,3	22,1	1,7	353
Nivel de educación														
Sin educación	18,3	164	26,7	16,7	0,0	0,0	43,3	0,0	20,0	0,0	0,0	33,3	3,3	30
Primaria	46,5	443	40,3	32,5	3,9	2,4	37,4	3,4	17,5	1,0	0,0	26,2	1,0	206
Secundaria	88,1	285	48,6	56,6	16,3	6,0	31,9	32,3	13,9	0,8	1,6	12,4	2,0	251
Superior	100,0	127	70,9	84,3	50,4	15,7	42,5	26,0	15,7	6,3	4,7	25,2	4,7	127
Total	60,3	1 018	49,3	52,3	18,4	6,5	36,5	19,7	15,8	2,0	1,6	20,7	2,3	613

11.2 CONOCIMIENTO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON EL VIH/SIDA

A las mujeres entrevistadas se les hizo una serie de preguntas sobre asuntos relacionados con el VIH/SIDA como medio de evaluar el grado de conocimiento sobre el tema. Se preguntó específicamente si una persona que parece saludable puede estar infectada, si el virus de VIH puede ser transmitido de la madre al niño y en qué momento. Los resultados se presentan en el Cuadro 11.4.

Igualmente se preguntó a las entrevistadas específicamente sobre aspectos sociales de la prevención del SIDA y relacionados con asuntos tales como la discriminación de las personas con SIDA; los derechos, a menudo conflictivos, de la persona con SIDA a su privacidad y los de la comunidad a protegerse de la enfermedad. Los resultados se detallan en el Cuadro 11.5.

Cuadro 11.4

Conocimiento de asuntos relacionados con el VIH/SIDA

- El 32 por ciento de las mujeres que conocen la existencia del SIDA sabe que una persona puede lucir saludable pero estar contagiada. La proporción es más alta entre las mujeres residentes en el área urbana (65%), las que tienen educación superior (90%) y las de 20 a 24 años de edad (39%).
- Por otro lado, el 32 por ciento de mujeres opina que el virus puede ser transmitido de una madre infectada al niño durante el embarazo o el parto y el 25 por ciento durante la lactancia. Este conocimiento es mayor, en términos generales, en las residentes en el área urbana y en las que alcanzaron un nivel de educación superior.

Cuadro 11.4 Conocimiento de asuntos relacionados con el VIH/SIDA

Distribución porcentual de mujeres que conocen VIH/SIDA por conocimiento de asuntos relacionados con el VIH/SIDA, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Característica	Una persona que luce saludable puede tener SIDA			El VIH/SIDA se puede transmitir de la madre al niño				Número de mujeres
	Si	No	No sabe/ No conoce/ Sin inform.	No	Durante embarazo o parto	Durante la lactancia	No sabe	
Edad								
15-19	36,6	15,6	47,8	2,2	33,9	34,9	40,9	186
20-24	38,9	7,6	53,5	1,6	42,2	27,0	42,7	185
25-29	34,0	13,8	52,2	5,0	34,6	28,3	37,1	159
30-39	26,5	7,2	66,3	0,7	24,7	21,6	57,4	291
40-49	27,3	6,1	66,7	2,0	28,3	16,7	53,0	198
Estado civil								
Casada/Conviviente	28,1	8,3	63,6	1,7	28,8	21,9	52,0	724
Divorciada, separada, viuda	25,4	6,0	68,7	4,5	26,9	13,4	49,3	67
Soltera, ha tenido relaciones	54,2	13,6	32,2	3,4	50,8	44,1	27,1	59
Soltera/ no ha tenido relaciones	42,9	15,5	41,7	2,4	39,9	36,9	35,7	168
Área de residencia								
Urbana	64,8	7,8	27,3	1,7	65,2	51,5	15,7	293
Rural	18,6	10,3	71,1	2,2	18,3	14,5	60,6	725
Nivel de educación								
Sin educación	1,2	3,7	95,1	1,2	2,4	0,6	87,8	164
Primaria	13,5	7,0	79,5	1,6	13,3	12,6	64,8	443
Secundaria	52,3	18,6	29,1	4,2	53,3	42,8	18,6	285
Superior	89,8	6,3	3,9	0,0	85,8	60,6	1,6	127
Total	31,9	9,6	58,5	2,1	31,8	25,1	47,7	1 018

Cuadro 11.5

Aspectos sociales de la prevención del SIDA

- En el departamento de Apurímac, un 20 por ciento de mujeres opina que un profesor que tiene SIDA puede seguir enseñando. La proporción que piensa lo contrario alcanza a 32 por ciento y la mayor proporción de mujeres (49%) no sabe o no opina al respecto.
- Entre las que dieron una respuesta afirmativa, destacan las entrevistadas de edades 20 a 24 años, las solteras que han tenido relaciones sexuales, las residentes del área urbana y las que tienen educación superior.
- Acerca de si una persona infectada debe ser despedida del trabajo, las mujeres que opinan afirmativamente alcanzan el 31% y las que opinan negativamente el 19 por ciento. Pero, más de dos quintos no sabe o no opina sobre el tema (49%). Los mayores porcentajes de mujeres que respondieron afirmativamente son las solteras que no han tenido relaciones sexuales, las residentes del área urbana y las que tienen educación secundaria.
- Respecto a que si estaría dispuesta a cuidar a un pariente si éste llegara a enfermarse con el virus que causa el SIDA, el 26 por ciento manifiesta estar de acuerdo, 25 por ciento no está de acuerdo y 50 por ciento no sabe. Las que demuestran en general tener menos prejuicios o temores respecto a estos aspectos son las solteras con experiencia sexual, las residentes del área urbana y las que tienen estudios superiores.

Cuadro 11.5 Aspectos sociales de la prevención del SIDA y su mitigación

Distribución porcentual de mujeres que conocen de VIH/SIDA, por respuestas a preguntas sobre ciertos aspectos sociales de la prevención y mitigación del SIDA, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Característica	Maestro con SIDA puede seguir enseñando			Persona infectada debe ser despedida del trabajo			Dispuesta a cuidar pariente infectado en el hogar			Número de mujeres
	Si	No	No sabe	Si	No	No sabe	Si	No	No sabe	
Edad										
15-19	19,4	37,1	43,5	37,6	19,4	43,0	27,4	28,5	44,1	186
20-24	28,1	29,7	42,2	32,4	22,7	44,9	27,6	29,2	43,2	185
25-29	22,6	37,1	40,3	37,7	22,0	40,3	28,9	32,1	39,0	159
30-39	15,8	26,1	58,1	24,7	16,5	58,8	21,6	19,6	58,8	291
40-49	14,6	31,8	53,5	28,8	18,2	53,0	24,7	20,2	55,1	198
Estado civil										
Casada/Conviviente	16,6	30,8	52,7	30,5	16,0	53,5	21,8	24,8	53,4	724
Divorciada, separada, viuda	19,4	28,4	52,2	28,4	19,4	52,2	19,4	29,9	50,7	67
Soltera, ha tenido relaciones	42,4	27,1	30,5	28,8	42,4	28,8	54,2	16,9	28,8	59
Soltera/ no ha tenido relaciones	24,4	38,1	37,5	36,9	25,6	37,5	33,9	26,8	39,3	168
Area de residencia										
Urbana	41,6	40,6	17,7	40,6	41,0	18,4	51,2	25,9	22,9	293
Rural	10,6	28,0	61,4	27,5	10,6	61,8	15,2	24,7	60,2	725
Nivel de educación										
Sin educación	0,6	9,1	90,2	9,1	0,6	90,2	3,0	8,5	88,4	164
Primaria	6,5	29,3	64,1	29,1	6,3	64,6	14,0	23,9	62,1	443
Secundaria	28,1	49,8	22,1	50,2	26,7	23,2	35,4	40,0	24,6	285
Superior	70,1	27,6	2,4	25,2	72,4	2,4	72,4	16,5	11,0	127
Total	19,5	31,6	48,9	31,3	19,3	49,4	25,5	25,0	49,5	1 018

11.3 CONOCIMIENTO DE LAS ENFERMEADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS)

Los programas de control de VIH/SIDA reconocen en la actualidad la importancia de controlar las ETS para reducir la transmisión del

VIH. Se reconoce que entre los esfuerzos necesarios, uno de los más importantes es la educación para que la población reconozca los síntomas de las ETS. También se reconoce que poco se sabe sobre cómo los hombres y mujeres perciben y responden a las ETS. Por esta razón en la ENDES 2000 se preguntó a las

entrevistadas si habían oído hablar de otras enfermedades que se pueden transmitir a través del contacto sexual; cuáles enfermedades conocían y si conocían síntomas y signos para reconocer que una persona tiene una enfermedad de transmisión sexual. Los resultados se pueden apreciar en el Cuadro 11.6 y 11.7.

Cuadros 11.6 y 11.7

Conocimiento de los síntomas de las ETS

- En el departamento de Apurímac, alrededor de la tercera parte de entrevistadas conoce una enfermedad de transmisión sexual. El 9 por ciento desconoce cualquier síntoma y 21 por ciento conoce por lo menos un síntoma.
- El desconocimiento de las ETS es más alto en las mujeres de 30 años a más de edad,

en las divorciadas, separadas o viudas, en las residentes en el área rural y en aquellas sin educación.

- La sífilis y la gonorrea son las ETS más conocidas (67% y 45% respectivamente) por las mujeres que han oído hablar sobre la existencia de las ETS.
- La sífilis y la gonorrea son conocidas por mayor proporción de mujeres de 20 a 24 años de edad, las solteras, las residentes en el área urbano y las que alcanzaron nivel de educación superior.
- Entre las que conocen las ETS, los síntomas que identifica más de un quinto de esta población es la pérdida de peso (32%), luego menciona enrojecimiento o picazón en genitales (21%) y menores porcentajes mencionan otros signos especificados en el cuadro. La categoría "otros síntomas" son mencionadas por el (20%).

Cuadro 11.6 Conocimiento de los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y ETS específicas

Distribución porcentual de las mujeres por conocimiento de los síntomas asociados con las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y porcentaje de mujeres, por ETS que conocen, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Característica	Síntomas específicas de las ETS				Total	Número de mujeres	Conoce ETS específicas				Número de mujeres
	No conoce sobre las ETS	No conoce	Conoce	Conoce			Conoce sífilis	Conoce gonorrea	Verrugas genitales/condiloma	Otras ETS	
		síntomas de ETS	un síntoma	dos o más síntomas							
Edad											
15-19	67,2	12,4	6,5	14,0	100,0	186	63,9	39,3	8,2	14,8	61
20-24	66,5	7,0	6,5	20,0	100,0	185	69,4	50,0	4,8	14,5	62
25-29	63,5	8,8	8,2	19,5	100,0	159	69,0	37,9	5,2	8,6	58
30-39	74,6	8,9	3,8	12,7	100,0	291	66,2	52,7	9,5	17,6	74
40-49	73,7	7,6	7,1	11,6	100,0	198	67,3	44,2	5,8	17,3	52
Estado civil											
Casada/Conviviente	72,1	8,6	5,9	13,4	100,0	724	66,3	42,6	5,4	14,4	202
Divorciada, separada, viuda	77,6	7,5	3,0	11,9	100,0	67	*	*	*	*	15
Soltera, ha tenido relaciones	40,7	10,2	11,9	37,3	100,0	59	74,3	48,6	2,9	11,4	35
Soltera/ no ha tenido relaciones	67,3	10,7	6,0	16,1	100,0	168	69,1	56,4	12,7	12,7	55
Área de residencia											
Urbana	43,7	11,6	8,9	35,8	100,0	293	80,6	58,8	9,1	10,3	165
Rural	80,4	7,9	5,0	6,7	100,0	725	51,4	29,6	4,2	19,7	142
Nivel de educación											
Sin educación	93,9	4,9	1,2	0,0	100,0	164	*	*	*	*	10
Primaria	83,3	9,0	3,6	4,1	100,0	443	39,2	14,9	2,7	16,2	74
Secundaria	58,9	10,9	11,6	18,6	100,0	285	70,1	35,9	6,8	16,2	117
Superior	16,5	9,4	8,7	65,4	100,0	127	86,8	80,2	10,4	10,4	106
Total	69,9	8,9	6,1	15,1	100,0	1 018	67,1	45,3	6,8	14,7	307

*: Menos de 20 casos.

Cuadro 11.7 Conocimiento de síntomas y signos de las ETS

Entre las mujeres con conocimiento de ETS, porcentaje con conocimiento de síntomas y signos específicos, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Característica	Síntomas y signos de las ETS													No conoce síntomas	Número de mujeres
	Dolor abdominal	Secreción vaginal	Secreción maloliente	Molestias	Enrojecimiento/picazón en genitales	Inflamación o hinchazón en genitales	Úlceras/lagas genitales	Verrugas genitales	Sangre en la orina	Pérdida de peso	Puede no haber síntomas	Secreción o pus por el pene	Otros síntomas		
Edad															
15-19	11,5	4,9	9,8	1,6	11,5	1,6	13,1	1,6	0,0	32,8	1,6	3,3	24,6	36,1	61
20-24	14,5	22,6	12,9	9,7	30,6	11,3	11,3	0,0	0,0	38,7	3,2	1,6	25,8	19,4	62
25-29	10,3	17,2	8,6	1,7	24,1	10,3	15,5	3,4	0,0	34,5	0,0	0,0	15,5	24,1	58
30-39	16,2	14,9	17,6	9,5	20,3	8,1	16,2	2,7	1,4	25,7	0,0	4,1	17,6	35,1	74
40-49	13,5	19,2	23,1	7,7	17,3	5,8	9,6	0,0	0,0	28,8	0,0	1,9	15,4	28,8	52
Estado civil															
Casada/Conviviente	14,9	16,8	14,4	6,9	22,3	8,4	11,4	2,0	0,5	28,2	1,0	2,5	15,8	30,2	202
Divorciada, separada, viuda	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	15
Soltera, ha tenido relaciones	11,4	14,3	14,3	8,6	25,7	5,7	17,1	2,9	0,0	48,6	0,0	0,0	31,4	17,1	35
Soltera/ no ha tenido relaciones	12,7	12,7	14,5	1,8	12,7	5,5	14,5	0,0	0,0	34,5	1,8	1,8	23,6	30,9	55
Area de residencia															
Urbana	15,8	26,7	15,8	7,9	24,2	12,1	13,9	1,8	0,6	37,6	0,0	3,0	21,8	20,6	165
Rural	10,6	2,8	12,7	4,2	16,9	2,1	12,7	1,4	0,0	25,4	2,1	1,4	17,6	38,7	142
Nivel de educación															
Sin educación	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	10
Primaria	8,1	5,4	4,1	0,0	6,8	2,7	10,8	1,4	0,0	23,0	1,4	0,0	9,5	51,4	74
Secundaria	12,8	12,8	13,7	5,1	16,2	2,6	11,1	0,9	0,0	29,9	0,9	2,6	25,6	26,5	117
Superior	18,9	27,4	23,6	12,3	37,7	17,0	18,9	2,8	0,9	41,5	0,9	3,8	22,6	11,3	106
Total	13,4	15,6	14,3	6,2	20,8	7,5	13,4	1,6	0,3	31,9	1,0	2,3	19,9	29,0	307

*: Menos de 20 casos.

11.4 PREVALENCIA DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

A las mujeres entrevistadas se les hizo una serie de preguntas para averiguar la prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual (ETS). En particular se les preguntó si en los últimos doce meses le diagnosticaron alguna ETS, si tuvo manifestaciones específicas de las mismas, como flujo vaginal anormal, o úlceras/lagas genitales y a las que tuvieron alguno de esos problemas, a quién acudió en busca de consejo o tratamiento.

Cuadros 11.8 y 11.9

- En el departamento de Apurímac alrededor del uno por ciento de mujeres declaró haber tenido alguna ETS en los

12 meses anteriores a la encuesta. Sin embargo, la presencia de flujo vaginal anormal fue declarado por el 19 por ciento y llagas o úlceras vaginales por el 2%. El flujo vaginal fue reportado en mayor proporción por las mujeres de 25 a 29 años (24%) las divorciadas, separadas o viudas (25%), las residentes del área urbana (19%) y las mujeres con educación secundaria y superior (22% en cada grupo).

- También se indagó si la entrevistada hizo algo o no para solucionar ese problema de salud y se obtuvo que 38 por ciento no tuvo consejo o tratamiento frente al 57 por ciento que recurrió a alguien. Entre las últimas destacan las que recurrieron al médico (49%), seguido de las que recurrieron al curandero, farmacia o tienda

(10%), se autorrecetó (4%) y por último están las que consultaron a amigos o parientes (2%).

- Entre las mujeres que no recibieron tratamiento, se encuentra una mayor proporción de mujeres residentes en el área rural (42%).

Cuadro 11.8 Prevalencia de enfermedades de transmisión sexual por características seleccionadas

Entre las mujeres entrevistadas porcentaje a quienes se les diagnosticó una ETS en los últimos 12 meses; y entre aquellas que tuvieron relaciones en los últimos 12 meses, porcentaje con flujo o secreción vaginal y porcentaje que ha tenido alguna llaga o úlcera genital, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Característica	Ha tenido ETS	Flujo vaginal anormal	Úlcera o llagas genitales	ETS flujo, úlceras o llagas	Número de mujeres
Edad					
15-19	0,0	9,8	2,0	9,8	51
20-24	0,0	13,5	2,5	14,1	163
25-29	0,0	23,7	1,9	25,0	156
30-39	1,8	19,7	3,2	23,2	284
40-49	0,0	19,3	1,5	20,3	197
Estado civil					
Casada/Conviviente	0,6	18,3	2,6	20,3	724
Divorciada, separada, viuda	0,0	25,4	0,0	25,4	67
Soltera, ha tenido relaciones	1,7	13,6	1,7	15,3	59
Área de residencia					
Urbana	1,3	19,1	1,8	20,9	225
Rural	0,3	18,4	2,6	20,1	625
Nivel de educación					
Sin educación	0,0	10,8	1,9	12,0	158
Primaria	0,0	19,1	3,3	20,7	397
Secundaria	0,0	22,0	1,6	22,6	186
Superior	4,5	21,8	0,9	27,3	110
Total	0,6	18,6	2,4	20,3	850

Cuadro 11.9 Fuente de tratamiento para las enfermedades de transmisión sexual

Entre las mujeres que tuvieron ETS, flujo vaginal, úlceras o llagas vaginales en los últimos 12 meses, porcentaje que recibió consejo o tratamientos, por fuente de tratamiento y según características seleccionadas, Apurímac 2000

Característica	Médico	Curandero	Farmacia/Botica	Cualquier fuente	Consultó amigos/parientes	Se auto recetó	Ni consejos ni tratamiento	Número de mujeres
Edad								
15-19	*	*	*	*	*	*	*	5
20-24	(26,1)	(17,4)	(0,0)	(43,5)	(4,3)	(17,4)	(34,8)	23
25-29	53,8	0,0	10,3	53,8	2,6	2,6	41,0	39
30-39	57,6	7,6	12,1	62,1	0,0	1,5	36,4	66
40-49	47,5	22,5	12,5	62,5	2,5	2,5	32,5	40
Área de residencia								
Urbana	57,4	4,3	23,4	61,7	6,4	6,4	25,5	47
Rural	45,2	12,7	5,6	54,8	0,0	3,2	42,1	126
Nivel de educación								
Sin educación	*	*	*	*	*	*	*	19
Primaria	37,8	11,0	6,1	46,3	1,2	2,4	50,0	82
Secundaria	61,9	11,9	19,0	69,0	4,8	7,1	19,0	42
Superior	66,7	6,7	16,7	73,3	0,0	3,3	23,3	30
Total	48,6	10,4	10,4	56,6	1,7	4,0	37,6	173

*: Menos de 20 casos.

(): Entre 20 y 24 casos.

11.5 CONDUCTA SEXUAL, USO DEL CONDÓN Y ACCESO AL CONDÓN

La conducta sexual individual y el uso de condones son determinantes claves del estatus de riesgo de contraer ETS y cuando esta información se agrega a nivel de la población permite describir el contexto en el cual se deben diseñar e implementar los programas preventivos de VIH/SIDA y ETS, al igual que los programas curativos de ETS y de alivio de VIH/SIDA. En la ENDES 2000 se preguntó a las mujeres por relaciones sexuales en los últimos 12 meses, número de parejas sexuales, uso de condón en la última relación y conocimiento de fuentes. Se trató también de conocer la relación de la mujer con la persona con quien tuvo la relación para distinguir la pareja sexual regular de la no regular, cohabitante o no. Los resultados se detallan en los Cuadros 11.10 a 11.12.

Cuadro 11.10

Número de parejas sexuales de las mujeres

- En el departamento de Apurímac, entre las mujeres que no están casadas o unidas pero que tienen vida sexual activa, 63 por ciento dijo que no tuvo relaciones sexuales durante los últimos 12 meses, 37 por ciento manifestó haberlas tenido con un solo compañero.
- Destacan las proporciones de mujeres no unidas de 40 a 49 años que son activas sexualmente y tuvieron relaciones en los últimos 12 meses, las solteras que han tenido relaciones sexuales, las residentes en áreas rurales y las que no tienen ningún nivel de educación (63%).

Cuadro 11.10 Número de parejas sexuales de las mujeres no en unión

Distribución porcentual de mujeres no en unión por número de personas con quienes han tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Característica	Número de compañeros sexuales		Total	Promedio de parejas	Número de mujeres
	Ninguno	Uno			
Edad					
15-19	91,4	8,6	100,0	0,1	152
20-24	44,4	55,6	100,0	0,6	54
25-29	(25,0)	(75,0)	(100,0)	(0,8)	24
30-39	37,8	62,2	100,0	0,6	37
40-49	7,4	92,6	100,0	0,9	27
Estado civil					
Divorciada, separada, viuda	23,9	76,1	100,0	0,8	67
Soltera, ha tenido relaciones	1,7	98,3	100,0	1,0	59
Soltera/ no ha tenido relaciones	100,0	0,0	100,0	0,0	168
Area de residencia					
Urbana	63,7	36,3	100,0	0,4	113
Rural	62,4	37,6	100,0	0,4	181
Nivel de educación					
Sin educación	37,0	63,0	100,0	0,6	27
Primaria	60,2	39,8	100,0	0,4	88
Secundaria	78,2	21,8	100,0	0,2	133
Superior	39,1	60,9	100,0	0,6	46
Total	62,9	37,1	100,0	0,4	294

(): Entre 20 y 24 casos.

Cuadro 11.11

Conocimiento y uso del condón

- En el departamento de Apurímac, gran proporción de mujeres que conocen sobre el VIH /SIDA y tuvieron relaciones durante los últimos 12 meses conoce el condón (93%). Pero alrededor de 11 por ciento desconoce dónde conseguirlo. La mayoría de las que saben donde, conseguirlo mencionó alguna fuente del sector público (88%), en segundo lugar las farmacias (22%) y menores proporciones mencionaron otras fuentes.
- Al indagar si usaron condón en la última relación sexual, se obtuvo que 5 por ciento lo usó el mes pasado y dos por ciento antes.
- Las mujeres que en mayor proporción usaron condón el mes anterior a la encuesta son las más jóvenes de 15 a 19 años, las solteras con relaciones sexuales, las residentes del área urbana y las que alcanzaron educación secundaria o superior.

Cuadro 11.11 Conocimiento y uso del condón

Entre las mujeres que conocen sobre VIH/SIDA y que han tenido relaciones sexuales, porcentaje que conoce el condón masculino, porcentaje que conoce una fuente para condón, porcentaje que los usó durante última relación, y porcentaje que usó condón para planificación familiar pero no durante la última relación, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Característica	Conoce sobre el condón ¹	Conoce fuente para el condón ²					No conoce fuente para el condón	Usó condón última relación		Usa condón para PF; no usó en última relación	Número de mujeres
		Fuente médica pública	Fuente médica privada	Farmacia	Otra fuente	Podría conseguir condones		El mes pasado	Antes		
Edad											
15-19	93,3	90,0	3,3	36,7	0,0	43,3	10,0	13,3	3,3	0,0	30
20-24	94,2	92,3	1,0	26,0	1,0	46,2	6,7	3,8	3,8	0,0	104
25-29	96,2	90,6	0,0	23,6	0,0	42,5	9,4	7,5	1,9	0,0	106
30-39	93,2	88,4	1,4	19,0	0,0	39,5	10,9	4,1	1,4	0,7	147
40-49	88,8	81,3	0,9	15,9	0,0	29,0	17,8	3,7	1,9	0,9	107
Estado civil											
Casada/Conviviente	93,6	89,7	1,2	21,6	0,0	40,7	10,0	5,6	0,5	0,5	408
Divorciada, separada, viuda	84,6	71,8	0,0	12,8	0,0	17,9	25,6	0,0	7,7	0,0	39
Soltera, ha tenido relaciones	95,7	89,4	0,0	31,9	2,1	46,8	8,5	6,4	12,8	0,0	47
Área de residencia											
Urbana	96,4	91,9	1,5	39,6	0,5	50,8	6,6	7,1	5,1	0,5	197
Rural	90,9	85,9	0,7	10,1	0,0	32,0	14,1	4,0	0,3	0,3	297
Nivel de educación											
Sin educación	72,4	75,9	0,0	3,4	0,0	13,8	24,1	0,0	0,0	0,0	29
Primaria	88,1	77,7	0,0	11,4	0,0	25,9	22,3	2,6	0,0	0,0	193
Secundaria	98,1	96,3	1,2	26,5	0,6	48,1	3,1	8,0	1,9	0,6	162
Superior	100,0	98,2	2,7	38,2	0,0	57,3	0,0	7,3	7,3	0,9	110
Total	93,1	88,3	1,0	21,9	0,2	39,5	11,1	5,3	2,2	0,4	493

¹ Conocimiento para planificación familiar o para prevención de enfermedades

² Para las usuarias actuales se incluyen como fuente el último sitio donde obtuvo en condón

Cuadro 11.12 y Gráfico 11.2

Uso de condón según tipo de compañero

- Con relación al uso del condón en la última relación sexual, solamente el 4 por ciento de las mujeres casadas o unidas lo usaron, principalmente las que viven en el área urbana y las que tienen educación superior.

En las que no están casadas o unidas pero que tienen vida sexual activa

- En el grupo de las que tienen cualquier compañero sexual un 6 por ciento usó el condón en la última relación sexual y entre las que tienen un compañero con quien no viven, el 29 por ciento lo usó.

Cuadro 11.12 Uso de condón por tipo de compañero


Entre las mujeres que tuvieron relaciones sexuales el año anterior a la encuesta, porcentaje que usaron condón en la última relación con el esposo o compañero, con cualquier compañero, según características seleccionadas, Apurímac 2000


Característica	Usó condón con esposo o compañero		Usó condón con cualquier compañero	
	Porcentaje	Número de mujeres	Porcentaje	Número de mujeres
Edad				
15-19	5,4	37	10,6	47
20-24	3,1	131	6,0	149
25-29	7,4	135	8,6	140
30-34	2,8	254	3,4	261
40-49	4,3	164	4,2	166
Estado civil				
Casada/Conviviente	4,2	705	4,2	705
Divorciada, separada, viuda	*	14	(12,5)	24
Soltera, ha tenido relaciones	*	1	27,3	33
Area de residencia				
Urbana	8,4	179	12,4	201
Rural	2,8	541	3,0	561
Nivel de educación				
Sin educación	0,7	134	0,7	135
Primaria	2,3	353	2,2	365
Secundaria	7,2	152	10,4	164
Superior	12,2	82	16,2	99
Total	4,2	720	5,5	762

*: Menos de 20 casos.

(): Entre 20 y 24 casos.

Gráfico 11.2
Uso de Condón por tipo de Compañero





XII. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS NIÑOS

XII. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS NIÑOS

La violencia familiar es una manifestación del ejercicio del poder de una persona sobre otra, sea física, psicológica o sexual. Es expresada a través de insultos, amenazas, coerciones, chantajes y/o agresiones físicas. Esta violencia afecta la salud de las personas que la sufren, sin embargo, es un problema que generalmente se oculta principalmente por la víctima. En muchas culturas es tolerada y hasta legitimada como un derecho del hombre sobre la mujer y los hijos, pasando a formar parte de la interacción dentro de la familia. La violencia se constituye como práctica cotidiana, perpetuándose a través de las generaciones en la crianza de los hijos, los que a su vez la replican cuando son padres en sus propios hijos.

En la ENDES 2000, se incluyó por primera vez en Perú, en este tipo de encuestas, un módulo sobre violencia familiar. A las mujeres alguna vez unidas se les preguntó por episodios de violencia verbal y física de parte del esposo o compañero. A todas las mujeres se les preguntó si alguna otra persona había ejercido violencia contra ella, a quien pidió ayuda, si visitó alguna institución para buscar ayuda; para quienes no buscaron ayuda, se les preguntó la razón por la cual no lo hicieron. A las mujeres que tenían por lo menos un hijo viviendo en el hogar se les preguntó quién castigaba a los hijos en el hogar y en cada caso la forma en que eran castigados. También se preguntó en qué forma la castigaban a ella sus padres, de ser el caso, y si el padre castigaba a la madre. Finalmente, se preguntó a las entrevistadas si consideraban que era necesario el castigo físico para educar a los hijos.

12.1 VIOLENCIA VERBAL DEL ESPOSO CONTRA LA MUJER

Para iniciar en el tema de la violencia conyugal, en la ENDES 2000, a las mujeres

casadas o unidas, o que lo hubieran estado anteriormente, se les hizo preguntas específicas acerca de si sus esposos o compañeros ejercían ciertas presiones o les hacían acusaciones relacionadas con la vida de pareja. Cabe aclarar que, si no se lograba privacidad total en las preguntas sobre violencia doméstica, no se aplicaba dichas preguntas.

Como una forma de indagar sobre la violencia de tipo psicológico, específicamente, se preguntó por situaciones de apoyo emocional: si el esposo pasaba tiempo con ella y si es o era cariñoso; situaciones de control de la pareja: si el esposo la ignoraba o era indiferente con ella, si le prohibía que estudiara o trabajara, si le impedía el contacto con las amigas o amigos o con la familia; por situaciones desobligantes: si le gritaba cuando le hablaba o si le decía "no sirves para nada"; y finalmente, amenazas específicas como "me tienes cansado, me voy de la casa" o "si te vas te quito mis hijos". El porcentaje de mujeres que contestaron afirmativamente a cada una de estas "situaciones de control por parte del esposo" se detallan en el Cuadro 12.1.

Cuadro 12.1

Apoyo emocional y violencia verbal por parte del esposo/compañero

- En el departamento de Apurímac, gran proporción de mujeres alguna vez unidas viven o han vivido con su esposo o compañero situaciones de apoyo emocional: esto es, que "pasa tiempo con ella" (95%) o es cariñoso (94%). En ambas situaciones, las menores proporciones se aprecian entre las viudas, divorciadas o separadas (90% y 82% respectivamente).

- Según área de residencia las mujeres que mayor apoyo emocional viven o han vivido con su esposo o compañero son las residentes en el área rural.
- Alrededor de un tercio de mujeres alguna vez unidas viven, o han vivido, situaciones de control de la pareja, tales como "la ignora o es indiferente" (52%), le prohíbe que estudie o trabaje (28%) o le impide ver amistades y familiares (23%). Según la edad, al 61 por ciento de las mujeres de 35 a 39 años su pareja las ignora o es indiferente; la mayor proporción de mujeres a las que su pareja le prohíbe que estudie o trabaje son las comprendidas entre 15 a 19 años a 31 por ciento de las que tienen entre 35 a 39 años le impiden ver amistades o familiares.
- Por otro lado, en cuanto a situaciones desobligantes, más de la mitad de mujeres alguna vez unidas manifiesta que su pareja le grita cuando se dirige a ella (57%) y el 35 por ciento mencionó que su pareja le dice que no sirve para nada. En ambos casos, las menores proporciones de mujeres con esta experiencia se observan entre las del grupo de 15 a 19 años y las que alcanzaron nivel superior de educación.
- En los casos mencionados de situaciones desobligantes, es mayor la proporción de mujeres residentes en el área rural que en la urbana, especialmente si se trata de que el marido le grita cuando se dirige a ella (61%).
- Alrededor de un cuarto de mujeres han sufrido amenazas por parte del marido, tales como "me tienes cansado", "me iré de la casa" (26%) o "si te vas te quito a mis hijos" (21%). Esta situación para el primer caso es más frecuente entre las mujeres residentes en el área rural en comparación a las del área urbana, en el segundo caso no hay diferencias apreciables.

Cuadro 12.1 Violencia intrafamiliar: apoyo emocional y violencia verbal por parte del esposo

Porcentaje de mujeres alguna vez unidas, que experimentó situaciones de apoyo emocional y de violencia verbal por parte del esposo, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Situaciones de apoyo emocional		Situaciones de control del esposo			Situaciones desobligantes		Amenazas		Número de mujeres
	Esposo pasaba tiempo con ella	El es/era cariñoso con ella	La ignora o es indiferente	Le prohíbe que estudie/trabaje	Le impide ver amigos/familia	Le grita cuando le habla	Le dice "no sirves para nada"	Le dice "me tienes cansado me voy de la casa"	Le dice: "si te vas te quito mis hijos"	
Edad										
15-19	100,0	97,3	37,8	35,1	10,8	32,4	10,8	16,2	16,2	37
20-24	94,3	95,7	45,0	25,7	20,0	40,0	22,1	15,0	15,7	140
25-29	97,2	97,2	49,7	31,0	25,5	61,4	38,6	29,0	26,2	145
30-34	95,9	94,6	56,5	25,2	21,8	57,1	32,0	25,9	20,4	147
35-39	93,6	91,2	60,8	34,4	31,2	60,8	46,4	34,4	21,6	125
40-44	92,3	92,3	50,5	23,1	19,8	62,6	40,7	27,5	22,0	91
45-49	96,2	93,3	53,8	27,9	24,0	71,2	44,2	26,9	19,2	104
Estado civil										
Casada /conviviente	95,8	95,6	50,0	27,8	21,3	55,1	33,2	23,3	18,4	721
Viuda/ divorciada / separada	89,6	82,1	73,1	34,3	43,3	74,6	58,2	52,2	44,8	67
Área de residencia										
Urbana	94,3	90,6	37,0	32,8	24,0	45,3	27,1	20,8	20,8	192
Rural	95,6	95,6	56,8	27,0	22,9	60,5	38,0	27,3	20,6	596
Nivel de educación										
Sin educación	94,8	92,9	60,0	26,5	28,4	65,8	50,3	30,3	19,4	155
Primaria	95,0	95,3	55,7	29,0	21,4	59,9	35,4	25,9	16,6	379
Secundaria	94,6	94,0	46,7	31,1	26,9	52,7	28,1	25,7	29,3	167
Superior	98,9	94,3	31,8	23,9	14,8	35,2	22,7	17,0	23,9	88
Total	95,3	94,4	52,0	28,4	23,2	56,8	35,4	25,7	20,7	788

12.2 VIOLENCIA FÍSICA CONTRA LA MUJER

En forma directa se les preguntó a las mujeres que habían estado alguna vez casadas o unidas si sus esposos o compañeros habían ejercido violencia física contra ellas. Específicamente se preguntó si habían sido empujadas, golpeadas o agredidas por parte del marido, al igual que la frecuencia. Los resultados se presentan en el Cuadro 12.2.

A las mujeres en unión se les preguntó también si habían experimentado violencia física por parte de una persona diferente al esposo o compañero. A las mujeres no unidas se les hizo la pregunta general y en ambos casos se pidió identificar la persona que ejerció la violencia. Los resultados se presentan en el Gráfico 12.1. A las mujeres alguna vez unidas se les preguntó por el uso de alcohol hasta embriagarse por parte del cónyuge. La información se detalla en el Cuadro 12.3.

Cuadro 12.2

Violencia física por parte del esposo/compañero

- En el departamento de Apurímac, el 50

por ciento de las mujeres experimentaron violencia física por parte del esposo. En general, esta violencia física contra las esposas o compañeras es mayor entre las mujeres de 40 a 44 años (60%), en las que estuvieron anteriormente casadas o unidas (70%), en las residentes del área rural (53%) y en las que no tienen nivel de educación (62%).

- El 83 por ciento de las mujeres alguna vez unidas dijeron que son maltratadas "a veces" por su esposo o compañero y el 15 por ciento es agredida frecuentemente.

Violencia física a las mujeres alguna vez unidas por parte de otra persona

- El 11 por ciento de las mujeres manifestó que había sido golpeada, abofeteada, pateada o herida por otra persona diferente al esposo o compañero. Este tipo de violencia contra la mujer es más común en aquellas mujeres de 40 a 44 años de edad (17%), en las viudas, separadas o divorciadas (12%), en las residentes en el área rural (11%) y en las mujeres sin educación (6%).

Cuadro 12.2 Violencia intrafamiliar: persona que ejerció la violencia y frecuencia de ésta

Porcentaje de mujeres alguna vez unidas, que experimentaron violencia física por parte del esposo o compañero o por otros y frecuencia de la violencia según características según características seleccionadas, Apurímac 2000


Características	Violencia física:		Frecuencia de la violencia			Número de mujeres
	Por parte del esposo	Por parte de otros	Frecuentemente	A veces	No responde	
Edad						
15-19	24,3	10,8	11,1	88,9	0,0	37
20-24	29,3	5,7	7,3	92,7	0,0	140
25-29	53,1	12,4	13,0	85,7	1,3	145
30-34	53,7	8,8	8,9	88,6	2,5	147
35-39	58,4	12,8	19,2	78,1	2,7	125
40-44	60,4	16,5	23,6	76,4	0,0	91
45-49	57,7	10,6	18,3	78,3	3,3	104
Estado civil						
Casada /conviviente	48,1	10,7	11,8	86,5	1,7	721
Viuda/ divorciada / separada	70,1	11,9	38,3	59,6	2,1	67
Area de residencia						
Urbana	39,6	8,9	19,7	80,3	0,0	192
Rural	53,3	11,4	13,8	84,0	2,2	596
Nivel de educación						
Sin educación	61,9	5,8	22,9	72,9	4,2	155
Primaria	49,1	13,2	11,8	86,6	1,6	379
Secundaria	49,1	11,4	14,6	85,4	0,0	167
Superior	34,1	8,0	10,0	90,0	0,0	88
Total	49,9	10,8	15,0	83,2	1,8	788

Gráfico 12.1

Violencia física a las mujeres en general por parte de otra persona

- Sin incluir al cónyuge, el padre o la madre se constituyen en los principales agresores de las mujeres (22% y 17%, respectivamente).
- El padre o la madre, como agresores físicos de la entrevistada, son mencionados con mayor frecuencia por las que viven en el área urbana.
- La agresión física por otra persona no familiar, fue manifestada por algo más de la mitad de las mujeres (66%). Concentrándose el mayor porcentaje entre las residentes del área rural (73%).

Gráfico 12.1
Persona que ejerció la Violencia Física



Cuadro 12.3

Uso de alcohol hasta embriagarse por parte del esposo o compañero

- En el departamento de Apurímac, nueve de cada diez mujeres alguna vez unidas declaró el uso de alcohol por sus esposos o compañeros, hasta embriagarse (90%). La mayoría manifestó que esto sucedió "a veces" (80%). Esta respuesta en mayor proporción fue manifestada por las mujeres de 30 a 34 y 45 y 49 años (83%), en las unidas (81%) y en aquéllas que alcanzaron nivel educativo superior (90%).
- El 11 por ciento de mujeres unidas (casadas o convivientes) dijeron que el esposo o compañero nunca bebió alcohol hasta embriagarse.

Cuadro 12.3 Violencia intrafamiliar: uso de alcohol por parte del esposo o compañero

Distribución porcentual de las mujeres alguna vez casadas o unidas por si sus esposos toman bebidas alcohólicas hasta embriagarse, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Frecuente-mente	A veces	Nunca	Sin información	Total	Número de mujeres
Edad						
15-19	2,7	73,0	18,9	5,4	100,0	37
20-24	0,7	79,3	20,0	0,0	100,0	140
25-29	11,7	77,9	9,0	1,4	100,0	145
30-34	7,5	83,0	8,8	0,7	100,0	147
35-39	16,0	76,8	7,2	0,0	100,0	125
40-44	14,3	81,3	4,4	0,0	100,0	91
45-49	9,6	82,7	6,7	1,0	100,0	104
Estado civil						
Casada/Conviviente	7,2	81,2	10,8	0,8	100,0	721
Viuda/ divorciada / separada	31,3	64,2	4,5	0,0	100,0	67
Area de residencia						
Urbana	9,9	80,2	9,9	0,0	100,0	192
Rural	9,0	79,6	10,4	1,0	100,0	596
Nivel de educación						
Sin educación	13,5	78,7	7,7	0,0	100,0	155
Primaria	9,0	77,3	12,9	0,8	100,0	379
Secundaria	9,6	80,8	7,8	1,8	100,0	167
Superior	2,3	89,8	8,0	0,0	100,0	88
Total	9,3	79,7	10,3	0,8	100,0	788

12.3 SOLICITUD DE AYUDA Y DENUNCIA DEL MALTRATO

A las mujeres que sufrieron violencia se les preguntó si pidieron ayuda cuando fueron maltratadas y a quienes pidieron ayuda, dónde fueron. La pregunta se hizo a las mujeres alguna vez unidas que experimentaron violencia por parte del esposo o compañero o de alguien más; y a las solteras que sufrieron violencia física por parte de alguna persona. Los resultados se presentan en los Cuadros 12.4 a 12.6. Las razones para no demandar al agresor se incluyen en el Cuadro 12.7.

Cuadros 12.4 a 12.6

Búsqueda de ayuda ante el maltrato

- De la totalidad de las mujeres que han sido maltratadas o golpeadas, el 59 por ciento pidió ayuda a una persona cercana y 32 por ciento acudieron a una institución.
- La búsqueda de ayuda a personas cercanas es más alta en las mujeres de 45

a 49 años de edad (70%), en las que tienen educación primaria (61%) y entre las residentes rurales (63%).

- Las actualmente unidas y las que alguna vez estuvieron unidas presentan porcentajes similares (61% y 60% respectivamente) en la búsqueda de ayuda en las personas cercanas.
- La mayor proporción de mujeres que pidió ayuda a instituciones son las viudas, divorciadas o separadas y las que alcanzaron educación superior. Según área de residencia la proporción es similar en el área urbana y rural (32% y 33% respectivamente).
- Las personas cercanas, a quienes recurren las mujeres víctimas de violencia física, suelen ser la madre (49%), las hermanas (24%), hermanos (20%) y el padre (18%), seguido de otro pariente de la mujer (17%). En menores proporciones buscaron ayuda en otras personas.

- En la búsqueda de soporte en instituciones, los sitios más frecuentemente mencionados para denunciar este tipo de atropellos son la comisaría y el juzgado.

Más de 6 de cada diez mujeres maltratadas no buscó ayuda en instituciones (66%).

Cuadro 12.4 Violencia intrafamiliar: búsqueda de ayuda ante la violencia

Porcentaje de mujeres entrevistadas que han sufrido violencia y han pedido ayuda, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	A personas cercanas	En una institución	Número de mujeres
Edad			
15-19	49,1	10,5	57
20-24	49,1	29,1	55
25-29	58,3	34,5	84
30-34	66,7	39,3	84
35-39	56,6	31,6	76
40-44	59,3	39,0	59
45-49	69,8	38,1	63
Estado civil			
Casada/conviviente	60,6	33,4	368
Viuda/ divorciada / separada	60,4	43,7	48
Nunca casada / unida	48,4	17,7	62
Area de residencia			
Urbana	46,4	32,1	112
Rural	62,8	32,5	366
Nivel de educación			
Sin educación	58,6	26,3	99
Primaria	61,1	32,9	216
Secundaria	58,1	33,9	124
Superior	51,3	41,0	39
Total	59,0	32,4	478

Cuadro 12.5 Violencia intrafamiliar: institución donde buscó ayuda

Porcentaje de mujeres que han experimentado violencia física, por la institución donde buscó ayuda, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Institución donde buscó ayuda								No buscó ayuda	Número de mujeres
	Comisaria	Juzgado	Fiscalía	Defensoría municipal DEMUNA	PROMUDEH	Defensoría del Pueblo	Establecimiento de salud	Otra institución		
Edad										
15-19	7,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	87,7	57
20-24	20,0	5,5	1,8	1,8	0,0	0,0	5,5	1,8	69,1	55
25-29	21,4	13,1	1,2	1,2	0,0	1,2	6,0	1,2	63,1	84
30-34	15,5	19,0	4,8	1,2	2,4	1,2	3,6	4,8	59,5	84
35-39	17,1	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	64,5	76
40-44	22,0	18,6	10,2	0,0	0,0	1,7	5,1	3,4	59,3	59
45-49	27,0	9,5	0,0	1,6	0,0	0,0	3,2	3,2	61,9	63
Estado civil										
Casada/Conviviente	18,5	13,0	2,4	0,5	0,5	0,5	4,1	2,4	64,4	368
Viuda/ divorciada / separada	29,2	22,9	4,2	4,2	0,0	0,0	2,1	2,1	56,2	48
Nunca casada / unida	11,3	1,6	1,6	0,0	0,0	1,6	1,6	3,2	80,6	62
Area de residencia										
Urbana	26,8	10,7	5,4	0,0	0,9	0,0	1,8	0,0	63,4	112
Rural	16,1	13,1	1,6	1,1	0,3	0,8	4,1	3,3	66,4	366
Nivel de educación										
Sin educación	9,1	12,1	3,0	1,0	0,0	0,0	1,0	5,1	71,7	99
Primaria	18,1	12,0	1,9	0,5	0,0	0,9	4,2	2,3	66,2	216
Secundaria	22,6	12,9	2,4	0,8	1,6	0,8	3,2	1,6	62,1	124
Superior	33,3	15,4	5,1	2,6	0,0	0,0	7,7	0,0	59,0	39
Total	18,6	12,6	2,5	0,8	0,4	0,6	3,6	2,5	65,7	478

Cuadro 12.6 Violencia intrafamiliar: persona a quien pidió ayuda cuando la maltrataron

Porcentaje de mujeres que han experimentado violencia física y que pidieron ayuda a personas cercanas, por la relación de parentesco con dicha persona, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Persona a quien pidió ayuda cuando la maltrataron											Número de mujeres
	Madre	Padre	Hermana	Hermano	Hijos	Ex-esposo/ esposo	Suegros	Otro pariente de esposo	Otro pariente de la mujer	Amigos	Otra persona	
Edad												
15-19	64,3	21,4	14,3	14,3	0,0	0,0	3,6	7,1	21,4	7,1	3,6	28
20-24	59,3	25,9	25,9	29,6	0,0	0,0	14,8	3,7	33,3	7,4	7,4	27
25-29	55,1	22,4	24,5	20,4	0,0	12,2	12,2	6,1	6,1	4,1	2,0	49
30-34	57,1	25,0	28,6	19,6	5,4	10,7	8,9	3,6	14,3	1,8	7,1	56
35-39	37,2	4,7	23,3	9,3	16,3	9,3	11,6	2,3	16,3	11,6	7,0	43
40-44	34,3	17,1	20,0	22,9	22,9	17,1	2,9	2,9	14,3	5,7	2,9	35
45-49	38,6	13,6	25,0	22,7	13,6	6,8	6,8	4,5	22,7	6,8	6,8	44
Estado civil												
Casada/Conviviente	49,8	17,0	23,3	18,8	10,3	11,2	9,9	4,5	16,1	4,9	4,9	223
Viuda/ divorciada / separada	37,9	27,6	31,0	24,1	3,4	0,0	10,3	6,9	17,2	13,8	6,9	29
Nunca casada / unida	53,3	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	6,7	6,7	30
Area de residencia												
Urbana	28,8	5,8	28,8	9,6	9,6	11,5	7,7	5,8	17,3	11,5	3,8	52
Rural	53,5	21,3	22,6	21,7	8,3	8,3	9,1	3,9	17,0	4,8	5,7	230
Nivel de educación												
Sin educación	50,0	12,1	27,6	25,9	17,2	1,7	5,2	0,0	22,4	5,2	3,4	58
Primaria	49,2	20,5	15,9	15,9	7,6	12,9	10,6	4,5	18,2	7,6	6,8	132
Secundaria	47,2	19,4	33,3	20,8	5,6	6,9	5,6	4,2	13,9	5,6	5,6	72
Superior	(50,0)	(20,0)	(30,0)	(20,0)	(0,0)	(10,0)	(20,0)	(15,0)	(5,0)	(0,0)	(0,0)	20
Total	48,9	18,4	23,8	19,5	8,5	8,9	8,9	4,3	17,0	6,0	5,3	282

(): Entre 20 y 24 casos.

Cuadro 12.7

Razones para no buscar ayuda o consejo

· Las razones más importantes que aludieron las mujeres para no denunciar los atropellos

fueron: vergüenza o humillación (27%), los daños sufridos no fueron lo suficientemente serios (22%), miedo a más agresión (17%), no sabía donde ir (15%).

Cuadro 12.7 Violencia intrafamiliar: razones para no demandar al agresor o no buscar ayuda o consejo

Porcentaje de mujeres en edad fértil que han sufrido violencia y que mencionaron razones específicas para no demandar al agresor o no buscar ayuda o consejo, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	No sabe a donde ir	Vergüenza/humillación	Parte de la vida (normal)	Siente que merece abuso	Miedo a separación	Miedo a más agresión	Daños no fueron serios	No desea dañar a agresor	Puede resolverlo sola	No cree justicia	Cree que no vuelve a ocurrir	Otras razones	Número de mujeres
Edad													
15-19	8,0	14,0	2,0	22,0	4,0	16,0	16,0	10,0	4,0	0,0	12,0	10,0	50
20-24	21,1	15,8	2,6	0,0	5,3	13,2	36,8	5,3	0,0	0,0	7,9	10,5	38
25-29	7,5	35,8	3,8	3,8	5,7	18,9	18,9	20,8	3,8	1,9	5,7	9,4	53
30-34	10,0	44,0	0,0	0,0	4,0	18,0	24,0	12,0	2,0	0,0	4,0	0,0	50
35-39	28,6	20,4	6,1	0,0	6,1	18,4	18,4	8,2	2,0	2,0	8,2	2,0	49
40-44	17,1	25,7	2,9	2,9	2,9	11,4	28,6	20,0	2,9	0,0	8,6	5,7	35
45-49	17,9	28,2	5,1	0,0	7,7	20,5	12,8	20,5	2,6	2,6	5,1	12,8	39
Estado civil													
Casada/Conviviente	15,2	31,2	3,4	0,8	6,3	16,0	23,2	15,6	3,0	1,3	7,2	5,9	237
Viuda/ divorciada / separada	22,2	22,2	3,7	0,0	3,7	29,6	14,8	7,4	3,7	0,0	0,0	14,8	27
Nunca casada / unida	12,0	8,0	2,0	24,0	0,0	14,0	18,0	8,0	0,0	0,0	12,0	8,0	50
Area de residencia													
Urbana	8,5	28,2	1,4	8,5	0,0	21,1	14,1	7,0	2,8	2,8	11,3	9,9	71
Rural	17,3	26,3	3,7	3,3	6,6	15,6	23,9	15,6	2,5	0,4	6,2	6,2	243
Nivel de educación													
Sin educación	22,5	19,7	8,5	1,4	4,2	21,1	21,1	9,9	2,8	0,0	5,6	5,6	71
Primaria	15,4	30,8	2,8	2,1	7,0	16,8	21,7	18,9	2,8	0,0	4,9	5,6	143
Secundaria	10,4	23,4	0,0	11,7	3,9	14,3	20,8	10,4	2,6	1,3	10,4	11,7	77
Superior	(8,7)	(34,8)	(0,0)	(4,3)	(0,0)	(13,0)	(26,1)	(4,3)	(0,0)	(8,7)	(17,4)	(4,3)	23
Total	15,3	26,8	3,2	4,5	5,1	16,9	21,7	13,7	2,5	1,0	7,3	7,0	314

(): Entre 20 y 24 casos.

12.4 MALTRATO A LOS NIÑOS

A las mujeres que tienen hijos vivos se les preguntó en qué forma sus esposos o compañeros o ellas mismas castigan a los hijos (Cuadros 12.8 y 12.9) y si los padres la castigaban a ella y en qué forma (Cuadro 12.10). En el gráfico 12.2 se resume el maltrato con golpes a los hijos por parte de la entrevistada, de su esposo u compañero, al igual que el porcentaje de entrevistadas que fueron golpeadas por sus padres. También se les preguntó si consideraban que para educar a los hijos se requiere el castigo físico y con qué frecuencia (Cuadro 12.11) y si el padre golpeaba a la madre de la mujer entrevistada (Cuadro 12.12).

Cuadro 12.8

Castigo a los hijos por el esposo o compañero

- En el departamento de Apurímac, el 89 por ciento de mujeres con al menos un hijo vivo dijo que el esposo o compañero castiga a los hijos con reprimendas verbales. El 62 por ciento contestó que los corrige con golpes o castigos físicos, el 13 por ciento prohibiéndoles algo que les gusta y 11 por ciento con palmadas. Menores proporciones se refiere a otras formas de castigo, aunque se trata de castigos traumatizantes para el desarrollo de los niños (encerrándoles, ignorándolos, etc.).

- El castigo con reprimenda verbal al niño por los esposos o compañeros, es declarado con mayor frecuencia conforme

avanza la edad de las mujeres, entre las del área urbana y las mujeres con educación superior.

Cuadro 12.8 Violencia intrafamiliar: forma como castigan los esposos o compañeros a sus hijos

Entre las mujeres que tienen hijos vivos en hogares donde el padre biológico castiga a los hijos; porcentaje que mencionaron formas específicas como los esposos o compañeros castigan a sus hijos, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Palmas	Reprimenda verbal	Prohibiendo algo que les gusta	Restringiendo la alimentación	Con golpes	Encerrándolos	Ignorándolos	Con más trabajo	Echándolos fuera de la casa	Echándolos agua	Quitándoles la ropa	Quitándoles las pertenencias	Quitándoles apoyos	Número de mujeres
Edad														
15-19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6
20-24	25,4	82,5	4,8	0,0	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	63
25-29	10,6	86,5	12,5	0,0	53,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	104
30-34	8,3	89,8	17,6	0,0	78,7	0,9	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	2,8	108
35-39	10,7	88,3	16,5	1,9	68,9	1,9	1,0	3,9	4,9	1,9	0,0	0,0	1,9	103
40-44	11,4	91,4	18,6	1,4	61,4	0,0	0,0	4,3	4,3	2,9	0,0	1,4	4,3	70
45-49	5,6	93,1	6,9	1,4	55,6	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	1,4	72
Area de residencia														
Urbana	14,8	97,0	28,1	0,7	44,4	0,7	0,0	1,5	3,7	3,0	0,0	0,7	4,4	135
Rural	10,2	85,9	8,2	0,8	68,5	1,0	0,3	2,0	1,5	0,3	0,3	0,0	1,0	391
Nivel de educación														
Sin educación	9,5	88,6	7,6	1,9	70,5	1,9	0,0	4,8	3,8	1,0	0,0	0,0	0,0	105
Primaria	11,4	87,1	11,1	0,0	67,5	0,0	0,0	1,1	1,5	0,4	0,4	0,0	1,5	271
Secundaria	12,6	89,5	17,9	2,1	53,7	2,1	1,1	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	3,2	95
Superior	12,7	96,4	27,3	0,0	36,4	1,8	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	5,5	55
Total	11,4	88,8	13,3	0,8	62,4	1,0	0,2	1,9	2,1	1,0	0,2	0,2	1,9	525

*: Menos de 20 casos.

Cuadro 12.9

Castigo a los hijos por las mujeres

- Las madres imparten a sus niños castigos similares a los que dan los esposos/compañeros. El 88 por ciento manifiesta que utiliza la reprimenda verbal, 58 por

ciento de madres dice que los castigan con golpes o físicamente. El 20 por ciento castiga con palmadas. Menores porcentajes se refieren a otros tipos de castigos.

Cuadro 12.9 Violencia intrafamiliar: forma como castigan las mujeres a sus hijos

Porcentaje de mujeres que mencionaron formas específicas cómo ellas castigan a sus hijos biológicos, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Palmadas	Reprimenda verbal	Prohibiendo algo que les gusta	Restringiendo la alimentación	Con golpes	Encerrándolos	Con más trabajo	Echándoles fuera de la casa	Echándoles agua	Quitándoles apoyos	Otra	Número de mujeres
Edad												
15-19	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	9
20-24	35,6	80,8	11,0	1,4	46,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73
25-29	20,5	85,0	11,0	0,8	54,3	0,0	0,8	0,0	3,1	0,0	0,8	127
30-34	16,3	86,8	8,5	0,0	65,9	0,8	0,8	0,0	1,6	0,0	0,0	129
35-39	17,9	92,9	8,0	1,8	61,6	0,9	4,5	1,8	3,6	0,9	0,0	112
40-44	17,1	89,0	12,2	1,2	54,9	1,2	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	82
45-49	12,3	92,6	3,7	1,2	58,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81
Estado civil												
Casada/conviviente	20,1	87,6	9,0	1,1	57,9	0,5	1,8	0,4	2,2	0,2	0,2	557
Viuda/ divorciada / separada	20,5	86,4	9,1	0,0	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44
Nunca casada / unida	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	11
Area de residencia												
Urbana	19,4	90,3	23,0	2,4	44,2	1,2	1,8	0,6	3,0	0,6	0,6	165
Rural	20,3	86,4	3,8	0,4	62,5	0,2	1,6	0,2	1,6	0,0	0,0	448
Nivel de educación												
Sin educación	20,0	93,6	0,8	0,8	60,0	0,8	3,2	0,8	0,8	0,0	0,0	125
Primaria	17,4	84,9	4,3	0,7	63,6	0,0	1,3	0,0	2,0	0,0	0,0	305
Secundaria	28,1	86,8	18,4	2,6	49,1	0,9	0,9	0,9	3,5	0,0	0,0	114
Superior	18,8	88,4	29,0	0,0	40,6	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4	69
Total	20,1	87,4	9,0	1,0	57,6	0,5	1,6	0,3	2,0	0,2	0,2	612

*: Menos de 20 casos.

Cuadro 12.10

Castigo a la entrevistada por parte de sus padres

- Los golpes (71%) y la reprimenda verbal (57%) son las principales formas que con similar frecuencia utilizaron los padres de la entrevistada para corregir su comportamiento. Otras formas fueron

declaradas por menores porcentajes de entrevistadas.


- En menor proporción las mujeres menores de 20 años refieren los golpes como la principal forma de castigo de parte de sus padres. Así mismo las de 40 a 44 años en menor porcentaje declaran la reprimenda verbal.

Cuadro 12.10 Violencia intrafamiliar: forma como castigaban los padres a la entrevistada

Porcentaje de entrevistadas que mencionaron formas específicas como sus padres la castigaban, según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	Palma- das	Repri- menda verbal	Prohi- biendo algo que les gusta	Restrin- giendo la alimen- tación	Con golpes	Queman- dolos	Ence- rrán- dolos	Con más trabajo	Deján- dolos fuera de casa	Echán- dolos agua	Quitán- dolos la ropa	Quitán- dolos las pertene- ncias	Quitán- dolos los apoyos	Otro	Número de mujeres
Edad															
15-19	5,4	63,4	15,1	0,5	63,4	0,5	3,8	3,2	0,5	0,5	0,0	0,0	1,1	0,5	186
20-24	5,9	59,5	10,3	1,6	71,4	0,0	2,2	5,4	4,9	0,0	0,0	0,5	2,2	0,0	185
25-29	5,7	61,4	7,0	0,0	75,3	0,0	1,9	5,1	3,2	0,0	0,6	0,0	2,5	0,6	158
30-34	7,1	52,9	5,2	0,6	70,3	1,3	0,6	5,8	3,2	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	155
35-39	3,7	57,5	3,7	0,7	70,9	0,0	0,7	6,0	2,2	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0	134
40-44	4,3	44,1	3,2	1,1	75,3	1,1	2,2	5,4	4,3	2,2	1,1	1,1	0,0	0,0	93
45-49	8,6	51,4	2,9	0,0	72,4	3,8	0,0	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	105
Estado civil															
Casada/Conviviente	5,7	54,0	4,3	0,6	73,5	1,0	1,5	5,0	3,2	0,3	0,4	0,3	1,2	0,0	721
Viuda/ divorciada / separada	7,5	59,7	7,5	0,0	74,6	0,0	1,5	6,0	4,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	67
Nunca casada / unida	5,7	65,6	18,1	1,3	60,8	0,4	2,6	4,4	2,2	0,4	0,0	0,0	1,8	0,9	227
Area de residencia															
Urbana	4,1	69,5	20,5	0,3	66,1	0,7	3,1	5,8	1,7	0,7	0,0	0,0	3,1	0,7	292
Rural	6,5	51,9	2,3	0,8	72,7	0,8	1,2	4,6	3,6	0,1	0,4	0,3	0,7	0,0	723
Nivel de educación															
Sin educación	3,1	50,0	0,6	0,6	72,8	0,6	1,2	4,9	4,9	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	162
Primaria	6,3	50,2	2,7	0,7	74,9	1,1	1,4	5,7	3,6	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	442
Secundaria	6,3	66,3	11,2	1,1	69,1	0,7	2,8	3,9	2,1	0,4	0,4	0,0	2,1	0,4	285
Superior	6,3	68,5	25,2	0,0	57,5	0,0	1,6	4,7	0,8	0,0	0,0	0,0	4,7	0,8	127
Total	5,8	57,0	7,6	0,7	70,8	0,8	1,8	4,9	3,1	0,3	0,3	0,2	1,4	0,2	1 015

Gráfico 12.2
Golpizas a los Niños por Parte de los Padres
y a la Entrevistada por Parte de sus Padres



Cuadro 12.11

Necesidad del castigo físico en la educación

- En el departamento de Apurímac, alrededor de 37 por ciento de las mujeres con hijos piensan que para educarlos es necesario algunas veces el castigo físico. Las mujeres que con más frecuencia dan esa respuesta son las del área rural (43%), las viudas, divorciadas o separadas (45%) y las mujeres sin nivel de educación (49%).
- El 62 por ciento de las mujeres en edad fértil menciona que nunca se debe proporcionar castigos físicos a los niños para educarlos. En este grupo encontramos mayor proporción en las menores de 20 años (78%), en las solteras (79%), las residentes en el área urbana (75%) y las que tienen menores niveles de educación (51% y 55%).

Cuadro 12.11 Violencia intrafamiliar: creencia en la necesidad de castigo físico en la educación de los hijos

Entre las mujeres en edad fértil, porcentaje que cree que para educar a los hijos se requiere el castigo, por característica seleccionada, Apurímac 2000

Característica	Frecuentemente	Algunas veces	Nunca	Total	Número de mujeres
Edad					
15-19	0,0	21,5	78,0	100,0	186
20-24	0,0	33,0	67,0	100,0	185
25-29	0,6	34,2	65,2	100,0	158
30-34	1,9	42,6	55,5	100,0	155
35-39	0,0	50,7	49,3	100,0	134
40-44	1,1	46,2	52,7	100,0	93
45-49	0,0	44,8	55,2	100,0	105
Estado civil					
Casada/conviviente	0,6	41,8	57,6	100,0	721
Viuda/ divorciada / separada	1,5	44,8	53,7	100,0	67
Nunca casada / unida	0,0	20,7	78,9	100,0	227
Area de residencia					
Urbana	0,3	24,3	75,0	100,0	292
Rural	0,6	42,5	56,9	100,0	723
Nivel de educación					
Sin educación	0,6	48,8	50,6	100,0	162
Primaria	0,9	44,3	54,5	100,0	442
Secundaria	0,0	28,4	71,6	100,0	285
Superior	0,0	18,1	81,9	100,0	127
Total	0,5	37,3	62,1	100,0	1 015

Cuadro 12.12


Agresión a la madre de la entrevistada por parte de su padre

- El 59 por ciento de las MEF declara que su padre golpeaba a su madre, proporción que es mayor entre las de 45 a 49 años, las viudas, divorciadas o separadas, entre las residentes del área rural y entre las que tienen educación secundaria.

Cuadro 12.12 Violencia intrafamiliar: mujeres que declararon que su padre golpeaba a la madre de la entrevistada

Distribución porcentual de las mujeres en edad fértil que declararon que su padre golpeaba a su madre según características seleccionadas, Apurímac 2000

Características	La golpeaba	No la golpeaba	Sin información	Total	Número de mujeres
Edad					
15-19	55,4	40,3	4,3	100,0	186
20-24	58,4	38,4	3,2	100,0	185
25-29	57,6	36,1	6,3	100,0	158
30-34	63,9	27,1	9,0	100,0	155
35-39	56,7	35,1	8,2	100,0	134
40-44	58,1	30,1	11,8	100,0	93
45-49	64,8	28,6	6,7	100,0	105
Estado civil					
Casada/conviviente	59,6	33,4	7,1	100,0	721
Viuda/ divorciada / separada	62,7	31,3	6,0	100,0	67
Nunca casada / unida	55,9	38,8	5,3	100,0	227
Area de residencia					
Urbana	54,5	40,1	5,5	100,0	292
Rural	60,8	32,2	7,0	100,0	723
Nivel de educación					
Sin educación	57,4	30,2	12,3	100,0	162
Primaria	59,5	33,7	6,8	100,0	442
Secundaria	63,5	32,3	4,2	100,0	285
Superior	48,8	47,2	3,9	100,0	127
Total	59,0	34,4	6,6	100,0	1 015



ANEXOS

Cuadro 2.4 Nivel de educación de la población masculina de 6 años y más

Distribución porcentual de la población masculina de 6 años y más por nivel de educación alcanzado, según características seleccionadas, Perú 2000

Características	Nivel de educación							Total	Número de hombres	Mediana de años
	Sin educación	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Superior	NS/ sin información			
Departamento										
Amazonas	7,8	39,5	23,8	15,1	9,2	4,5	0,1	100,0	827	5,1
Ancash	9,7	33,4	16,5	17,5	13,5	9,0	0,3	100,0	2 283	5,4
Apurímac	11,0	37,6	15,5	17,8	9,5	8,3	0,2	100,0	853	5,1
Arequipa	4,3	20,9	11,6	18,6	23,0	21,3	0,4	100,0	2 451	8,7
Ayacucho	10,6	36,2	14,5	16,2	10,6	11,7	0,2	100,0	956	5,2
Cajamarca	10,4	40,5	18,7	13,7	9,3	7,0	0,3	100,0	3 050	4,8
Cusco	10,9	37,8	12,2	16,1	12,8	9,5	0,8	100,0	2 356	5,1
Huancavelica	11,6	40,6	13,7	18,7	10,1	5,1	0,3	100,0	889	4,7
Huánuco	11,4	44,9	15,5	14,0	7,9	6,3	0,1	100,0	1 573	4,2
Ica	4,4	20,3	12,4	17,0	27,4	18,3	0,2	100,0	1 487	8,8
Junín	6,1	26,8	13,8	19,5	19,1	14,3	0,4	100,0	2 510	6,7
La Libertad	6,1	31,5	15,5	13,4	18,4	14,9	0,2	100,0	2 927	5,8
Lambayeque	6,5	27,5	14,8	18,5	19,4	12,7	0,6	100,0	2 590	6,2
Lima	2,5	15,9	11,4	18,1	29,2	22,7	0,2	100,0	17 730	10,1
Loreto	7,5	37,4	15,4	17,6	12,1	9,5	0,5	100,0	1 796	5,3
Madre de Dios	6,4	27,5	13,7	22,9	17,5	11,6	0,3	100,0	144	6,4
Moquegua	4,4	19,0	13,7	18,1	23,3	21,1	0,4	100,0	313	8,7
Pasco	7,1	29,1	16,0	23,1	13,7	11,0	0,0	100,0	531	5,9
Piura	8,4	30,3	16,0	15,3	17,9	12,0	0,1	100,0	4 134	5,7
Puno	7,6	35,3	14,7	18,7	14,0	9,4	0,2	100,0	2 541	5,5
San Martín	6,3	34,2	23,8	14,4	12,2	8,9	0,3	100,0	1 506	5,4
Tacna	4,1	19,7	11,8	17,6	26,4	19,6	0,8	100,0	567	8,9
Tumbes	5,5	25,1	12,5	20,8	20,4	15,5	0,2	100,0	434	7,1
Ucayali	5,6	34,1	13,6	22,3	12,9	11,1	0,5	100,0	759	5,7
Total	6,1	27,1	14,1	17,2	20,0	15,2	0,3	100,0	55 207	6,6

Nota: Población de facto.

Cuadro 2.5 Nivel de educación de la población femenina de 6 años y más

Distribución porcentual de la población femenina de 6 años y más por nivel de educación alcanzado, según características seleccionadas, Perú 2000

Características	Nivel de educación							Total	Número de mujeres	Mediana de años
	Sin educación	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Superior	NS/ sin información			
Departamento										
Amazonas	16,0	41,1	21,5	11,3	5,3	4,7	0,1	100,0	769	4,0
Ancash	23,3	33,7	13,7	13,3	8,7	7,2	0,1	100,0	2 277	3,7
Apurímac	29,0	38,1	10,3	11,7	4,6	6,0	0,2	100,0	852	2,6
Arequipa	8,8	23,0	12,1	16,6	19,1	20,0	0,3	100,0	2 391	7,3
Ayacucho	27,1	36,2	10,7	12,0	5,5	8,3	0,2	100,0	1 008	3,0
Cajamarca	24,9	40,2	15,8	8,4	4,7	5,8	0,3	100,0	3 074	3,0
Cusco	22,8	37,5	9,5	12,1	8,9	8,4	0,8	100,0	2 466	3,2
Huancavelica	28,9	42,2	12,4	9,4	3,1	3,8	0,3	100,0	934	2,4
Huánuco	24,6	42,6	10,2	11,4	4,6	6,3	0,4	100,0	1 632	2,7
Ica	6,8	23,0	12,5	17,5	20,1	19,9	0,2	100,0	1 514	7,9
Junín	12,8	27,8	15,4	17,2	14,2	12,4	0,2	100,0	2 673	5,6
La Libertad	12,4	29,1	14,8	14,1	15,3	14,1	0,2	100,0	3 033	5,6
Lambayeque	11,0	26,3	16,6	16,9	15,3	13,6	0,4	100,0	2 618	5,8
Lima	5,6	17,9	12,4	17,6	26,8	19,4	0,2	100,0	17 960	9,1
Loreto	10,2	41,8	14,8	16,4	8,8	7,4	0,6	100,0	1 728	4,7
Madre de Dios	9,9	34,1	13,4	21,1	11,1	10,3	0,2	100,0	129	5,4
Moquegua	9,7	23,2	11,7	17,9	15,7	21,2	0,5	100,0	322	7,2
Pasco	16,8	32,3	12,8	18,4	9,0	10,6	0,0	100,0	534	5,1
Piura	12,7	31,0	16,4	13,8	13,6	12,3	0,3	100,0	4 152	5,4
Puno	22,0	35,8	16,1	13,6	7,5	4,6	0,4	100,0	2 721	3,9
San Martín	11,5	36,0	20,5	15,4	8,8	7,7	0,1	100,0	1 390	5,1
Tacna	8,3	23,1	11,7	19,9	20,7	15,7	0,6	100,0	586	7,4
Tumbes	7,1	28,4	12,1	21,2	16,6	14,6	0,1	100,0	438	6,5
Ucayali	8,1	37,2	14,0	20,1	9,9	10,5	0,2	100,0	757	5,3
Total	12,9	28,2	13,7	15,3	16,2	13,4	0,3	100,0	55 959	5,6

Nota: Población de facto.

Cuadro 3.5 Alfabetismo por características seleccionadas

Distribución porcentual de las mujeres en edad fértil por nivel más alto alcanzado y por nivel de alfabetismo, según características seleccionadas, Perú 2000

Características	Sin escolaridad o escuela primaria			Sin información	Con educación secundaria o más	Total	Número de mujeres
	No puede leer	Lee con dificultad	Lee fácilmente				
Departamento							
Amazonas	13,5	5,3	44,6	0,2	36,3	100,0	362
Ancash	18,5	5,4	25,0	0,2	50,9	100,0	1 026
Apurímac	25,2	6,4	27,6	0,4	40,4	100,0	352
Arequipa	4,3	2,7	13,0	0,7	79,2	100,0	1 232
Ayacucho	20,1	6,6	26,4	0,4	46,4	100,0	433
Cajamarca	21,6	6,9	41,1	0,0	30,4	100,0	1 442
Cusco	23,0	8,9	20,5	0,2	47,5	100,0	1 130
Huancavelica	26,1	18,7	25,1	0,3	29,7	100,0	383
Huánuco	24,1	9,2	27,5	0,2	39,0	100,0	740
Ica	2,6	2,8	13,3	0,6	80,8	100,0	793
Junín	7,1	5,9	19,1	0,6	67,3	100,0	1 337
La Libertad	8,2	3,8	23,8	0,7	63,6	100,0	1 484
Lambayeque	5,6	1,9	25,2	0,2	67,1	100,0	1 350
Lima	2,1	2,1	10,9	0,2	84,7	100,0	9 531
Loreto	10,4	6,4	27,3	0,4	55,4	100,0	820
Madre de Dios	8,5	5,2	22,0	0,4	63,8	100,0	66
Moquegua	2,9	3,5	14,0	0,6	79,1	100,0	173
Pasco	7,8	7,6	21,3	0,6	62,6	100,0	250
Piura	7,3	5,1	25,0	0,5	62,2	100,0	2 097
Puno	14,7	11,1	30,9	0,2	43,2	100,0	1 206
San Martín	10,5	7,2	33,9	0,3	48,1	100,0	692
Tacna	3,4	2,3	16,0	0,1	78,2	100,0	328
Tumbes	4,1	2,5	18,8	0,0	74,6	100,0	235
Ucayali	8,9	4,5	20,7	1,3	64,6	100,0	381
Total	8,6	4,6	20,2	0,3	66,2	100,0	27 843

Cuadro 4.3 Fecundidad y paridez por lugar de residencia y educación

Tasa global de fecundidad, porcentaje de mujeres embarazadas y número promedio de hijos nacidos vivos a mujeres de 40-49 años, por lugar de residencia y nivel de educación. Perú 2000

Características	Tasa global de fecundidad	Porcentaje de mujeres actualmente embarazadas	Número promedio de nacidos vivos a mujeres
	15-49	15-49	40-49
Departamento			
Amazonas	3,8	5,9	6,4
Ancash	3,4	5,1	4,2
Apurímac	4,2	6,3	7,1
Arequipa	2,2	3,6	3,3
Ayacucho	4,2	6,0	6,4
Cajamarca	3,5	5,7	4,3
Cusco	4,0	6,0	5,2
Huancavelica	6,1	7,0	6,9
Huánuco	4,3	5,8	5,0
Ica	2,5	4,0	3,2
Junín	3,2	5,0	3,1
La Libertad	2,9	4,2	3,2
Lambayeque	2,4	4,4	3,8
Lima	2,1	3,3	4,1
Loreto	4,3	6,6	6,8
Madre de Dios	3,5	5,4	5,4
Moquegua	2,1	3,4	3,4
Pasco	3,3	6,0	2,4
Piura	2,7	4,6	4,2
Puno	3,8	5,3	4,6
San Martín	3,0	5,5	5,0
Tacna	2,0	3,6	3,0
Tumbes	2,3	4,7	2,9
Ucayali	3,2	5,4	4,5
Total	2,9	4,4	4,3

Cuadro 5.5 Uso actual de métodos anticonceptivos entre las mujeres entrevistadas por características seleccionadas

Distribución porcentual de las mujeres en unión por método usado actualmente, por características seleccionadas e indicadores de estatus de la mujer, Perú 2000

Característica	Usando algún método	Usando algún método moderno	Total tradicionales	Métodos folclóricos	No usa actualmente	Número de mujeres
Departamento						
Amazonas	64,8	44,3	19,6	0,9	35,2	246
Ancash	62,5	40,9	21,4	0,2	37,5	608
Apurímac	63,9	47,6	14,9	1,4	36,1	250
Arequipa	75,4	57,6	17,2	0,7	24,6	659
Ayacucho	55,4	33,1	21,8	0,6	44,6	258
Cajamarca	62,9	41,2	21,1	0,5	37,1	927
Cusco	67,3	43,8	19,1	4,4	32,7	719
Huancavelica	49,6	24,6	24,5	0,5	50,4	259
Huánuco	60,2	46,0	13,3	1,0	39,8	449
Ica	77,5	60,9	16,4	0,2	22,5	418
Junín	74,5	43,5	30,8	0,2	25,5	748
La Libertad	68,3	46,7	21,1	0,5	31,7	811
Lambayeque	65,6	50,8	14,5	0,3	34,4	746
Lima	72,9	58,1	14,3	0,5	27,1	4 707
Loreto	63,1	48,3	12,6	2,3	36,9	537
Madre de Dios	66,9	54,5	11,5	0,8	33,1	44
Moquegua	75,8	60,3	15,3	0,3	24,2	105
Pasco	70,9	50,4	18,6	1,9	29,1	136
Piura	68,9	57,0	11,8	0,1	31,1	1 201
Puno	61,4	24,2	35,7	1,6	38,6	768
San Martín	72,5	57,5	12,1	3,0	27,5	478
Tacna	79,4	60,1	18,7	0,6	20,6	176
Tumbes	77,8	69,1	8,5	0,2	22,2	135
Ucayali	70,4	58,9	7,9	3,7	29,6	241
Total	68,9	50,4	17,5	0,9	31,1	15 628

Cuadro 7.6.1 Necesidad de servicios de planificación familiar para las mujeres en unión, por características seleccionadas

Porcentaje de mujeres en unión con necesidad insatisfecha de planificación familiar y demanda total de planificación familiar, por características seleccionadas, Perú 2000

Características	Necesidad satisfecha ²										
	Necesidad insatisfecha ¹			(uso de métodos)			Demanda total ³			Demanda satisfecha (porcentaje) ⁴	Número de mujeres en unión
	Para espaciar	Para limitar	Total	Para espaciar	Para limitar	Total	Para espaciar	Para limitar	Total		
Departamento											
Amazonas	6,2	7,7	13,9	23,1	41,7	64,8	31,3	52,5	83,8	83,4	246
Ancash	3,7	11,6	15,4	17,1	45,4	62,5	22,5	59,5	82,0	81,3	608
Apurímac	5,1	7,9	13,0	17,5	46,3	63,9	26,2	56,1	82,3	84,3	250
Arequipa	2,3	4,4	6,7	18,2	57,2	75,4	21,5	62,6	84,1	92,1	659
Ayacucho	4,7	14,4	19,2	12,4	43,1	55,4	19,4	61,0	80,4	76,2	258
Cajamarca	4,8	8,7	13,5	19,4	43,4	62,9	25,2	53,5	78,7	82,9	927
Cusco	2,2	9,5	11,8	13,8	53,5	67,3	17,0	65,9	83,0	85,8	719
Huancavelica	6,5	15,9	22,4	8,9	40,7	49,6	18,8	60,0	78,8	71,6	259
Huánuco	4,9	12,5	17,4	16,6	43,6	60,2	23,6	59,1	82,7	78,9	449
Ica	1,7	3,5	5,2	25,3	52,1	77,5	29,6	56,4	86,0	93,9	418
Junín	1,8	2,6	4,4	19,2	55,4	74,5	22,9	60,6	83,4	94,7	748
La Libertad	3,1	5,7	8,8	21,4	46,9	68,3	26,5	54,1	80,6	89,0	811
Lambayeque	4,8	8,0	12,8	16,2	49,4	65,6	22,0	58,6	80,6	84,1	746
Lima	3,0	4,3	7,3	24,8	48,0	72,9	29,7	53,2	82,9	91,2	4 707
Loreto	4,7	11,6	16,3	18,3	44,9	63,1	24,4	57,6	82,0	80,1	537
Madre de Dios	5,4	7,9	13,3	13,3	53,5	66,9	20,0	62,0	82,0	83,8	44
Moquegua	1,6	2,4	4,0	21,3	54,5	75,8	24,3	57,7	82,0	95,2	105
Pasco	3,9	4,7	8,6	20,7	50,2	70,9	25,8	56,1	81,9	89,5	136
Piura	4,6	4,9	9,5	20,7	48,2	68,9	26,7	54,5	81,2	88,3	1 201
Puno	4,6	12,0	16,6	11,4	50,1	61,4	18,6	66,4	85,0	80,5	768
San Martín	4,1	4,7	8,9	26,3	46,2	72,5	33,1	51,8	84,9	89,6	478
Tacna	2,2	3,7	5,9	21,8	57,6	79,4	25,7	62,5	88,2	93,3	176
Tumbes	2,6	2,6	5,2	23,4	54,4	77,8	27,0	57,4	84,3	93,8	135
Ucayali	2,9	8,0	10,9	19,3	51,2	70,4	23,1	60,2	83,4	86,9	241
Total	3,6	6,7	10,2	20,3	48,5	68,9	25,7	56,8	82,5	87,6	15 628

¹ Necesidad insatisfecha para **limitar**: mujeres embarazadas o amenorréicas cuyo último embarazo **no fue deseado** y mujeres fértiles que no están ni embarazadas ni amenorréicas **que no desean más hijos**. Necesidad insatisfecha para **espaciar**: mujeres actualmente embarazadas o amenorréicas cuyo último embarazo **si fue deseado, pero más tarde** y mujeres fértiles que no están ni embarazadas ni amenorréicas **que si desean más hijos pero prefieren esperar** por lo menos dos años.

² La *necesidad satisfecha para espaciar* se refiere a las mujeres que usan algún método de planificación familiar porque desean espaciar los nacimientos (respondieron que desean tener más hijos o están indecisas al respecto). La *necesidad satisfecha para limitar* se refiere a aquellas mujeres que están usando porque desean limitar los nacimientos (respondieron que no desean más hijos).

³ La *demanda total* incluye mujeres embarazadas o amenorréicas que quedaron embarazadas mientras usaban un método (falta de método).

⁴ [(Necesidad satisfecha)+(falta de método)]/(demanda total)]

Cuadro 9.7 Atención durante el parto para los menores de cinco años de edad, por características seleccionadas

Distribución porcentual de nacidos en los cinco años que precedieron la encuesta, por persona que proporcionó la atención durante el parto, según características seleccionadas, Perú 2000

Características	Asistencia durante el parto ¹					No recibió atención durante el parto	Total	Número de nacimientos
	Médico	Obstetriz	Enfermera/ Sanitario/ Promotora	Comadrona/ Partera	Pariente/ otro			
Departamento								
Amazonas	16,1	8,7	3,5	58,8	12,2	0,5	100,0	220
Ancash	21,6	17,5	2,9	30,2	24,6	3,1	100,0	557
Apurímac	23,3	14,6	17,3	25,1	18,5	1,0	100,0	234
Arequipa	53,7	22,4	1,5	5,7	16,5	0,0	100,0	417
Ayacucho	17,2	25,1	13,3	13,2	30,2	0,6	100,0	276
Cajamarca	10,7	10,1	6,3	55,7	15,6	0,8	100,0	799
Cusco	19,9	12,5	15,3	12,6	38,6	0,0	100,0	678
Huancavelica	8,7	8,1	4,2	13,9	61,2	3,7	100,0	347
Huánuco	13,0	9,6	5,2	35,9	33,5	2,5	100,0	481
Ica	53,8	39,6	0,8	3,4	2,4	0,0	100,0	297
Junín	21,1	26,7	6,2	21,9	23,6	0,4	100,0	627
La Libertad	37,4	10,9	3,2	28,9	15,4	4,0	100,0	656
Lambayeque	34,5	25,3	1,4	35,7	2,4	0,2	100,0	527
Lima	69,3	20,5	1,3	2,7	5,9	0,1	100,0	3 022
Loreto	18,5	13,2	6,5	29,7	30,7	0,6	100,0	534
Madre de Dios	39,9	29,9	5,9	12,6	10,7	0,7	100,0	36
Moquegua	48,3	34,9	3,4	4,0	9,1	0,3	100,0	58
Pasco	23,2	23,9	9,6	23,9	17,2	1,5	100,0	125
Piura	29,7	34,5	2,0	29,2	4,1	0,4	100,0	909
Puno	13,4	9,5	4,9	18,0	52,9	1,2	100,0	688
San Martín	24,2	16,6	7,6	40,7	9,0	1,2	100,0	344
Tacna	57,8	25,7	3,7	5,4	6,4	0,7	100,0	102
Tumbes	39,6	48,3	0,5	10,0	1,3	0,0	100,0	86
Ucayali	23,5	19,2	3,1	32,2	19,8	1,8	100,0	201
Total	35,7	19,1	4,5	21,1	18,3	0,9	100,0	12 222

Nota: Las estimaciones se refieren a los nacimientos en el período 0-59 meses que precedieron la encuesta, incluyéndose así los nacimientos en el mes de la entrevista. Se incluyen todos los nacimientos en los cinco años.

¹ Si la entrevistada mencionó más de una fuente de atención, se considera sólo la más calificada

Cuadro 9.12 Cuidado postnatal por características seleccionadas

Entre los últimos nacimientos de los 5 años anteriores a la encuesta, porcentaje que nacieron en un establecimiento de salud y distribución porcentual de los que nacieron en un servicio de salud según momento del primer control postnatal, por características seleccionadas. Perú 2000

Características	Control Postnatal según lugar del parto				Momento del primer control para madres que no tuvieron el parto en establecimiento de salud					Total	Número de nacimientos
	Servicio de Salud	Otro Lugar	Total	Número de nacimientos	Primeros 2 días después del parto	3 - 7 días después	8 - 27 días después	4 o más semanas después	No recibió control postnatal		
Departamento											
Amazonas	27,3	10,0	37,3	165	1,4	1,9	4,7	5,8	86,2	100,0	120
Ancash	38,4	18,7	57,1	418	6,3	6,3	11,0	5,5	69,6	100,0	257
Apurímac	49,3	32,4	81,7	176	15,1	23,9	15,1	9,7	35,9	100,0	89
Arequipa	79,4	11,5	90,9	338	9,2	13,8	13,8	18,5	44,6	100,0	70
Ayacucho	47,2	17,8	65,0	201	5,7	12,5	8,8	6,8	66,2	100,0	106
Cajamarca	22,2	14,5	36,7	599	1,4	1,7	5,8	8,1	81,4	100,0	466
Cusco	39,4	26,7	66,1	501	3,2	11,7	16,5	12,1	56,0	100,0	304
Huancavelica	19,6	26,7	46,3	220	5,7	5,0	17,5	4,7	66,8	100,0	177
Huánuco	28,3	12,7	41,0	348	1,7	4,9	6,3	4,9	82,3	100,0	249
Ica	92,5	3,5	96,0	249	4,2	25,0	12,5	4,2	54,2	100,0	19
Junín	46,0	19,1	65,1	470	5,3	7,2	18,7	4,3	64,6	100,0	254
La Libertad	51,6	14,5	66,1	501	2,2	6,0	12,6	8,7	69,9	100,0	242
Lambayeque	57,4	17,8	75,2	414	1,4	3,6	26,6	9,4	58,3	100,0	177
Lima	89,5	5,7	95,2	2 570	13,1	16,6	13,5	11,1	45,8	100,0	270
Loreto	39,6	6,3	45,9	388	0,3	1,3	4,6	3,6	89,5	100,0	234
Madre de Dios	74,9	9,2	84,1	29	4,3	8,7	20,0	5,2	61,7	100,0	7
Moquegua	83,6	10,7	94,3	51	16,0	28,0	16,0	6,0	32,0	100,0	8
Pasco	50,7	10,7	61,4	98	2,5	5,5	5,5	8,5	78,1	100,0	48
Piura	63,4	10,1	73,5	710	1,9	5,0	13,1	7,5	72,5	100,0	260
Puno	20,5	37,1	57,6	498	8,5	6,9	17,8	13,0	53,3	100,0	396
San Martín	45,8	17,2	63,0	275	1,9	4,7	20,4	4,7	68,2	100,0	149
Tacna	82,2	13,5	95,7	90	15,2	21,7	30,4	8,7	23,9	100,0	16
Tumbes	85,7	5,8	91,5	73	0,0	19,1	19,1	4,3	57,4	100,0	10
Ucayali	46,3	15,3	61,6	155	4,0	4,0	10,7	9,4	71,4	100,0	83
Total	57,9	13,9	71,8	9 535	4,6	7,0	13,0	8,1	66,9	100,0	4 013

Nota: Las estimaciones se refieren a los nacimientos en el período 0-59 meses que precedieron la encuesta, incluyéndose así los nacimientos en el mes de la entrevista. Sólo se incluye el último nacimiento de la mujer. El total incluye 0.5 por ciento de nacimientos sin información sobre control postnatal.

Cuadro 9.16 Prevalencia y tratamiento de infecciones respiratorias agudas para los menores de cinco años

Entre los niños menores de cinco años, porcentaje que estuvo enfermo con tos acompañada de respiración agitada durante las dos semanas que precedieron la encuesta; y entre los niños enfermos, el porcentaje que recibió tratamientos específicos, por características seleccionadas, Perú 2000

Característica	Infección respiratoria aguda		Tratamiento de IRA	
	Prevalencia infección respiratoria aguda ¹	Número de Niños	Porcentaje llevado a proveedores de salud ²	Número de Niños
Departamento				
Amazonas	19,6	212	52,0	42
Ancash	20,0	542	61,0	109
Apurímac	8,2	224	73,6	18
Arequipa	21,8	398	61,7	87
Ayacucho	15,9	263	59,8	42
Cajamarca	21,5	758	44,7	163
Cusco	16,8	627	54,7	105
Huancavelica	19,2	333	39,5	64
Huánuco	26,1	455	49,7	119
Ica	17,7	290	75,8	51
Junín	21,2	606	51,9	129
La Libertad	9,1	627	46,5	57
Lambayeque	32,2	502	57,5	161
Lima	20,3	2 969	63,4	603
Loreto	27,2	507	59,4	138
Madre de Dios	13,6	35	50,0	5
Moquegua	15,7	58	79,6	9
Pasco	24,6	118	44,3	29
Piura	21,6	879	56,4	190
Puno	17,6	649	54,1	114
San Martín	17,4	328	61,7	57
Tacna	28,6	100	80,7	29
Tumbes	7,4	83	85,7	6
Ucayali	22,0	190	61,9	42
Total	20,2	11 754	57,6	2 369

Nota: Las estimaciones se refieren a los niños nacidos en el período de 1-59 meses que precedieron la encuesta, excluyéndose así los nacidos en el mes de la entrevista.

Todos los porcentajes están basados en más de 25 casos sin ponderar.

¹ Tos con respiración agitada o rápida.

² Incluye hospitales, centros y puestos de salud, promotores, farmacias y médicos privados.

Cuadro 9.19 Prevalencia de diarrea para los menores de cinco años

Entre los niños menores de cinco años, porcentaje que tuvo diarrea en las dos semanas que precedieron la encuesta, por características seleccionadas, Perú 2000

Característica	Todo tipo de diarrea	Número de niños
Departamento		
Amazonas	15,8	212
Ancash	15,8	542
Apurímac	21,1	224
Arequipa	10,5	398
Ayacucho	20,2	263
Cajamarca	21,5	758
Cusco	18,2	627
Huancavelica	15,4	333
Huánuco	14,9	455
Ica	12,9	290
Junín	20,8	606
La Libertad	9,7	627
Lambayeque	15,4	502
Lima	9,9	2 969
Loreto	29,8	507
Madre de Dios	10,9	35
Moquegua	9,0	58
Pasco	23,4	118
Piura	12,2	879
Puno	17,5	649
San Martín	24,1	328
Tacna	6,6	100
Tumbes	16,2	83
Ucayali	26,5	190
Total	15,4	11 754

Nota: Las estimaciones se refieren a los niños nacidos en el período de 1-59 meses que precedieron la encuesta, excluyéndose así los nacidos en el mes de la entrevista.

Cuadro 9.20 Conocimiento de SRO y aplicación del patrón adecuado de alimentación para el cuidado de la diarrea por características seleccionadas

Porcentaje de madres con nacimiento en los cinco años anteriores a la encuesta que conocen de SRO y distribución porcentual de niños con diarrea según cantidad de alimentos recibidos durante la diarrea, según características seleccionadas, Perú 2000

Característica	Conoce SRO		Cantidad de líquidos y de sólidos recibidos durante la diarrea									
	Porcentaje que conoce SRO	Número de madres	Cantidad de líquidos				Cantidad de sólidos				Total	Número de niños
			Nada	Menos cantidad	Misma cantidad	Más cantidad	Nada	Menos cantidad	Misma cantidad	Más cantidad		
Departamento												
Amazonas	73,7	165	3,0	20,8	31,7	44,6	22,8	42,6	29,7	5,0	100,0	34
Ancash	66,2	418	0,0	6,3	25,3	68,4	7,6	59,5	31,6	1,3	100,0	86
Apurímac	72,6	176	2,2	18,2	16,1	63,5	6,6	54,7	25,5	13,1	100,0	47
Arequipa	81,6	338	2,6	7,7	33,3	56,4	5,1	48,7	38,5	7,7	100,0	42
Ayacucho	61,1	201	6,1	24,3	24,3	44,6	11,5	63,5	21,6	2,7	100,0	53
Cajamarca	63,9	599	5,8	20,4	34,0	39,8	16,5	52,4	28,2	1,9	100,0	163
Cusco	57,5	501	2,2	11,8	34,4	51,6	11,8	40,9	41,9	5,4	100,0	114
Huancavelica	61,0	220	2,5	12,3	23,0	62,3	10,7	38,5	19,7	31,1	100,0	51
Huánuco	66,4	348	5,3	7,4	17,9	69,5	26,3	50,5	14,7	8,4	100,0	68
Ica	90,0	249	0,0	16,7	31,3	52,1	0,0	56,3	33,3	10,4	100,0	37
Junín	64,3	470	0,0	4,8	35,6	59,6	12,5	44,2	38,5	4,8	100,0	126
La Libertad	80,4	501	8,7	13,0	43,5	32,6	26,1	39,1	30,4	0,0	100,0	61
Lambayeque	88,0	414	0,0	3,3	31,1	65,6	18,0	52,5	29,5	0,0	100,0	77
Lima	89,9	2 570	2,9	12,5	25,9	57,8	13,4	63,2	21,4	1,9	100,0	293
Loreto	79,6	388	1,5	19,8	27,4	51,3	12,2	48,2	26,9	12,7	100,0	151
Madre de Dios	81,7	29	3,3	9,8	19,7	67,2	13,1	55,7	29,5	1,6	100,0	4
Moquegua	90,8	51	9,7	12,9	16,1	61,3	19,4	54,8	16,1	6,5	100,0	5
Pasco	78,7	98	0,0	18,1	31,9	50,0	9,5	58,6	29,3	2,6	100,0	28
Piura	91,3	710	0,0	12,1	31,8	56,1	13,6	60,6	25,8	0,0	100,0	107
Puno	63,1	498	1,7	6,6	34,7	57,0	13,2	44,6	35,5	6,6	100,0	113
San Martín	76,9	275	3,6	16,1	25,9	52,7	19,6	51,8	23,2	2,7	100,0	79
Tacna	86,1	90	0,0	21,1	15,8	63,2	5,3	68,4	26,3	0,0	100,0	7
Tumbes	90,3	73	0,0	6,6	23,0	68,9	8,2	57,4	29,5	3,3	100,0	13
Ucayali	77,7	155	2,2	25,0	30,1	42,6	11,8	54,4	30,9	2,9	100,0	50
Total	78,2	9 535	2,5	13,2	29,5	54,5	13,8	52,4	28,4	5,1	100,0	1 810

Nota: Las estimaciones se refieren a los niños nacidos en el período de 1-59 meses que precedieron la encuesta, excluyéndose así los nacimientos en el mes de la entrevista. El total para 2000 incluye 0.3 por ciento sin información sobre la cantidad de líquidos y 0.4 por ciento sobre la cantidad de sólidos. Todas las distribuciones porcentuales están basadas en más de 25 casos sin ponderar.

SRO: incluye sólo las sales de rehidratación oral. El patrón adecuado de alimentación: en comparación con prácticas corrientes.

Cuadro 10.8 Indicadores de desnutrición para niños menores de cinco años, por características seleccionadas

Entre los niños menores de cinco años, porcentaje clasificado como desnutrido según tres indicadores antropométricos: talla para la edad, peso para la talla y peso para la edad, por características seleccionadas, Perú 2000

Características	Porcentaje con desnutrición crónica (Talla para la edad)		Porcentaje con desnutrición aguda (Peso para la talla)		Porcentaje con desnutrición global (Peso para la edad)		Número de niños
	Severa ¹	Total ²	Severa ¹	Total ²	Severa ¹	Total ²	
Departamento							
Amazonas	12,2	36,0	0,2	0,7	0,7	10,5	180
Ancash	10,2	34,5	0,0	0,4	0,7	6,0	488
Apurímac	13,6	43,0	0,3	2,0	2,0	12,3	208
Arequipa	2,3	12,3	0,0	0,3	0,3	4,0	323
Ayacucho	12,1	33,6	0,4	3,0	1,2	10,1	240
Cajamarca	15,4	42,8	0,2	1,4	1,9	12,0	657
Cusco	14,0	43,2	0,6	1,6	3,1	13,0	595
Huancavelica	22,2	53,4	0,0	0,9	3,0	17,5	269
Huánuco	15,3	42,8	0,2	1,1	1,4	11,6	400
Ica	2,7	12,1	0,3	0,9	0,0	1,2	258
Junín	10,5	31,3	0,7	1,8	0,9	10,0	532
La Libertad	9,9	27,9	0,2	0,2	0,9	7,2	574
Lambayeque	4,3	23,6	0,0	0,3	0,0	3,8	469
Lima	1,6	8,3	0,1	0,1	0,0	0,8	2 649
Loreto	9,0	32,4	0,3	2,1	1,0	17,3	471
Madre de Dios	3,7	18,7	0,6	2,3	0,6	4,8	30
Moquegua	1,8	9,3	0,0	0,4	0,0	0,4	38
Pasco	5,0	26,4	0,0	2,6	0,9	12,2	110
Piura	7,0	24,1	0,4	1,8	0,8	8,2	818
Puno	5,9	29,7	0,3	0,7	0,3	6,1	556
San Martín	6,7	19,9	0,0	1,2	1,0	8,2	284
Tacna	0,8	5,4	0,0	0,8	0,0	0,8	83
Tumbes	3,3	12,9	0,0	1,1	0,3	4,4	81
Ucayali	9,9	33,6	0,0	0,9	1,3	11,0	165
Total	7,7	25,4	0,2	0,9	0,8	7,1	10 477

Nota: Las estimaciones se refieren a los niños nacidos en el período 3-59 meses anteriores a la encuesta (se excluyen los menores de 3 meses). Cada índice se expresa en términos del número de desviaciones estándar (DE) de la media del patrón internacional utilizado por NCHS/CDC/OMS. Los niños se clasifican como desnutridos si están 2 o más desviaciones estándar (DE) por debajo de la media de la población de referencia.

El cuadro está basado en 89.1 por ciento del total de niños menores de 5 años (11,754). Para el 9.5 por ciento de los niños no se pudo recolectar información y para 1.3 por ciento se encontró alguna inconsistencia.

¹ Niños que están 3 DE o más por debajo de la medida.

² Niños que están 2 DE o más por debajo de la medida. Incluye los niños que están 3 DE o más por debajo de la medida.

Cuadro 10.14 Prevalencia de anemia en mujeres

Prevalencia de anemia en mujeres por tipo de anemia, según características seleccionadas, Perú 2000

Características	Distribución porcentual de mujeres con prueba de anemia					Número de mujeres	Porcentaje de mujeres sin prueba de anemia	Total de mujeres
	Mujeres con anemia			Mujeres sin anemia	Total			
	Anemia severa	Anemia moderada	Anemia leve					
Departamento								
Amazonas	0,0	5,3	26,5	68,1	100,0	75	15,0	88
Ancash	0,0	5,4	30,8	63,8	100,0	240	9,1	264
Apurímac	0,0	4,6	22,8	72,6	100,0	83	7,7	90
Arequipa	0,4	2,1	16,2	81,3	100,0	252	17,8	306
Ayacucho	0,4	8,6	36,9	54,1	100,0	91	13,0	105
Cajamarca	0,0	5,7	29,9	64,5	100,0	333	8,7	365
Cusco	0,5	8,5	31,5	59,6	100,0	261	4,1	272
Huancavelica	1,0	7,9	30,5	60,6	100,0	85	11,4	96
Huánuco	0,0	3,8	21,8	74,4	100,0	169	15,6	201
Ica	0,0	3,3	21,9	74,8	100,0	189	4,3	197
Junín	0,4	4,5	18,9	76,2	100,0	296	11,3	334
La Libertad	0,4	6,5	20,3	72,8	100,0	366	8,6	400
Lambayeque	0,0	6,1	31,3	62,6	100,0	292	9,1	321
Lima	0,4	6,4	25,9	67,4	100,0	2 069	13,4	2 389
Loreto	0,4	1,7	14,9	83,1	100,0	186	2,8	191
Madre de Dios	0,9	7,0	26,5	65,6	100,0	13	13,3	16
Moquegua	0,5	2,5	16,0	81,0	100,0	33	19,7	42
Pasco	0,0	2,7	18,5	78,8	100,0	62	4,1	65
Piura	0,3	6,9	24,7	68,1	100,0	468	3,7	486
Puno	0,0	7,8	38,0	54,3	100,0	230	26,2	311
San Martín	0,8	7,4	20,2	71,6	100,0	172	2,4	176
Tacna	0,5	7,1	31,5	60,9	100,0	68	13,6	79
Tumbes	0,0	5,5	26,3	68,2	100,0	61	1,1	61
Ucayali	0,4	5,4	21,6	72,6	100,0	89	8,0	97
Total	0,3	5,9	25,4	68,4	100,0	6 184	11,0	6 952

Nota: Anemia severa: 7.0 g/dl; anemia moderada: 7.0-9.9 g/dl; anemia leve: 10.0-11.9 g/dl (10.0-10.9 para las mujeres embarazadas).

Cuadro 10.15 Prevalencia de anemia en niños menores de 5 años

Prevalencia de anemia en niños 6-59 meses, por tipo de anemia, según características seleccionadas, Perú 2000


Características	Distribución porcentual de mujeres con prueba de anemia						Porcentaje de niños sin prueba de anemia	Total de niños
	Niños con anemia			Niños sin anemia	Total	Número de niños		
	Anemia severa	Anemia moderada	Anemia leve					
Departamento								
Amazonas	0,0	20,0	21,9	58,1	100,0	35	29,5	50
Ancash	0,0	27,2	21,0	51,9	100,0	88	31,4	128
Apurímac	2,1	20,4	24,6	52,8	100,0	49	9,6	54
Arequipa	7,8	15,7	15,7	60,8	100,0	55	37,0	87
Ayacucho	0,9	21,8	30,0	47,3	100,0	39	29,0	55
Cajamarca	1,1	26,4	25,3	47,3	100,0	144	24,2	190
Cusco	4,3	47,4	19,0	29,3	100,0	142	7,2	153
Huancavelica	0,8	27,3	30,5	41,4	100,0	54	24,7	71
Huánuco	2,6	15,8	37,7	43,9	100,0	81	26,9	111
Ica	1,8	10,5	14,0	73,7	100,0	44	19,7	55
Junín	1,1	24,4	28,9	45,6	100,0	109	23,7	143
La Libertad	2,0	17,0	19,0	62,0	100,0	133	9,9	147
Lambayeque	2,8	22,2	26,4	48,6	100,0	91	18,2	112
Lima	0,0	23,7	23,4	53,0	100,0	569	20,0	711
Loreto	0,0	16,1	22,8	61,1	100,0	114	1,3	116
Madre de Dios	1,1	20,4	33,3	45,2	100,0	6	19,8	7
Moquegua	0,0	15,8	10,5	73,7	100,0	6	51,3	13
Pasco	1,1	13,2	22,0	63,7	100,0	22	13,3	25
Piura	1,0	28,0	27,0	44,0	100,0	163	10,7	182
Puno	1,1	46,1	14,6	38,2	100,0	83	50,0	167
San Martín	0,0	15,3	16,7	68,1	100,0	51	19,1	63
Tacna	2,3	23,3	37,2	37,2	100,0	15	28,3	21
Tumbes	2,1	29,8	22,3	45,7	100,0	21	3,1	21
Ucayali	2,1	30,2	16,7	51,0	100,0	36	17,2	43
Total	1,3	24,9	23,4	50,4	100,0	2 150	21,1	2 726

Nota: Anemia severa: 7.0 g/dl, anemia moderada: 7.0-9.9 g/dl, anemia leve: 10.0-11.9 g/dl (10.0-10.9 para las mujeres embarazadas)

Cuadro 11.7 Conocimiento de los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y ETS específicas

Distribución porcentual de las mujeres por conocimiento de los síntomas asociados con las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y porcentaje de mujeres, por ETS que conocen, según características seleccionadas, Perú 2000

Característica	Síntomas específicas de las ETS				Total	Número de mujeres	Conoce ETS específicas				Número de mujeres
	No conoce sobre las ETS	No conoce síntomas de ETS	Conoce un síntoma	Conoce dos o más síntomas			Conoce sífilis	Conoce gonorrea	Verrugas genitales/condiloma	Otras ETS	
Departamento											
Amazonas	60,4	11,5	9,9	18,1	100,0	362	56,5	62,7	5,8	15,7	144
Ancash	68,8	7,5	8,4	15,2	100,0	1 026	48,1	46,8	3,7	17,3	320
Apurímac	69,9	8,7	6,1	15,1	100,0	352	67,1	45,3	6,8	14,7	106
Arequipa	39,6	11,1	11,8	37,4	100,0	1 232	63,3	59,1	3,5	21,3	744
Ayacucho	66,5	8,9	6,4	18,3	100,0	433	65,4	51,4	4,7	22,0	145
Cajamarca	81,9	4,8	4,7	8,5	100,0	1 442	53,3	58,2	6,7	21,8	261
Cusco	66,6	10,8	6,9	15,4	100,0	1 130	69,2	60,7	3,2	15,9	377
Huancavelica	81,9	2,7	3,1	12,3	100,0	383	65,5	52,7	2,4	17,6	69
Huánuco	69,1	3,9	7,6	19,3	100,0	740	78,5	72,0	9,0	10,6	229
Ica	47,9	11,0	12,6	28,5	100,0	793	66,6	64,5	5,5	11,9	413
Junín	45,9	14,0	10,0	30,2	100,0	1 337	68,0	52,3	1,7	19,1	724
La Libertad	52,9	11,3	8,8	27,1	100,0	1 484	60,4	52,7	3,6	20,1	700
Lambayeque	66,6	8,5	7,1	17,8	100,0	1 350	66,5	71,3	2,3	12,1	451
Lima	35,8	9,6	17,5	37,1	100,0	9 531	64,8	51,1	4,3	25,5	6 121
Loreto	32,1	9,3	10,6	48,0	100,0	820	54,3	91,7	4,4	22,1	556
Madre de Dios	46,3	7,0	9,4	37,2	100,0	66	73,2	67,5	5,9	21,3	35
Moquegua	40,1	15,5	15,9	28,4	100,0	173	60,6	58,4	0,6	13,8	104
Pasco	60,8	9,3	11,2	18,7	100,0	250	67,3	58,8	4,9	17,6	98
Piura	61,5	6,7	9,5	22,2	100,0	2 097	71,4	70,2	8,7	9,9	808
Puno	82,4	4,0	3,7	9,9	100,0	1 206	49,1	38,1	8,8	25,2	212
San Martín	29,2	8,1	7,9	54,8	100,0	692	54,8	93,1	2,7	20,3	490
Tacna	40,3	9,8	14,5	35,3	100,0	328	70,7	70,4	3,4	22,2	196
Tumbes	16,0	3,2	29,1	51,6	100,0	235	59,9	65,9	5,5	26,7	197
Ucayali	30,2	14,5	15,9	39,5	100,0	381	60,6	90,3	5,3	18,5	266
Total	50,6	9,0	11,8	28,6	100,0	27 843	63,8	58,9	4,4	21,2	13 766



APENDICE A

DISEÑO Y COBERTURA DE LA MUESTRA

APENDICE A

A.1 INTRODUCCION

La muestra utilizada para la encuesta ENDES 2000 es una muestra probabilística que fue seleccionada en tres etapas: la selección de centros poblados en la primera etapa, la selección de conglomerados en la segunda etapa, y la selección de viviendas en la etapa final. La muestra estuvo constituida por 1414 conglomerados, distribuidos proporcionalmente en el área urbana y rural de cada departamento. El número de conglomerados por departamento fue de alrededor de 50, con la excepción de Lima en donde se seleccionaron 226. La muestra total permite sólidas estimaciones de indicadores para los hogares y para las mujeres entre 15-49 años de edad para un número de variables importantes al nivel de cada uno de los 24 departamentos, las tres regiones naturales del país (Costa, Sierra y Selva) y niveles de urbanización. Para otros indicadores como la mortalidad, por ejemplo, deben preferirse las estimaciones a nivel de las 13 regiones administrativas y no a nivel departamental. También, la cuarta parte de la muestra total permite estimaciones para la anemia en mujeres y niños. La muestra es autoponderada a nivel de departamento, pero para estimaciones a nivel agregado deben utilizarse las ponderaciones adecuadas detalladas al final de este apéndice.

Para la muestra total, el número de hogares visitados fue de 33,046, de los cuales sólo 28,900 fueron entrevistados. En los hogares entrevistados se encontró un total de 29,423 mujeres elegibles y de las cuales se obtuvo un total de 27,843 entrevistas completas. La muestra seleccionada representa la totalidad de la población total del país. Ninguna área fue deliberadamente omitida del marco muestral.

A.2 DISEÑO Y SELECCION

Unidades de Muestreo

Las Unidades Primarias de Muestreo (UPM) fueron los centros poblados empadronados en el último censo de población del año de 1993. Cada UPM fue dividida en conglomerados (USM), y toda vivienda localizada en dicha área se considera como la unidad última de muestreo (UUM).

Marco Muestral

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) realizó el último censo de población y de vivienda en 1993 y mantiene un listado computarizado de los centros poblados con información censal, lo cual permite el cálculo de los parámetros para el diseño de cualquier muestra utilizando dicho marco de unidades. El archivo computarizado de centros poblados dentro de cada departamento ha sido estratificado de tal manera que refleje la agrupación de ellos en sedes urbanas, en el resto urbano y en el área rural.

Como consecuencia se decidió usar este marco muestral para la encuesta ENDES 2000. La razón principal es que es factible una subdivisión en conglomerados adecuada para los objetivos de la encuesta ENDES 2000. La segunda razón, es la de hacer posible la implementación de los listados actualizados de viviendas en cada conglomerado seleccionado.

Además de la estratificación por departamento, en cada uno de ellos los centros poblados fueron clasificados en cuatro grupos: sedes urbanas (20 mil o más habitantes), resto

urbano (2 mil a menos de 20 mil), semirural (localidades con 500 a menos de 2 mil habitantes) y rural (localidades con menos de 500 habitantes).

Composición de la muestra

Con el objetivo inicial de obtener un total aproximado de 28,000 entrevistas completas de mujeres elegibles se utilizó información de la encuesta ENDES 1996, como un instrumento de ayuda para estimar ciertos parámetros del diseño, especialmente las tasas de respuesta. Se estimó que se haría necesario un total aproximado de 33,000 viviendas a ser seleccionadas para obtener ese número de entrevistas completas. Ese total fue distribuido por departamentos pero no proporcionalmente a su tamaño poblacional sino para poder cumplir con los objetivos requeridos de la encuesta de tener indicadores a nivel departamental. Para ello se fijó el número esperado de entrevistas por departamento en alrededor de 1,000 (3,325 para Lima), tal como se puede observar en el Cuadro A.1.

Selección de la muestra

La muestra resultante para la ENDES 2000 se obtuvo en tres etapas: la primera etapa es una selección sistemática de centros poblados con probabilidad proporcional a su tamaño. Después de la primera etapa de selección se implementó una actualización del levantamiento cartográfico existente y de sus viviendas en las áreas de nueva construcción que se habían generado después del último censo de población. Inmediatamente después de esta actualización cartográfica se dividió el centro poblado en conglomerados (de un tamaño promedio apropiado, más o menos alrededor de 100 viviendas cada uno), para proceder a la selección de ellos. En los conglomerados seleccionados se realizó un levantamiento exhaustivo de viviendas. Finalmente fue seleccionado un número de viviendas en cada conglomerado, de tal manera de mantener una

fracción muestral uniforme para cada vivienda (e implícitamente para cada hogar) dentro de cada departamento.

Para el proceso de selección de los centros poblados se siguieron los siguientes pasos:

- El número de conglomerados a ser seleccionados en cada departamento fue calculado como la división del tamaño de muestra esperado en el departamento y del tamaño promedio de muestra esperado dentro del conglomerado.
- El total de muestra requerido en cada departamento fue distribuido entre sus subestratos (sede, resto urbano y rural) de acuerdo a su población censal, y también dentro de cada dentro de cada subestrato, sus centros poblados fueron ordenados de acuerdo a su continuidad geográfica en serpentin.
- Para cada subestrato, se elaboró un listado de sus centro poblados con sus correspondientes totales de población (viviendas) y también de sus correspondientes acumulados parciales de población.
- En cada subestrato, se realizó una selección (sistemática y con probabilidad proporcional a su tamaño poblacional) de un número de centros poblados requeridos para esta encuesta, digamos a , en el total de ellos en dicho subestrato.
- La probabilidad de selección del i -ésimo centro poblado para la ENDES 2000 es:

$$P_{1i} = (a * m_i) / (Sm_i)$$

donde

a : es el número de centros poblados a ser seleccionados en el subestrato.

m_i : es el total de viviendas del i -ésimo centro poblado de acuerdo al censo de 1993,

Sm_i : es el total de viviendas del subestrato según el censo de 1993.

La selección de las UPMs, mediante el muestreo sistemático con probabilidad proporcional al tamaño, se efectuó de la manera siguiente:

- Se listaron las UPMs con su respectivo tamaño (m_i) de viviendas.
- Se acumularon los valores de m_i uno a uno. Al final, se verificó que el acumulado total sea igual a la suma de los valores m_i .
- Dado que a es el número de UPMs a ser seleccionadas, se calcula el intervalo de selección (K): Se eligió al azar un número comprendido entre 1 y K . Este número se denomina "arranque aleatorio" (aa).

$$K = \frac{\text{Total de Viviendas en el subestrato}}{\text{Nº de UPM's a elegirse en el subestrato}} = \frac{\sum m_i}{a}$$

- El arranque aleatorio (aa) es el número que determina la primera UPM a seleccionar. La segunda UPM seleccionada será: $aa + K$. La tercera UPM seleccionada será: $aa + 2K$, y así sucesivamente hasta completar las UPM requeridas para la muestra.

Antes de la siguiente etapa de selección, cada centro poblado seleccionado (previa actualización cartográfica) se dividió en áreas compactas denominadas conglomerados (unidades secundarias de muestreo o USMs). Para el proceso de selección de los conglomerados o USMs se siguieron los siguientes pasos:

- En cada UPM o centro poblado, se realizó una selección (sistemática y con probabilidad proporcional a su tamaño) del número de conglomerados requeridos para la ENDES 2000.
- La probabilidad final del j -ésimo conglomerado está dada como:

Cuadro A.1 Número de conglomerados urbanos y rurales por departamentos

Número de conglomerados urbanos y rurales por departamento, Perú 2000

Departamento	Número esperado de entrevistas de mujeres	Número de conglomerados seleccionados			
		Sede	Resto urbano	Rural	Total
Amazonas	1 000	5	9	36	50
Ancash	1 100	13	14	25	52
Apurímac	1 000	7	6	37	50
Arequipa	1 150	40	5	11	56
Ayacucho	1 200	14	8	38	60
Cajamarca	900	4	6	40	50
Cusco	900	10	7	33	50
Huancavelica	1 000	6	2	42	50
Huánuco	1 000	13	3	34	50
Ica	1 000	28	12	10	50
Junín	1 100	17	13	20	50
La Libertad	1 200	23	12	17	52
Lambayeque	1 000	26	12	12	50
Lima	3 600	198	13	15	226
Loreto	1 200	27	8	23	58
Madre de Dios	1 000	23	2	25	50
Moquegua	1 000	31	5	14	50
Pasco	1 000	14	9	27	50
Piura	900	9	21	20	50
Puno	1 200	15	8	37	60
San Martín	1 000	12	15	23	50
Tacna	1 000	40	2	8	50
Tumbes	1 000	24	17	9	50
Ucayali	1 000	28	6	16	50
Total	27 450	627	215	572	1 414

$$P_{ji} = (a * m_i) / (\sum m_i) (n_i / N_i)$$

donde

n_i : es el número de (USMs) conglomerados seleccionado en el i -ésimo centro poblado,

N_i : es el número total de (USMs) conglomerados en el i -ésimo centro poblado.

Antes de la última etapa de selección, el listado de viviendas de cada conglomerado (USM) seleccionado fue actualizado mediante trabajo de campo. Después de obtener los listados actualizados de viviendas para los conglomerados (USMs) seleccionados, se determinó el número final de viviendas de acuerdo al siguiente procedimiento:

$$P_{2ij} = (b_{ij} / L_{ij})$$

$$f = P_{1i} * P_{2ij}$$

y de las cuales se obtiene

$$b_{ij} = (f * L_{ij}) / (P_{1i})$$

donde:

b_{ij} : es el número de viviendas a seleccionar en la j -ésima USM de la i -ésima UPM.

L_{ij} : es el número total de viviendas listadas en el j -ésimo conglomerado de la i -ésima UPM según el censo de 1999.

f : es la fracción de muestreo para cada departamento, según el diseño.

P_{1i} : es la probabilidad de selección del i -ésimo conglomerado.

Una vez establecido el número total de viviendas a ser seleccionado, el procedimiento de selección de ellos depende si el conglomerado es urbano o rural.

Conglomerados urbanos. Se procedió a seleccionar automáticamente por computadora las unidades últimas de muestreo usando una selección sistemática para cada conglomerado seleccionado, mediante el siguiente algoritmo:

- Se listan las viviendas particulares de la USM seleccionada.
- Se enumeran las viviendas en la lista desde 1 hasta L_{ij} .
- Se determina el intervalo de selección (K):

$$K = \frac{\text{Total de viviendas ocup. acumuladas en el conglomerado}}{\text{Total de viviendas a seleccionarse en el conglomerado}} = \frac{L_{ij}}{b_{ij}}$$

- Se elige al azar un número como "arranque aleatorio" (aa). Este número muestral debe estar entre 1 y K .

- El arranque aleatorio (aa) es el número muestral que corresponde a la primera vivienda seleccionada. La segunda vivienda seleccionada será el arranque aleatorio (aa) + K . La tercera vivienda seleccionada será el arranque aleatorio (aa) + $2K$, y así sucesivamente hasta completar el número requerido de viviendas a seleccionar dentro del conglomerado.

Conglomerados rurales. Par cada conglomerado rural, la selección se hace en grupos compactos de ocho hogares contiguos sobre el listado de hogares de acuerdo al siguiente procedimiento:

- Se enumeran las viviendas en forma consecutiva en el listado de conglomerados rurales.
- Después de cada múltiplo de ocho (es decir 8, 16, 24, etc) se traza una línea horizontal (con un marcador de color). Cada grupo está formado por las viviendas entre cada dos líneas horizontales consecutivas y el primer grupo está constituido por la primera vivienda en la lista hasta el anterior inmediato a la primera línea horizontal, y en el caso de existir más de 4 viviendas después de la última línea horizontal, el último grupo estará constituido por esas viviendas después de la última línea horizontal. Todos estos grupos así formados se denominan grupos compactos; sea G_{ij} ese total de ellos.
- Si hubieran viviendas (menos de cuatro) después de la última línea horizontal, ellas serán distribuidas uniformemente entre los grupos compactos anteriores en forma sistemática y con un inicio al azar.
- Se calcula el número de grupo compactos a seleccionar como

$$g_{ij} = \text{redondeo al entero más cercano de } (b_{ij}/8)$$

- Se selecciona entonces g_{ij} grupos compactos del total G_{ij} en una forma sistemática y con un comienzo al azar.
- Todas las viviendas dentro de los grupos compactos en el conglomerado rural será considerado como la muestra de viviendas de dicho conglomerado.

Rendimiento de la muestra

En los Cuadros A.2 y A3. Se presentan las tasas de respuesta por departamento y por área de residencia para la encuesta de hogares (Cuadro A.2) y para la encuesta de mujeres (Cuadro A.3). De un total de 1,414 conglomerados seleccionados, se logró implementar la encuesta en todos ellos.

De los 33,046 hogares que fueron seleccionados, casi el 9 por ciento de sus viviendas estaban desocupadas, destruidas o en otra condición. En los restantes (hogares residenciales) se obtuvieron 28,900 entrevistas completas, el 88 por ciento de los hogares potenciales seleccionados.

De un total de 29,423 mujeres elegibles se logró entrevistar 27,843, obteniéndose una tasa de respuesta individual del 95 por ciento. La tasa de respuesta combinada de hogares y mujeres fue del 93 por ciento, la cual es bastante

satisfactoria para este tipo de encuesta. La mejor tasa de cobertura se logró en el departamento de Tumbes con 99 por ciento y la más baja en el departamento de Lima con casi un 89 por ciento.

Metodología de estimación

Para que las estimaciones derivadas de la ENDES 2000 sean representativas de la población, es necesario multiplicar los datos de cada hogar muestral contenido en los archivos por el peso o factor de expansión calculada según el diseño muestral.

El factor final para cada hogar tiene dos componentes: el factor básico de muestreo y el factor de ajuste por la no respuesta. El factor básico de expansión es determinado por el diseño de la muestra y equivale al inverso de la probabilidad final de selección de cada hogar, la misma que es igual a la fracción de muestreo en el departamento. Esto quiere decir que los factores básicos de expansión varían según el departamento de estudio.

El factor de ajuste por no respuesta es utilizado para ajustar los factores básicos de muestreo con el fin de tener en cuenta los hogares no entrevistados en el conglomerado. Este ajuste a los factores básicos es realizado a nivel de departamento.

Cuadro A.2 Implementación de la muestra: hogares


Distribución porcentual de la población total en los hogares visitados por nivel de urbanización y región natural, según departamento, Perú 2000

Área y departamento	Comple- pletos	Persona compe- tente ausente	Hogar ausente	Rechazo	Vivienda deso- cupada	Vivi- enda des- truida	Vivienda no encon- trada	Otra	Total	Número de hogares	Tasa de respuesta
Área de residencia											
Urbana	88,9	0,4	1,9	1,1	6,8	0,3	0,4	0,3	100,0	17,401	97,9
Rural	85,9	0,5	3,4	0,1	6,9	0,5	0,8	1,9	100,0	15,645	98,3
Departamento											
Amazonas	86,5	0,6	3,8	0,3	7,3	0,4	0,9	0,1	100,0	1,379	97,9
Ancash	88,2	0,8	0,8	0,2	9,7	0,0	0,1	0,2	100,0	1,188	98,8
Apurímac	85,9	0,2	4,3	0,3	7,8	0,3	0,6	0,7	100,0	1,534	98,8
Arequipa	87,6	0,7	3,6	1,5	6,0	0,0	0,3	0,1	100,0	1,358	97,1
Ayacucho	83,9	0,8	4,8	0,2	5,9	0,4	0,9	3,1	100,0	1,847	97,8
Cajamarca	85,9	0,3	1,8	0,1	8,0	0,0	1,7	2,2	100,0	1,083	97,7
Cusco	91,5	0,2	3,3	0,3	3,5	0,3	0,3	0,5	100,0	1,166	99,2
Huancavelica	84,3	0,3	2,1	0,0	5,8	0,5	1,0	6,0	100,0	1,443	98,4
Huánuco	84,5	0,2	8,0	0,2	5,1	0,5	0,6	0,8	100,0	1,255	98,8
Ica	88,2	0,2	1,2	0,4	9,1	0,4	0,1	0,6	100,0	1,126	99,3
Junín	89,4	0,4	3,0	0,1	4,3	0,7	0,8	1,1	100,0	1,152	98,5
La Libertad	87,7	0,5	0,8	0,0	9,8	0,2	0,3	0,7	100,0	1,259	99,1
Lambayeque	92,2	0,1	0,5	1,3	5,5	0,1	0,2	0,1	100,0	1,000	98,3
Lima	89,9	0,5	1,5	2,6	4,8	0,1	0,5	0,2	100,0	3,714	96,2
Loreto	83,9	1,0	4,7	0,3	7,0	1,3	1,5	0,3	100,0	1,121	96,8
Madre de Dios	83,5	0,6	3,6	0,6	9,2	1,3	0,9	0,4	100,0	1,418	97,6
Moquegua	87,0	0,0	0,9	1,2	10,6	0,0	0,1	0,1	100,0	1,372	98,4
Pasco	86,3	0,2	0,8	0,2	7,5	0,5	0,6	3,8	100,0	1,301	98,9
Piura	91,8	0,5	1,6	0,1	4,9	0,1	1,1	0,0	100,0	1,191	98,2
Puno	86,2	0,7	3,9	0,8	7,4	0,1	0,1	0,8	100,0	1,925	98,2
San Martín	89,0	0,3	1,9	0,2	5,0	0,5	0,9	2,2	100,0	1,093	98,5
Tacna	87,5	0,0	0,9	0,6	10,8	0,0	0,1	0,1	100,0	1,067	99,3
Tumbes	90,6	0,1	1,3	0,1	7,6	0,3	0,0	0,0	100,0	1,014	99,8
Ucayali	88,6	0,9	2,3	0,8	5,2	1,1	0,7	0,6	100,0	1,040	97,5
Total	87,5	0,4	2,6	0,7	6,8	0,4	0,6	1,0	100,0	33,046	98,1

Cuadro A.3 Implementación de la muestra: mujeres

Distribución porcentual de mujeres elegibles en la muestra por resultado de la entrevista de mujeres y tasas de respuesta, Perú, 2000

Departamento	Mujer completa	Mujer ausente	Rechazo	Parcial	Incapa- citada	Otra	Total	Número	Tasa de respuesta	Tasa de respuesta global
Área de residencia										
Urbana	94,0	2,9	1,9	0,4	0,6	0,1	100,0	18,152	94,0	92,1
Rural	95,6	2,9	0,5	0,1	0,9	0,1	100,0	11,270	95,6	94,0
Departamento										
Amazonas	93,5	4,1	0,4	0,1	1,7	0,2	100,0	1,166	93,5	91,6
Ancash	95,5	2,9	0,7	0,1	0,6	0,2	100,0	990	95,5	94,3
Apurímac	96,7	1,9	0,9	0,1	0,3	0,1	100,0	1,054	96,7	95,5
Arequipa	92,7	4,4	1,5	0,3	0,6	0,2	100,0	1,241	92,7	89,9
Ayacucho	93,5	4,7	0,9	0,2	0,7	0,1	100,0	1,292	93,5	91,4
Cajamarca	95,9	3,2	0,0	0,1	0,7	0,1	100,0	952	95,9	93,7
Cusco	96,3	2,5	0,2	0,4	0,4	0,0	100,0	958	96,3	95,5
Huancavelica	95,0	3,1	0,5	0,3	1,0	0,0	100,0	959	95,0	93,5
Huánuco	95,9	2,1	0,7	0,4	0,7	0,1	100,0	1,083	95,9	94,8
Ica	92,3	5,0	1,8	0,0	0,9	0,0	100,0	1,103	92,3	91,6
Junín	94,5	4,2	0,9	0,2	0,3	0,0	100,0	1,165	94,5	93,1
La Libertad	94,8	2,5	1,6	0,2	0,8	0,1	100,0	1,181	94,8	94,0
Lambayeque	95,2	0,6	2,9	0,3	1,1	0,0	100,0	1,117	95,2	93,5
Lima	92,8	3,3	2,7	0,4	0,7	0,1	100,0	3,823	92,8	89,3
Loreto	93,5	4,2	0,5	0,6	0,9	0,2	100,0	1,142	93,5	90,5
Madre de Dios	95,0	1,9	2,0	0,1	0,8	0,2	100,0	1,103	95,0	92,7
Moquegua	93,4	1,7	3,5	0,5	0,9	0,0	100,0	1,111	93,4	92,0
Pasco	98,5	0,6	0,3	0,2	0,5	0,0	100,0	1,062	98,5	97,5
Piura	96,2	2,3	0,1	0,0	1,2	0,1	100,0	1,341	96,2	94,5
Puno	93,2	4,3	1,4	0,5	0,4	0,1	100,0	1,380	93,2	91,5
San Martín	95,8	2,3	0,9	0,2	0,6	0,2	100,0	1,023	95,8	94,3
Tacna	92,6	2,7	3,2	0,9	0,6	0,0	100,0	1,026	92,6	91,9
Tumbes	99,3	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	100,0	1,069	99,3	99,0
Ucayali	95,1	2,6	1,3	0,1	0,8	0,1	100,0	1,081	95,1	92,7
Total	94,6	2,9	1,4	0,3	0,7	0,1	100,0	29,422	94,6	92,8



APENDICE B

LOS ERRORES DE MUESTREO

APENDICE B

Por tratarse de una encuesta por muestreo, los resultados de la ENDES 2000 que se incluyen en el presente informe son estimaciones que están afectadas por dos tipos de errores: aquellos que se producen durante las labores de recolección y procesamiento de la información (que se denominan usualmente errores no muestrales) y los llamados errores de muestreo, que resultan del hecho de haberse entrevistado sólo una muestra y no la población total.

El primer tipo de error incluye la falta de cobertura de todas las mujeres seleccionadas, errores en la formulación de las preguntas y en el registro de las respuestas, confusión o incapacidad de las mujeres para dar la información y errores de codificación o de procesamiento. En el presente estudio se trató de reducir a un mínimo este tipo de errores a través de una serie de procedimientos que se emplean en toda encuesta bien diseñada y ejecutada, como son: el diseño cuidadoso y numerosas pruebas del cuestionario, intensa capacitación de las entrevistadoras, supervisión intensa y permanente del trabajo de campo, revisión de los cuestionarios en el campo por parte de las críticas, supervisión apropiada en la etapa de codificación, y procesamiento de los datos y limpieza cuidadosa del archivo con retroalimentación a las supervisoras, críticas y entrevistadoras a partir de los cuadros de control de calidad. Los elementos de juicio disponibles señalan que este tipo de errores se mantuvo dentro de márgenes razonables en la ENDES 2000. En lo que sigue no se hará más referencia a los errores ajenos al muestreo sino únicamente a los llamados errores de muestreo.

La muestra de mujeres estudiadas en la ENDES 2000 no es sino una de la gran cantidad de muestras del mismo tamaño que sería posible seleccionar de la población de interés utilizando el diseño empleado. Cada una de ellas habría

dado resultados en alguna medida diferentes de los arrojados por la muestra usada. La variabilidad que se observaría entre todas las muestras posibles constituye el error de muestreo, el cual no se conoce pero puede ser estimado a partir de los datos suministrados por la muestra realmente seleccionada. El error de muestreo se mide por medio del error estándar. El error estándar de un promedio, porcentaje, diferencia o cualquier otra estadística calculada con los datos de la muestra se define como la raíz cuadrada de la varianza de la estadística y es una medida de su variación en todas las muestras posibles. En consecuencia, el error estándar mide el grado de precisión con que el promedio, porcentaje, o estadística basado en la muestra, se aproxima al resultado que se habría obtenido si se hubiera entrevistado a todas las mujeres de la población bajo las mismas condiciones.

El error estándar puede ser usado para calcular intervalos dentro de los cuales hay una determinada confianza de que se encuentra el valor poblacional. Así, si se toma cierta estadística calculada de la muestra (un porcentaje, por ejemplo) y se le suma y resta dos veces su error estándar, se obtiene un intervalo al cual se le asigna una confianza de 95 por ciento de que contiene, en este caso, el porcentaje poblacional.

Si las mujeres incluidas en la muestra hubieran sido seleccionadas en forma simple al azar, podrían utilizarse directamente las fórmulas muy conocidas que aparecen en los textos de estadística para el cálculo de errores estándar y límites de confianza y para la realización de pruebas de hipótesis. Sin embargo, como se ha señalado, el diseño empleado es complejo, por lo cual se requiere utilizar fórmulas especiales que consideran los efectos de la estratificación y la conglomeración.

Ha sido posible realizar estos cálculos para un cierto grupo de variables de interés especial, empleando la metodología, actualmente incorporada en ISSA, del programa CLUSTERS (Computation and Listing of Useful Statistics on Errors of Sampling), un programa de computador desarrollado por la Encuesta Mundial de Fecundidad (WFS), apropiado para el análisis estadístico de muestras complejas como la de la ENDES 2000. El programa CLUSTERS maneja el porcentaje o promedio de interés como una razón estadística $r = y/x$, en donde tanto el numerador $[y]$ como el denominador $[x]$ son variables aleatorias. El cálculo de la varianza de r lo hace CLUSTERS utilizando la fórmula que seguidamente se indica y el error estándar tomando la raíz cuadrada de esa varianza:

$$\text{var}(r) = \frac{1-f}{x^2} \sum_{h=1}^H \left[\frac{m_h}{m_h - 1} \left(\sum_{i=1}^{m_h} z_{hi}^2 \cdot \frac{z_h^2}{m_h} \right) \right]$$

en donde $z_{hi} = y_{hi} - r \circ x_{hi}$ y en forma análoga $z_h = y_h - r \circ x_h$, el subíndice h representa los estratos y varía de 1 a H , m_h es el número de conglomerados en el estrato h , las cantidades y_{hi} y x_{hi} son la suma de los valores de la variable y el número de casos (mujeres) en el conglomerado i del estrato h , respectivamente. Finalmente, f representa la fracción de muestreo, la cual es ignorada por el programa CLUSTERS.

Además del error estándar, la metodología original de CLUSTERS calcula el efecto del diseño, EDIS, el cual se define como la razón entre el error estándar correspondiente al diseño empleado (EE) y el error estándar que se obtiene tratando la muestra como si hubiera sido aleatoria simple (EE_{mas}):

$$\text{EDIS} = \text{EE} / \text{EE}_{\text{mas}}.$$

Un valor de EDIS igual a 1.0 indicaría que el diseño utilizado es tan eficiente como uno simple al azar del mismo tamaño, mientras que un valor superior a 1.0 indicaría que el uso de conglomerados produjo una varianza superior a la que se habría obtenido con una muestra simple al azar del mismo tamaño.

En el Cuadro B.1 se listan las variables para las cuales se han calculado los errores de muestreo. Se indica allí el tipo de estimador utilizado y la población de referencia. Los errores de muestreo para el resto de variables se presentan en los Cuadros B.2.1 a B.2.31. Los errores de muestreo para las estimaciones de fecundidad y mortalidad por zona, región y subregión se presentan en los Cuadros B.2.32 a B.2.37. Para cada variable se incluye el correspondiente valor estimado V (sea un promedio o un porcentaje), el error estándar y el número de casos (sin ponderar y ponderados) para los cuales se investigó la característica considerada. Además del error estándar, en el cuadro aparecen también el efecto del diseño (EDIS), el error relativo (EE/ V) y el intervalo con 95 por ciento de confianza que contenga el verdadero valor. En algunos casos no se puede calcular cierto estimador y en la celda aparece 'NA'.

El examen de los cuadros revela que, en general, los errores estándar son pequeños y que por ello la muestra puede calificarse como bastante precisa; ésto es especialmente claro en la antepenúltima columna donde aparecen los errores relativos. Nótese que los efectos del diseño tienden a aumentar para las clasificaciones geográficas y a disminuir para clasificaciones que cruzan toda la muestra, como es la edad.

Para ilustrar el uso de las cifras en este Apéndice, considérese la variable no desea más hijos, que tiene un valor estimado de 0.583 (58 por ciento) con un error estándar de 0.020 para la población del departamento de Apurímac en el Cuadro B.2.6. Si se desea un intervalo de confianza del 95 por ciento, lo que se hace es sumarle y restarle al promedio dos veces el error estándar: $0.583 \pm (2 \times 0.020)$, lo que produce el intervalo de 0.543 a 0.624 de las dos últimas columnas. Esto significa que se tiene una confianza de 95 por ciento de que el valor estimado para el porcentaje de mujeres que no desean más hijos encuentra entre esos valores que arroja la muestra (entre el 54 y el 62 por ciento).

Cuadro B.1 Variable seleccionadas para el cálculo de los errores de muestreo

Variables, tipo de estimación y población base para el cálculo de los errores de muestreo, Perú 2000

Variable	Estimación	Población base
Residencia urbana	Proporción	Mujeres de 15-49 años
Sin instrucción	Proporción	Mujeres de 15-49 años
Educación secundaria o más	Proporción	Mujeres de 15-49 años
Nunca en unión	Proporción	Mujeres de 15-49 años
Actualmente unida	Proporción	Mujeres de 15-49 años
Casada antes de 20 años	Proporción	Mujeres de 15-49 años
Primera relación antes 18 años	Proporción	Mujeres de 15-49 años
Promedio de nacidos vivos 15-49	Promedio	Mujeres de 15-49 años
Promedio de nacidos vivos 40-49	Promedio	Mujeres de 40-49 años
Promedio de sobrevivientes 15-49	Promedio	Mujeres de 15-49 años
Conoce método anticonceptivo	Proporción	Mujeres actualmente unidas
Conoce método moderno	Proporción	Mujeres actualmente unidas
Alguna vez usó anticonceptivos	Proporción	Mujeres actualmente unidas
Actualmente usa anticonceptivos	Proporción	Mujeres actualmente unidas
Usa método moderno actualmente	Proporción	Mujeres actualmente unidas
Usa píldora actualmente	Proporción	Mujeres actualmente unidas
Usa DIU actualmente	Proporción	Mujeres actualmente unidas
Usa condón actualmente	Proporción	Mujeres actualmente unidas
Usa esterilización femenina	Proporción	Mujeres actualmente unidas
Usa ritmo actualmente	Proporción	Mujeres actualmente unidas
Sector público como fuente del método	Proporción	Mujeres actualmente usan métodos
No desea más hijos	Proporción	Mujeres actualmente unidas
Desea esperar 2 años o más	Proporción	Mujeres actualmente unidas
Tamaño ideal de familia	Promedio	Mujeres de 15-49 años con respuesta numérica
Vacuna antitetánica	Proporción	Nacidos en los últimos 5 años
Atención médica al parto	Proporción	Nacidos en los últimos 5 años
Niños con diarrea últimas 2 semanas	Proporción	Niños de 1-59 meses
Recibió tratamiento de SRO	Proporción	Niños con diarrea 2 semanas que precedieron la encuesta
Recibió tratamiento médico	Proporción	Niños con diarrea 2 semanas que precedieron la encuesta
Niños con tarjeta	Proporción	Niños de 12-23 meses
Niños que recibieron BCG	Proporción	Niños de 12-23 meses
Niños que recibieron DPT (3 dosis)	Proporción	Niños de 12-23 meses
Niños que recibieron Polio (3 dosis)	Proporción	Niños de 12-23 meses
Recibieron vacuna antisarampionosa	Proporción	Niños de 12-23 meses
Recibieron todas las vacunas	Proporción	Niños de 12-23 meses
Peso para la edad 2 DE por debajo	Proporción	Niños de 0-59 meses con medición1
Talla para la edad 2 DE por debajo	Proporción	Niños de 0-59 meses con medición1
Peso para la talla 2 DE por debajo	Proporción	Niños de 0-59 meses con medición1
Fecundidad	Tasa	Mujeres 15-49
Mortalidad neonatal	Tasa	Nacimientos en los 10 años anteriores a la encuesta
Mortalidad post-neonatal	Tasa	Nacimientos en los 10 años anteriores a la encuesta
Mortalidad infantil	Tasa	Nacimientos en los 10 años anteriores a la encuesta
Mortalidad post-infantil	Tasa	Nacimientos en los 10 años anteriores a la encuesta
Mortalidad en la niñez	Tasa	Nacimientos en los 10 años anteriores a la encuesta

1/ Los valores de la columna "valor estimado" en los Cuadros B.2.1 a B.2.22 son ligeramente diferentes a los de los

Cuadros 9.5 y 9.6 del Capítulo 9 porque estos últimos cuadros no incluyen los niños menores de 3 meses

Cuadro B.2.1 Errores de muestreo para la población total

Valor estimado, error estándar, efecto del diseño, error relativo e intervalo de confianza para variables seleccionadas, Perú 2000

Variable	Valor estimado (V)	Efecto Error estándar (EE)	Número de casos			Intervalo de confianza		
			Sin ponderar (SP)	Ponderados (P)	del diseño (EDIS)	Error relativo (EE/V)	Valor estimado -2EE	Valor estimado +2EE
Población urbana	0,699	0,005	27 843	27 843	1,921	0,008	0,688	0,709
Sin educación	0,051	0,002	27 843	27 843	1,743	0,045	0,047	0,056
Con secundaria o más	0,662	0,006	27 843	27 843	2,123	0,009	0,650	0,674
Nunca se unió	0,358	0,005	27 843	27 843	1,641	0,013	0,349	0,368
Actualmente unida	0,561	0,005	27 843	27 843	1,658	0,009	0,551	0,571
Casada antes de los 20 años	0,380	0,005	22 095	22 198	1,675	0,014	0,369	0,391
Primera relación antes 18 años	0,372	0,005	22 095	22 198	1,681	0,015	0,361	0,383
Promedio de nacidos vivos 15-49	2,111	0,023	27 843	27 843	1,610	0,011	2,065	2,158
Promedio de nacidos vivos 40-49	4,422	0,058	5 471	5 661	1,504	0,013	4,306	4,537
Promedio de sobrevivientes 15-49	1,918	0,020	27 843	27 843	1,560	0,010	1,879	1,958
Conoce método anticonceptivo	0,924	0,003	16 518	15 628	1,452	0,003	0,918	0,930
Conoce método moderno	0,905	0,003	16 518	15 628	1,476	0,004	0,898	0,912
Alguna vez usó anticonceptivos	0,898	0,003	16 518	15 628	1,399	0,004	0,892	0,905
Actualmente usa anticonceptivos	0,689	0,005	16 518	15 628	1,335	0,007	0,679	0,698
Usa método moderno actualmente	0,504	0,006	16 518	15 628	1,459	0,011	0,493	0,516
Usa píldora	0,067	0,003	16 518	15 628	1,364	0,040	0,061	0,072
Usa DIU	0,091	0,003	16 518	15 628	1,506	0,037	0,084	0,097
Usa inyección	0,148	0,004	16 518	15 628	1,327	0,025	0,140	0,155
Usa implante	0,002	0,000	16 518	15 628	1,196	0,194	0,001	0,003
Usa condón	0,056	0,003	16 518	15 628	1,453	0,046	0,051	0,062
Usa esterilización femenina	0,123	0,003	16 518	15 628	1,301	0,027	0,116	0,129
Usa esterilización masculina	0,005	0,001	16 518	15 628	1,369	0,149	0,004	0,007
Usa ritmo actualmente	0,144	0,004	16 518	15 628	1,286	0,024	0,137	0,151
Usa retiro	0,032	0,002	16 518	15 628	1,284	0,055	0,028	0,035
Sector público como fuente	0,783	0,007	9 100	8 911	1,635	0,009	0,769	0,797
No desea más hijos	0,545	0,005	16 518	15 628	1,409	0,010	0,535	0,556
Desea esperar 2 años o más	0,194	0,004	16 518	15 628	1,368	0,022	0,186	0,203
Tamaño ideal de familia	2,391	0,010	27 316	27 366	1,392	0,004	2,371	2,412
Vacuna antitetánica	0,577	0,006	13 697	12 222	1,431	0,011	0,564	0,589
Atención médica al parto	0,469	0,008	13 697	12 222	1,620	0,018	0,452	0,485
Niños con diarrea últimas 2 semanas	0,154	0,004	13 130	11 754	1,194	0,027	0,146	0,162
Recibió tratamiento de SRO	0,687	0,013	2 211	1 810	1,164	0,019	0,661	0,714
Recibió tratamiento médico	0,384	0,014	2 211	1 810	1,209	0,037	0,355	0,413
Niños con tarjeta	0,621	0,013	2 594	2 366	1,271	0,021	0,596	0,647
Niños que recibieron BCG	0,962	0,004	2 594	2 366	1,121	0,005	0,953	0,971
Niños que recibieron DPT (3 dosis)	0,836	0,010	2 594	2 366	1,270	0,012	0,816	0,855
Niños que recibieron polio (3 dosis)	0,752	0,011	2 594	2 366	1,269	0,015	0,729	0,775
Recibieron vacuna antisarampionosa	0,719	0,012	2 594	2 366	1,239	0,016	0,696	0,742
Recibieron todas las vacunas	0,564	0,013	2 594	2 366	1,228	0,022	0,539	0,589
Peso para la talla 2 DE por debajo	0,009	0,001	11 585	10 477	1,040	0,106	0,007	0,011
Talla para la edad 2 DE por debajo	0,254	0,006	11 585	10 477	1,356	0,025	0,242	0,267
Peso para la edad 2 DE por debajo	0,071	0,003	11 585	10 477	1,138	0,042	0,065	0,077

Cuadro B.2.6 Errores de muestreo para la población de Apurímac

Valor estimado, error estándar, efecto del diseño, error relativo e intervalo de confianza para variables seleccionadas, Perú 2000

Variable	Valor estimado (V)	Error estándar (EE)	Número de casos		Efecto del diseño (EDIS)	Error relativo (EE/V)	Intervalo de confianza	
			Sin ponderar (SP)	Ponderados (P)			Valor estimado -2EE	Valor estimado +2EE
Población urbana	0,288	0,020	1 019	352	1,388	0,068	0,248	0,327
Sin educación	0,161	0,021	1 019	352	1,844	0,132	0,118	0,203
Con secundaria o más	0,404	0,027	1 019	352	1,741	0,066	0,351	0,458
Nunca se unió	0,223	0,010	1 019	352	0,800	0,047	0,202	0,244
Actualmente unida	0,711	0,012	1 019	352	0,819	0,016	0,688	0,735
Casada antes de los 20 años	0,553	0,016	833	287	0,910	0,028	0,522	0,585
Primera relación antes 18 años	0,498	0,020	833	287	1,169	0,041	0,458	0,539
Promedio de nacidos vivos 15-49	3,136	0,095	1 019	352	1,020	0,030	2,947	3,326
Promedio de nacidos vivos 40-49	6,268	0,227	198	68	1,051	0,036	5,815	6,721
Promedio de sobrevivientes 15-49	2,706	0,085	1 019	352	1,092	0,031	2,536	2,875
Conoce método anticonceptivo	0,890	0,021	725	250	1,777	0,023	0,848	0,931
Conoce método moderno	0,866	0,022	725	250	1,712	0,025	0,823	0,910
Alguna vez usó anticonceptivos	0,851	0,020	725	250	1,500	0,023	0,811	0,891
Actualmente usa anticonceptivos	0,639	0,019	725	250	1,076	0,030	0,600	0,677
Usa método moderno actualmente	0,476	0,025	725	250	1,370	0,053	0,425	0,527
Usa píldora	0,036	0,007	725	250	1,007	0,194	0,022	0,050
Usa DIU	0,047	0,009	725	250	1,108	0,186	0,029	0,064
Usa inyección	0,215	0,018	725	250	1,211	0,086	0,178	0,252
Usa implante	0,001	0,001	725	250	0,990	0,990	0,000	0,004
Usa condón	0,040	0,008	725	250	1,054	0,192	0,025	0,055
Usa esterilización femenina	0,121	0,011	725	250	0,914	0,091	0,099	0,144
Usa esterilización masculina	0,008	0,004	725	250	1,186	0,483	0,000	0,016
Usa ritmo actualmente	0,130	0,013	725	250	1,061	0,102	0,103	0,156
Usa retiro	0,019	0,005	725	250	1,070	0,283	0,008	0,030
Sector público como fuente	0,948	0,015	362	125	1,272	0,016	0,918	0,977
No desea más hijos	0,583	0,020	725	250	1,101	0,035	0,543	0,624
Desea esperar 2 años o más	0,197	0,018	725	250	1,201	0,090	0,162	0,233
Tamaño ideal de familia	2,416	0,051	973	336	1,379	0,021	2,315	2,517
Vacuna antitetánica	0,592	0,026	677	234	1,472	0,044	0,540	0,645
Atención médica al parto	0,402	0,026	677	234	1,198	0,064	0,350	0,453
Niños con diarrea últimas 2 semanas	0,211	0,019	648	224	1,174	0,091	0,173	0,250
Recibió tratamiento de SRO	0,693	0,047	137	47	1,189	0,068	0,599	0,787
Recibió tratamiento médico	0,526	0,045	137	47	1,022	0,085	0,436	0,615
Niños con tarjeta	0,662	0,062	136	47	1,534	0,094	0,537	0,787
Niños que recibieron BCG	1,000	0,000	136	47	NA	0,000	1,000	1,000
Niños que recibieron DPT (3 dosis)	0,853	0,038	136	47	1,255	0,045	0,777	0,929
Niños que recibieron polio (3 dosis)	0,824	0,044	136	47	1,349	0,054	0,735	0,912
Recibieron vacuna antisarampionosa	0,735	0,039	136	47	1,023	0,053	0,658	0,813
Recibieron todas las vacunas	0,574	0,045	136	47	1,064	0,079	0,483	0,664
Peso para la talla 2 DE por debajo	0,020	0,007	602	208	1,257	0,359	0,006	0,034
Talla para la edad 2 DE por debajo	0,430	0,027	602	208	1,293	0,062	0,376	0,484
Peso para la edad 2 DE por debajo	0,123	0,018	602	208	1,344	0,147	0,087	0,159

Cuadro B.2.32 Errores de muestreo para la tasa global de fecundidad por lugar de residencia

Valor estimado, error estándar, efecto del diseño, error relativo e intervalo de confianza para variables seleccionadas, Perú 2000

Lugar de residencia	Valor estimado (V)	Error estándar (EE)	Número de casos		Efecto del diseño (EDIS)	Error relativo (EE/V)	Intervalo de confianza	
			Sin ponderar (SP)	Ponderados (P)			Valor estimado -2EE	Valor estimado +2EE
Área de residencia								
Urbana	2,217	0,050	NA	54 675	1,453	0,023	2,116	2,318
Rural	4,337	0,108	NA	23 329	1,702	0,025	4,120	4,553
Departamento								
Amazonas	3,831	0,315	NA	1 011	1,621	0,082	3,201	4,461
Ancash	3,374	0,270	NA	2 870	1,482	0,080	2,834	3,915
Apurímac	4,241	0,268	NA	999	1,346	0,063	3,706	4,776
Arequipa	2,242	0,246	NA	3 501	1,697	0,110	1,750	2,733
Ayacucho	4,190	0,289	NA	1 206	1,422	0,069	3,612	4,768
Cajamarca	3,536	0,281	NA	4 027	1,386	0,079	2,975	4,098
Cusco	4,003	0,300	NA	3 180	1,340	0,075	3,403	4,604
Huancavelica	6,136	0,317	NA	1 073	1,365	0,052	5,503	6,770
Huánuco	4,270	0,350	NA	2 076	1,648	0,082	3,570	4,971
Ica	2,520	0,158	NA	2 201	0,938	0,063	2,203	2,837
Junín	3,151	0,292	NA	3 671	1,655	0,093	2,566	3,735
La Libertad	2,852	0,251	NA	4 113	1,561	0,088	2,349	3,355
Lambayeque	2,359	0,254	NA	3 815	1,630	0,108	1,850	2,868
Lima	2,108	0,085	NA	26 899	1,125	0,040	1,938	2,278
Loreto	4,277	0,333	NA	2 259	1,609	0,078	3,610	4,944
Madre de Dios	3,542	0,216	NA	183	1,223	0,061	3,110	3,975
Moquegua	2,061	0,168	NA	490	1,274	0,081	1,726	2,396
Pasco	3,168	0,218	NA	694	1,259	0,069	2,733	3,603
Piura	2,656	0,177	NA	5 847	1,224	0,067	2,302	3,010
Puno	3,800	0,208	NA	4 681	1,158	0,055	3,385	4,215
San Martín	3,000	0,269	NA	1 922	1,536	0,090	2,463	3,538
Tacna	2,003	0,146	NA	921	1,124	0,073	1,711	2,295
Tumbes	2,298	0,137	NA	650	1,087	0,060	2,023	2,572
Ucayali	3,240	0,276	NA	1 051	1,616	0,085	2,689	3,791
Región natural								
Lima Metropolitana	2,017	0,085	NA	24 388	1,080	0,042	1,847	2,187
Resto Costa	2,354	0,084	NA	19 781	1,572	0,036	2,187	2,522
Sierra	3,719	0,099	NA	25 203	1,619	0,027	3,521	3,916
Selva	3,785	0,160	NA	8 632	2,049	0,042	3,465	4,106
Total	2,847	0,060	NA	78 004	1,750	0,021	2,727	2,967

NA: no aplicable

Cuadro B.2.35 Errores de muestreo para la mortalidad infantil por lugar de residencia

Valor estimado, error estándar, efecto del diseño, error relativo e intervalo de confianza para variables seleccionadas, Perú 2000

Lugar de residencia	Valor estimado (V)	Error estándar (EE)	Número de casos		Efecto del diseño (EDIS)	Error relativo (EE/V)	Intervalo de confianza	
			Sin ponderar (SP)	Ponde- rados (P)			Valor estimado -2EE	Valor estimado +2EE
			ESTIMACIONES PARA LOS DIEZ AÑOS ANTERIORES A LA ENDES 2000					
Área de residencia								
Urbana	28,426	1,892	13 388	14 060	1,200	0,067	24,643	32,209
Rural	60,347	2,528	16 057	12 065	1,222	0,042	55,291	65,403
Departamento								
Amazonas	47,251	6,208	1 440	478	0,976	0,131	34,836	59,667
Ancash	49,972	7,397	1 087	1 180	0,987	0,148	35,177	64,766
Apurímac	70,953	8,239	1 533	529	1,074	0,116	54,475	87,430
Arequipa	39,892	9,598	861	922	1,310	0,241	20,696	59,089
Ayacucho	49,613	6,377	1 576	564	1,072	0,129	36,859	62,367
Cajamarca	50,558	7,412	1 090	1 721	1,104	0,147	35,733	65,382
Cusco	83,666	8,901	1 199	1 468	0,976	0,106	65,863	101,468
Huancavelica	70,492	7,805	1 617	679	1,129	0,111	54,883	86,102
Huánuco	63,250	6,283	1 466	1 044	0,916	0,099	50,685	75,816
Ica	21,362	3,999	804	626	0,794	0,187	13,364	29,360
Junín	43,017	4,938	1 099	1 335	0,780	0,115	33,142	52,892
La Libertad	45,054	7,207	1 016	1 346	1,011	0,160	30,640	59,467
Lambayeque	37,998	7,865	957	1 216	1,270	0,207	22,267	53,729
Lima	19,726	3,065	2 411	6 232	1,076	0,155	13,597	25,856
Loreto	52,983	7,003	1 467	1 126	1,142	0,132	38,978	66,989
Madre de Dios	27,654	4,445	1 236	78	0,912	0,161	18,763	36,544
Moquegua	28,181	5,411	715	119	0,893	0,192	17,358	39,003
Pasco	57,944	7,054	1 160	277	0,922	0,122	43,835	72,053
Piura	36,789	6,808	1 229	1 998	1,125	0,185	23,173	50,405
Puno	59,230	6,876	1 599	1 500	1,082	0,116	45,477	72,983
San Martín	48,509	7,760	1 157	817	1,164	0,160	32,989	64,029
Tacna	23,841	6,091	656	227	1,072	0,256	11,658	36,024
Tumbes	35,580	6,109	849	188	0,990	0,172	23,363	47,798
Ucayali	51,639	7,094	1 221	453	1,103	0,137	37,451	65,828
Región natural								
Lima Metropolitana	17,418	3,122	1 889	5 306	1,057	0,179	11,173	23,663
Resto Costa	34,349	3,220	6 113	5 915	1,338	0,094	27,908	40,789
Sierra	57,596	2,578	13 944	10 958	1,171	0,045	52,441	62,751
Selva	50,774	3,679	7 499	3 946	1,396	0,072	43,415	58,133
Total	43,173	1,640	29 445	26 124	1,213	0,038	39,893	46,452
ESTIMACIONES PARA LOS CINCO AÑOS ANTERIORES A LA ENDES 2000								
Área urbana	23,608	2,380	6 399	6 845	1,178	0,100	18,840	28,368
Área rural	44,880	3,236	7 689	5 735	1,272	0,070	38,400	51,352
Total	33,311	2,013	14 088	12 580	1,202	0,060	29,280	37,337
ESTIMACIONES PARA LOS DIEZ AÑOS ANTERIORES A LA ENDES 1996								
Área urbana	34,934	1,839	17 999	18 196	1,225	0,053	31,255	38,613
Área rural	71,023	3,000	17 255	12 943	1,339	0,042	65,023	77,023
Total	49,912	1,798	35 254	31 139	1,327	0,036	46,316	53,509

Cuadro B.2.37 Errores de muestreo para la mortalidad en la niñez por lugar de residencia

Valor estimado, error estándar, efecto del diseño, error relativo e intervalo de confianza para variables seleccionadas, Perú 2000

Lugar de residencia	Valor estimado (V)	Error estándar (EE)	Número de casos		Efecto del diseño (EDIS)	Error relativo (EE/V)	Intervalo de confianza	
			Sin ponderar (SP)	Ponderados (P)			Valor estimado -2EE	Valor estimado +2EE
	ESTIMACIONES PARA LOS DIEZ AÑOS ANTERIORES A LA ENDES 2000							
Área de residencia								
Urbana	39,028	2,227	13 430	14 102	1,228	0,057	34,573	43,483
Rural	85,287	3,127	16 172	12 154	1,301	0,037	79,033	91,540
Departamento								
Amazonas	68,484	7,315	1 449	481	0,964	0,107	53,855	83,114
Ancash	71,751	10,077	1 094	1 188	1,158	0,140	51,597	91,906
Apurímac	93,942	8,635	1 541	532	1,034	0,092	76,671	111,212
Arequipa	57,588	18,297	864	925	1,996	0,318	20,995	94,182
Ayacucho	68,259	8,112	1 584	567	1,158	0,119	52,034	84,484
Cajamarca	68,936	9,913	1 097	1 733	1,281	0,144	49,110	88,762
Cusco	108,004	9,563	1 210	1 482	0,971	0,089	88,878	127,129
Huancavelica	107,713	9,651	1 636	687	1,149	0,090	88,411	127,014
Huánuco	93,218	7,644	1 476	1 051	0,932	0,082	77,931	108,505
Ica	32,236	6,541	806	628	0,935	0,203	19,153	45,318
Junín	62,056	6,608	1 107	1 344	0,840	0,106	48,840	75,272
La Libertad	60,449	8,256	1 017	1 348	1,004	0,137	43,938	76,961
Lambayeque	47,047	8,635	958	1 217	1,216	0,184	29,777	64,316
Lima	26,855	3,650	2 422	6 255	1,109	0,136	19,556	34,155
Loreto	78,651	7,369	1 474	1 131	0,993	0,094	63,912	93,390
Madre de Dios	39,850	5,252	1 239	78	0,940	0,132	29,345	50,355
Moquegua	33,029	6,097	716	120	0,928	0,185	20,836	45,222
Pasco	77,505	9,035	1 164	278	0,982	0,117	59,435	95,575
Piura	53,791	7,731	1 235	2 008	1,148	0,144	38,329	69,252
Puno	85,045	8,033	1 609	1 509	1,112	0,094	68,979	101,110
San Martín	69,671	8,512	1 163	821	1,043	0,122	52,647	86,696
Tacna	34,280	7,151	658	227	1,054	0,209	19,977	48,582
Tumbes	46,523	8,733	851	188	1,219	0,188	29,056	63,990
Ucayali	80,176	7,872	1 232	457	0,982	0,098	64,433	95,920
Región natural								
Lima Metropolitana	22,519	3,605	1 894	5 320	1,079	0,160	15,308	29,729
Resto Costa	46,076	3,764	6 128	5 933	1,397	0,082	38,548	53,604
Sierra	81,221	3,313	14 037	11 032	1,307	0,041	74,595	87,847
Selva	74,581	3,845	7 543	3 971	1,209	0,052	66,892	82,271
Total	60,381	2,052	29 602	26 256	1,308	0,034	56,277	64,485
	ESTIMACIONES PARA LOS CINCO AÑOS ANTERIORES A LA ENDES 2000							
Área urbana	32,410	2,770	6 434	6 876	1,187	0,080	26,870	37,949
Área rural	63,611	3,782	7 762	5 792	1,289	0,050	56,040	71,176
Total	46,726	2,388	14 196	12 668	1,230	0,050	41,950	51,502
	ESTIMACIONES PARA LOS DIEZ AÑOS ANTERIORES A LA ENDES 1996							
Área urbana	46,425	2,184	18 062	18 245	1,276	0,047	42,057	50,793
Área rural	99,579	3,748	17 351	13 016	1,412	0,038	92,083	107,075
Total	68,426	2,264	35 413	31 261	1,422	0,033	63,897	72,955

LISTA DE CUADROS Y GRAFICOS

APENDICE

C

LISTA DE CUADROS

Página

CAPITULO 1

Cuadro 1.1	Composición del producto bruto interno	23
------------	--	----

CAPITULO 2

Cuadro 2.1	Composición de la población total por edad, sexo y residencia urbana-rural	32
Cuadro 2.2	Nivel de educación de la población masculina de 6 años y más	33
Cuadro 2.3	Nivel de educación de la población femenina de 6 años y más	34
Cuadro 2.4	Asistencia Escolar de la Población en los Hogares	34
Cuadro 2.5	Composición de los hogares	35
Cuadro 2.6	Niños según sobrevivencia de los padres y situación de residencia	36
Cuadro 2.7	Características de las viviendas y los hogares	37
Cuadro 2.8	Bienes de consumo duraderos	38

CAPITULO 3

Cuadro 3.1	Nivel de educación de las mujeres entrevistadas por características seleccionadas	42
Cuadro 3.2	Nivel de educación más alto alcanzado y razones de abandono	44
Cuadro 3.3	Alfabetismo por características seleccionadas	44
Cuadro 3.4	Acceso a los medios masivos de comunicación	45
Cuadro 3.5	Trabajo en los últimos 12 meses y tipo actual de empleo, según características seleccionadas	46
Cuadro 3.6	Tipo de ocupación de las mujeres, según características seleccionadas	47
Cuadro 3.7	Empleador y forma de remuneración de las mujeres que trabajan, según características seleccionadas	48
Cuadro 3.8	Persona que decide como gastar los ingresos y gastos del hogar que paga la entrevistada, según características seleccionadas	49
Cuadro 3.9	Control de los ingresos para la contribución a los gastos del hogar (mujeres unidas)	50
Cuadro 3.10	Decisiones en el hogar ((mujeres unidas)	51
Cuadro 3.10a	Decisiones en el hogar (mujeres no unidas)	51
Cuadro 3.11	Última palabra en decisiones del hogar según características seleccionadas	52
Cuadro 3.12	Razones específicas para rehusar relaciones sexuales con el esposo	53

CAPITULO 4

Cuadro 4.1	Niveles de fecundidad	58
Cuadro 4.2	Fecundidad y paridez por lugar de residencia y educación	59
Cuadro 4.3	Fecundidad por edad para varios quinquenios anteriores a la encuesta	60
Cuadro 4.4	Número de nacidos vivos y sobrevivientes a las mujeres entrevistadas, por edad	61
Cuadro 4.5	Intervalos entre nacimientos	62
Cuadro 4.6	Edad al primer nacimiento	63
Cuadro 4.7	Edad mediana al primer nacimiento	63
Cuadro 4.8	Fecundidad en adolescentes	64

CAPITULO 5

Cuadro 5.1	Conocimiento de métodos específicos entre las mujeres entrevistadas	68
Cuadro 5.2	Conocimiento de métodos entre las mujeres en unión por características seleccionadas	69
Cuadro 5.3	Uso alguna vez de métodos anticonceptivos específicos entre las mujeres entrevistadas	70
Cuadro 5.4	Uso actual de métodos anticonceptivos específicos entre las mujeres entrevistadas	71
Cuadro 5.5	Uso actual de métodos anticonceptivos entre las mujeres en unión	72
Cuadro 5.6	Número de hijos al usar métodos por primera vez	73
Cuadro 5.7	Conocimiento del período fértil	74
Cuadro 5.8	Fuente de suministros para métodos modernos	74
Cuadro 5.9	Información suministrada durante la prescripción de métodos modernos	76
Cuadro 5.10	Razones de discontinuación de métodos anticonceptivos	77
Cuadro 5.11	Uso futuro de anticoncepción entre mujeres que no usan actualmente	78
Cuadro 5.12	Exposición a mensajes de planificación familiar en medios de comunicación	80
Cuadro 5.13	Contacto de mujeres no usuarias con proveedores de planificación familiar	81
Cuadro 5.14	Discusión de planificación familiar entre parejas	82
Cuadro 5.15	Percepción de las mujeres con relación a la actitud de sus cónyuges sobre la planificación familiar	82

CAPITULO 6

Cuadro 6.1	Estado conyugal actual	86
Cuadro 6.2	Tipo de relación sexual de las mujeres no unidas	86
Cuadro 6.3	Edad a la primera unión por edad actual de las mujeres	87
Cuadro 6.4	Edad mediana a la primera unión	87
Cuadro 6.5	Edad a la primera relación sexual por edad actual de las mujeres	88
Cuadro 6.6	Edad mediana a la primera relación sexual	88
Cuadro 6.7	Actividad sexual reciente	90
Cuadro 6.8	Amenorrea, abstinencia e insusceptibilidad de postparto	91
Cuadro 6.9	Duración mediana de insusceptibilidad de postparto	91
Cuadro 6.10	Terminación de exposición al riesgo de embarazo: menopausia	92

CAPITULO 7

Cuadro 7.1	Preferencia de fecundidad por número de hijos sobrevivientes	96
Cuadro 7.2	Preferencia de fecundidad por edad actual de las mujeres	97
Cuadro 7.3	Mujeres que no desean más hijos según características seleccionadas	97
Cuadro 7.4	Necesidad de servicios de planificación familiar para las mujeres en unión, según características seleccionadas	99

Cuadro 7.5	Número ideal y promedio ideal de hijos	101
Cuadro 7.6	Promedio ideal de hijos, según características seleccionadas	101
Cuadro 7.7	Planificación de la fecundidad	102
Cuadro 7.8	Fecundidad deseada y observada	103

CAPITULO 8

Cuadro 8.1	Mortalidad infantil y en la niñez para varios quinquenios	108
Cuadro 8.2	Mortalidad infantil y en la niñez en los diez años anteriores a la encuesta, según características seleccionadas	109
Cuadro 8.3	Mortalidad perinatal, según características seleccionadas	110
Cuadro 8.4	Categorías de alto riesgo reproductivo	112

CAPITULO 9

Cuadro 9.1	Percepción del acceso a los servicios de salud como un gran problema	116
Cuadro 9.2	Atención prenatal para los menores de cinco años	117
Cuadro 9.3	Contenido de la atención prenatal para menores de cinco años	119
Cuadro 9.4	Vacuna contra el tétanos neonatal	120
Cuadro 9.5	Lugar del parto para los nacimientos en los últimos cinco años	121
Cuadro 9.6	Atención durante el parto para los menores de cinco años de edad por características seleccionadas	122
Cuadro 9.7	Características del parto: nacimientos por cesárea y peso al nacer para los menores de cinco años	124
Cuadro 9.8	Complicaciones durante el parto	124
Cuadro 9.9	Problemas postnatales por características seleccionadas	125
Cuadro 9.10	Atención médica para los problemas postnatal	126
Cuadro 9.11	Proveedores de atención postnatal para los menores de cinco años	127
Cuadro 9.12	Síntomas que conllevan a la madre a buscar ayuda médica inmediata	128
Cuadro 9.13	Vacunaciones en cualquier momento para los niños de 18-29 meses según fuente de información	130
Cuadro 9.14	BCG, DPT, Polio y Sarampión: vacunación en cualquier momento de los niños 18-29 meses, por sexo del niño y orden de nacimiento	130
Cuadro 9.15	BCG, DPT, Polio y Sarampión: niños vacunados a la edad apropiada	131
Cuadro 9.16	Prevalencia de infecciones respiratorias agudas para los menores de cinco años	132
Cuadro 9.17	Prevalencia de diarrea para los menores de cinco años	134
Cuadro 9.18	Conocimiento de SRO y aplicación del patron adecuado de alimentación para el cuidado de la diarrea por características seleccionadas	136
Cuadro 9.19	Tratamiento de diarrea para los menores de cinco años	137
Cuadro 9.20	Eliminación de las deposiciones de los niños	138

CAPITULO 10

Cuadro 10.1	Lactancia inicial para niños menores de cinco años	142
Cuadro 10.2	Situación de lactancia para niños menores de tres años	143
Cuadro 10.3	Duración de la lactancia para niños menores de tres años	145
Cuadro 10.4	Micronutrientes	148
Cuadro 10.5	Indicadores de desnutrición para niños menores de cinco años, según características seleccionadas	150

Cuadro 10.6	Indicadores de desnutrición para niños menores de cinco años	151
Cuadro 10.7	La talla como indicador del estado nutricional de las mujeres	152
Cuadro 10.8	El índice de masa corporal como indicador de la situación nutricional de las madres, según características seleccionadas	153
Cuadro 10.9	Prevalencia de anemia en mujeres	156
Cuadro 10.10	Prevalencia de anemia en niños menores de 5 años	157
Cuadro 10.11	Prevalencia de anemia en niños menores de 5 años y de sus madres	157

CAPITULO 11

Cuadro 11.1	Conocimiento de VIH/SIDA en general por parte de las mujeres entrevistadas y conocimiento particular de formas válidas y específicas de evitar el VIH/SIDA	162
Cuadro 11.2	Conocimiento de formas para evitar el contagio entre las mujeres con conocimiento del VIH/SIDA	163
Cuadro 11.3	Fuente de conocimiento del VIH/SIDA	164
Cuadro 11.4	Conocimiento de asuntos relacionados con el VIH/SIDA	165
Cuadro 11.5	Aspectos sociales de la prevención del SIDA y su mitigación	166
Cuadro 11.6	Conocimiento de los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y ETS específicas	167
Cuadro 11.7	Conocimiento de síntomas y signos de las ETS	168
Cuadro 11.8	Prevalencia de enfermedades de transmisión sexual por características seleccionadas	169
Cuadro 11.9	Fuente de tratamiento para las enfermedades de transmisión sexual	169
Cuadro 11.10	Número de parejas sexuales de las mujeres no en unión	170
Cuadro 11.11	Conocimiento y uso del condón	171
Cuadro 11.12	Uso de condón por tipo de compañero	172

CAPITULO 12

Cuadro 12.1	Violencia intrafamiliar: apoyo emocional y violencia verbal por parte del esposo	176
Cuadro 12.2	Violencia intrafamiliar: persona que ejerció la violencia y frecuencia de ésta	177
Cuadro 12.3	Violencia intrafamiliar: uso de alcohol por parte del esposo o compañero	179
Cuadro 12.4	Violencia intrafamiliar: búsqueda de ayuda ante la violencia	180
Cuadro 12.5	Violencia intrafamiliar: institución donde buscó ayuda	180
Cuadro 12.6	Violencia intrafamiliar: persona a quién pidió ayuda cuando la maltrataron	181
Cuadro 12.7	Violencia intrafamiliar: razones para no demandar al agresor o no buscar ayuda o consejo	182
Cuadro 12.8	Violencia intrafamiliar: forma como castigan los esposos o compañeros a sus hijos	183
Cuadro 12.9	Violencia intrafamiliar: forma como castigan las mujeres a sus hijos	184
Cuadro 12.10	Violencia intrafamiliar: forma como castigaban los padres a la entrevistada	185
Cuadro 12.11	Violencia intrafamiliar: creencia en la necesidad de castigo físico en la educación de los hijos	186
Cuadro 12.12	Violencia intrafamiliar: mujeres que declararon que su padre golpeaba a la madre de la entrevistada	186

ANEXO

Cuadro 2.4	Nivel de Educación de la población masculina de 6 años y más	189
Cuadro 2.5	Nivel de Educación de la población femenina de 6 años y más	189
Cuadro 3.5	Alfabetismo por características seleccionadas	190
Cuadro 4.3	Fecundidad y paridez por lugar de residencia y educación	190
Cuadro 5.5	Uso actual de métodos anticonceptivos entre las mujeres entrevistadas por características seleccionadas	191
Cuadro 7.6.1	Necesidad de Servicios de planificación familiar para las mujeres en unión por características seleccionadas	191
Cuadro 9.7	Atención durante el parto para los menores de cinco años de edad, por características socioeconómicas seleccionadas	192
Cuadro 9.12	Cuidado postnatal por características seleccionadas	193
Cuadro 9.16	Prevalencia y tratamiento de infecciones respiratorias agudas para los menores de cinco años	194
Cuadro 9.19	Prevalencia de diarrea para los menores de cinco años	195
Cuadro 9.20	Conocimiento de SRO y aplicación del patrón adecuado de alimentación para el cuidado de la diarrea por características seleccionadas	196
Cuadro 10.8	Indicadores de desnutrición para niños menores de cinco años, por características socioeconómicas	197
Cuadro 10.14	Prevalencia de anemia en mujeres	197
Cuadro 10.15	Prevalencia de anemia en niños menores de cinco años	198
Cuadro 11.7	Conocimiento de los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y ETS específicas	198

APENDICE A

Cuadro A.1	Número de conglomerados urbanos y rurales por departamentos	203
Cuadro A.2	Implementación de la Muestra: hogares	206
Cuadro A.3	Implementación de la Muestra: mujeres	206

APENDICE B

Cuadro B.1	Variables seleccionadas para el cálculo de los errores de muestreo	211
Cuadro B.2.1	Errores de muestreo para la población total	212
Cuadro B.2.6	Errores de muestreo para la población de Apurímac	213
Cuadro B.2.32	Errores de muestreo para la tasa global de fecundidad por lugar de residencia	214
Cuadro B.2.35	Errores de muestreo para la mortalidad infantil por lugar de residencia	215
Cuadro B.2.37	Errores de muestreo para la mortalidad en la niñez por lugar de residencia	216

LISTA DE GRAFICOS

Página

CAPITULO 2

Gráfico 2.1	Población de Facto del departamento de Apurímac	32
-------------	---	----

CAPITULO 3

Gráfico 3.1	Mujeres entrevistadas por edad, estado conyugal y area de residencia	41
Gráfico 3.2	Nivel de Educación de las mujeres en edad fértil por area de residencia y edad	43
Gráfico 3.3	Control de los Ingresos para la contribución a los gastos del hogar por las mujeres no unidas	50

CAPITULO 5

Gráfico 5.1	Fuente de suministro para métodos modernos	75
Gráfico 5.2	Fuentes de suministro para métodos modernos (Sector Público)	75
Gráfico 5.3	Preferencia de metodos para uso futuro en mujeres que no usan actualmente	78
Gráfico 5.4	Razones para no usar métodos anticonceptivos	79

CAPITULO 9

Gráfico 9.1a	Número de visitas prenatales	118
Gráfico 9.1b	Meses de embarazo a la primera visita prenatal	118
Gráfico 9.2	Porcentaje de niños menores de cinco años que tuvieron IRA y fueron llevados a proveedores de salud	133
Gráfico 9.3	Razones por no llevar a un niño con IRA a un establecimiento de salud	133

CAPITULO 10

Gráfico 10.1	Intensidad de la lactancia en niños menores de 6 meses	145
Gráfico 10.2a	Porcentaje de menores de tres años por tipo de comidas recibidas (lactantes)	147
Gráfico 10.2b	Porcentaje de menores de tres años por tipo de comidas recibidas (no lactantes)	147

CAPITULO 11

Gráfico 11.1	Conocimiento de formas de evitar el VIH/SIDA	163
Gráfico 11.2	Uso de condón por tipo de compañero	172

CAPITULO 12

Gráfico 12.1	Persona que ejerció la violencia Física	178
Gráfico 12.2	Golpizas a los niños por parte de los padres y a la entrevistada por parte de sus padres	185

Créditos

APURÍMAC: INFORME DEPARTAMENTAL DE LA ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR - ENDES IV

DIRECCION Y SUPERVISION.

Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales

ROSARIO AQUIJE VALDEZ
GENARA RIVERA ARAUJO

Directora Técnica
Directora Técnica Adjunta

EQUIPO DE TRABAJO:

LUIS ULLOA JESUS

Director Ejecutivo de Demografía

FLOR SUAREZ RODRIGUEZ

Coordinadora del equipo de analistas

ORFA DÁVILA MELGAREJO

Analista Responsable

MONICA LIZAMA EGOÁVIL

Revisor

ANGELICA DIAZ HERRERA

Procesamiento de textos y gráficos

DIAGRAMACION Y EDICION:

Centro de Edición de la OTD