

## 11. CONOCIMIENTO DE VIH E ITS





## 11. CONOCIMIENTO DE VIH E ITS



**E**n la mayoría de los países en desarrollo, las infecciones de transmisión sexual (ITS) ocupan el segundo lugar entre las causas de enfermedad de las mujeres en edad reproductiva, después de aquellas relacionadas con la maternidad. La prevención y el tratamiento de las ITS constituyen un mecanismo de intervención que mejora la salud pública, dado el grado de morbilidad y mortalidad que causan, y evita la transmisión del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

El comportamiento del VIH y del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en el Perú es el de una epidemia concentrada, así desde el primer caso diagnosticado de SIDA en el Perú en el año 1983 hasta el 31 de diciembre de 2013, se han reportado 30 mil 465 casos de SIDA y 51 mil 894 casos notificados de VIH<sup>1</sup> pero se estima que más de 100 mil personas estarían viviendo con el virus de inmunodeficiencia humana hasta el año 2040. La magnitud del problema, la rápida propagación del VIH/SIDA, la inexistencia de cura para la enfermedad y la relación entre ITS y VIH confirman la importancia de monitorear el conocimiento de la población sobre la transmisión, prevención y percepción de los riesgos.

El cuestionario individual de la Encuesta 2013 sigue incluyendo una sección, con preguntas previamente evaluadas y mejoradas, para indagar sobre el conocimiento general de las mujeres acerca de las infecciones transmitidas sexualmente: conocimiento de las distintas infecciones, si han adquirido infecciones en los 12 meses anteriores a la entrevista y, en caso positivo, lugar y persona donde buscó tratamiento o consejo y comunicación con el compañero sexual. Con relación al VIH/SIDA, se indagó sobre el lugar donde una persona puede hacerse la prueba para saber si tiene el virus que causa la enfermedad, qué debe hacerse para evitar contraer el VIH, si una persona puede ser VIH-positiva aunque parezca saludable, y si cree que el VIH puede ser transmitido de la madre a la hija o hijo y en qué momento.

Igualmente se les pidió a las mujeres opinar sobre los derechos de las personas con VIH-positivo para participar en el mercado laboral o llevar una vida en comunidad. También se hicieron preguntas sobre la conducta sexual en los últimos 12 meses (número y tipo de parejas sexuales y uso del condón).

### 11.1 CONOCIMIENTO DE VIH/SIDA Y FORMAS DE EVITAR

A las mujeres entrevistadas se les preguntó si habían oído hablar de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana y del SIDA. A quienes respondieron afirmativamente, se indagó si había algo que una persona pueda hacer para evitar infectarse con el VIH. El conocimiento de formas programáticas y

1/ Ministerio de Salud: Dirección General de Epidemiología / Boletín Mensual Diciembre 2013.

específicas de evitar el virus, la percepción de la entrevistada sobre el riesgo de infección por el VIH y los aspectos sociales de la prevención y mitigación, se presenta en los Cuadros N°11.1 al N°11.6.

### *Conocimiento de VIH/SIDA*

- Del total de mujeres entrevistadas el año 2013, el 97,1% conoce o ha oído hablar del VIH/SIDA lo que implica una mejora de 2,9 puntos porcentuales, en relación con el año 2009 donde el porcentaje era de 94,2%. Este resultado corrobora que el acceso a la información ha mejorado con el tiempo y ha permitido que más mujeres estén informadas y tengan conocimiento sobre el tema.
- En el año 2013, el 5,6% de mujeres entrevistadas manifestó que desconocía alguna forma de prevención de las dos formas consideradas de importancia programática para evitar el VIH (menor número de parejas sexuales o uso del condón). En el año 2009, este porcentaje fue 5,7%.
- Con respecto a las mujeres que desconocen los aspectos relacionados con el VIH/SIDA, se observa que según característica seleccionada, los menores porcentajes se ubicaron en aquellas mujeres con educación superior (0,1%). De igual manera en las que pertenecen al cuarto quintil de riqueza (0,3%). En cambio, las mujeres entrevistadas que no tienen educación (27,4%) y, las que pertenecen al quintil inferior de riqueza (12,8%) constituyen el mayor porcentaje de mujeres que desconoce sobre el VIH/SIDA.
- Según ámbito geográfico, Cajamarca fue el departamento donde se registró el mayor porcentaje de mujeres que respondieron desconocimiento sobre el VIH/SIDA (10,0%), seguido por Apurímac (9,9%), Puno (9,7%) y Huancavelica (9,4%); por región natural, la Sierra concentra a las mujeres que tienen menor conocimiento en este tema (7,4%); y por área de residencia, este porcentaje fue mayor en el área rural (9,8%).
- Sobre el conocimiento de las formas específicas de evitar el VIH, el 85,2% de las mujeres respondió “limitar el número de parejas sexuales o mutua fidelidad”; con relación al año 2009 se aprecia un incremento de 2,3 puntos porcentuales. Asimismo, el conocimiento sobre el uso del condón creció al pasar de 74,2%, en el año 2009 a 76,8% en el 2013.

**CUADRO N° 11.1**  
**PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE FORMAS DE IMPORTANCIA PROGRAMÁTICA**  
**Y ESPECÍFICAS DE EVITAR EL VIH, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013**  
(Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Total	No conoce VIH/SIDA	Conocimiento de dos formas de importancia programática de evitar el VIH			Conocimiento de dos formas específicas		Número de mujeres
			Ninguna de las dos formas 1/	Una forma	Dos formas	Usar condones	Limitar el número de parejas sexuales 2/	
<b>Edad</b>								
15-19	100,0	2,7	6,0	28,2	63,1	70,2	84,4	4 092
20-24	100,0	2,1	5,8	20,5	71,7	78,8	85,1	3 411
25-29	100,0	1,9	4,3	19,0	74,8	81,0	87,5	3 372
30-39	100,0	2,8	5,5	19,1	72,6	78,3	86,1	6 477
40-49	100,0	4,1	6,2	19,5	70,2	76,2	83,6	5 568
15-24	100,0	2,4	5,9	24,7	67,0	74,1	84,7	7 503
<b>Estado conyugal</b>								
Soltera	100,0	2,5	5,0	24,4	68,2	74,5	86,2	7 413
Ha tenido RS	100,0	1,9	3,5	19,6	75,0	81,3	88,3	3 220
Nunca ha tenido RS	100,0	3,0	6,1	28,1	62,9	69,3	84,6	4 193
Casada o Conviviente	100,0	3,3	6,1	19,6	71,0	77,3	84,4	12 969
Divorciada/Separada/Viuda	100,0	1,6	5,4	18,2	74,8	80,9	87,0	2 537
<b>Nivel de educación</b>								
Sin educación	100,0	27,4	13,9	23,7	35,0	42,4	51,2	553
Primaria	100,0	9,1	10,7	22,2	58,0	66,3	71,9	4 648
Secundaria	100,0	0,7	4,9	22,8	71,6	78,0	88,0	10 662
Superior	100,0	0,1	2,7	17,3	79,9	84,5	92,5	7 057
<b>Quintil de riqueza</b>								
Quintil inferior	100,0	12,8	11,5	23,4	52,3	60,0	67,9	3 686
Segundo quintil	100,0	2,9	6,1	20,3	70,7	77,3	84,4	4 559
Quintil intermedio	100,0	0,7	4,3	21,6	73,4	79,8	88,6	5 002
Cuarto quintil	100,0	0,3	5,1	21,7	72,9	78,8	88,6	4 938
Quintil superior	100,0	0,0	2,4	18,5	79,1	84,2	92,4	4 733
<b>Total 2013</b>	<b>100,0</b>	<b>2,9</b>	<b>5,6</b>	<b>21,0</b>	<b>70,5</b>	<b>76,8</b>	<b>85,2</b>	<b>22 919</b>
Total 2009	100,0	5,8	5,7	19,9	68,6	74,2	82,9	24 212

**Nota:** Las dos formas de importancia programática son: usar condones y limitar el número de parejas sexuales. Las respuestas provienen tanto de respuestas espontáneas como sondeos.

1/ Mujeres que no han oído hablar de VIH/SIDA o que no conocen las formas de importancia programática.

2/ Incluye ser mutuamente fiel.

**Fuente:** Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

**CUADRO N° 11.2**  
**PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE FORMAS DE IMPORTANCIA PROGRAMÁTICA**  
**Y ESPECÍFICAS DE EVITAR EL VIH, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2013**  
(Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Total	No conoce VIH/SIDA	Conocimiento de dos formas de importancia programática de evitar el VIH			Conocimiento de dos formas específicas		Número de mujeres
			Ninguna de las dos formas 1/	Una forma	Dos formas	Usar condones	Limitar el número de parejas sexuales 2/	
<b>Área de residencia</b>								
Urbana	100,0	0,8	4,2	20,7	74,3	80,2	89,1	17 644
Rural	100,0	9,8	10,3	21,9	58,0	65,6	72,3	5 276
<b>Región natural</b>								
Lima Metropolitana	100,0	0,2	3,6	21,6	74,5	80,4	90,2	7 463
Resto Costa	100,0	1,2	5,4	22,6	70,8	77,3	86,8	5 806
Sierra	100,0	7,4	7,9	20,7	64,0	70,7	78,0	6 821
Selva	100,0	2,2	5,8	16,8	75,2	81,0	86,2	2 830
<b>Departamento</b>								
Amazonas	100,0	5,7	13,4	22,7	58,2	66,4	72,8	276
Áncash	100,0	4,3	4,3	22,3	69,1	75,6	85,0	978
Apurímac	100,0	9,9	3,5	22,8	63,8	68,6	81,7	280
Arequipa	100,0	2,3	5,7	24,0	68,0	75,8	84,2	932
Ayacucho	100,0	4,9	8,9	29,5	56,7	62,6	80,3	516
Cajamarca	100,0	10,0	12,1	24,2	53,6	64,2	67,3	1 012
Cusco	100,0	4,2	8,9	18,6	68,3	73,7	81,4	1 012
Huancavelica	100,0	9,4	9,3	22,0	59,4	66,7	74,0	325
Huánuco	100,0	3,0	9,6	20,2	67,3	76,2	78,6	499
Ica	100,0	0,9	4,9	21,1	73,1	78,3	89,0	638
Junín	100,0	2,2	0,5	1,2	96,1	96,6	96,9	961
La Libertad	100,0	5,1	5,0	19,8	70,1	74,6	85,4	1 405
Lambayeque	100,0	1,6	6,6	25,6	66,2	71,6	86,5	900
Lima 3/	100,0	0,3	3,8	21,7	74,2	80,5	89,6	8 177
Loreto	100,0	1,7	6,1	18,3	73,9	80,5	85,5	796
Madre de Dios	100,0	2,6	7,7	21,4	68,3	75,7	82,3	99
Moquegua	100,0	1,2	9,5	26,7	62,7	71,5	80,5	129
Pasco	100,0	6,9	3,9	23,0	66,2	72,2	83,1	165
Piura	100,0	4,5	6,8	24,1	64,6	72,3	80,9	1 610
Puno	100,0	9,7	11,4	24,1	54,8	64,0	69,6	793
San Martín	100,0	0,0	4,3	15,7	80,0	85,4	90,2	606
Tacna	100,0	1,4	6,4	17,8	74,4	80,1	86,4	256
Tumbes	100,0	0,4	3,2	26,6	69,7	73,3	92,8	190
Ucayali	100,0	3,9	2,9	12,9	80,3	83,5	90,0	364
<b>Total 2013</b>	<b>100,0</b>	<b>2,9</b>	<b>5,6</b>	<b>21,0</b>	<b>70,5</b>	<b>76,8</b>	<b>85,2</b>	<b>22 919</b>
Total 2009	100,0	5,8	5,7	19,9	68,6	74,2	82,9	24 212


**Nota:** Las dos formas de importancia programática son: usar condones y limitar el número de parejas sexuales. Las respuestas provienen tanto de respuestas espontáneas como sondeos.

1/ Mujeres que no han oído hablar de VIH/SIDA o que no conocen las formas de importancia programática.

2/ Incluye ser mutuamente fiel.

3/ Incluye el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

**Fuente:** Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



## 11.2 CONOCIMIENTO DE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL VIH

A las mujeres entrevistadas se les hizo una serie de preguntas sobre asuntos relacionados con el VIH con el propósito de evaluar el grado de conocimiento sobre el tema. Específicamente se les preguntó si una persona que parece saludable puede ser VIH-positiva y si puede ser transmitido de la madre a la hija o hijo y en qué momento. Los resultados obtenidos se presentan en los Cuadros N°11.3 y N°11.4.

### *Aspectos relacionados con el VIH*

- El 77,0% de mujeres entrevistadas en el año 2013 manifestó que una persona que parece saludable pueda tener el VIH, incrementándose en 2,4 puntos porcentuales con respecto al año 2009 (74,6%). Se advierte que el porcentaje de mujeres que consideraron una posición contraria ha aumentado 2,9 puntos porcentuales, lo que significaría un retroceso en el nivel de conocimiento y percepción que tienen las mujeres sobre el tema. Por otro lado, se constata una mejora entre las mujeres que respondieron “No sabe o no tiene información”, al registrar un porcentaje menor en el año 2013 (7,6%) respecto al año 2009 (12,9%). En efecto en términos comparativos disminuyó en 5,3 puntos porcentuales.
- Las mujeres que respondieron en mayor porcentaje acerca de que una persona que parece saludable pueda tener el VIH, fueron las que alcanzaron educación superior (92,1%), ubicadas en el quintil superior de riqueza (90,6%) y, solteras que han tenido relaciones sexuales (85,9%). Por área de residencia, fue mayor en la urbana (82,9%), por región natural en Lima Metropolitana (86,0%) y Resto Costa (79,9%), mientras que por departamento fueron San Martín (88,0%), Lima (84,9%) Tumbes (84,8%) e Ica (81,8%).
- Dado que el VIH registra un largo periodo asintomático, lo anterior es muy importante, ya que el desconocer que una persona aparentemente saludable pueda transmitir este virus permitiría que muchas mujeres incurran en contactos sexuales de riesgo.
- También es muy preocupante los datos obtenidos respecto a la transmisión vertical (madre a hija o hijo) del VIH. Al respecto, se constató un importante incremento en el porcentaje de mujeres que refirieron que el virus no se puede transmitir en esta condición. El 20,2% de mujeres no consideraron esta posibilidad, significando un incremento de 8,1 puntos porcentuales respecto al año 2009 que fue 12,1%. Este aumento pone en inminente riesgo a la hija e hijo por nacer en el caso que su madre fuera portadora del VIH.
- Por otra parte, entre las mujeres que identifican las formas de transmisión del VIH de madre a hija o hijo, un 66,9% mencionó que puede ocurrir durante el embarazo o parto y un 36,5% con la lactancia, habiendo disminuido el grupo que no sabe el mecanismo de transmisión (de 9,6% en el año 2009 a 2,9% en el 2013).
- Investigaciones especializadas, sobre el tema, enfatizan acerca de la importancia del control prenatal en esta etapa, ya que la identificación de una gestante con VIH permitiría que reciba el tratamiento profiláctico correspondiente (antirretrovirales, cesárea electiva y lactancia artificial) para disminuir el riesgo en la hija o hijo.

**CUADRO N° 11.3**  
**PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON EL VIH Y TRANSMISIÓN**  
**DEL VIH DE LA MADRE A LA HIJA O HIJO, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013**  
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	Una persona que parece saludable puede tener el VIH			El VIH se puede transmitir de la madre a la hija o hijo				Número de mujeres
	Si	No	No sabe / No conoce	No 1/	Durante el embarazo o parto	Durante la lactancia	No sabe 2/	
<b>Edad</b>								
15-19	76,6	16,8	6,6	19,6	64,2	39,6	2,7	4 092
20-24	80,0	14,1	5,9	15,3	70,4	42,4	2,1	3 411
25-29	78,2	15,3	6,6	18,3	70,1	39,4	1,9	3 372
30-39	77,7	14,7	7,6	20,8	67,6	34,9	2,8	6 477
40-49	73,8	16,1	10,1	24,1	64,0	30,9	4,1	5 568
15-24	78,2	15,6	6,3	17,6	67,0	40,8	2,4	7 503
<b>Estado conyugal</b>								
Soltera	80,8	13,6	5,6	16,1	71,1	39,2	2,5	7 413
Ha tenido RS	85,9	9,5	4,6	13,8	74,6	40,7	1,9	3 220
No ha tenido RS	77,0	16,7	6,3	17,9	68,5	38,1	3,0	4 193
Casada o Conviviente	74,3	16,8	9,0	23,0	63,7	35,4	3,3	12 969
Divorciada/Separada/Viuda	79,7	13,6	6,7	18,0	70,9	34,6	1,6	2 537
<b>Nivel de educación</b>								
Sin educación	35,8	25,0	39,2	63,9	23,3	19,7	27,4	553
Primaria	57,0	24,4	18,5	43,4	41,0	26,5	9,1	4 648
Secundaria	77,8	16,9	5,3	16,2	69,3	38,0	0,7	10 662
Superior	92,1	6,5	1,4	7,6	83,8	42,3	0,1	7 057
<b>Quintil de riqueza</b>								
Quintil inferior	52,3	26,8	20,9	45,0	37,9	28,9	12,8	3 686
Segundo quintil	71,8	19,0	9,2	23,8	61,1	35,8	2,9	4 559
Quintil intermedio	79,7	14,6	5,7	15,8	70,9	38,8	0,7	5 002
Cuarto quintil	84,4	12,0	3,6	12,2	75,8	39,9	0,3	4 938
Quintil superior	90,6	7,4	1,9	10,4	81,6	37,4	0,0	4 733
<b>Total 2013</b>	<b>77,0</b>	<b>15,4</b>	<b>7,6</b>	<b>20,2</b>	<b>66,9</b>	<b>36,5</b>	<b>2,9</b>	<b>22 919</b>
Total 2009	74,6	12,5	12,9	12,1	64,1	37,0	9,6	24 212

1/ Incluye las que respondieron no y no sabe acerca de la transmisión del VIH de la madre a la hija o hijo.

2/ No ha oído hablar de VIH/SIDA.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

**CUADRO N° 11.4**  
**PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON EL VIH Y TRANSMISIÓN**  
**DEL VIH DE LA MADRE A LA HIJA O HIJO, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2013**  
 (Porcentaje)

Ámbito geográfico	Una persona que parece saludable puede tener el VIH			El VIH se puede transmitir de la madre a la hija o hijo			Número de mujeres	
	Si	No	No sabe / No conoce	No 1/	Durante el embarazo o parto	Durante la lactancia		No sabe 2/
<b>Área de residencia</b>								
Urbana	82,9	12,5	4,6	14,6	73,4	38,3	0,8	17 644
Rural	57,1	25,2	17,7	38,8	45,4	30,8	9,8	5 276
<b>Región natural</b>								
Lima Metropolitana	86,0	10,9	3,1	12,0	76,7	39,8	0,2	7 463
Resto Costa	79,9	14,1	6,1	19,5	68,4	36,0	1,2	5 806
Sierra	64,6	20,8	14,5	29,9	56,0	32,1	7,4	6 821
Selva	77,0	17,0	6,0	20,1	64,5	39,7	2,2	2 830
<b>Departamento</b>								
Amazonas	59,9	25,7	14,4	34,7	49,8	32,4	5,7	276
Áncash	72,5	16,6	10,9	19,1	67,2	36,7	4,3	978
Apurímac	56,6	28,1	15,3	28,9	49,9	47,3	9,9	280
Arequipa	79,4	15,5	5,2	18,5	73,4	25,5	2,3	932
Ayacucho	63,9	18,7	17,4	34,3	43,9	35,3	4,9	516
Cajamarca	59,5	24,8	15,7	42,7	45,7	28,2	10,0	1 012
Cusco	66,5	17,3	16,1	20,7	68,3	38,2	4,2	1 012
Huancavelica	61,3	22,0	16,6	38,3	43,4	33,0	9,4	325
Huánuco	65,8	26,9	7,3	20,1	57,6	44,4	3,0	499
Ica	81,8	11,8	6,3	15,0	70,1	40,8	0,9	638
Junín	71,4	22,5	6,0	8,7	74,9	42,7	2,2	961
La Libertad	79,3	9,2	11,4	27,4	62,9	32,1	5,1	1 405
Lambayeque	79,8	12,3	7,8	19,3	70,0	30,0	1,6	900
Lima 3/	84,9	11,9	3,2	12,4	76,0	39,5	0,3	8 177
Loreto	78,9	17,6	3,5	23,6	60,9	41,7	1,7	796
Madre de Dios	78,2	13,6	8,2	16,7	71,4	36,9	2,6	99
Moquegua	80,2	12,5	7,3	21,5	70,6	30,0	1,2	129
Pasco	72,3	18,0	9,7	20,6	71,2	29,1	6,9	165
Piura	72,1	18,3	9,6	26,2	61,1	34,0	4,5	1 610
Puno	59,9	23,8	16,3	49,2	39,0	19,8	9,7	793
San Martín	88,0	10,2	1,8	7,1	72,5	44,8	0,0	606
Tacna	81,4	9,2	9,4	20,2	66,4	40,0	1,4	256
Tumbes	84,8	12,4	2,8	18,1	67,6	47,7	0,4	190
Ucayali	78,2	13,9	7,9	24,9	60,2	35,5	3,9	364
<b>Total 2013</b>	<b>77,0</b>	<b>15,4</b>	<b>7,6</b>	<b>20,2</b>	<b>66,9</b>	<b>36,5</b>	<b>2,9</b>	<b>22 919</b>
Total 2009	74,6	12,5	12,9	12,1	64,1	37,0	9,6	24 212

1/ Incluye las que respondieron no y no sabe acerca de la transmisión del VIH de la madre a la hija o hijo.

2/ No ha oído hablar de VIH/SIDA.

3/ Incluye el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

### Aspectos sociales de la prevención del VIH

- Del total de mujeres entrevistadas que conoce del VIH/SIDA, más de la mitad (60,5%) opinó que una maestra o maestro con VIH si puede seguir enseñando (incremento de 6,5 puntos porcentuales respecto al año 2009), representando un avance en este aspecto; sin embargo, una proporción importante de mujeres piensan lo contrario, es decir, que no debe enseñar, y que representan un 34,3% (2,4 puntos porcentuales menos que en el año 2009).
- Las opiniones sobre si la persona VIH-positiva podría ser despedida de su trabajo fueron, en comparación con la Encuesta 2009, las siguientes: 19,2% opinó que si puede ser despedida (disminuyó en 12,6 puntos porcentuales), y 75,4% manifestó lo contrario (se incrementó en 16,3 puntos porcentuales).

- Han aumentado los porcentajes sobre si las mujeres entrevistadas estarían dispuestas a cuidar en el hogar a un pariente con el VIH: sí lo harían, un 73,7% (69,4% en el 2009), y no lo harían, un 19,8% (20,2% en el año 2009).
- La respuesta “No sabe” a cada una de las tres preguntas mencionadas también debe llamar la atención por su relevancia en las acciones que se debe tomar para el futuro. El 5,2% de mujeres no sabía si a una maestra (o) con VIH se le debe permitir o continuar impartiendo clases en la escuela, colegio o universidad; igualmente, un 5,5% no sabía si una persona VIH-positiva podría ser despedida de su trabajo; y un 6,6% no sabía si cuidaría en el hogar a un pariente que vive con el VIH.
- Se observa que la mayoría de mujeres que opinaron que a una maestra (o) con VIH no se le debe permitir o continuar impartiendo clases en la escuela, colegio o universidad se ubicaron en el quintil inferior de riqueza (61,2%), con educación primaria y sin educación (59,6% y 53,0%, respectivamente) y residentes en el área rural (57,2%).
- El mayor porcentaje de mujeres opinó que una persona con el VIH no puede ser despedida del trabajo, especialmente entre las mujeres del quintil superior y cuarto quintil de riqueza (91,7% y 86,1%, respectivamente), con educación superior (91,6%), Por área de residencia las del área urbana (83,2%) y, por región natural, Lima Metropolitana (88,4%). Asimismo, entre aquellas que manifestaron estarían

**CUADRO N° 11.5**  
**PERÚ: MUJERES POR RESPUESTAS A PREGUNTAS SOBRE CIERTOS ASPECTOS SOCIALES DE**  
**LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL VIRUS, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013**  
 (Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Maestra/Maestro con VIH debe seguir enseñando			Persona VIH-positiva puede ser despedida del trabajo			Dispuesta a cuidar pariente con VIH en el hogar			Número de mujeres
	Sí	No	No sabe	Sí	No	No sabe	Sí	No	No sabe	
<b>Edad</b>										
15-19	57,9	37,3	4,7	18,3	77,1	4,6	75,2	19,0	5,9	4 092
20-24	64,2	31,1	4,7	16,5	79,0	4,5	75,9	19,0	5,1	3 411
25-29	64,0	31,9	4,1	17,2	78,4	4,3	73,4	20,5	6,1	3 372
30-39	60,3	34,5	5,2	19,6	74,7	5,7	71,7	21,4	6,9	6 477
40-49	58,2	35,3	6,5	22,0	70,9	7,2	73,7	18,4	7,9	5 568
15-24	60,8	34,5	4,7	17,5	78,0	4,5	75,5	19,0	5,5	7 503
<b>Estado conyugal</b>										
Soltera	66,9	28,7	4,4	13,8	81,7	4,5	79,0	15,6	5,5	7 413
Ha tenido RS	72,8	23,6	3,6	11,7	84,4	3,9	81,7	13,9	4,4	3 220
Nunca ha tenido RS	62,3	32,6	5,1	15,5	79,6	4,9	76,8	16,8	6,3	4 193
Casada o Conviviente	56,2	37,8	6,0	22,6	71,2	6,3	70,2	22,4	7,4	12 969
Divorciada/Separada/Viuda	63,7	32,7	3,6	17,3	78,4	4,3	75,7	18,5	5,7	2 537
<b>Nivel de educación</b>										
Sin educación	17,0	53,0	30,0	37,7	29,6	32,7	38,0	29,0	33,1	553
Primaria	28,5	59,6	11,9	38,1	47,9	14,0	59,8	27,4	12,8	4 648
Secundaria	61,5	35,3	3,2	17,9	79,0	3,1	76,4	19,0	4,7	10 662
Superior	83,4	14,7	1,9	7,1	91,6	1,3	81,5	15,2	3,3	7 057
<b>Quintil de riqueza</b>										
Quintil inferior	23,8	61,2	15,0	39,8	42,9	17,3	52,7	31,2	16,1	3 686
Segundo quintil	49,0	44,8	6,3	27,1	66,3	6,6	70,9	21,6	7,5	4 559
Quintil intermedio	65,6	31,5	2,9	15,6	81,6	2,9	79,7	16,0	4,2	5 002
Cuarto quintil	73,8	23,6	2,6	11,5	86,1	2,4	80,2	16,0	3,9	4 938
Quintil superior	81,0	17,3	1,7	7,2	91,7	1,1	79,4	17,0	3,6	4 733
<b>Total 2013</b>	<b>60,5</b>	<b>34,3</b>	<b>5,2</b>	<b>19,2</b>	<b>75,4</b>	<b>5,5</b>	<b>73,7</b>	<b>19,8</b>	<b>6,6</b>	<b>22 919</b>
Total 2009	54,0	36,7	9,4	31,8	59,1	9,1	69,4	20,2	10,4	24 212

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

dispuestas a cuidar a un pariente VIH-positivo en el hogar, mayor porcentaje se presentó en las mujeres con educación superior (81,5%), y solteras que han tenido relaciones sexuales (81,7%). Por área de residencia, en la urbana (78,3%) y por región natural en Lima Metropolitana (80,0%) y Resto Costa (75,4%).

**CUADRO N° 11.6**  
**PERÚ: MUJERES POR RESPUESTAS A PREGUNTAS SOBRE CIERTOS ASPECTOS SOCIALES**  
**DE LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL VIRUS, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2013**  
 (Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Maestra/Maestro con VIH debe seguir enseñando			Persona VIH-positiva puede ser despedida del trabajo			Dispuesta a cuidar pariente con VIH en el hogar			Número de mujeres
	Sí	No	No sabe	Sí	No	No sabe	Sí	No	No sabe	
<b>Área de residencia</b>										
Urbana	69,5	27,5	3,1	13,9	83,2	2,9	78,3	17,2	4,5	17 644
Rural	30,5	57,2	12,3	36,6	49,2	14,2	58,2	28,3	13,5	5 276
<b>Región natural</b>										
Lima Metropolitana	73,9	23,6	2,5	10,1	88,4	1,5	80,0	17,2	2,8	7 463
Resto Costa	64,4	31,4	4,1	16,7	78,8	4,5	75,4	17,2	7,3	5 806
Sierra	45,6	44,9	9,5	29,0	60,0	11,0	65,6	23,4	11,0	6 821
Selva	52,9	42,9	4,2	24,3	71,2	4,5	72,9	22,7	4,3	2 830
<b>Departamento</b>										
Amazonas	41,6	49,9	8,5	34,1	54,6	11,3	66,6	25,9	7,5	276
Áncash	56,4	35,2	8,4	23,5	68,8	7,8	75,6	16,7	7,7	978
Apurímac	31,6	56,2	12,2	42,2	44,9	12,8	56,9	30,5	12,7	280
Arequipa	70,2	26,2	3,6	19,2	77,4	3,4	79,5	15,8	4,7	932
Ayacucho	41,5	49,4	9,1	35,9	51,5	12,6	66,4	23,6	10,0	516
Cajamarca	39,3	49,2	11,5	30,3	57,0	12,7	64,2	22,6	13,2	1 012
Cusco	48,1	45,3	6,7	23,3	67,8	8,8	60,5	28,2	11,3	1 012
Huancavelica	33,4	55,8	10,9	46,4	42,1	11,5	67,6	22,1	10,3	325
Huánuco	46,7	49,6	3,8	33,8	61,8	4,4	69,4	26,5	4,1	499
Ica	67,4	28,4	4,2	9,3	87,1	3,6	80,0	15,3	4,7	638
Junín	57,7	39,1	3,2	19,6	77,4	3,0	75,5	21,6	3,0	961
La Libertad	60,7	30,9	8,4	16,1	74,9	9,0	64,1	17,0	18,9	1 405
Lambayeque	62,4	32,2	5,4	16,5	75,2	8,2	72,4	16,8	10,8	900
Lima 1/	72,4	25,0	2,6	11,1	87,3	1,6	79,6	17,6	2,8	8 177
Loreto	51,1	45,7	3,2	21,4	75,2	3,4	69,7	27,4	2,8	796
Madre de Dios	56,6	37,3	6,0	22,9	71,1	6,0	76,3	17,4	6,3	99
Moquegua	64,4	29,5	6,2	18,0	76,8	5,2	75,3	13,9	10,8	129
Pasco	51,0	41,1	7,9	29,5	61,8	8,6	67,4	25,1	7,5	165
Piura	54,5	39,0	6,5	23,9	69,1	7,0	73,1	19,6	7,3	1 610
Puno	39,2	49,4	11,4	33,9	48,9	17,2	57,0	30,6	12,4	793
San Martín	52,2	45,4	2,4	24,2	73,2	2,6	80,9	17,1	2,0	606
Tacna	70,0	24,8	5,2	14,6	81,0	4,3	76,7	17,4	5,8	256
Tumbes	69,3	28,3	2,4	12,1	86,0	2,0	80,7	17,0	2,4	190
Ucayali	69,5	25,6	4,9	17,6	77,7	4,7	78,1	13,9	8,0	364
<b>Total 2012</b>	<b>60,5</b>	<b>34,3</b>	<b>5,2</b>	<b>19,2</b>	<b>75,4</b>	<b>5,5</b>	<b>73,7</b>	<b>19,8</b>	<b>6,6</b>	<b>22 919</b>
Total 2009	54,0	36,7	9,4	31,8	59,1	9,1	69,4	20,2	10,4	24 212

1/ Incluye el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


### 11.3 CONOCIMIENTO DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

Los programas de control de VIH reconocen, en la actualidad, la importancia de controlar las ITS para reducir la transmisión del virus. Se reconoce que entre los esfuerzos necesarios, uno de los más importantes es la educación para que la población reconozca los síntomas de las ITS. Asimismo, poco se sabe sobre cómo las personas perciben y responden a las ITS. Por esta razón en la Encuesta 2013, se preguntó a las entrevistadas si habían oído hablar de otras enfermedades que se pueden transmitir a través de las relaciones

sexuales; cuáles son las enfermedades que conocía; y que síntomas y signos pueden hacer parecer que una mujer o un hombre tenía una infección de transmisión sexual. Los resultados se pueden apreciar en los Cuadros N°11.7 al N°11.10.

**Conocimiento de las ITS**

- El conocimiento sobre las ITS se mantuvo en 62,0% entre el año 2009 y 2013, pero si consideramos que el 38,0% de las mujeres entrevistadas declaró desconocer lo que éstas significan, entonces se debe reconocer que existe un grave problema por las importantes implicancias económicas y sociales que su alta morbilidad representa. Que más de la tercera parte de la población entrevistada no conozca de las ITS implica un riesgo potencial de adquirirlas, y esto incluye la posibilidad de padecer secuelas y complicaciones importantes de no atenderlas a tiempo. (Ver Cuadro N° 11.7).
- El mayor desconocimiento de las ITS se presentó entre las mujeres sin educación y con primaria (85,9% y 71,2%, respectivamente), así como en las mujeres ubicadas en el quintil inferior (73,4%). Por ámbito geográfico las del área rural (67,6%) y de la Sierra (56,3%), por su desconocimiento sobre las ITS (Ver Cuadro N° 11.8).



- Los departamentos donde las mujeres entrevistadas registraron mayor desconocimiento de las ITS fueron: Huancavelica (73,3%), Cajamarca (72,2%), Apurímac (68,3%) y Puno (68,1%).
- Un 20,3% de las mujeres entrevistadas no conocía síntomas de las ITS (1,2 puntos porcentuales más que en el 2009), 14,1% conocía un síntoma y 27,5% dos o más síntomas. Estos porcentajes resultan bajos, en tanto significa que una gran mayoría de personas con una ITS no sabría identificarla con el consiguiente riesgo de transmitir a otras personas, no recibir un tratamiento oportuno y padecer secuelas o complicaciones a futuro.

- En comparación con encuestas anteriores, hay menos mujeres que conocen ITS específicas entre quienes conocen síntomas: de 44,6% que conocían la sífilis y 43,6% la gonorrea en el año 2009, bajó a 43,2% y 39,2%, respectivamente en el 2013. Asimismo hubo un aumento en el porcentaje de mujeres que conocen verrugas genitales/condiloma ya que de 3,2% en el año 2009 pasó a 4,4% en el año 2013.
- La sífilis fue la enfermedad más reconocida por las mujeres con nivel superior (58,4%) y el quintil superior de riqueza (51,6%). Por área de residencia fue mayor en la urbana (45,4%), por región natural en Resto Costa y Lima Metropolitana (45,8% y 45,3%, respectivamente) y, por departamento en Pasco (53,6%), Junín (52,8%) y La Libertad (51,0%).
- La gonorrea fue más conocida en mujeres con educación superior (50,9%), de 25 a 29 años de edad (46,7%) y, las solteras que han tenido relaciones sexuales (45,7%). Por área de residencia fue mayor en la urbana (40,3%), por región natural en la Selva (56,6%) y, por departamento en Loreto (65,5%) y San Martín (65,2%).
- El chancro fue más conocido en mujeres con educación superior (26,2%) y, en mujeres de 25 a 29 años de edad (24,7%). Por área de residencia fue mayor en la rural (22,8%), por región natural en la Selva (30,7%) y, por departamento en Junín (42,1%) y Ayacucho (37,3%).

**CUADRO N° 11.7**  
**PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS ESPECÍFICOS DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y MUJERES QUE CONOCEN ITS ESPECÍFICAS, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013**  
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	Total	Síntomas específicos de las ITS			Número de mujeres	Conoce ITS específicas						Número de mujeres que conocen síntomas	
		No conoce síntomas de ITS	Conoce un síntoma	Conoce dos o más síntomas		Sífilis	Gono- rea	Verrugas genitales/ Condiloma	Chan- cro	Herpes	Otras ITS 1/		
<b>Edad</b>													
15-19	100,0	46,8	23,1	12,2	17,9	4 092	29,8	33,1	5,2	13,3	15,0	7,7	2 176
20-24	100,0	33,3	21,3	15,3	30,1	3 411	45,2	42,4	4,5	22,8	16,5	11,1	2 274
25-29	100,0	34,1	17,9	16,0	32,0	3 372	51,2	46,7	3,3	24,7	12,9	11,1	2 223
30-39	100,0	34,8	19,2	14,4	31,7	6 477	48,9	40,5	4,5	21,2	10,4	11,7	4 225
40-49	100,0	40,6	20,4	13,4	25,5	5 568	37,8	34,4	4,3	21,7	7,2	9,7	3 306
15-24	100,0	40,7	22,3	13,6	23,5	7 503	37,7	37,9	4,8	18,2	15,8	9,4	4 451
<b>Estado conyugal</b>													
Soltera	100,0	34,3	22,1	15,6	28,0	7 413	43,4	42,4	4,8	20,3	17,7	11,0	4 870
Ha tenido RS	100,0	23,8	21,7	17,1	37,5	3 220	49,4	45,7	4,8	23,9	18,6	13,8	2 454
Nunca ha tenido RS	100,0	42,4	22,4	14,4	20,8	4 193	37,4	39,0	4,9	16,7	16,9	8,2	2 416
Casada o Conviviente	100,0	41,3	19,0	13,0	26,7	12 969	43,1	37,5	4,0	21,0	8,7	9,8	7 607
Divorciada/Separada/Viuda	100,0	31,9	21,9	15,8	30,4	2 537	42,5	37,6	4,6	22,4	8,3	11,6	1 728
<b>Nivel de educación</b>													
Sin educación	100,0	85,9	9,0	2,1	2,9	553	7,3	13,1	0,2	10,5	2,2	7,2	78
Primaria	100,0	71,2	15,2	5,8	7,8	4 648	11,9	20,6	2,2	15,4	2,5	7,9	1 338
Secundaria	100,0	39,8	22,9	14,0	23,3	10 662	35,0	31,8	3,9	17,0	9,2	9,7	6 417
Superior	100,0	9,7	20,6	20,8	48,8	7 057	58,4	50,9	5,3	26,2	16,4	11,7	6 372
<b>Quintil de riqueza</b>													
Quintil inferior	100,0	73,4	13,4	5,4	7,9	3 686	18,5	31,9	2,4	22,5	3,0	5,7	982
Segundo quintil	100,0	50,6	19,2	11,7	18,4	4 559	32,7	35,9	4,0	22,9	7,3	8,3	2 252
Quintil intermedio	100,0	35,7	21,3	15,1	27,9	5 002	40,8	36,7	4,3	20,6	9,0	9,0	3 218
Cuarto quintil	100,0	25,2	21,2	18,1	35,5	4 938	48,9	39,8	4,3	20,0	12,7	12,0	3 694
Quintil superior	100,0	14,2	24,8	18,1	42,9	4 733	51,6	44,3	5,1	20,6	17,6	12,4	4 060
<b>Total 2013</b>	100,0	<b>38,0</b>	<b>20,3</b>	<b>14,1</b>	<b>27,5</b>	<b>22 919</b>	<b>43,2</b>	<b>39,2</b>	<b>4,4</b>	<b>20,9</b>	<b>11,7</b>	<b>10,4</b>	<b>14 205</b>
Total 2009	100,0	38,0	19,1	16,6	26,3	24 212	44,6	43,6	3,2	19,7	nd	40,1	15 015

nd= No disponible.

1/A partir del año 2010, se excluye Herpes.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

**CUADRO N° 11.8**  
**PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS ESPECÍFICOS DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN**  
**SEXUAL (ITS) Y MUJERES QUE CONOCEN ITS ESPECÍFICAS, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2013**  
 (Porcentaje)

Ámbito geográfico	Total	Síntomas específicos de las ITS				Número de mujeres	Conoce ITS específicas						Número de mujeres que conocen síntomas
		No conoce sobre las ITS	No conoce síntomas de ITS	Conoce un síntoma	Conoce dos o más síntomas		Sífilis	Gono- rrea	Verrugas genitales/ Condiloma	Chan- cro	Herpes	Otras ITS 1/	
<b>Área de residencia</b>													
Urbana	100,0	29,2	22,1	16,3	32,5	17 644	45,4	40,3	4,6	20,7	12,6	10,9	12 498
Rural	100,0	67,6	14,4	7,0	10,9	5 276	26,5	31,2	2,8	22,8	5,2	6,8	1 707
<b>Región natural</b>													
Lima Metropolitana	100,0	21,5	24,2	17,2	37,0	7 463	45,3	34,6	4,8	17,9	13,5	13,1	5 858
Resto Costa	100,0	41,1	17,8	14,1	27,1	5 806	45,8	42,3	4,0	16,6	12,7	9,6	3 421
Sierra	100,0	56,3	17,1	10,4	16,2	6 821	39,5	33,3	3,7	25,4	10,6	7,3	2 981
Selva	100,0	31,3	22,7	15,1	31,0	2 830	37,8	56,6	4,6	30,7	6,2	8,6	1 944
<b>Departamento</b>													
Amazonas	100,0	42,8	29,7	11,1	16,4	276	31,3	35,8	4,0	28,6	4,7	2,2	158
Áncash	100,0	43,2	17,2	14,9	24,8	978	36,9	33,8	5,7	15,0	13,1	9,6	556
Apurímac	100,0	68,3	14,8	7,7	9,2	280	39,9	28,9	3,5	31,1	13,4	15,5	88
Arequipa	100,0	29,0	29,2	15,3	26,5	932	38,2	35,9	2,7	17,6	11,0	5,7	661
Ayacucho	100,0	58,1	15,3	10,8	15,8	516	38,5	34,4	3,4	37,3	6,5	9,1	217
Cajamarca	100,0	72,2	11,8	4,5	11,5	1 012	39,3	39,6	2,6	29,9	9,8	0,5	281
Cusco	100,0	52,5	20,1	10,5	16,9	1 012	49,1	41,3	5,9	34,3	16,6	4,2	481
Huancavelica	100,0	73,3	13,8	5,5	7,4	325	34,3	25,9	1,3	18,7	9,8	5,8	87
Huánuco	100,0	33,5	26,4	15,1	25,0	499	35,3	29,0	4,9	23,6	8,7	18,1	332
Ica	100,0	24,9	17,4	18,5	39,3	638	47,3	42,2	3,7	17,5	9,6	14,6	480
Junín	100,0	36,1	14,2	19,0	30,7	961	52,8	41,4	4,9	42,1	10,5	3,6	615
La Libertad	100,0	51,3	16,6	7,5	24,6	1 405	51,0	49,7	3,8	18,9	13,1	18,2	685
Lambayeque	100,0	44,1	21,1	14,8	20,1	900	48,8	47,8	3,9	17,6	13,5	3,9	503
Lima 2/	100,0	23,6	23,9	16,7	35,8	8 177	44,9	34,2	4,6	17,5	13,2	12,8	6 248
Loreto	100,0	32,6	23,2	17,2	27,0	796	38,6	65,5	9,0	29,5	5,6	9,3	537
Madre de Dios	100,0	38,6	21,5	13,5	26,4	99	44,3	47,8	3,1	31,9	7,9	6,5	61
Moquegua	100,0	22,7	23,5	17,4	36,3	129	49,9	36,8	2,0	18,7	9,0	9,0	100
Pasco	100,0	64,2	7,8	11,3	16,6	165	53,6	43,7	4,4	33,0	13,1	7,0	59
Piura	100,0	56,9	10,1	13,3	19,7	1 610	43,4	41,4	4,6	15,5	13,2	4,2	693
Puno	100,0	68,1	17,4	6,0	8,5	793	21,6	22,1	1,9	17,3	8,4	4,6	253
San Martín	100,0	15,6	22,8	17,2	44,4	606	32,4	65,2	1,3	28,3	6,3	12,5	512
Tacna	100,0	34,3	22,0	18,5	25,3	256	36,2	34,2	3,5	13,8	13,8	16,8	168
Tumbes	100,0	35,2	16,7	16,4	31,6	190	41,3	40,3	2,8	19,5	9,3	2,0	123
Ucayali	100,0	15,5	30,3	15,7	38,4	364	36,8	51,5	3,6	20,4	5,1	8,1	308
<b>Total 2013</b>	<b>100,0</b>	<b>38,0</b>	<b>20,3</b>	<b>14,1</b>	<b>27,5</b>	<b>22 919</b>	<b>43,2</b>	<b>39,2</b>	<b>4,4</b>	<b>20,9</b>	<b>11,7</b>	<b>10,4</b>	<b>14 205</b>
Total 2009	100,0	38,0	19,1	16,6	26,3	24 212	44,6	43,6	3,2	19,7	nd	40,1	15 015

nd= No disponible.

1/ A partir del año 2010, se excluye Herpes.

2/ Incluye el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

### Síntomas y signos de las ITS

- En cuanto a los síntomas y signos específicos que las mujeres entrevistadas con conocimiento de ITS manifestaron, la mayoría refirió que fue el enrojecimiento/picazón en genitales (31,6%), seguido de úlceras/llagas genitales (23,3%), inflamación o hinchazón en genitales (19,6%), secreción mal oliente (15,8%) y secreción por genital (15,7%).
- En relación al enrojecimiento/picazón en genitales, el mayor porcentaje por característica seleccionada fue entre las mujeres con educación superior (37,9%), ubicadas en el quintil superior de riqueza (37,3%) y las solteras que han tenido relaciones sexuales (35,7%). Por ámbito geográfico, las residentes en el área urbana (32,7%) y en Resto Costa (34,3%).

- Las úlceras/llagas genitales fueron referidas en mayor porcentaje por característica seleccionada entre las mujeres con educación superior (31,0%), solteras que han tenido relaciones sexuales (29,0%) y ubicadas en el quintil superior de riqueza (28,9%). Por área de residencia, las residentes en el área urbana (24,5%) y por región natural en Lima Metropolitana (26,6%).
- La inflamación o hinchazón en genitales por característica seleccionada, fue manifestada más por mujeres con educación superior (24,5%), ubicadas en el quintil superior de riqueza (24,0%), con 30 a 39 años de edad (22,1%) y solteras que han tenido relaciones sexuales (21,2%). Por ámbito geográfico, en el área urbana (20,2%) y las residentes en la Selva (22,9%).
- Aunque no se especifica cuáles son, 16,0% de las mujeres con conocimiento de las ITS refirió que identifican “otros síntomas”.
- Las mujeres entrevistadas que en mayor porcentaje identificaron el enrojecimiento/picazón en genitales, residían en los departamentos de San Martín (43,2%) e Ica (42,6%), las úlceras/llagas genitales en Piura (34,4%) y Junín (30,3%) y la inflamación o hinchazón en genitales en San Martín (34,9%) y Tumbes (25,8%).
- Llama la atención que un síntoma evidente como es la secreción o pus por el pene solo fue reconocido en un 5,1% para el año 2013, cuando en el 2009 fue de 6,8%. Las verrugas genitales se identificó como probable ITS por solo el 10,0% de mujeres entrevistadas.

**CUADRO N° 11.9**  
**PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS Y SIGNOS ESPECÍFICOS DE LAS INFECCIONES**  
**DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS), SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013**  
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	Síntomas y signos de las infecciones de transmisión sexual (ITS)														Número de mujeres
	Dolor abdominal	Secreción por genital 1/	Secreción mal oliente	Molestia al orinar	Enrojecimiento/picazón en genitales	Inflamación o hinchazón en genitales	Úlceras/llagas genitales	Verrugas genitales	Sangre en la orina	Pérdida de peso	Puede no haber síntomas	Impotencia/Infertilidad	Secreción o pus por el pene	Otros síntomas	
<b>Grupo de edad</b>															
15-19	4,1	7,9	10,2	9,8	23,3	13,4	20,4	7,5	1,6	15,7	0,6	0,9	2,3	18,3	2 176
20-24	5,2	14,2	15,2	12,4	30,8	18,7	26,8	11,4	2,6	16,1	0,8	0,5	5,5	16,1	2 274
25-29	5,2	19,0	17,8	13,0	32,8	20,1	26,6	10,5	2,4	16,5	1,8	0,3	5,3	18,0	2 223
30-39	4,4	18,6	17,7	13,5	33,8	22,1	23,9	11,7	3,3	15,7	1,4	0,3	6,2	14,9	4 225
40-49	4,5	15,9	16,4	9,7	34,1	20,8	19,8	8,5	1,6	12,9	2,2	0,3	4,9	14,6	3 306
15-24	4,7	11,1	12,7	11,1	27,1	16,1	23,7	9,5	2,1	15,9	0,7	0,7	4,0	17,2	4 451
<b>Estado conyugal</b>															
Soltera	4,5	13,3	13,9	11,1	29,8	18,4	26,0	10,3	2,5	16,5	1,3	0,5	4,1	18,2	4 870
Ha tenido RS	5,0	17,1	17,9	12,3	35,7	21,2	29,0	12,6	2,6	14,5	1,7	0,3	5,2	17,2	2 454
Nunca ha tenido RS	3,9	9,4	9,9	9,8	23,8	15,5	22,9	7,9	2,4	18,5	1,0	0,8	3,0	19,1	2 416
Casada o Conviviente	4,9	17,1	16,6	12,5	32,2	20,3	22,0	10,0	2,4	14,9	1,4	0,4	5,4	14,8	7 607
Divorciada/Separada/Viuda	4,0	16,1	17,7	10,5	34,1	19,9	21,6	9,5	2,0	13,3	2,0	0,5	6,3	15,4	1 728
<b>Nivel de educación</b>															
Sin educación	8,7	5,3	5,5	8,1	8,1	5,7	10,5	4,4	1,0	12,0	1,4	0,0	4,6	17,1	78
Primaria	4,3	10,1	9,1	9,6	20,8	16,4	8,2	3,4	0,7	8,4	1,3	0,3	4,0	12,2	1 338
Secundaria	4,4	12,9	12,7	10,9	27,9	15,6	19,0	8,0	2,0	15,7	1,2	0,5	4,1	15,7	6 417
Superior	4,9	19,8	20,6	13,2	37,9	24,5	31,0	13,5	3,2	16,2	1,8	0,4	6,2	17,1	6 372
<b>Quintil de riqueza</b>															
Quintil inferior	6,7	11,1	9,1	12,3	18,3	16,4	10,0	3,6	0,9	11,6	1,0	0,5	5,2	11,0	982
Segundo quintil	5,0	13,9	13,5	11,8	26,5	15,3	16,6	7,5	1,2	14,6	1,7	0,4	4,8	13,4	2 252
Quintil intermedio	4,5	15,8	15,3	11,5	30,6	17,9	21,8	9,0	2,0	16,9	1,3	0,4	5,8	15,0	3 218
Cuarto quintil	4,8	17,1	17,5	13,0	33,0	19,7	26,2	11,1	3,0	16,7	1,8	0,3	5,3	18,7	3 694
Quintil superior	4,0	16,4	17,7	10,9	37,3	24,0	28,9	12,9	3,2	13,9	1,2	0,6	4,3	17,0	4 060
<b>Total 2013</b>	<b>4,6</b>	<b>15,7</b>	<b>15,8</b>	<b>11,8</b>	<b>31,6</b>	<b>19,6</b>	<b>23,3</b>	<b>10,0</b>	<b>2,4</b>	<b>15,3</b>	<b>1,4</b>	<b>0,4</b>	<b>5,1</b>	<b>16,0</b>	<b>14 205</b>
Total 2009	5,6	18,6	15,8	11,6	31,1	19,2	20,0	6,6	1,8	15,4	1,9	0,6	6,8	24,8	15 015

1/ A partir del año 2004 en la variable secreción por genital incluye secreción de flujo por la vagina y secreción/goteos en genitales.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

**CUADRO N° 11.10**  
**PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS Y SIGNOS ESPECÍFICOS DE LAS**  
**INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS), SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2013**  
 (Porcentaje)

Ámbito geográfico	Síntomas y signos de las infecciones de transmisión sexual (ITS)														Número de mujeres
	Dolor abdominal	Secreción por genital 1/	Secreción mal oliente	Molestia al orinar	Enrojecimiento/ Picazón en genitales	Inflamación o hinchazón en genitales	Úlceras/ Lagas genitales	Verrugas genitales	Sangre en la orina	Pérdida de peso	Puede no haber síntomas	Impotencia / Infertilidad	Secreción o pus por el pene	Otros síntomas	
<b>Área de residencia</b>															
Urbana	4,5	16,2	16,2	11,8	32,7	20,2	24,5	10,5	2,6	15,8	1,5	0,5	5,1	16,9	12 498
Rural	5,6	11,8	13,2	11,6	23,9	15,5	14,5	6,5	1,1	11,0	1,3	0,2	4,6	9,5	1 707
<b>Región natural</b>															
Lima Metropolitana	4,1	14,9	14,6	11,2	33,5	21,6	26,6	11,8	3,2	16,2	1,4	0,4	4,1	18,4	5 858
Resto Costa	4,3	15,7	16,5	10,4	34,3	18,7	25,5	9,8	2,6	16,7	1,7	0,4	4,2	17,8	3 421
Sierra	5,0	13,7	15,1	10,3	25,3	14,4	18,3	9,1	1,6	14,6	1,2	0,5	2,7	12,8	2 981
Selva	6,4	21,2	19,8	18,3	31,1	22,9	17,3	6,5	0,9	11,0	1,5	0,5	13,1	10,7	1 944
<b>Departamento</b>															
Amazonas	6,6	13,8	13,5	3,4	16,9	12,7	14,2	3,7	0,7	8,4	3,4	0,5	3,3	15,2	158
Áncash	6,9	11,9	19,2	9,9	29,7	24,4	17,7	9,8	3,5	20,0	2,0	1,6	1,9	23,3	556
Apurímac	3,3	6,4	12,1	5,6	19,4	13,2	12,8	8,0	0,4	19,5	1,5	2,2	2,9	13,0	88
Arequipa	3,0	11,4	12,1	9,3	28,6	14,7	17,7	13,6	0,2	6,7	0,6	0,0	2,2	16,9	661
Ayacucho	4,2	16,9	20,7	14,3	25,9	13,5	21,6	6,7	0,9	12,7	1,1	0,9	1,0	16,6	217
Cajamarca	8,3	22,0	18,9	10,4	29,3	18,3	18,8	3,9	0,7	14,8	0,4	0,5	3,7	7,9	281
Cusco	5,3	18,1	14,7	10,7	26,6	10,6	17,8	9,6	2,4	15,7	2,1	1,2	4,7	16,4	481
Huancavelica	5,2	5,4	13,9	11,2	19,6	11,2	9,0	5,1	0,9	16,0	0,5	0,0	0,4	19,0	87
Huánuco	5,6	12,6	16,0	10,7	27,5	16,6	16,5	4,6	3,2	17,8	1,5	0,2	4,8	7,7	332
Ica	3,7	16,8	19,3	12,0	42,6	21,8	26,8	15,9	1,3	11,6	3,0	0,2	12,2	15,3	480
Junín	4,6	14,9	19,4	14,6	30,5	14,3	30,3	13,4	2,8	16,2	0,8	0,8	3,8	0,4	615
La Libertad	6,9	16,9	12,0	12,4	35,3	22,8	25,7	8,9	2,9	19,6	1,5	0,5	2,6	18,3	685
Lambayeque	5,2	11,1	11,8	11,6	30,6	16,4	20,2	4,3	1,3	14,0	1,0	0,2	2,2	10,1	503
Lima 2/	4,2	14,8	14,3	11,1	33,3	21,3	26,3	11,9	3,2	16,3	1,3	0,4	4,1	18,2	6 248
Loreto	5,7	20,3	17,3	17,7	23,1	20,2	14,8	3,5	0,8	12,9	0,9	0,0	19,3	18,3	537
Madre de Dios	7,4	21,2	20,0	20,2	24,4	14,0	19,0	9,5	0,6	11,1	0,7	0,7	6,9	2,4	61
Moquegua	6,3	19,4	32,0	13,5	29,8	15,4	18,4	6,9	1,3	11,3	8,7	0,2	2,2	12,3	100
Pasco	8,3	13,7	15,2	13,7	31,0	17,0	18,6	6,3	3,0	31,6	0,4	0,7	1,7	22,7	59
Piura	1,9	16,9	21,2	6,2	33,5	13,1	34,4	6,4	3,1	20,3	1,2	0,0	2,7	22,7	693
Puno	1,8	13,3	13,9	10,2	16,2	10,7	8,9	5,5	0,2	11,3	1,1	0,3	2,4	8,1	253
San Martín	7,3	17,9	23,7	23,7	43,2	34,9	13,5	5,1	0,4	10,2	2,1	0,7	17,3	9,0	512
Tacna	1,2	15,0	11,0	10,9	28,1	15,4	18,1	20,1	1,2	8,8	0,8	0,0	2,3	20,8	168
Tumbes	2,5	24,6	13,7	11,5	35,7	25,8	27,3	4,4	3,3	20,3	2,8	0,0	7,1	14,2	123
Ucayali	6,9	36,5	20,7	18,5	26,7	19,8	19,7	10,4	0,6	5,1	1,8	0,2	9,5	8,3	308
<b>Total 2013</b>	<b>4,6</b>	<b>15,7</b>	<b>15,8</b>	<b>11,8</b>	<b>31,6</b>	<b>19,6</b>	<b>23,3</b>	<b>10,0</b>	<b>2,4</b>	<b>15,3</b>	<b>1,4</b>	<b>0,4</b>	<b>5,1</b>	<b>16,0</b>	<b>14 205</b>
Total 2009	5,6	18,6	15,8	11,6	31,1	19,2	20,0	6,6	1,8	15,4	1,9	0,6	6,8	24,8	15 015

1/ A partir del año 2004 en la variable secreción por genital incluye secreción de flujo por la vagina y secreción/goteos en genitales.

2/ Incluye el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

## 11.4 PREVALENCIA DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

A las mujeres entrevistadas se les hizo una serie de preguntas para disponer de información que facilite la estimación de la prevalencia de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). En particular, a cada mujer entrevistada se le preguntó si en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista le diagnosticaron alguna infección de transmisión sexual, si había tenido algún flujo o secreción genital, si había tenido llaga o úlceras en sus genitales y, a las que tuvieron alguno de esos problemas se les preguntó a quién acudió en búsqueda de consejo o tratamiento. El detalle de los resultados por características seleccionadas y ámbito geográfico se presenta en los Cuadros N°11.11 al N°11.14.

*Prevalencia de ITS*

- Entre las mujeres entrevistadas que respondieron haber mantenido relaciones sexuales, un 0,7% informó haber tenido una ITS y/o síntomas asociados en los 12 meses anteriores a la entrevista. En el año 2009 fue 0,6%.
- Según características de las mujeres que respondieron haber padecido una ITS, el mayor porcentaje aparece en las divorciadas/separadas/viudas (1,1%), que pertenecen al quintil superior de riqueza (1,0%), y con educación superior (0,9%).
- Los departamentos, que registraron los más altos porcentajes de mujeres con episodios de ITS fueron: Moquegua (2,4%) y San Martín (1,3%).
- El 12,0% de mujeres declaró tener una ITS o flujo vaginal o úlceras/llagas genitales, el porcentaje se ha reducido en 1,9 puntos porcentuales, respecto al año 2009 (13,9%). El mayor porcentaje fue declarado por mujeres ubicadas en el cuarto quintil de riqueza (14,5%) y de 20 a 24 años de edad (14,0%). Por área de residencia, fue mayor en la urbana (12,5%) y por departamento, en Ayacucho (24,7%), Cusco (21,2%) y Apurímac (20,2%).

**CUADRO N° 11.11**  
**PERÚ: MUJERES POR PREVALENCIA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y SÍNTOMAS DE ITS EN**  
**LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013**  
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	Informó ITS o síntoma			Porcentaje de mujeres con una ITS o flujo vaginal o úlceras/llagas	Número de mujeres
	Porcentaje con una ITS	Porcentaje con flujo vaginal	Úlceras/llagas genitales		
<b>Edad</b>					
15-19	0,5	11,1	1,6	12,0	1 196
20-24	0,6	12,7	1,3	14,0	2 642
25-29	0,7	12,2	1,6	13,4	3 138
30-39	0,8	10,8	1,9	12,4	6 290
40-49	0,5	8,5	1,9	9,9	5 461
15-24	0,5	12,2	1,4	13,4	3 838
<b>Estado conyugal</b>					
Soltera	0,5	11,1	1,1	12,0	3 221
Casada o Conviviente	0,6	10,5	1,9	11,9	12 969
Divorciada/Separada/Viuda	1,1	11,0	1,7	12,7	2 537
<b>Nivel de educación</b>					
Sin educación	0,0	7,0	0,7	7,4	541
Primaria	0,4	8,8	2,2	10,2	4 364
Secundaria	0,7	11,8	1,9	13,2	7 879
Superior	0,9	10,8	1,3	12,2	5 943
<b>Quintil de riqueza</b>					
Quintil inferior	0,2	8,4	1,9	9,3	3 104
Segundo quintil	0,5	11,8	2,3	13,2	3 838
Quintil intermedio	0,6	10,3	1,9	11,8	4 123
Cuarto quintil	0,8	13,1	1,7	14,5	3 932
Quintil superior	1,0	9,2	1,1	10,7	3 730
<b>Total 2013</b>	<b>0,7</b>	<b>10,7</b>	<b>1,8</b>	<b>12,0</b>	<b>18 727</b>
<b>Total 2009</b>	<b>0,6</b>	<b>12,8</b>	<b>2,1</b>	<b>13,9</b>	<b>19 310</b>


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

**CUADRO N° 11.12**  
**PERÚ: MUJERES POR PREVALENCIA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y SÍNTOMAS DE ITS**  
**EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2013**  
 (Porcentaje)

Ámbito geográfico	Informó ITS o síntoma			Porcentaje de mujeres con una ITS o flujo vaginal o úlceras/lagas	Número de mujeres
	Porcentaje con una ITS	Porcentaje con flujo vaginal	Úlceras/lagas genitales		
<b>Área de residencia</b>					
Urbana	0,8	11,0	1,7	12,5	14 315
Rural	0,3	9,4	2,0	10,5	4 412
<b>Región natural</b>					
Lima Metropolitana	1,1	12,1	2,0	13,7	6 018
Resto Costa	0,4	8,7	1,6	10,0	4 709
Sierra	0,5	12,5	2,0	13,8	5 462
Selva	0,5	7,0	1,0	8,1	2 539
<b>Departamento</b>					
Amazonas	0,1	5,2	2,0	6,4	245
Áncash	0,5	11,6	2,6	13,0	803
Apurímac	0,0	18,0	4,8	20,2	224
Arequipa	0,8	13,4	1,0	14,8	741
Ayacucho	0,9	22,9	4,5	24,7	429
Cajamarca	0,0	6,4	0,9	7,0	842
Cusco	0,4	19,5	2,9	21,2	803
Huancavelica	0,5	11,0	0,7	11,7	251
Huánuco	1,1	8,4	1,5	10,2	416
Ica	0,4	2,3	0,5	3,1	526
Junín	0,6	10,8	2,2	12,0	792
La Libertad	0,2	9,1	1,6	10,1	1 150
Lambayeque	0,4	10,8	1,2	11,9	699
Lima 1/	1,1	12,1	1,8	13,7	6 619
Loreto	0,3	4,0	0,4	4,5	715
Madre de Dios	0,4	9,8	2,4	10,8	91
Moquegua	2,4	14,0	2,2	18,0	104
Pasco	0,5	9,6	1,1	11,2	138
Piura	0,0	5,9	2,2	7,0	1 285
Puno	0,2	8,5	1,7	9,8	610
San Martín	1,3	10,4	0,7	12,4	546
Tacna	0,7	8,0	2,2	9,7	208
Tumbes	0,8	11,8	3,6	14,8	164
Ucayali	0,6	3,6	0,4	4,4	325
<b>Total 2013</b>	<b>0,7</b>	<b>10,7</b>	<b>1,8</b>	<b>12,0</b>	<b>18 727</b>
Total 2009	0,6	12,8	2,1	13,9	19 310

1/ Incluye el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



#### *Fuente de consejo o tratamiento de las ITS*

- Entre las mujeres que tuvieron una ITS en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista, el 69,1% buscó consejo o tratamiento por un médico y un 82,6% recibió de cualquier fuente en comparación con un 10,4% que no recibió ni consejo ni tratamiento y un 3,3% se autorecetó, es decir, utilizó medicamentos por su cuenta. Otras fuentes mencionadas fueron los curanderos (5,8%) y las farmacias/boticas (25,4%).
- Las entrevistadas que en mayor porcentaje consultaron a un médico fueron las mujeres ubicadas en el quintil superior de riqueza (79,1%), seguido de las mujeres con educación superior (75,3%) y entre 40 y 49 años de edad (71,9%) y por área de residencia fue mayor en el área urbana 69,9%.
- Al curandero fueron, mayormente, mujeres con educación primaria (14,3%), y del quintil inferior de riqueza (12,6%). Por estado conyugal fueron las casadas o convivientes (6,7%). Por ámbito geográfico, del área rural (10,8%), la región sierra (8,0%), y por departamento, La Libertad (16,3%) y Piura (15,8%).
- A la farmacia/botica acudieron más las mujeres del segundo quintil y quintil intermedio de riqueza (29,6% y 28,8%, respectivamente), de 20 a 24 años de edad (29,3%) y con educación primaria (28,4%). Por área de residencia el mayor porcentaje estuvo en la urbana (26,5%). Por región natural, en la Selva (27,6%) y, por departamento en Junín (44,9%), Pasco (39,5%), Madre de Dios (38,7%) y Piura (38,5%).
- Dado que podía mencionarse más de una fuente de atención, es muy probable que las mujeres acudan a cada una de estas fuentes de tratamiento de acuerdo con las circunstancias específicas, estas deberían evaluarse a futuro para conocimiento y definición de políticas.

**CUADRO N° 11.13**  
**PERÚ: MUJERES QUE RECIBIERON CONSEJO O TRATAMIENTO PARA UNA ITS,**  
**POR FUENTE DE TRATAMIENTO, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013**  
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	Fuente de tratamiento de ITS 1/					Se auto-rece- tó	Ni consejo ni trata- miento	Número de mujeres con una ITS 2/
	Médico	Curan- dero	Farmacia / Botica	Consejo o tratamiento de cualquier fuente	Consejo o tratamiento de amigos o familiares			
<b>Edad</b>								
15-19	55,0	6,3	25,3	69,2	7,3	1,2	22,2	144
20-24	64,2	2,2	29,3	79,3	5,0	2,8	12,9	370
25-29	70,1	3,4	24,5	82,7	3,1	4,4	9,7	421
30-39	71,6	7,3	24,0	84,6	3,2	2,5	9,6	778
40-49	71,9	7,7	25,5	85,6	2,7	4,6	7,1	539
15-24	61,6	3,4	28,2	76,5	5,7	2,4	15,5	514
<b>Estado conyugal</b>								
Soltera	60,0	2,7	25,4	75,2	5,2	2,5	17,1	386
Casada o Conviviente	71,5	6,7	25,0	83,9	3,5	3,2	9,3	1 544
Divorciada/Separada/Viuda	68,8	4,8	27,2	85,4	2,3	4,9	7,4	322
<b>Nivel de educación</b>								
Sin educación	65,5	10,9	22,3	77,1	1,1	7,6	14,1	40
Primaria	62,2	14,3	28,4	81,4	4,0	3,6	11,0	446
Secundaria	67,9	4,2	27,1	81,8	3,7	3,1	11,5	1 040
Superior	75,3	2,4	21,2	84,8	3,5	3,3	8,3	726
<b>Quintil de riqueza</b>								
Quintil inferior	61,3	12,6	19,6	74,4	6,3	5,1	14,2	288
Segundo quintil	63,9	8,4	29,6	82,5	3,5	2,9	11,1	508
Quintil intermedio	71,2	5,5	28,8	85,2	2,1	4,0	8,7	486
Cuarto quintil	68,9	3,5	27,9	82,3	4,5	3,2	10,0	572
Quintil superior	79,1	1,1	16,5	86,1	2,7	1,8	9,4	398
<b>Total 2013</b>	<b>69,1</b>	<b>5,8</b>	<b>25,4</b>	<b>82,6</b>	<b>3,7</b>	<b>3,3</b>	<b>10,4</b>	<b>2 252</b>
Total 2009	65,8	6,1	17,9	76,5	3,1	6,6	13,7	2 796

1/ Las entrevistadas podían informar más de una fuente de tratamiento.

2/ Incluye las mujeres que informaron tener una ITS o flujo vaginal o llagas/granos genitales, en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

**CUADRO N° 11.14**  
**PERÚ: MUJERES QUE RECIBIERON CONSEJO O TRATAMIENTO PARA UNA ITS,**  
**POR FUENTE DE TRATAMIENTO, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2013**  
 (Porcentaje)

Ámbito geográfico	Fuente de tratamiento de ITS 1/				Consejo o tratamiento de amigos o familiares	Se auto-recetó	Ni consejo ni tratamiento	Número de mujeres con una ITS 2/
	Médico	Curandero	Farmacia / Botica	Consejo o tratamiento de cualquier fuente				
<b>Área de residencia</b>								
Urbana	69,9	4,5	26,5	83,8	3,5	3,1	9,6	1 788
Rural	66,2	10,8	21,1	78,3	4,2	4,2	13,3	464
<b>Región natural</b>								
Lima Metropolitana	74,2	2,2	25,7	84,6	3,2	2,3	9,9	825
Resto Costa	68,6	7,6	26,6	84,6	1,5	4,1	9,8	471
Sierra	62,4	8,0	23,7	78,1	4,9	4,6	12,3	751
Selva	74,4	7,6	27,6	86,4	5,7	1,0	6,9	205
<b>Departamento</b>								
Amazonas	(81,0)	(6,3)	(12,8)	(88,3)	(0,0)	(1,5)	(10,2)	16
Áncash	60,5	4,0	23,0	75,3	3,8	11,7	9,2	104
Apurímac	69,4	3,8	22,6	78,8	7,8	6,7	6,6	45
Arequipa	77,1	1,0	18,8	87,1	2,0	2,0	8,9	110
Ayacucho	66,5	7,3	17,8	76,5	3,8	5,2	14,5	106
Cajamarca	(70,6)	(7,2)	(25,9)	(83,1)	(2,2)	(5,8)	(8,9)	59
Cusco	62,1	10,2	20,4	76,9	2,5	4,2	16,4	170
Huancavelica	59,6	10,3	19,7	81,0	0,0	4,1	14,9	29
Huánuco	61,8	7,7	28,7	80,6	4,7	0,9	13,7	42
Ica	(70,9)	(0,0)	(26,1)	(85,1)	(0,0)	(3,0)	(11,9)	17
Junín	64,2	2,4	44,9	81,5	6,6	1,2	10,7	95
La Libertad	62,4	16,3	32,6	84,3	1,7	1,0	12,9	116
Lambayeque	77,3	3,9	12,2	86,8	0,8	5,7	6,7	83
Lima 3/	74,6	2,6	25,9	85,2	3,2	2,1	9,5	905
Loreto	(56,1)	(16,6)	(21,0)	(77,1)	(15,8)	(0,0)	(7,1)	32
Madre de Dios	66,4	6,9	38,7	82,4	4,2	5,0	8,4	10
Moquegua	71,7	8,9	8,5	78,3	3,1	7,9	10,7	19
Pasco	62,6	13,0	39,5	85,3	3,4	3,2	8,1	15
Piura	55,5	15,8	38,5	82,9	4,5	3,2	9,4	90
Puno	46,1	11,9	30,6	69,8	11,6	8,5	10,1	60
San Martín	76,5	7,7	23,5	87,0	5,9	1,8	5,3	68
Tacna	66,2	1,7	16,3	78,2	1,6	1,2	19,0	20
Tumbes	66,4	0,9	18,8	81,4	3,3	5,1	10,3	24
Ucayali	(74,8)	(8,1)	(24,6)	(86,6)	(5,4)	(0,0)	(8,0)	14
<b>Total 2013</b>	<b>69,1</b>	<b>5,8</b>	<b>25,4</b>	<b>82,6</b>	<b>3,7</b>	<b>3,3</b>	<b>10,4</b>	<b>2 252</b>
Total 2009	65,8	6,1	17,9	76,5	3,1	6,6	13,7	2 796

**Nota:** Los porcentajes basados en menos de 25 casos sin ponderar no se muestran (\*), y los de 25 a 49 casos se presentan entre paréntesis.

1/ Las entrevistadas podían informar más de una fuente de tratamiento.

2/ Incluye las mujeres que informaron tener una ITS o flujo vaginal o llagas/granos genitales, en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista.

3/ Incluye el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

**Fuente:** Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

## 11.5 CONDUCTA SEXUAL, USO DEL CONDÓN Y ACCESO AL CONDÓN

La conducta sexual individual y el uso de condón son determinantes claves del estatus de riesgo de contraer ITS y cuando esta información se agrega a nivel de la población, permite describir el contexto en el cual se deben diseñar e implementar los programas preventivos y curativos del VIH e ITS. En la Encuesta 2013, se preguntó a las mujeres acerca de sus relaciones sexuales en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista, número de parejas sexuales, uso de condón en la última relación y conocimiento de fuentes.

Asimismo se indagó acerca del nivel de conocimiento de la mujer respecto a la persona con quien mantuvo contacto sexual, para distinguir la pareja sexual regular de la no regular, cohabitante o no. Los resultados se detallan en los Cuadros N°11.15 y N°11.16.

### Número de parejas sexuales de las mujeres no unidas

- La distribución porcentual de mujeres no unidas por el número de personas con quienes tuvieron relaciones sexuales en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista muestra que el 69,0% refirió no haber tenido pareja sexual (71,4% en el año 2009), 29,4% respondió haber tenido una pareja (26,5% en el año 2009), y 1,6% tuvo dos o más parejas (2,2% en el año 2009).
- Las mujeres de 15 a 19 años de edad respondieron en mayor porcentaje no haber tenido pareja sexual (84,4%), seguido de las mujeres del quintil inferior de riqueza (83,6%) y sin educación (82,1%).
- El departamento en el que se registró el mayor porcentaje de mujeres que respondió “ninguna pareja” fue Puno (84,0%), con una fue San Martín (43,5%) y con dos o más parejas, Ucayali (5,8%).
- El área rural (81,4%) y la Sierra (77,7%) fueron los ámbitos donde se encontró un mayor porcentaje de mujeres que respondió no haber tenido pareja sexual, en los últimos 12 meses.

**CUADRO N° 11.15**  
**PERÚ: NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES DE LAS MUJERES NO UNIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013**  
 (Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Total	Número de parejas sexuales			Promedio de parejas	Número de mujeres
		Ninguna pareja	1	2 y más		
<b>Edad</b>						
15-19	100,0	84,4	14,6	1,1	0,2	3 615
20-24	100,0	56,9	40,2	2,9	0,5	1 979
25-29	100,0	47,8	49,5	2,7	0,6	1 217
30-39	100,0	60,7	38,2	1,1	0,4	1 675
40-49	100,0	74,3	24,7	1,1	0,3	1 466
15-24	100,0	74,6	23,7	1,7	0,3	5 593
<b>Estado conyugal</b>						
Soltera	100,0	70,8	27,7	1,6	0,3	7 413
Soltera ha tenido RS	100,0	32,7	63,7	3,6	0,7	3 220
Soltera no ha tenido RS	100,0	100,0	n.a.	n.a.	n.a.	4 193
Divorciada/Separada/Viuda	100,0	63,7	34,5	1,8	0,4	2 537
<b>Nivel de educación</b>						
Sin educación	100,0	82,1	17,9	0,0	0,2	105
Primaria	100,0	81,9	17,1	1,0	0,2	1 079
Secundaria	100,0	76,1	22,7	1,2	0,3	4 991
Superior	100,0	55,4	42,1	2,5	0,5	3 775
<b>Quintil de riqueza</b>						
Quintil inferior	100,0	83,6	15,0	1,4	0,2	1 165
Segundo quintil	100,0	73,1	25,4	1,5	0,3	1 697
Quintil intermedio	100,0	69,3	29,4	1,3	0,3	2 120
Cuarto quintil	100,0	66,9	32,0	1,0	0,3	2 364
Quintil superior	100,0	61,3	36,1	2,7	0,4	2 604
<b>Total 2013</b>	<b>100,0</b>	<b>69,0</b>	<b>29,4</b>	<b>1,6</b>	<b>0,3</b>	<b>9 951</b>
Total 2009	100,0	71,4	26,5	2,2	0,3	10 384

na= No aplicable.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

**CUADRO N° 11.16**  
**PERÚ: NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES DE LAS MUJERES NO UNIDAS EN LOS ÚLTIMOS**  
**12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2013**  
 (Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Total	Número de parejas sexuales			Promedio de parejas	Número de mujeres
		Ninguna pareja	1	2 y más		
<b>Área de residencia</b>						
Urbana	100,0	66,4	31,8	1,7	0,4	8 267
Rural	100,0	81,4	17,6	1,1	0,2	1 684
<b>Región natural</b>						
Lima Metropolitana	100,0	65,0	33,3	1,7	0,4	3 782
Resto Costa	100,0	69,5	29,1	1,5	0,3	2 460
Sierra	100,0	77,7	21,5	0,8	0,2	2 790
Selva	100,0	57,5	38,2	4,3	0,5	918
<b>Departamento</b>						
Amazonas	100,0	69,8	28,5	1,7	0,3	88
Áncash	100,0	72,1	26,7	1,2	0,3	417
Apurímac	100,0	79,0	19,8	1,2	0,2	100
Arequipa	100,0	67,1	31,9	1,0	0,3	431
Ayacucho	100,0	74,1	25,2	0,8	0,3	205
Cajamarca	100,0	81,3	18,7	0,0	0,2	373
Cusco	100,0	74,7	23,1	2,2	0,3	416
Huancavelica	100,0	80,9	18,8	0,2	0,2	144
Huánuco	100,0	71,7	25,5	2,7	0,3	199
Ica	100,0	62,3	35,7	1,9	0,4	287
Junín	100,0	69,9	29,2	0,9	0,3	402
La Libertad	100,0	75,5	23,7	0,9	0,3	624
Lambayeque	100,0	73,4	24,4	2,2	0,3	414
Lima 1/	100,0	64,9	33,4	1,7	0,4	4 046
Loreto	100,0	56,5	39,5	4,0	0,5	267
Madre de Dios	100,0	55,6	40,4	4,1	0,5	31
Moquegua	100,0	72,1	26,3	1,6	0,3	58
Pasco	100,0	70,9	27,4	1,7	0,3	60
Piura	100,0	75,1	23,5	1,4	0,3	595
Puno	100,0	84,0	16,0	0,0	0,2	303
San Martín	100,0	51,7	43,5	4,7	0,5	186
Tacna	100,0	68,8	29,0	2,2	0,3	111
Tumbes	100,0	75,0	25,0	0,0	0,3	62
Ucayali	100,0	55,2	39,0	5,8	0,5	132
<b>Total 2013</b>	<b>100,0</b>	<b>69,0</b>	<b>29,4</b>	<b>1,6</b>	<b>0,3</b>	<b>9 951</b>
Total 2009	100,0	71,4	26,5	2,2	0,3	10 384

1/ Incluye el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

### *Número de parejas sexuales de mujeres unidas*

- Evaluando la distribución porcentual de mujeres actualmente casadas o convivientes por número de personas con las que han tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista, se observa que la gran mayoría (97,6%) refirió haber tenido una sola pareja sexual incluyendo el esposo/compañero, lo cual se refuerza con el gran porcentaje de mujeres que manifestaron no haber tenido parejas sexuales (99,5%) excluyendo el esposo/compañero; en tanto, el 0,3% ha tenido dos o más parejas sexuales incluyendo el esposo/compañero.

- Entre las mujeres que, incluyendo al esposo/compañero, aceptaron haber tenido dos o más parejas sexuales, un mayor porcentaje tenía de 15 a 19 años de edad (0,7%). Por área de residencia, en el área urbana (0,3%). Por región natural, la Selva (0,6%) y, por departamento Loreto (1,3%) y Madre de Dios (0,8%).

**CUADRO N° 11.17**  
**PERÚ: NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES DE MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS EN LOS ÚLTIMOS**  
**12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013**  
 (Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Número de parejas sexuales incluyendo esposo/compañero					Número de parejas sexuales excluyendo esposo/compañero				Número de mujeres
	Total	Ninguna	1	2 y más	Pro-medio	Total	Ninguna	1	Pro-medio	
<b>Edad</b>										
15-19	100,0	0,8	98,5	0,7	1,0	100,0	99,1	0,8	0,1	477
20-24	100,0	0,8	98,8	0,3	1,0	100,0	99,1	0,9	0,0	1 432
25-29	100,0	1,7	98,1	0,2	1,0	100,0	99,5	0,4	0,0	2 156
30-39	100,0	1,3	98,4	0,3	1,0	100,0	99,5	0,5	0,0	4 802
40-49	100,0	4,1	95,8	0,1	1,0	100,0	99,6	0,4	0,0	4 102
15-24	100,0	0,8	98,7	0,4	1,0	100,0	99,1	0,8	0,0	1 909
<b>Nivel de educación</b>										
Sin educación	100,0	5,9	94,0	0,1	0,9	100,0	99,7	0,3	0,0	448
Primaria	100,0	2,2	97,6	0,2	1,0	100,0	99,7	0,3	0,0	3 568
Secundaria	100,0	1,9	97,8	0,3	1,0	100,0	99,3	0,7	0,0	5 671
Superior	100,0	2,1	97,6	0,3	1,0	100,0	99,6	0,4	0,0	3 282
<b>Quintil de riqueza</b>										
Quintil inferior	100,0	2,2	97,5	0,3	1,0	100,0	99,6	0,4	0,0	2 521
Segundo quintil	100,0	2,0	97,7	0,3	1,0	100,0	99,4	0,5	0,0	2 863
Quintil intermedio	100,0	2,1	97,6	0,3	1,0	100,0	99,6	0,4	0,0	2 882
Cuarto quintil	100,0	2,0	97,9	0,0	1,0	100,0	99,6	0,4	0,0	2 574
Quintil superior	100,0	2,5	97,0	0,4	1,0	100,0	99,2	0,8	0,0	2 129
<b>Total 2013</b>	<b>100,0</b>	<b>2,2</b>	<b>97,6</b>	<b>0,3</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>	<b>99,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>12 969</b>

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

**CUADRO N° 11.18**  
**PERÚ: NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES DE MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS EN LOS**  
**ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2013**  
 (Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Número de parejas sexuales incluyendo esposo/compañero					Número de parejas sexuales excluyendo esposo/compañero				Número de mujeres
	Total	Ninguna	1	2 y más	Pro-medio	Total	Ninguna	1	Pro-medio	
<b>Área de residencia</b>										
Urbana	100,0	2,3	97,4	0,3	1,0	100,0	99,4	0,6	0,0	9 377
Rural	100,0	1,9	98,0	0,1	1,0	100,0	99,7	0,3	0,0	3 592
<b>Región natural</b>										
Lima Metropolitana	100,0	2,8	96,8	0,4	1,0	100,0	99,1	0,9	0,0	3 681
Resto Costa	100,0	1,7	98,1	0,1	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	3 346
Sierra	100,0	2,3	97,6	0,1	1,0	100,0	99,7	0,3	0,0	4 031
Selva	100,0	1,5	97,9	0,6	1,0	100,0	99,3	0,7	0,0	1 911
<b>Departamento</b>										
Amazonas	100,0	1,9	98,1	0,0	1,0	100,0	100,0	0,0	0,0	188
Áncash	100,0	2,3	97,6	0,2	1,0	100,0	99,7	0,3	0,0	561
Apurímac	100,0	2,4	97,2	0,4	1,0	100,0	99,6	0,4	0,0	180
Arequipa	100,0	2,9	97,1	0,0	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	501
Ayacucho	100,0	1,4	98,6	0,0	1,0	100,0	100,0	0,0	0,0	311
Cajamarca	100,0	0,7	99,3	0,0	1,0	100,0	100,0	0,0	0,0	639
Cusco	100,0	3,3	96,7	0,0	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	596
Huancavelica	100,0	1,9	98,1	0,0	1,0	100,0	99,7	0,3	0,0	181
Huánuco	100,0	3,0	96,9	0,1	1,0	100,0	99,6	0,4	0,0	300
Ica	100,0	1,3	98,3	0,4	1,0	100,0	99,6	0,3	0,0	351
Junín	100,0	3,4	96,3	0,3	1,0	100,0	99,1	0,9	0,0	559
La Libertad	100,0	2,3	97,5	0,1	1,0	100,0	99,4	0,6	0,0	781
Lambayeque	100,0	1,8	98,1	0,1	1,0	100,0	100,0	0,0	0,0	486
Lima y Callao 1/	100,0	2,7	96,9	0,3	1,0	100,0	99,2	0,8	0,0	4 131
Loreto	100,0	1,8	96,8	1,3	1,0	100,0	99,0	0,9	0,0	530
Madre de Dios	100,0	2,4	96,8	0,8	1,0	100,0	99,2	0,8	0,0	68
Moquegua	100,0	2,1	97,7	0,2	1,0	100,0	100,0	0,0	0,0	71
Pasco	100,0	1,2	98,8	0,0	1,0	100,0	99,9	0,1	0,0	105
Piura	100,0	0,9	99,0	0,1	1,0	100,0	99,7	0,3	0,0	1 014
Puno	100,0	2,3	97,6	0,1	1,0	100,0	99,9	0,1	0,0	490
San Martín	100,0	0,8	99,0	0,1	1,0	100,0	99,7	0,3	0,0	421
Tacna	100,0	1,6	98,4	0,0	1,0	100,0	99,5	0,5	0,0	145
Tumbes	100,0	0,3	99,7	0,0	1,0	100,0	100,0	0,0	0,0	129
Ucayali	100,0	1,1	98,3	0,5	1,0	100,0	99,3	0,7	0,0	232
<b>Total 2013</b>	<b>100,0</b>	<b>1,9</b>	<b>97,8</b>	<b>0,3</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>	<b>99,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>13 624</b>

1/ Incluye el departamento de Lima y Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

### Conocimiento y uso del condón

- Entre las mujeres que han oído hablar sobre el VIH/SIDA, el 99,3% conocía sobre el uso de condón, como una forma de prevenir enfermedades, pero solo el 9,8% utilizó el último mes. De las mujeres que lo usan como método anticonceptivo, el 2,6% no los usó en su última relación sexual.
- El 79,3% de mujeres conocía que hay fuente médica pública y un 2,6% fuente médica privada. El 78,9%, sabía que se adquiere en las farmacias contra un 1,2% que no conoce fuentes para obtenerlos.
- Es importante mencionar que las mujeres que reconocieron haber utilizado condones en el último mes fueron las pertenecientes al quintil superior de riqueza (14,8%), seguido de las que tuvieron educación superior (13,5%) y con 25 a 29 años de edad (12,1%).

- En cuanto al grupo que usa el condón como método de planificación familiar pero que no los usó en su última relación sexual, fue mayor en mujeres ubicadas en el quintil superior de riqueza (4,5%), con educación superior (4,2%), y de 20 a 24 años de edad (3,9%). Por área de residencia en la urbana (3,1%), por región natural en Lima Metropolitana (4,1%) y por departamentos en Moquegua (5,3%) y Madre de Dios (4,6%).

**CUADRO N° 11.19**  
**PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO, FUENTE Y USO DEL CONDÓN, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013**  
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	Conoce sobre el condón 1/	Conoce fuente para el condón 2/					No conoce fuentes para el condón	Uso de condones		Usa condón para PF; pero no usó en última relación	Número de mujeres
		Fuente médica pública	Fuente médica privada	Farmacia	Otra fuente	Podría conseguir uno		El último mes	Antes		
<b>Edad</b>											
15-19	99,0	72,7	3,6	82,6	7,1	58,2	1,7	8,8	10,5	3,0	1 16
20-24	99,5	79,3	3,5	83,4	6,6	71,1	1,0	11,4	7,7	3,9	2 59
25-29	99,5	81,2	3,0	83,1	7,0	70,5	0,6	12,1	4,4	3,6	3 07
30-39	99,6	80,3	2,6	77,7	6,4	68,6	0,9	10,5	2,1	2,6	6 12
40-49	99,0	78,3	1,6	74,8	4,4	62,8	1,8	7,2	2,4	1,4	5 24
15-24	99,3	77,3	3,5	83,2	6,8	67,1	1,2	10,6	8,6	3,6	3 75
<b>Estado conyugal</b>											
Soltera ha tenido RS	99,7	68,1	4,9	90,7	11,6	70,8	0,8	11,9	13,4	3,3	3 16
Casada o Conviviente	99,2	82,1	1,9	75,9	4,7	66,0	1,3	10,6	1,4	2,8	12 54
Divorciada/Separada/Viuda	99,6	79,1	2,8	79,0	5,9	66,8	1,0	3,2	4,6	1,1	2 49
<b>Nivel de educación</b>											
Sin educación	92,7	80,4	0,5	26,9	2,0	29,9	11,0	1,9	1,2	0,0	39
Primaria	98,2	85,6	0,8	52,3	2,1	48,0	3,4	5,6	0,9	0,7	4 02
Secundaria	99,8	81,1	1,9	83,7	4,4	68,8	0,4	9,6	3,6	2,5	7 83
Superior	99,9	72,4	4,8	94,0	11,1	79,9	0,0	13,5	6,5	4,2	5 93
<b>Quintil de riqueza</b>											
Quintil inferior	97,0	91,0	0,9	36,9	2,2	44,9	4,3	4,2	1,0	0,3	2 72
Segundo quintil	99,4	86,2	1,5	72,4	3,3	59,0	1,3	7,5	2,7	1,6	3 73
Quintil intermedio	99,9	79,1	1,8	86,1	4,4	68,9	0,7	10,7	3,5	2,6	4 09
Cuarto quintil	99,9	76,7	2,9	91,1	6,6	73,9	0,3	10,4	5,7	3,4	3 91
Quintil superior	99,8	66,6	5,3	95,3	12,8	81,6	0,1	14,8	5,8	4,5	3 73
<b>Total 2013</b>	<b>99,3</b>	<b>79,3</b>	<b>2,6</b>	<b>78,9</b>	<b>6,0</b>	<b>67,0</b>	<b>1,2</b>	<b>9,8</b>	<b>3,9</b>	<b>2,6</b>	<b>18 19</b>
Total 2009	98,3	78,9	2,9	73,0	6,2	65,3	2,5	9,5	3,2	1,8	18 15

1/ Conocimiento para Planificación Familiar o para prevención de enfermedades.

2/ Para las usuarias actuales se incluye como fuente el último sitio donde obtuvo el condón.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

**CUADRO N° 11.20**  
**PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO, FUENTE Y USO DEL CONDÓN, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2013**  
 (Porcentaje)

Ámbito geográfico	Conoce sobre el condón 1/	Conoce fuente para el condón 2/					No conoce fuentes para el condón	Uso de condones		Usa condón para PF; pero no usó en última relación	Número de mujeres
		Fuente médica pública	Fuente médica privada	Farmacia	Otra fuente	Podría conseguir uno		El último mes	Antes		
<b>Área de residencia</b>											
Urbana	99,8	76,1	2,9	88,1	7,1	71,9	0,6	11,0	4,5	3,1	14 194
Rural	97,8	90,3	1,2	46,3	2,2	49,4	3,3	5,7	1,6	0,9	4 004
<b>Región natural</b>											
Lima Metropolitana	99,9	71,8	3,7	93,4	10,2	77,8	0,3	13,1	5,7	4,1	6 005
Resto Costa	99,6	77,2	2,3	83,9	5,1	65,6	1,0	8,3	3,3	2,7	4 652
Sierra	98,5	84,4	2,0	61,1	2,6	57,3	2,3	9,1	3,1	1,4	5 058
Selva	99,3	90,7	1,6	70,6	4,8	63,2	1,3	6,2	2,2	1,5	2 483
<b>Departamento</b>											
Amazonas	95,1	87,8	1,3	63,9	3,2	51,7	6,8	4,5	1,4	1,7	232
Áncash	99,0	86,4	5,7	74,8	6,8	63,2	2,0	7,1	3,2	1,2	769
Apurímac	98,8	92,2	2,2	48,9	1,4	49,1	1,6	7,5	1,1	1,7	202
Arequipa	99,7	69,4	2,1	82,6	3,9	76,1	0,8	12,1	4,7	3,8	724
Ayacucho	97,8	93,9	2,2	60,5	3,6	49,9	2,5	7,6	3,3	1,5	410
Cajamarca	97,8	85,4	0,7	48,4	0,6	50,4	2,8	7,7	0,8	0,7	765
Cusco	98,8	77,4	1,1	61,5	2,4	64,7	3,1	12,3	4,3	1,2	768
Huancavelica	99,3	98,4	1,9	63,1	4,7	52,0	0,7	5,3	1,9	0,3	226
Huánuco	97,4	89,9	1,9	54,1	2,5	63,4	3,4	10,5	2,6	0,8	405
Ica	99,9	69,6	2,2	90,0	5,6	67,8	0,9	9,6	4,7	1,8	521
Junín	99,7	91,0	2,5	75,2	6,2	68,5	0,3	12,6	5,5	1,0	775
La Libertad	99,5	85,3	2,3	74,0	6,1	52,3	1,2	8,4	2,7	1,9	1 094
Lambayeque	99,6	71,6	1,0	76,0	4,7	72,4	1,0	5,6	2,9	3,9	688
Lima 3/	99,8	72,9	3,4	92,2	9,4	77,1	0,5	12,9	5,6	3,9	6 601
Loreto	99,5	92,7	1,1	69,9	8,6	59,4	0,9	5,3	2,5	1,6	706
Madre de Dios	99,9	87,5	0,7	86,4	4,6	65,3	1,9	5,9	3,6	4,6	88
Moquegua	99,7	87,9	1,8	80,4	3,1	72,5	1,2	10,5	5,6	5,3	103
Pasco	98,9	93,6	2,8	63,3	4,0	71,9	1,6	8,2	3,5	0,6	127
Piura	98,9	70,1	1,3	80,7	3,7	58,7	1,4	6,1	1,2	3,3	1 224
Puno	98,7	77,4	2,6	54,8	0,2	37,0	1,8	6,9	3,0	0,7	545
San Martín	99,9	93,4	2,6	85,8	2,5	63,0	0,2	4,7	1,7	0,9	546
Tacna	100,0	90,9	6,6	84,8	2,1	69,6	0,9	12,3	7,1	3,0	204
Tumbes	100,0	91,7	2,2	85,2	4,0	81,2	0,5	7,1	2,4	0,8	164
Ucayali	99,8	87,1	1,7	68,2	2,7	77,8	0,4	3,5	1,6	2,3	311
<b>Total 2013</b>	<b>99,3</b>	<b>79,3</b>	<b>2,6</b>	<b>78,9</b>	<b>6,0</b>	<b>67,0</b>	<b>1,2</b>	<b>9,8</b>	<b>3,9</b>	<b>2,6</b>	<b>18 198</b>
Total 2009	98,3	78,9	2,9	73,0	6,2	65,3	2,5	9,5	3,2	1,8	18 157

1/ Conocimiento para Planificación Familiar o para prevención de enfermedades.

2/ Para las usuarias actuales se incluye como fuente el último sitio donde obtuvo el condón.

3/ Incluye el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

### Uso de condón según tipo de compañero

- El uso de condón entre las mujeres que tuvieron relaciones sexuales, en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista, de acuerdo con el tipo de compañero, muestra los siguientes porcentajes: un 12,1% usó condón con su esposo o compañero, en el año 2009 fue 9,8%; el 30,6% los usó con un compañero con el cual no vive, en el año 2009 fue 32,5%; y, un 15,6% usó condón con cualquier compañero, en el año 2009 fue 13,8%. Es decir, hubo un incremento en la mayoría de los casos, y el uso es mayor con parejas que no viven con ellas.

- El uso de condón con compañero con el cual no vive fue mayor entre las mujeres del quintil superior de riqueza (37,2%), seguido de solteras que han tenido relaciones sexuales y de 20 a 24 años de edad (37,0%, en ambos casos). Por área de residencia fue más alta en la urbana (31,8%), por región natural en Lima Metropolitana (36,5%) y por departamento en Tacna (43,0%) y Cusco (39,8%).
- El uso de condón con cualquier compañero, ocurrió en mayor porcentaje en mujeres solteras que han tenido relaciones sexuales (37,0%), en mujeres del quintil superior de riqueza (24,5%) y con educación superior (23,9%). Por área de residencia, fue en la urbana (18,2%), por región natural, en Lima Metropolitana (22,6%) y, por departamento en Lima y Tacna (22,0%, en ambos casos).

**CUADRO N° 11.21**  
**PERÚ: USO DEL CONDÓN POR TIPO DE COMPAÑERO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**  
**ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013**  
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	Usó condón con esposo o compañero		Usó con compañero con quien no vive		Usó condón con cualquier compañero	
	Porcentaje	Número de mujeres	Porcentaje	Número de mujeres	Porcentaje	Número de mujeres
<b>Edad</b>						
15-19	7,1	489	33,8	560	21,3	1 045
20-24	12,1	1 462	37,0	856	21,3	2 309
25-29	13,0	2 152	35,7	642	18,3	2 781
30-39	12,9	4 815	22,6	680	14,0	5 477
40-49	11,0	3 985	17,9	390	11,6	4 368
15-24	10,8	1 950	35,7	1 416	21,3	3 355
<b>Estado conyugal</b>						
Soltera ha tenido RS	*	0	37,0	2 146	37,0	2 146
Casada o Conviviente	11,9	12 643	18,5	65	11,9	12 677
Divorciada/Separada/Viuda	17,6	260	16,5	917	16,7	1 157
<b>Nivel de educación</b>						
Sin educación	3,1	421	*	20	3,1	440
Primaria	6,8	3 547	12,3	204	7,1	3 743
Secundaria	12,5	5 646	27,6	1 216	15,1	6 836
Superior	18,1	3 288	35,3	1 688	23,9	4 961
<b>Quintil de riqueza</b>						
Quintil inferior	4,6	2 483	14,2	197	5,3	2 672
Segundo quintil	9,5	2 854	24,3	467	11,5	3 308
Quintil intermedio	13,4	2 888	29,3	658	16,3	3 535
Cuarto quintil	15,1	2 557	31,2	789	18,8	3 338
Quintil superior	18,7	2 120	37,2	1 017	24,5	3 128
<b>Total 2013</b>	<b>12,1</b>	<b>12 902</b>	<b>30,6</b>	<b>3 128</b>	<b>15,6</b>	<b>15 981</b>
Total 2009	9,8	13 781	32,5	3 002	13,8	16 743

**Nota:** Los porcentajes basados en menos de 25 casos sin ponderar no se muestran (\*), y los de 25-49 casos sin ponderar se presentan entre paréntesis.

**Fuente:** Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


**CUADRO N° 11.22**  
**PERÚ: USO DEL CONDÓN POR TIPO DE COMPAÑERO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**  
**ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2013**  
 (Porcentaje)

Ámbito geográfico	Usó condón con esposo o compañero		Usó con compañero con quien no vive		Usó condón con cualquier compañero	
	Porcentaje	Número de mujeres	Porcentaje	Número de mujeres	Porcentaje	Número de mujeres
<b>Área de residencia</b>						
Urbana	14,2	9 351	31,8	2 814	18,2	12 121
Rural	6,5	3 551	20,6	314	7,6	3 860
<b>Región natural</b>						
Lima Metropolitana	17,6	3 667	36,5	1 350	22,6	4 999
Resto Costa	10,4	3 359	25,8	753	13,1	4 097
Sierra	10,9	3 971	30,2	627	13,5	4 593
Selva	6,8	1 906	20,3	399	9,1	2 292
<b>Departamento</b>						
Amazonas	4,7	187	19,0	26	6,4	213
Áncash	8,9	556	25,9	117	11,7	671
Apurímac	6,6	178	29,7	21	8,8	198
Arequipa	17,1	488	27,9	143	19,5	631
Ayacucho	10,3	310	24,5	53	12,3	362
Cajamarca	8,6	640	13,8	70	9,1	710
Cusco	14,5	583	39,8	107	18,4	690
Huancavelica	4,5	179	(29,8)	28	7,9	207
Huánuco	11,5	294	33,6	57	15,1	351
Ica	12,5	347	28,6	110	16,3	456
Junín	18,8	544	31,0	122	21,1	665
La Libertad	11,0	791	23,9	158	13,2	947
Lambayeque	6,2	487	24,4	108	9,5	592
Lima 1/	17,3	4 109	35,9	1 443	22,0	5 532
Loreto	5,5	530	22,2	121	8,4	644
Madre de Dios	7,6	68	23,8	14	10,1	81
Moquegua	16,2	70	31,9	16	19,1	87
Pasco	9,6	104	28,7	17	12,0	121
Piura	6,2	1 021	19,4	149	7,7	1 167
Puno	8,1	483	31,6	48	10,2	530
San Martín	4,0	420	20,2	90	6,9	508
Tacna	17,0	146	43,0	35	22,0	181
Tumbes	8,6	131	28,4	15	10,6	147
Ucayali	2,5	233	17,4	60	5,6	291
<b>Total 2013</b>	<b>12,1</b>	<b>12 902</b>	<b>30,6</b>	<b>3 128</b>	<b>15,6</b>	<b>15 981</b>
Total 2009	9,8	13 781	32,5	3 002	13,8	16 743

1/ Incluye el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

**GRÁFICO Nº 11.4**  
**PERÚ: USO DE CONDÓN POR TIPO DE COMPAÑERO, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013**  
 (Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

