



11. *Conocimiento de VIH e ITS*

11. Conocimiento de VIH e ITS



En la mayoría de los países en desarrollo, las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) ocupan el segundo lugar entre las causas de enfermedad de las mujeres en edad reproductiva. La prevención y el tratamiento de las ITS constituyen un mecanismo de intervención que mejora la salud pública, dado el grado de morbilidad y mortalidad que causan, y evita la transmisión del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

El comportamiento del VIH y del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en el Perú es el de una epidemia concentrada, así desde el primer caso diagnosticado de SIDA en el Perú en el año 1983 hasta noviembre de 2014, se han reportado 31 mil 600 casos de SIDA y 51 mil 998 casos notificados de VIH¹ pero se estima que más de 100 mil personas estarían viviendo con el virus de inmunodeficiencia humana hasta el año 2040. La magnitud del problema, la rápida propagación del VIH/SIDA, la inexistencia de cura para la enfermedad y la relación entre ITS y VIH confirman la importancia de monitorear el conocimiento de la población sobre la transmisión, prevención y percepción de los riesgos.

En el cuestionario individual de la Encuesta 2014 se continúa incluyendo una sección, con preguntas previamente evaluadas y mejoradas, para indagar sobre el conocimiento general de las mujeres acerca de las infecciones transmitidas sexualmente: conocimiento de las distintas infecciones, si han adquirido infecciones en los 12 meses anteriores a la entrevista y, en caso positivo, lugar y persona donde buscó tratamiento o consejo y comunicación con el compañero sexual. Con relación al VIH/SIDA, se indagó sobre el lugar donde una persona puede hacerse la prueba para saber si tiene el virus que causa la enfermedad, qué debe hacerse para evitar contraer el VIH, si una persona puede ser VIH-positiva aunque parezca saludable, y si cree que el VIH puede ser transmitido de la madre a la hija o hijo y en qué momento.

Igualmente se les pidió a las mujeres opinar sobre los derechos de las personas con VIH-positivo para participar en el mercado laboral o llevar una vida en comunidad. También se hicieron preguntas sobre la conducta sexual en los últimos 12 meses (número y tipo de parejas sexuales y uso del condón).

11.1 CONOCIMIENTO DE VIH/SIDA Y FORMAS DE EVITAR

A las mujeres entrevistadas se les preguntó si habían oído hablar de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana y del SIDA. A quienes respondieron afirmativamente, se indagó si había algo que una persona pueda hacer para evitar infectarse con el VIH. Se presenta el conocimiento de formas programáticas y específicas de evitar el virus, la percepción de la entrevistada sobre el riesgo de infección por el VIH y los aspectos sociales de la prevención y mitigación.

1 Ministerio de Salud: Dirección General de Epidemiología / Boletín Mensual Noviembre 2014.

Conocimiento de VIH/SIDA


Del total de mujeres entrevistadas en la Encuesta 2014, el 96,9% conoce o ha oído hablar del VIH/SIDA lo que implica una mejora de 2,7 puntos porcentuales, en relación con el año 2009 (94,2%).

En el año 2014, el 5,6% de mujeres entrevistadas manifestó que desconocía alguna de las dos formas consideradas de importancia programática para evitar el VIH (menor número de parejas sexuales o uso del condón). En el año 2009, este porcentaje fue 5,7%.

Con respecto a las mujeres que desconocen el VIH/SIDA, se observa que según característica seleccionada, los menores porcentajes se ubicaron en aquellas mujeres con educación superior (0,1%). De igual manera en las que pertenecen al cuarto quintil de riqueza (0,1%). En cambio, las mujeres entrevistadas que no tienen educación (29,8%) y las que pertenecen al quintil inferior de riqueza (14,2%) constituyen el mayor porcentaje de mujeres que desconoce sobre el VIH/SIDA.

Según área de residencia, este porcentaje fue mayor en el área rural (11,0%), en comparación a la urbana (0,9%) y por departamento en Apurímac se registró el mayor porcentaje de mujeres que respondieron desconocimiento sobre el VIH/SIDA (14,0%), seguido por Cajamarca (11,6%), Huánuco (8,2%), Cusco (7,8%) y Huancavelica (7,6%)

Sobre el conocimiento de las formas específicas de evitar el VIH, el 85,0% de las mujeres respondió “limitar el número de parejas sexuales o mutua fidelidad”; con relación al año 2009 se aprecia un incremento de 2,1 puntos porcentuales. Asimismo, el conocimiento sobre el uso del condón creció al pasar de 74,2%, en el año 2009 a 76,4% en el 2014.



CUADRO N° 11.1
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE FORMAS DE IMPORTANCIA PROGRAMÁTICA Y ESPECÍFICAS
DE EVITAR EL VIH, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2014
(Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Total	No conoce VIH/SIDA	Conocimiento de dos formas de importancia programática de evitar el VIH			Conocimiento de dos formas específicas		Número de mujeres
			Ninguna de las dos formas 1/	Una forma	Dos formas	Usar condones	Limitar el número de parejas sexuales 2/	
Edad								
15-19	100,0	3,1	7,5	27,6	61,8	69,1	82,2	4 311
20-24	100,0	2,6	5,6	21,3	70,5	77,0	85,3	3 739
25-29	100,0	2,3	5,6	18,2	73,9	79,9	86,1	3 664
30-39	100,0	2,8	4,9	18,9	73,4	79,1	86,6	7 040
40-49	100,0	4,1	5,2	20,8	69,9	76,1	84,5	6 118
15-24	100,0	2,9	6,6	24,6	65,9	72,8	83,6	8 050
Estado conyugal								
Soltera	100,0	2,7	5,6	23,7	67,9	74,2	85,4	8 007
Ha tenido RS	100,0	1,9	4,0	18,8	75,2	81,5	87,8	3 623
Nunca ha tenido RS	100,0	3,3	7,0	27,8	61,9	68,2	83,4	4 384
Casada o Conviviente	100,0	3,4	5,7	19,6	71,2	77,3	84,8	14 105
Divorciada/Separada/Viuda	100,0	2,7	4,9	21,1	71,3	78,5	85,1	2 760
Nivel de educación								
Sin educación	100,0	29,8	9,4	23,3	37,4	45,7	52,4	507
Primaria	100,0	11,0	11,0	22,1	55,9	64,5	69,4	4 674
Secundaria	100,0	0,8	5,2	22,6	71,3	77,8	87,4	11 725
Superior	100,0	0,1	2,7	18,2	79,0	83,4	92,8	7 966
Quintil de riqueza								
Quintil inferior	100,0	14,2	11,1	22,8	51,9	61,1	65,5	4 063
Segundo quintil	100,0	2,5	6,4	22,8	68,4	75,9	83,6	4 908
Quintil intermedio	100,0	0,8	4,8	21,0	73,4	79,0	88,8	5 375
Cuarto quintil	100,0	0,4	4,0	20,7	74,9	80,0	90,6	5 394
Quintil superior	100,0	0,1	3,0	18,8	78,1	82,8	92,2	5 132
Total 2014	100,0	3,1	5,6	21,1	70,2	76,4	85,0	24 872
Total 2009	100,0	5,8	5,7	19,9	68,6	74,2	82,9	24 212

Nota: Las dos formas de importancia programática son: usar condones y limitar el número de parejas sexuales. Las respuestas provienen tanto de respuestas espontáneas como sondeos.

1/ Mujeres que no han oído hablar de VIH/SIDA o que no conocen las formas de importancia programática.

2/ Incluye ser mutuamente fiel.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 11.2
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE FORMAS DE IMPORTANCIA PROGRAMÁTICA Y
ESPECÍFICAS DE EVITAR EL VIH, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
 (Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Total	No conoce VIH/SIDA	Conocimiento de dos formas de importancia programática de evitar el VIH			Conocimiento de dos formas específicas		Número de mujeres
			Ninguna de las dos formas 1/	Una forma	Dos formas	Usar condones	Limitar el número de parejas sexuales 2/	
Área de residencia								
Urbana	100,0	0,9	4,3	20,9	73,9	79,5	89,2	19 366
Rural	100,0	11,0	10,0	21,9	57,1	65,9	70,3	5 506
Región natural								
Lima Metropolitana 3/	100,0	0,4	4,0	20,7	74,9	80,5	90,1	8 236
Resto Costa	100,0	1,5	5,0	21,1	72,5	77,5	88,5	6 340
Sierra	100,0	7,7	7,7	21,5	63,2	70,6	77,2	7 272
Selva	100,0	2,9	6,4	21,3	69,4	77,1	83,0	3 024
Departamento								
Amazonas	100,0	3,9	7,8	19,4	68,9	75,2	82,0	316
Áncash	100,0	6,2	6,8	20,1	67,0	71,6	82,4	997
Apurímac	100,0	14,0	3,9	19,6	62,5	66,2	78,4	322
Arequipa	100,0	0,8	4,8	23,4	71,0	77,1	88,2	1 191
Ayacucho	100,0	6,1	5,5	24,0	64,4	71,4	81,5	493
Cajamarca	100,0	11,6	8,2	21,9	58,3	67,6	70,9	1 181
Prov. Const. Del Callao	100,0	0,3	3,8	22,7	73,2	79,1	89,9	897
Cusco	100,0	7,8	10,9	19,2	62,1	68,9	74,5	964
Huancavelica	100,0	7,6	6,0	19,2	67,1	74,3	79,2	297
Huánuco	100,0	8,2	9,1	24,5	58,2	67,9	73,0	573
Ica	100,0	0,8	5,0	22,3	71,8	77,0	89,0	709
Junín	100,0	2,1	4,8	17,8	75,2	81,6	86,7	1 008
La Libertad	100,0	3,8	4,8	18,3	73,1	77,6	86,9	1 524
Lambayeque	100,0	1,8	3,1	18,0	77,1	80,1	92,1	965
Lima	100,0	0,5	4,2	20,4	74,8	80,4	89,7	8 202
Provincia de Lima 4/	100,0	0,4	4,0	20,5	75,1	80,7	90,1	7 349
Lima Provincias 5/	100,0	1,9	5,9	20,0	72,3	77,9	86,6	853
Loreto	100,0	2,9	6,7	23,5	67,0	74,6	82,8	789
Madre de Dios	100,0	1,6	4,9	24,0	69,6	75,6	87,6	112
Moquegua	100,0	1,8	4,9	20,8	72,5	79,2	86,5	137
Pasco	100,0	3,1	4,8	23,3	68,8	78,6	82,3	190
Piura	100,0	4,4	7,1	25,1	63,4	70,6	81,2	1 551
Puno	100,0	6,5	10,8	25,9	56,8	67,6	71,9	887
San Martín	100,0	0,3	5,2	20,9	73,6	80,2	87,9	674
Tacna	100,0	2,4	5,7	17,7	74,2	81,6	84,6	266
Tumbes	100,0	0,3	6,9	24,8	68,0	73,7	87,1	209
Ucayali	100,0	3,1	5,2	18,4	73,3	81,4	83,7	418
Total 2014	100,0	3,1	5,6	21,1	70,2	76,4	85,0	24 872
Total 2009	100,0	5,8	5,7	19,9	68,6	74,2	82,9	24 212

Nota: Las dos formas de importancia programática son: usar condones y limitar el número de parejas sexuales. Las respuestas provienen tanto de respuestas espontáneas como sondeos.

1/ Mujeres que no han oído hablar de VIH/SIDA o que no conocen las formas de importancia programática.

2/ Incluye ser mutuamente fiel.

3/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

11.2 CONOCIMIENTO DE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL VIH

A las mujeres entrevistadas se les hizo una serie de preguntas sobre asuntos relacionados con el VIH con el propósito de evaluar el grado de conocimiento sobre el tema. Específicamente se les preguntó si una persona que parece saludable puede ser VIH-positiva y si puede ser transmitido de la madre a la hija o hijo y en qué momento.

Aspectos relacionados con el VIH

El 77,8% de mujeres entrevistadas en el año 2014 manifestó que una persona que parece saludable pueda tener el VIH, incrementándose en 3,2 puntos porcentuales con respecto al año 2009 (74,6%). Se advierte que el porcentaje de mujeres que consideraron una posición contraria ha aumentado 2,0 puntos porcentuales, lo que significaría un retroceso en el nivel de conocimiento y percepción que tienen las mujeres sobre el tema. Por otro lado, se constata una mejora entre las mujeres que respondieron “No sabe o no tiene información”, al registrar un porcentaje menor en el año 2014 (7,7%) respecto al año 2009 (12,9%). En efecto en términos comparativos disminuyó en 5,2 puntos porcentuales.

Las mujeres que respondieron en mayor proporción acerca de que una persona que parece saludable pueda tener el VIH, fueron las que alcanzaron educación superior (91,6%), y las ubicadas en el quintil superior de riqueza (91,4%). Por área de residencia, fue mayor en la urbana (83,4%), mientras que por departamento fue la Provincia Constitucional del Callao (86,6%), el departamento de Lima (84,8%) y Tumbes (84,4%).

Son muy preocupantes los datos obtenidos respecto a la transmisión vertical (madre a hija o hijo) del VIH. Al respecto, se constató un importante incremento en el porcentaje de mujeres que desconoce que el virus no se puede transmitir en esta condición, significando un incremento de 6,9 puntos porcentuales respecto al año 2009 que fue 12,1%.

Por otra parte, entre las mujeres que identifican las formas de transmisión del VIH de madre a hija o hijo, un 68,8% mencionó que puede ocurrir durante el embarazo o parto y un 36,4% con la lactancia, habiendo disminuido el grupo que no sabe el mecanismo de transmisión (de 9,6% en el año 2009 a 3,1% en el 2014).

CUADRO N° 11.3
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON EL VIH Y TRANSMISIÓN DEL VIH
DE LA MADRE A LA HIJA O HIJO, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2014
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	Una persona que parece saludable puede tener el VIH			El VIH se puede transmitir de la madre a la hija o hijo				Número de mujeres
	Si	No	No sabe / No conoce	No 1/	Durante el embarazo o parto	Durante la lactancia	No sabe 2/	
Edad								
15-19	78,0	15,3	6,7	21,3	64,2	37,4	3,1	4 311
20-24	80,1	13,3	6,6	15,8	70,5	40,9	2,6	3 739
25-29	79,3	14,8	5,9	16,9	71,4	40,8	2,3	3 664
30-39	78,7	14,2	7,1	18,7	70,1	35,0	2,8	7 040
40-49	74,2	14,9	10,9	20,9	68,0	32,1	4,1	6 118
15-24	79,0	14,4	6,6	18,8	67,2	39,0	2,9	8 050
Estado conyugal								
Soltera	81,3	12,9	5,8	16,7	71,5	37,6	2,7	8 007
Ha tenido RS	83,8	11,5	4,7	13,2	76,2	40,2	1,9	3 623
No ha tenido RS	79,2	14,1	6,7	19,6	67,7	35,5	3,3	4 384
Casada o Conviviente	75,3	15,9	8,8	20,5	66,8	36,0	3,4	14 105
Divorciada/Separada/Viuda	80,3	12,0	7,8	18,1	71,2	35,2	2,7	2 760
Nivel de educación								
Sin educación	38,5	20,8	40,7	59,1	28,0	19,7	29,8	507
Primaria	54,5	23,7	21,7	40,7	43,5	26,9	11,0	4 674
Secundaria	79,3	15,6	5,1	16,4	69,8	37,4	0,8	11 725
Superior	91,6	7,1	1,3	7,5	84,8	41,7	0,1	7 966
Quintil de riqueza								
Quintil inferior	52,9	24,7	22,3	42,0	41,4	29,7	14,2	4 063
Segundo quintil	72,2	18,7	9,1	22,4	63,4	35,6	2,5	4 908
Quintil intermedio	80,6	14,0	5,4	14,8	71,8	39,3	0,8	5 375
Cuarto quintil	85,7	10,8	3,5	12,4	77,3	38,3	0,4	5 394
Quintil superior	91,4	6,9	1,7	8,9	83,7	37,6	0,1	5 132
Total 2014	77,8	14,5	7,7	19,0	68,8	36,4	3,1	24 872
Total 2009	74,6	12,5	12,9	12,1	64,1	37,0	9,6	24 212

1/ Incluye las que respondieron no y no sabe acerca de la transmisión del VIH de la madre a la hija o hijo.

2/ No ha oído hablar de VIH/SIDA.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 11.4
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON EL VIH Y TRANSMISIÓN
DEL VIH DE LA MADRE A LA HIJA O HIJO, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
 (Porcentaje)

Ámbito geográfico	Una persona que parece saludable puede tener el VIH			El VIH se puede transmitir de la madre a la hija o hijo			Número de mujeres	
	Si	No	No sabe / No conoce	No 1/	Durante el embarazo o parto	Durante la lactancia		No sabe 2/
Área de residencia								
Urbana	83,4	12,0	4,6	14,0	74,8	38,0	0,9	19 366
Rural	57,9	23,3	18,8	36,5	47,8	31,0	11,0	5 506
Región natural								
Lima Metropolitana 3/	85,5	11,2	3,3	11,4	78,1	39,7	0,4	8 236
Resto Costa	81,4	12,4	6,2	16,8	70,8	36,5	1,5	6 340
Sierra	66,3	19,6	14,1	29,0	58,2	31,5	7,7	7 272
Selva	76,6	15,8	7,6	20,2	64,8	39,5	2,9	3 024
Departamento								
Amazonas	64,4	23,4	12,3	28,9	59,6	36,7	3,9	316
Áncash	75,6	13,7	10,7	23,7	65,2	36,2	6,2	997
Apurímac	56,2	22,4	21,3	34,2	44,2	39,4	14,0	322
Arequipa	82,4	10,3	7,3	15,1	73,0	33,5	0,8	1 191
Ayacucho	64,0	21,3	14,7	32,4	52,3	35,1	6,1	493
Cajamarca	61,7	20,9	17,5	33,2	56,5	32,9	11,6	1 181
Prov. Const. Del Callao	86,6	10,3	3,1	11,9	78,7	35,7	0,3	897
Cusco	65,7	13,1	21,2	28,8	58,5	32,2	7,8	964
Huancavelica	64,0	25,0	11,0	24,0	56,2	43,5	7,6	297
Huánuco	66,3	20,4	13,3	27,2	54,4	32,9	8,2	573
Ica	83,0	10,8	6,2	16,4	72,1	40,7	0,8	709
Junín	74,0	19,8	6,2	17,1	71,4	34,2	2,1	1 008
La Libertad	80,7	10,1	9,2	19,3	70,8	29,4	3,8	1 524
Lambayeque	81,2	12,4	6,4	17,7	71,4	28,1	1,8	965
Lima	84,8	11,6	3,6	11,8	77,5	39,9	0,5	8 202
Provincia de Lima 4/	85,3	11,3	3,4	11,4	78,0	40,2	0,4	7 349
Lima Provincias 5/	80,6	14,1	5,3	15,5	73,2	37,8	1,9	853
Loreto	79,1	15,7	5,2	21,9	63,8	40,1	2,9	789
Madre de Dios	80,6	12,4	7,0	17,1	74,0	37,7	1,6	112
Moquegua	81,2	11,5	7,3	17,2	74,5	35,4	1,8	137
Pasco	69,5	24,2	6,3	21,5	62,2	30,2	3,1	190
Piura	71,8	19,4	8,8	22,4	62,3	38,2	4,4	1 551
Puno	59,3	28,5	12,2	39,8	48,0	24,3	6,5	887
San Martín	83,1	13,2	3,7	12,4	67,3	46,6	0,3	674
Tacna	84,1	8,2	7,6	24,0	62,0	35,6	2,4	266
Tumbes	84,4	12,8	2,8	19,3	63,5	48,3	0,3	209
Ucayali	80,0	12,6	7,5	18,5	68,7	33,9	3,1	418
Total 2014	77,8	14,5	7,7	19,0	68,8	36,4	3,1	24 872
Total 2009	74,6	12,5	12,9	12,1	64,1	37,0	9,6	24 212

1/ Incluye las que respondieron no y no sabe acerca de la transmisión del VIH de la madre a la hija o hijo.

2/ No ha oído hablar de VIH/SIDA.

3/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Aspectos sociales de la prevención del VIH

Del total de mujeres entrevistadas que conoce del VIH/SIDA, más de la mitad (60,2%) opinó que una maestra o maestro con VIH si puede seguir enseñando (incremento de 6,2 puntos porcentuales respecto al año 2009), representando un avance en este aspecto; sin embargo, una proporción importante de mujeres piensan lo contrario, es decir, que no debe enseñar, y que representan un 33,9% (2,8 puntos porcentuales menos que en la Encuesta 2009).

El despido del trabajo de una persona VIH positiva fue aceptado por el 18,0% de mujeres, lo que significa una disminución importante en comparación al 2009 (31,8%), sin embargo es mayor la diferencia en esos cinco años, en las que opinaron que no debe ser despedida (de 59,1% en el 2009 a 76,3% en el 2014)

Acercas de la opinión de las mujeres que estarían dispuestas a cuidar en el hogar a un pariente con VIH, ha aumentado el porcentaje de 69,4% a 75,3%

La respuesta “No sabe” a cada una de las tres preguntas mencionadas también debe llamar la atención por su relevancia en las acciones que se deben tomar para el futuro. El 5,9% de mujeres no sabía si a una maestra o maestro con VIH se le debe permitir o continuar impartiendo clases en la escuela, colegio o universidad; igualmente, un 5,7% no sabía si una persona VIH-positiva podría ser despedida de su trabajo; y un 6,5% no sabía si cuidaría en el hogar a un pariente que vive con el VIH.

Se observa que la mayoría de mujeres que opinaron que a una maestra o maestro con VIH no se le debe permitir o continuar impartiendo clases en la escuela, colegio o universidad, tenían educación primaria (60,4%), seguidas de las mujeres ubicadas en el quintil inferior de riqueza (59,0%),

El mayor porcentaje de mujeres opinó que una persona con el VIH no puede ser despedida del trabajo, especialmente entre las que alcanzaron educación superior (92,8%) y del quintil superior de riqueza (92,3%).

Asimismo, entre aquellas que manifestaron estarían dispuestas a cuidar a un pariente VIH-positivo en el hogar, mayor porcentaje se presentó en las mujeres con educación superior (83,6%), y las solteras que han tenido relaciones sexuales (82,3%). Por área de residencia, en la urbana (79,8%).

CUADRO N° 11.5
PERÚ: MUJERES POR RESPUESTAS A PREGUNTAS SOBRE CIERTOS ASPECTOS SOCIALES DE
LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL VIRUS, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2014
 (Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Maestra/Maestro con VIH debe seguir enseñando			Persona VIH-positiva puede ser despedida del trabajo			Dispuesta a cuidar pariente con VIH en el hogar			Número de mujeres
	Sí	No	No sabe	Sí	No	No sabe	Sí	No	No sabe	
Edad										
15-19	55,7	38,4	5,9	18,1	76,7	5,1	76,3	17,9	5,8	4 311
20-24	64,9	29,5	5,6	14,6	80,4	5,0	75,0	19,1	5,9	3 739
25-29	61,8	32,0	6,2	16,5	78,8	4,7	74,3	19,5	6,3	3 664
30-39	60,8	33,8	5,4	18,8	75,5	5,7	74,2	19,4	6,4	7 040
40-49	58,7	34,8	6,5	19,9	73,0	7,1	76,7	15,7	7,5	6 118
15-24	60,0	34,3	5,8	16,5	78,4	5,1	75,7	18,4	5,8	8 050
Estado conyugal										
Soltera	66,2	28,4	5,4	13,6	81,9	4,5	80,7	13,6	5,7	8 007
Ha tenido RS	71,6	23,8	4,6	12,0	84,4	3,6	82,3	12,7	5,0	3 623
Nunca ha tenido RS	61,7	32,3	6,1	15,0	79,8	5,3	79,5	14,4	6,2	4 384
Casada o Conviviente	56,3	37,4	6,3	20,6	72,9	6,5	71,9	21,0	7,0	14 105
Divorciada/Separada/Viuda	62,5	32,1	5,4	17,1	77,9	5,0	77,1	17,1	5,8	2 760
Nivel de educación										
Sin educación	13,2	53,9	32,9	39,5	27,7	32,8	44,5	22,3	33,2	507
Primaria	24,9	60,4	14,8	37,3	46,1	16,6	60,7	24,6	14,6	4 674
Secundaria	60,2	35,6	4,1	17,3	79,3	3,4	76,9	19,1	4,1	11 725
Superior	83,7	14,7	1,6	6,2	92,8	1,0	83,6	12,9	3,5	7 966
Quintil de riqueza										
Quintil inferior	23,7	59,0	17,3	39,3	41,9	18,8	54,7	28,0	17,3	4 063
Segundo quintil	47,9	46,0	6,1	25,5	68,6	6,0	73,5	20,4	6,1	4 908
Quintil intermedio	64,5	32,1	3,5	14,0	83,0	3,1	80,1	15,6	4,2	5 375
Cuarto quintil	72,7	24,1	3,2	10,3	87,5	2,3	81,6	15,0	3,3	5 394
Quintil superior	83,1	14,8	2,1	6,3	92,3	1,3	81,9	14,3	3,9	5 132
Total 2014	60,2	33,9	5,9	18,0	76,3	5,7	75,3	18,2	6,5	24 872
Total 2009	54,0	36,7	9,4	31,8	59,1	9,1	69,4	20,2	10,4	24 212

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 11.6
PERÚ: MUJERES POR RESPUESTAS A PREGUNTAS SOBRE CIERTOS ASPECTOS SOCIALES
DE LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL VIRUS, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
(Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Maestra/Maestro con VIH debe seguir enseñando			Persona VIH-positiva puede ser despedida del trabajo			Dispuesta a cuidar pariente con VIH en el hogar			Número de mujeres
	Sí	No	No sabe	Sí	No	No sabe	Sí	No	No sabe	
Área de residencia										
Urbana	68,8	27,5	3,6	12,9	84,1	3,0	79,8	16,1	4,2	19 366
Rural	29,6	56,5	13,9	35,9	48,8	15,2	59,8	25,7	14,5	5 506
Región natural										
Lima Metropolitana 1/	73,7	23,2	3,1	8,5	89,5	2,0	80,5	15,9	3,6	8 236
Resto Costa	64,0	31,5	4,6	15,3	80,5	4,2	79,0	15,9	5,1	6 340
Sierra	44,9	44,8	10,3	27,5	61,4	11,2	66,8	22,0	11,2	7 272
Selva	51,9	42,4	5,7	26,9	67,5	5,6	74,1	20,1	5,8	3 024
Departamento										
Amazonas	43,4	50,1	6,5	33,2	59,2	7,7	72,1	22,3	5,6	316
Áncash	51,2	38,0	10,8	21,9	68,5	9,6	74,4	16,1	9,5	997
Apurímac	29,1	55,3	15,6	42,8	41,0	16,2	65,7	19,4	14,8	322
Arequipa	66,1	28,8	5,2	13,5	82,4	4,1	81,3	14,5	4,2	1 191
Ayacucho	44,5	46,6	8,9	30,9	57,3	11,9	72,0	19,0	9,1	493
Cajamarca	36,1	50,4	13,6	33,6	51,3	15,1	66,3	19,5	14,2	1 181
Prov. Const. Del Callao	71,7	24,7	3,6	9,5	88,3	2,1	79,5	15,4	5,1	897
Cusco	49,7	39,7	10,5	22,3	66,2	11,6	51,5	30,3	18,3	964
Huancavelica	38,9	51,7	9,4	44,1	47,3	8,7	67,7	23,3	9,1	297
Huánuco	44,8	44,0	11,2	26,4	60,8	12,7	66,4	23,3	10,2	573
Ica	65,0	29,6	5,4	13,8	82,8	3,3	80,2	15,8	4,0	709
Junín	53,8	41,9	4,3	22,7	73,4	3,9	76,9	19,5	3,6	1 008
La Libertad	60,2	32,7	7,0	16,0	77,4	6,6	78,1	15,2	6,7	1 524
Lambayeque	63,0	32,0	5,0	14,6	80,6	4,8	78,2	15,4	6,4	965
Lima	72,7	24,1	3,2	9,0	88,8	2,2	80,2	16,2	3,6	8 202
Provincia de Lima 2/	73,9	23,0	3,1	8,3	89,7	2,0	80,6	16,0	3,4	7 349
Lima Provincias 3/	62,1	33,4	4,5	14,4	81,5	4,1	76,6	18,1	5,3	853
Loreto	52,6	42,5	5,0	23,3	72,1	4,6	71,6	23,2	5,2	789
Madre de Dios	55,3	40,6	4,1	25,4	70,2	4,4	76,3	19,5	4,2	112
Moquegua	65,3	27,1	7,6	14,7	78,5	6,8	78,3	14,5	7,2	137
Pasco	48,0	47,7	4,3	27,7	68,0	4,3	74,1	22,2	3,7	190
Piura	54,2	39,8	6,0	21,7	71,3	7,0	72,3	19,6	8,1	1 551
Puno	39,6	52,4	8,0	34,4	54,2	11,4	60,2	29,7	10,1	887
San Martín	50,9	45,4	3,7	26,8	69,0	4,2	78,1	18,6	3,2	674
Tacna	65,7	27,1	7,2	16,0	79,1	4,9	76,6	15,7	7,7	266
Tumbes	69,9	26,8	3,3	15,5	82,2	2,2	81,9	14,7	3,4	209
Ucayali	69,8	25,2	5,0	21,9	73,4	4,7	81,0	12,6	6,3	418
Total 2014	60,2	33,9	5,9	18,0	76,3	5,7	75,3	18,2	6,5	24 872
Total 2009	54,0	36,7	9,4	31,8	59,1	9,1	69,4	20,2	10,4	24 212

1/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

2/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

3/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Hurochiri, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


11.3 CONOCIMIENTO DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

Los programas de control de VIH reconocen, en la actualidad, la importancia de controlar las ITS para reducir la transmisión del virus. Se reconoce que entre los esfuerzos necesarios, uno de los más importantes es la educación para que la población reconozca los síntomas de las ITS. Asimismo, poco se sabe sobre cómo las personas perciben y responden a las ITS. Por esta razón en la Encuesta 2014, se preguntó a las entrevistadas si habían oído hablar de otras enfermedades que se pueden transmitir a través de las relaciones sexuales; cuáles son las enfermedades que conocía; y qué síntomas y signos pueden hacer parecer que una mujer o un hombre tenía una infección de transmisión sexual.

Conocimiento de las ITS

El conocimiento sobre las ITS fue 65,0% en la Encuesta 2014, produciéndose un aumento de 3,0 puntos porcentuales en relación a la encuesta 2009 (62,0%), pero si consideramos que el 35,0% de las mujeres entrevistadas declaró desconocer lo que estas significan, entonces se debe reconocer que existe un grave problema por las importantes implicancias económicas y sociales que su alta morbilidad representa. Que más de la tercera parte de la población entrevistada no conozca de las ITS implica un riesgo potencial de adquirirlas, y esto incluye la posibilidad de padecer secuelas y complicaciones importantes de no atenderlas a tiempo.

El mayor desconocimiento de las ITS se presentó entre las mujeres sin educación (79,5%), así como en las mujeres ubicadas en el quintil inferior (67,6%). Por área de residencia, fue mayor en el área rural (63,6%), y por departamento, Pasco (66,6%), Cajamarca (63,6%) y Huancavelica (61,8%), presentaron los mayores porcentajes.



Un 19,3% de las mujeres entrevistadas no conocía síntomas de las ITS (0,2 puntos porcentuales más que en el 2009), 16,7% conocía un síntoma y 29,0% dos o más síntomas.

En comparación con encuestas anteriores, las mujeres que conocen ITS específicas como la gonorrea disminuyeron de 43,6% en el 2009 a 40,6% en el 2014. Por el contrario, hubo un aumento en el porcentaje de mujeres que conocen sífilis, de 44,6% a 47,0%, al igual que las verrugas genitales/condiloma ya que de 3,2% en el año 2009 pasó a 6,0% en el año 2014.

La sífilis fue la enfermedad más reconocida por las mujeres con nivel de educación superior (62,0%) y el quintil superior de riqueza (59,6%). Por área de residencia fue mayor en la urbana (49,9%) y, por departamento en Ica (56,8%) y el departamento de Lima (52,5%).

La gonorrea fue más conocida en mujeres con educación superior (52,0%) y las solteras que han tenido relaciones sexuales (47,6%). Por área de residencia fue mayor en la urbana (41,8%) y, por departamento fue en Loreto (67,7%) y Ucayali (60,2%).

El chancro fue más conocido en mujeres con educación superior (25,9%) y en mujeres de 25 a 29 años de edad (22,6%). Por área de residencia fueron muy similares 20,2% en la urbana y 20,1% en la rural y por departamento en Junín (43,0%) y Huancavelica (37,0%).

CUADRO N° 11.7
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS ESPECÍFICOS DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y MUJERES QUE CONOCEN ITS ESPECÍFICAS, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2014
(Porcentaje)

Característica seleccionada	Total	Síntomas específicos de las ITS			Número de mujeres	Conoce ITS específicas						Número de mujeres que conocen síntomas	
		No conoce sobre las ITS	No conoce síntomas de ITS	Conoce un síntoma		Conoce dos o más síntomas	Sífilis	Gonorrea	Verrugas genitales/Condiloma	Chancro	Herpes		Otras ITS 1/
Edad													
15-19	100,0	43,9	22,3	16,0	17,8	4 311	32,5	34,2	6,1	12,5	19,7	11,6	2 420
20-24	100,0	32,6	19,8	17,3	30,4	3 739	45,3	42,8	5,6	18,5	16,4	14,1	2 521
25-29	100,0	29,6	17,0	17,4	36,1	3 664	54,2	46,9	6,0	22,6	17,1	14,2	2 580
30-39	100,0	33,3	18,0	17,2	31,5	7 040	53,1	41,9	6,6	21,8	12,8	14,0	4 693
40-49	100,0	35,2	19,9	15,7	29,2	6 118	45,1	37,4	5,3	22,5	8,5	15,6	3 963
15-24	100,0	38,6	21,1	16,6	23,6	8 050	39,0	38,6	5,9	15,6	18,0	12,9	4 941
Estado conyugal													
Soltera	100,0	32,3	20,2	18,4	29,1	8 007	43,5	43,0	7,0	18,7	21,5	14,3	5 421
Ha tenido RS	100,0	23,5	17,9	19,7	38,9	3 623	48,7	47,6	8,4	22,4	20,5	16,4	2 774
Nunca ha tenido RS	100,0	39,6	22,2	17,3	20,9	4 384	38,1	38,2	5,6	14,8	22,5	12,1	2 648
Casada o Conviviente	100,0	37,8	18,7	15,6	27,9	14 105	48,7	39,4	5,1	20,9	9,7	13,6	8 771
Divorciada/Separada/Viuda	100,0	28,1	20,1	16,9	34,9	2 760	49,2	39,5	7,0	21,4	12,8	15,6	1 985
Nivel de educación													
Sin educación	100,0	79,5	9,9	5,8	4,8	507	10,1	10,1	3,0	10,9	2,0	12,7	104
Primaria	100,0	67,1	16,5	6,8	9,6	4 674	14,0	19,7	3,1	14,1	3,0	10,7	1 539
Secundaria	100,0	36,9	22,4	17,5	23,1	11 725	40,0	34,3	5,3	16,1	12,1	12,7	7 393
Superior	100,0	10,4	17,1	21,8	50,7	7 966	62,0	52,0	7,3	25,9	18,5	16,3	7 141
Quintil de riqueza													
Quintil inferior	100,0	67,6	15,1	7,2	10,1	4 063	18,9	29,1	2,5	19,5	3,3	9,6	1 317
Segundo quintil	100,0	46,0	20,2	14,3	19,5	4 908	35,4	35,4	5,0	18,2	8,7	9,4	2 651
Quintil intermedio	100,0	32,8	20,3	17,6	29,2	5 375	45,1	39,1	5,5	20,3	12,7	12,9	3 609
Cuarto quintil	100,0	23,7	20,4	20,1	35,8	5 394	51,5	42,4	6,5	21,4	16,3	14,6	4 117
Quintil superior	100,0	12,6	19,7	21,7	45,9	5 132	59,6	46,6	7,4	20,5	19,2	18,6	4 483
Total 2014	100,0	35,0	19,3	16,7	29,0	24 872	47,0	40,6	6,0	20,2	14,0	14,1	16 177
Total 2009	100,0	38,0	19,1	16,6	26,3	24 212	44,6	43,6	3,2	19,7	nd	40,1	15 015

nd= No disponible.

1/ A partir del año 2010, se excluye Herpes.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 11.8
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS ESPECÍFICOS DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN
SEXUAL (ITS) Y MUJERES QUE CONOCEN ITS ESPECÍFICAS, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
 (Porcentaje)

Ámbito geográfico	Total	No conoce sobre las ITS	Síntomas específicos de las ITS			Número de mujeres	Conoce ITS específicas						Número de mujeres que conocen síntomas
			No conoce síntomas de ITS	Conoce un síntoma	Conoce dos o más síntomas		Sífilis	Gonoreya	Verrugas genitales/ Condiloma	Chan-cro	Herpes	Otras ITS 1/	
Área de residencia													
Urbana	100,0	26,8	20,3	19,0	33,8	19 366	49,9	41,8	6,4	20,2	15,3	14,7	14 172
Rural	100,0	63,6	15,9	8,3	12,3	5 506	26,8	32,0	2,8	20,1	4,9	9,3	2 005
Región natural													
Lima Metropolitana 2/	100,0	22,3	19,7	20,3	37,6	8 236	52,9	37,8	7,4	19,3	18,2	18,4	6 397
Resto Costa	100,0	35,1	21,5	17,0	26,5	6 340	45,7	41,0	5,7	14,0	13,0	12,3	4 117
Sierra	100,0	51,3	16,5	12,2	20,0	7 272	41,9	35,8	3,6	24,9	11,7	11,5	3 541
Selva	100,0	29,8	20,7	16,6	32,9	3 024	40,4	56,2	5,9	26,9	7,3	8,6	2 123
Departamento													
Amazonas	100,0	42,3	23,2	13,4	21,2	316	31,0	35,3	3,5	28,1	8,5	6,1	183
Áncash	100,0	44,6	16,8	15,5	23,2	997	36,0	30,7	5,2	12,9	9,7	15,9	552
Apurímac	100,0	55,7	21,7	11,6	11,0	322	23,2	21,2	2,2	21,1	6,2	28,6	143
Arequipa	100,0	26,8	22,1	19,3	31,8	1 191	47,2	40,3	3,3	22,4	15,9	15,2	872
Ayacucho	100,0	52,6	17,7	11,6	18,1	493	42,8	37,8	6,5	28,4	7,9	17,0	233
Cajamarca	100,0	63,6	12,1	9,2	15,0	1 181	39,8	40,7	3,1	24,5	11,5	6,8	429
Prov. Const. Del Callao	100,0	25,8	18,3	19,7	36,1	897	52,3	36,5	4,5	16,9	15,4	17,8	665
Cusco	100,0	50,8	19,6	10,1	19,5	964	48,0	35,8	3,2	26,2	11,9	10,8	474
Huancavelica	100,0	61,8	12,5	11,0	14,7	297	39,1	33,7	12,5	37,0	15,5	3,3	113
Huánuco	100,0	41,1	19,3	15,7	23,9	573	44,3	42,3	4,6	31,1	9,4	18,3	338
Ica	100,0	26,4	20,3	20,1	33,2	709	44,3	39,3	5,7	18,1	10,7	14,2	522
Junín	100,0	36,9	14,4	18,2	30,5	1 008	56,8	46,9	2,2	43,0	13,9	7,9	637
La Libertad	100,0	32,9	25,4	15,2	26,5	1 524	47,7	43,4	8,0	14,6	14,1	11,5	1 023
Lambayeque	100,0	41,4	23,1	16,1	19,4	965	47,5	43,9	2,6	11,6	16,6	6,0	565
Lima	100,0	23,6	20,0	20,1	36,4	8 202	52,5	37,9	7,5	19,1	17,9	18,3	6 268
Provincia de Lima 3/	100,0	21,9	19,9	20,4	37,8	7 349	52,9	37,9	7,7	19,6	18,5	18,5	5 739
Lima Provincias 4/	100,0	38,0	20,5	17,2	24,3	853	47,0	37,9	5,3	14,1	11,7	16,3	529
Loreto	100,0	30,5	20,1	20,8	28,5	789	40,8	67,7	12,8	26,1	7,0	6,8	548
Madre de Dios	100,0	31,2	25,5	18,6	24,8	112	42,0	39,1	6,8	26,3	10,3	6,8	77
Moquegua	100,0	25,3	23,3	18,9	32,5	137	50,2	35,6	4,8	19,7	13,2	10,8	103
Pasco	100,0	66,6	7,1	9,6	16,7	190	46,2	39,0	2,6	30,7	9,2	1,7	64
Piura	100,0	49,5	14,8	14,1	21,6	1 551	40,4	40,2	6,0	9,3	11,1	11,6	783
Puno	100,0	60,8	17,1	6,7	15,3	887	29,9	25,7	3,5	18,4	8,2	6,6	347
San Martín	100,0	10,0	22,2	18,0	49,8	674	32,3	55,9	2,9	21,0	5,8	8,9	606
Tacna	100,0	41,3	19,6	14,6	24,5	266	39,0	36,8	2,8	15,0	13,4	15,0	156
Tumbes	100,0	37,9	23,5	16,6	22,0	209	38,9	39,6	4,9	13,4	7,3	2,2	130
Ucayali	100,0	17,1	25,0	12,7	45,2	418	47,9	60,2	3,7	21,2	7,0	8,3	346
Total 2014	100,0	35,0	19,3	16,7	29,0	24 872	47,0	40,6	6,0	20,2	14,0	14,1	16 177
Total 2009	100,0	38,0	19,1	16,6	26,3	24 212	44,6	43,6	3,2	19,7	nd	40,1	15 015

nd= No disponible.

1/ A partir del año 2010, se excluye Herpes.

2/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

3/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

4/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Síntomas y signos de las ITS

En cuanto a los síntomas y signos específicos que las mujeres entrevistadas con conocimiento de ITS manifestaron, la mayoría refirió que eran el enrojecimiento/picazón en genitales (29,6%), seguido de úlceras/llagas genitales (20,9%), pérdida de peso (19,4%), inflamación o hinchazón en genitales (18,8%), secreción mal oliente (16,4%) y secreción por genital (14,5%).

En relación al enrojecimiento/picazón en genitales, la mayor proporción por característica seleccionada fue entre las mujeres con educación superior (36,3%) y ubicadas en el quintil superior de riqueza (35,6%). Por área de residencia, fueron más altos en el área urbana (30,8%), y por departamento, en San Martín (41,1%), Ica (35,6%) y Pasco (33,5%).

Las úlceras/llagas genitales fueron referidas en mayor porcentaje por característica seleccionada entre las mujeres con educación superior (28,5%) y las ubicadas en el quintil superior de riqueza (27,2%). Por área de residencia, las residentes en el área urbana (22,3%), y por departamento en Piura (31,1%), y Junín (26,1%).

La inflamación o hinchazón en genitales por característica seleccionada, fue manifestada más por mujeres con educación superior (23,2%) y ubicadas en el quintil superior de riqueza (22,1%). Por área de residencia en el área urbana (19,1%) y por departamento en San Martín (40,4%).

Aunque no se especifica cuáles son, el 17,2% de las mujeres con conocimiento de las ITS refirió que identifican “otros síntomas”.

Llama la atención que un síntoma evidente como es la secreción o pus por el pene solo fue reconocido en un 4,3% para el año 2014, cuando en el 2009 fue de 6,8%. Las verrugas genitales se identificó como probable ITS por solo el 9,7% de mujeres entrevistadas.

CUADRO N° 11.9
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS Y SIGNOS ESPECÍFICOS DE LAS INFECCIONES
DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS), SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2014
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	Síntomas y signos de las infecciones de transmisión sexual (ITS)														Número de mujeres
	Dolor abdominal	Secreción por genital 1/	Secreción maloliente	Molestia al orinar	Enrojecimiento/Picazón en genitales	Inflamación o hinchazón en genitales	Úlceras/Llagas genitales	Verrugas genitales	Sangre en la orina	Pérdida de peso	Puede no haber síntomas	Impotencia/Infertilidad	Secreción o pus por el pene	Otros síntomas	
Grupo de edad															
15-19	6,7	6,6	7,7	8,6	20,8	13,2	16,6	9,0	2,7	20,1	1,0	0,3	2,9	15,2	2 420
20-24	8,0	13,1	16,3	13,3	29,8	18,7	21,6	9,7	4,0	19,2	1,7	0,3	3,7	17,4	2 521
25-29	8,4	17,4	19,5	12,9	32,2	19,6	26,8	12,6	3,8	20,6	1,6	0,6	4,4	20,0	2 580
30-39	7,4	15,8	17,9	12,5	32,0	19,9	20,8	10,2	2,5	19,1	2,0	0,5	4,6	17,7	4 693
40-49	6,3	16,8	17,9	10,3	30,2	20,6	19,5	7,7	2,8	18,6	1,4	0,5	5,1	16,0	3 963
15-24	7,3	9,9	12,1	11,0	25,4	16,0	19,1	9,3	3,4	19,6	1,4	0,3	3,3	16,3	4 941
Estado conyugal															
Soltera	7,5	11,6	14,7	10,9	28,6	17,2	21,9	10,9	3,4	20,8	1,6	0,4	3,5	18,3	5 421
Ha tenido RS	8,3	16,0	20,2	13,5	33,9	19,7	25,0	12,6	3,8	19,3	2,1	0,3	4,3	17,5	2 774
Nunca ha tenido RS	6,7	7,0	9,0	8,1	22,9	14,6	18,8	9,3	2,9	22,5	1,2	0,5	2,6	19,0	2 648
Casada o Conviviente	7,4	15,5	16,6	11,7	29,5	19,7	20,3	8,8	3,0	18,5	1,6	0,5	4,7	17,0	8 771
Divorciada/Separada/Viuda	6,1	18,2	19,7	13,1	32,6	19,2	20,9	10,3	2,2	19,2	1,3	0,2	4,8	15,6	1 985
Nivel de educación															
Sin educación	9,6	5,9	4,3	6,4	12,5	13,3	6,6	1,1	1,7	16,2	1,3	0,0	2,3	9,3	104
Primaria	8,0	10,1	9,7	8,6	17,5	14,7	8,0	2,9	1,7	13,4	1,4	0,3	4,7	13,3	1 539
Secundaria	6,2	11,2	12,0	9,7	25,9	15,5	16,6	7,8	2,6	18,7	1,2	0,4	3,9	16,1	7 393
Superior	8,3	19,1	22,5	14,2	36,3	23,2	28,5	13,3	3,7	21,4	2,1	0,5	4,6	19,3	7 141
Quintil de riqueza															
Quintil inferior	8,0	11,8	10,7	12,3	18,7	16,2	8,4	2,3	1,6	13,4	1,8	0,6	5,8	12,4	1 317
Segundo quintil	7,4	12,8	13,2	10,7	22,9	14,4	14,8	6,2	2,6	18,3	1,6	0,4	4,6	15,4	2 651
Quintil intermedio	7,6	14,8	16,4	11,0	27,9	17,9	19,7	8,8	3,0	20,2	1,4	0,5	3,9	17,4	3 609
Cuarto quintil	7,5	14,1	17,1	11,9	32,3	19,7	23,2	10,8	2,8	20,5	1,4	0,4	4,0	18,7	4 117
Quintil superior	6,6	16,5	19,3	12,0	35,6	22,1	27,2	13,7	4,0	20,2	1,8	0,5	4,2	18,2	4 483
Total 2014	7,3	14,5	16,4	11,6	29,6	18,8	20,9	9,7	3,0	19,4	1,6	0,5	4,3	17,2	16 177
Total 2009	5,6	18,6	15,8	11,6	31,1	19,2	20,0	6,6	1,8	15,4	1,9	0,6	6,8	24,8	15 015

1/ A partir del año 2004 en la variable secreción por genital incluye secreción de flujo por la vagina y secreción/goteos en genitales.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 11.10
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS Y SIGNOS ESPECÍFICOS DE LAS INFECCIONES
DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS), SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
 (Porcentaje)

Ámbito geográfico	Síntomas y signos de las infecciones de transmisión sexual (ITS)														Número de mujeres
	Dolor abdominal	Secreción por genital 1/	Secreción mal oliente	Molestia al orinar	Enrojecimiento/Picazón en genitales	Inflamación o hinchazón en genitales	Úlceras/Llagas genitales	Verrugas genitales	Sangre en la orina	Pérdida de peso	Puede no haber síntomas	Impotencia/Infertilidad	Secreción o pus por el pene	Otros síntomas	
Área de residencia															
Urbana	7,2	15,0	17,0	11,6	30,8	19,1	22,3	10,5	3,2	20,0	1,6	0,5	4,3	18,0	14 172
Rural	8,1	11,3	12,2	11,4	21,3	16,8	11,0	4,3	1,9	15,4	1,4	0,4	4,6	12,1	2 005
Región natural															
Lima Metropolitana 2/	7,3	12,4	16,0	10,9	32,0	20,5	23,1	13,2	3,8	22,3	1,4	0,5	3,8	20,4	6 397
Resto Costa	5,5	13,6	14,4	9,6	29,9	16,5	22,4	8,4	2,9	17,5	1,2	0,2	3,2	17,4	4 117
Sierra	8,0	16,0	18,1	11,6	24,8	15,8	18,1	7,4	2,6	19,8	2,1	0,7	1,8	13,2	3 541
Selva	9,4	20,2	18,5	17,3	29,8	23,4	16,2	5,6	1,8	13,6	2,0	0,4	12,1	14,3	2 123
Departamento															
Amazonas	8,0	17,5	15,8	8,6	22,9	14,1	16,8	3,4	1,9	17,8	1,6	1,0	2,8	20,4	183
Áncash	10,6	16,2	13,6	10,6	31,7	20,9	16,0	6,0	2,7	19,1	0,3	0,3	2,1	20,5	552
Apurímac	8,3	7,3	9,1	7,8	15,9	7,0	11,5	6,5	1,4	16,9	2,1	0,0	0,4	14,7	143
Arequipa	6,5	18,4	18,4	12,1	28,9	16,2	22,9	10,7	3,0	16,5	2,5	0,3	2,3	11,8	872
Ayacucho	6,7	15,4	21,2	12,6	22,6	14,6	18,6	6,5	1,6	21,4	1,0	0,2	1,7	14,5	233
Cajamarca	10,7	18,6	18,3	12,5	26,2	19,5	18,2	2,8	2,7	18,9	0,3	0,3	2,6	20,3	429
Prov. Const. Del Callao	8,4	13,4	14,6	10,6	31,4	21,1	21,7	11,5	3,6	24,5	1,0	0,4	5,0	22,7	665
Cusco	11,3	13,5	19,9	11,0	21,5	12,6	14,9	8,5	2,1	19,8	1,9	0,9	1,8	18,2	474
Huancavelica	7,8	19,6	14,2	15,5	18,4	12,3	8,7	8,9	5,1	36,3	2,3	1,8	2,1	12,6	113
Huánuco	5,1	11,3	18,4	7,5	30,7	21,3	20,5	3,6	0,0	17,8	3,8	0,8	3,3	4,5	338
Ica	4,9	14,0	15,7	13,5	35,6	16,3	21,6	16,3	1,2	16,0	3,4	0,4	8,5	14,8	522
Junín	7,2	16,3	16,9	7,3	28,9	17,4	26,1	10,8	2,5	21,6	1,7	1,1	1,1	11,4	637
La Libertad	6,2	13,1	15,5	10,4	28,5	15,7	20,5	8,5	5,0	15,3	0,4	0,1	1,8	15,8	1 023
Lambayeque	3,5	8,2	7,9	6,6	28,1	15,4	20,4	4,4	0,5	19,5	1,1	0,1	3,3	16,4	565
Lima	7,1	12,1	15,7	10,9	31,5	20,2	22,9	13,0	3,9	21,9	1,5	0,5	3,7	20,1	6 268
Provincia de Lima 3/	7,2	12,2	16,2	11,0	32,0	20,4	23,3	13,4	3,8	22,0	1,5	0,5	3,6	20,1	5 739
Lima Provincias 4/	6,6	10,2	10,8	10,7	25,4	17,4	18,6	9,3	4,1	20,8	1,8	0,2	4,2	20,3	529
Loreto	9,3	23,3	13,8	18,5	22,9	18,2	16,1	5,2	2,0	15,3	1,2	0,2	20,3	19,1	548
Madre de Dios	6,3	13,8	18,7	10,0	20,4	10,0	17,1	11,0	1,2	14,3	0,6	1,6	5,6	0,7	77
Moquegua	5,0	19,5	26,6	11,9	29,6	13,5	14,4	6,7	1,9	15,6	2,8	0,2	1,0	14,5	103
Pasco	8,7	16,6	13,4	16,4	33,5	18,0	19,4	8,2	2,4	25,7	2,4	0,0	2,6	10,8	64
Piura	4,6	16,5	16,9	6,6	28,3	15,0	31,1	4,0	2,7	19,6	0,4	0,2	1,3	18,8	783
Puno	6,1	14,9	23,0	20,1	19,7	12,7	8,2	4,5	4,6	21,6	3,1	1,6	3,2	5,8	347
San Martín	10,1	15,3	21,0	20,1	41,1	40,4	13,6	4,5	2,1	8,7	2,8	0,2	11,8	13,9	606
Tacna	4,0	15,4	13,8	10,9	30,7	16,5	19,9	14,6	0,9	8,2	2,0	0,3	2,5	20,5	156
Tumbes	3,8	15,6	14,0	9,0	21,8	16,5	22,2	4,0	1,3	18,4	2,6	0,4	3,1	9,3	130
Ucayali	12,1	36,1	26,2	24,0	27,1	15,7	15,5	7,9	1,1	10,0	2,8	0,5	14,2	11,7	346
Total 2014	7,3	14,5	16,4	11,6	29,6	18,8	20,9	9,7	3,0	19,4	1,6	0,5	4,3	17,2	16 177
Total 2009	5,6	18,6	15,8	11,6	31,1	19,2	20,0	6,6	1,8	15,4	1,9	0,6	6,8	24,8	15 015

1/ A partir del año 2004 en la variable secreción por genital incluye secreción de flujo por la vagina y secreción/goteos en genitales.

2/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

3/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

4/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Hualar, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

11.4 PREVALENCIA DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

A las mujeres entrevistadas se les hizo una serie de preguntas para disponer de información que facilite la estimación de la prevalencia de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). En particular, a cada mujer entrevistada se le preguntó si en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista le diagnosticaron alguna infección de transmisión sexual, si había tenido algún flujo o secreción genital, si había tenido llaga o úlceras en sus genitales y, a las que tuvieron alguno de esos problemas se les preguntó a quién acudió en búsqueda de consejo o tratamiento.

Prevalencia de ITS

Entre las mujeres entrevistadas que respondieron haber mantenido relaciones sexuales, un 0,7% informó haber tenido una ITS y/o síntomas asociados en los 12 meses anteriores a la entrevista. En el año 2009 fue 0,6%.

Según características de las mujeres que respondieron haber padecido una ITS, el mayor porcentaje aparece en las divorciadas/separadas/viudas (1,1%), así como las de 15 a 19 años de edad y del segundo quintil de riqueza (1,0%, en ambos casos).

Los departamentos, que registraron los porcentajes mas altos de mujeres con episodios de ITS fueron: Ucayali (1,7%) y Junín (1,5%).

El 13,2% de mujeres declaró tener una ITS o flujo vaginal o úlceras/ llagas genitales, la proporción se ha reducido en 0,7 puntos porcentuales, respecto al año 2009 (13,9%). El mayor porcentaje fue declarado por mujeres divorciadas/separadas/viudas (15,4%) y del quintil intermedio de riqueza (15,2%). Por área de residencia, fue mayor en la urbana (14,0%), y por departamento, en Ayacucho (22,2%), Arequipa (20,3%) y Áncash (19,7%).

CUADRO N° 11.11
PERÚ: MUJERES POR PREVALENCIA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y SÍNTOMAS DE ITS EN
LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2014
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	Informó ITS o síntoma			Porcentaje de mujeres con una ITS o flujo vaginal o úlceras/llagas	Número de mujeres
	Porcentaje con una ITS	Porcentaje con flujo vaginal	Úlceras/llagas genitales		
Edad					
15-19	1,0	12,3	2,0	14,1	1 326
20-24	0,7	12,1	1,6	13,6	2 927
25-29	0,8	12,5	1,6	14,0	3 422
30-39	0,8	11,8	2,1	13,7	6 837
40-49	0,5	10,2	2,0	11,8	5 977
15-24	0,8	12,1	1,7	13,7	4 253
Estado conyugal					
Soltera	0,9	11,5	1,1	12,9	3 623
Casada o Conviviente	0,6	11,2	2,0	12,8	14 105
Divorciada/Separada/Viuda	1,1	12,9	2,4	15,4	2 760
Nivel de educación					
Sin educación	0,2	7,3	2,7	9,0	489
Primaria	0,5	10,6	2,4	12,4	4 391
Secundaria	0,7	12,4	2,2	14,2	8 842
Superior	0,8	11,2	1,2	12,6	6 766
Quintil de riqueza					
Quintil inferior	0,3	9,3	1,3	10,1	3 397
Segundo quintil	1,0	11,4	2,2	13,5	4 127
Quintil intermedio	0,7	13,1	2,5	15,2	4 453
Cuarto quintil	0,6	11,6	1,8	13,1	4 399
Quintil superior	0,9	11,6	1,6	13,3	4 112
Total 2014	0,7	11,5	1,9	13,2	20 488
Total 2009	0,6	12,8	2,1	13,9	19 310

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 11.12
PERÚ: MUJERES POR PREVALENCIA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y SÍNTOMAS DE ITS EN
LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
 (Porcentaje)


Ámbito geográfico	Informó ITS o síntoma			Porcentaje de mujeres con una ITS o flujo vaginal o úlceras/lagas	Número de mujeres
	Porcentaje con una ITS	Porcentaje con flujo vaginal	Úlceras/lagas genitales		
Área de residencia					
Urbana	0,8	12,1	2,0	14,0	15 830
Rural	0,3	9,4	1,7	10,5	4 658
Región natural					
Lima Metropolitana 1/	0,7	13,2	2,2	15,2	6 761
Resto Costa	0,6	9,3	2,1	11,0	5 136
Sierra	0,7	13,1	2,0	14,7	5 888
Selva	0,8	8,0	0,8	9,1	2 704
Departamento					
Amazonas	0,2	7,3	0,9	7,7	280
Áncash	0,7	17,4	3,6	19,7	817
Apurímac	0,3	14,3	3,3	15,9	261
Arequipa	0,9	18,5	3,0	20,3	937
Ayacucho	0,8	19,9	3,7	22,2	418
Cajamarca	0,2	8,0	1,2	8,8	968
Prov. Const. Del Callao	0,5	10,6	2,2	12,2	737
Cusco	1,3	16,4	1,6	18,4	782
Huancavelica	1,0	14,3	1,8	15,8	240
Huánuco	0,5	7,7	1,5	9,2	475
Ica	0,3	4,1	0,4	4,5	575
Junín	1,5	10,9	1,2	12,8	828
La Libertad	0,7	10,3	2,4	12,3	1 218
Lambayeque	0,7	6,6	2,1	8,4	734
Lima	0,7	13,3	2,2	15,4	6 771
Provincia de Lima 2/	0,8	13,5	2,2	15,5	6 032
Lima Provincias 3/	0,3	11,9	2,9	14,1	739
Loreto	0,3	5,7	0,2	6,1	716
Madre de Dios	0,8	14,1	2,4	16,0	101
Moquegua	1,5	11,4	3,3	14,7	118
Pasco	0,1	10,1	0,6	10,4	158
Piura	0,2	6,9	1,2	7,9	1 270
Puno	0,4	8,6	1,9	10,1	698
San Martín	1,1	9,7	0,4	11,0	613
Tacna	1,0	11,3	1,7	12,8	218
Tumbes	0,7	10,0	1,8	11,6	177
Ucayali	1,7	6,2	0,7	8,3	377
Total 2014	0,7	11,5	1,9	13,2	20 488
Total 2009	0,6	12,8	2,1	13,9	19 310

1/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

2/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

3/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.



Fuente de consejo o tratamiento de las ITS

Entre las mujeres que tuvieron una ITS en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista, el 69,0% buscó consejo o tratamiento por un médico y un 82,1% recibió de cualquier fuente en comparación con un 11,1% que no recibió ni consejo ni tratamiento y un 3,5% se autorecetó, es decir, utilizó medicamentos por su cuenta. Otras fuentes mencionadas fueron los curanderos (5,2%) y las farmacias/boticas (27,1%).

Las entrevistadas que en mayor porcentaje consultaron a un médico fueron las mujeres ubicadas en el quintil superior de riqueza (74,3%), seguido de las mujeres entre 30 y 39 años de edad (74,2%) y con educación superior (73,5%). Por área de residencia fue mayor en el área urbana 69,5%.

Al curandero fueron, mayormente, mujeres sin educación y con educación primaria (21,1% y 13,3%, respectivamente), y del quintil inferior de riqueza (10,8%). Por área de residencia, las mujeres del área rural (8,9%) y por departamento, en la Provincia Constitucional del Callao (16,3%), San Martín (13,7%) y Madre de Dios (13,2%).

A la farmacia/botica acudieron más las mujeres del quintil intermedio de riqueza (34,0%) y sin educación (33,3%). Por área de residencia, el mayor porcentaje estuvo en la urbana (27,7%) y por departamento en Madre de Dios (46,3%), San Martín (37,1%) y Huancavelica (34,4%).

CUADRO N° 11.13
PERÚ: MUJERES QUE RECIBIERON CONSEJO O TRATAMIENTO PARA UNA ITS, POR FUENTE
DE TRATAMIENTO, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2014
 (Porcentaje)

Característica seleccionada	Fuente de tratamiento de ITS 1/					Se auto-recetó	Ni consejo ni tratamiento	Número de mujeres con una ITS 2/
	Médico	Curandero	Farmacia / Botica	Consejo o tratamiento de cualquier fuente	Consejo o tratamiento de amigos o familiares			
Edad								
15-19	56,9	2,7	25,6	70,9	9,5	1,6	18,0	186
20-24	65,2	3,6	30,4	80,9	4,0	3,5	11,6	398
25-29	67,0	3,3	26,5	79,8	3,1	5,3	11,8	478
30-39	74,2	5,4	25,3	84,2	3,3	3,5	9,1	934
40-49	68,8	7,6	28,2	84,5	1,3	2,9	11,3	705
15-24	62,5	3,3	28,8	77,7	5,8	2,9	13,6	585
Estado conyugal								
Soltera	59,7	2,2	30,1	76,5	6,7	4,3	12,5	467
Casada o Conviviente	71,7	6,1	25,6	83,2	2,2	3,7	11,0	1 811
Divorciada/Separada/Viuda	67,8	4,5	29,8	83,5	4,1	2,1	10,3	424
Nivel de educación								
Sin educación	49,1	21,1	33,3	75,8	6,8	4,4	13,0	44
Primaria	67,6	13,3	29,6	82,4	2,4	4,6	10,6	543
Secundaria	67,3	3,8	30,6	81,3	3,8	3,2	11,7	1 260
Superior	73,5	1,2	19,9	83,4	3,0	3,2	10,4	855
Quintil de riqueza								
Quintil inferior	63,0	10,8	25,0	72,8	6,6	6,6	14,0	343
Segundo quintil	71,4	8,1	23,0	81,4	3,6	4,3	10,6	556
Quintil intermedio	63,4	5,9	34,0	81,7	3,0	4,2	11,1	676
Cuarto quintil	71,7	2,7	28,7	84,7	1,5	2,0	11,8	578
Quintil superior	74,3	0,3	22,1	86,3	3,1	1,5	9,2	549
Total 2014	69,0	5,2	27,1	82,1	3,3	3,5	11,1	2 702
Total 2009	65,8	6,1	17,9	76,5	3,1	6,6	13,7	2 796

1/ Las entrevistadas podían informar más de una fuente de tratamiento.

2/ Incluye las mujeres que informaron tener una ITS o flujo vaginal o llagas/granos genitales, en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 11.14
PERÚ: MUJERES QUE RECIBIERON CONSEJO O TRATAMIENTO PARA UNA ITS, POR FUENTE
DE TRATAMIENTO, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
 (Porcentaje)

Ámbito geográfico	Fuente de tratamiento de ITS 1/				Consejo o tratamiento de amigos o familiares	Se auto-recetó	Ni consejo ni tratamiento	Número de mujeres con una ITS 2/
	Médico	Curandero	Farmacia / Botica	Consejo o tratamiento de cualquier fuente				
Área de residencia								
Urbana	69,5	4,3	27,7	83,5	2,8	3,0	10,6	2 211
Rural	66,8	8,9	24,2	75,6	5,3	5,9	13,2	491
Región natural								
Lima Metropolitana 3/	71,8	2,6	29,8	86,6	1,7	1,8	9,9	1 025
Resto Costa	70,2	5,1	24,4	82,7	3,7	2,6	11,0	565
Sierra	63,7	7,1	23,9	74,6	5,1	6,3	14,1	866
Selva	73,0	9,2	32,9	88,3	2,8	3,0	6,0	247
Departamento								
Amazonas	74,2	7,4	32,7	83,0	6,1	3,5	7,4	22
Áncash	62,8	7,2	32,2	73,2	12,4	4,6	9,8	161
Apurímac	60,3	8,8	26,7	73,7	6,2	3,5	16,6	42
Arequipa	62,2	4,1	24,4	74,1	5,4	3,3	17,1	190
Ayacucho	63,6	7,4	23,2	74,1	3,8	5,4	16,7	93
Cajamarca	72,0	13,8	20,5	85,8	3,2	6,5	4,4	85
Prov. Const. Del Callao	72,4	4,4	31,7	86,7	0,8	1,0	11,5	90
Cusco	66,3	6,0	13,1	70,3	3,6	8,6	17,5	144
Huancavelica	64,8	6,7	34,4	77,8	4,6	5,1	12,6	38
Huánuco	66,4	1,6	34,2	73,4	4,7	8,0	13,9	44
Ica	(73,4)	(3,7)	(13,6)	(75,2)	(0,0)	(7,4)	(17,4)	26
Junín	74,6	9,8	31,8	93,6	2,8	1,3	2,2	106
La Libertad	70,4	7,4	21,8	82,1	1,8	6,3	9,9	150
Lambayeque	70,3	5,5	22,4	85,6	4,1	1,6	8,7	61
Lima	71,9	2,7	29,0	86,6	1,8	1,8	9,7	1 039
Provincia de Lima 4/	71,8	2,4	29,6	86,6	1,7	1,9	9,8	935
Lima Provincias 5/	72,6	5,7	24,2	86,9	2,7	1,0	9,4	104
Loreto	(73,6)	(6,0)	(23,5)	(87,0)	(3,2)	(4,2)	(5,5)	44
Madre de Dios	75,9	13,2	46,3	88,5	3,5	1,6	6,3	16
Moquegua	79,1	3,9	20,7	88,1	3,6	0,9	7,4	17
Pasco	58,9	9,9	30,3	81,1	8,9	3,7	6,2	16
Piura	66,5	3,2	33,5	79,9	4,7	3,4	12,0	100
Puno	51,9	5,7	26,4	66,0	0,0	10,2	23,8	70
San Martín	70,3	13,7	37,1	91,4	0,8	1,5	6,3	68
Tacna	61,3	2,9	16,1	76,1	2,0	1,3	20,6	28
Tumbes	75,5	0,8	15,3	83,7	3,4	3,2	9,7	21
Ucayali	77,4	4,2	11,6	82,0	2,6	6,1	9,3	31
Total 2014	69,0	5,2	27,1	82,1	3,3	3,5	11,1	2702
Total 2009	65,8	6,1	17,9	76,5	3,1	6,6	13,7	2 796

Nota: Los porcentajes basados en menos de 25 casos sin ponderar no se muestran (*) y los de 25-49 casos sin ponderar se presentan entre paréntesis.

1/ Las entrevistadas podían informar más de una fuente de tratamiento.

2/ Incluye las mujeres que informaron tener una ITS o flujo vaginal o llagas/granos genitales, en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista.

3/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

11.5 CONDUCTA SEXUAL, USO DEL CONDÓN Y ACCESO AL CONDÓN

La conducta sexual individual y el uso de condón son determinantes claves del estatus de riesgo de contraer ITS y cuando esta información se agrega a nivel de la población, permite describir el contexto en el cual se deben diseñar e implementar los programas preventivos y curativos del VIH e ITS. En la Encuesta 2014, se preguntó a las mujeres acerca de sus relaciones sexuales en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista, número de parejas sexuales, uso de condón en la última relación y conocimiento de fuentes. Asimismo se indagó acerca del nivel de conocimiento de la mujer respecto a la persona con quien mantuvo contacto sexual, para distinguir la pareja sexual regular de la no regular, cohabitante o no.

Número de parejas sexuales de las mujeres no unidas

La distribución porcentual de mujeres no unidas por el número de personas con quienes tuvieron relaciones sexuales en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista muestra que el 65,9% refirió no haber tenido pareja sexual (71,4% en el año 2009), 31,9% respondió haber tenido una pareja (26,5% en el año 2009), y 2,2% tuvo dos o más parejas (2,2% en el año 2009).

Las mujeres sin educación respondieron en mayor porcentaje no haber tenido pareja sexual (85,4%), seguido de las mujeres de 15 a 19 años de edad (82,6%) y las del quintil inferior de riqueza (81,4%).

En el área rural (78,3%) se encontró una mayor proporción de mujeres que respondió no haber tenido pareja sexual, en los últimos 12 meses. Por departamento, Puno (81,3%), Cajamarca (80,5%) y Huancavelica (78,8%) registraron el mayor porcentaje de mujeres que respondió “ninguna pareja”.

CUADRO N° 11.15
PERÚ: NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES DE LAS MUJERES NO UNIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12
MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2014
(Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Total	Número de parejas sexuales			Promedio de parejas	Número de mujeres
		Ninguna pareja	1	2 y más		
Edad						
15-19	100,0	82,6	15,6	1,8	0,2	3 823
20-24	100,0	52,5	44,6	2,9	0,5	2 204
25-29	100,0	46,6	50,5	2,9	0,6	1 361
30-39	100,0	56,5	40,7	2,8	0,5	1 785
40-49	100,0	71,5	27,8	0,7	0,3	1 593
15-24	100,0	71,6	26,2	2,2	0,3	6 027
Estado conyugal						
Soltera	100,0	67,5	30,3	2,1	0,3	8 006
Soltera ha tenido RS	100,0	28,2	67,0	4,7	0,8	3 622
Soltera no ha tenido RS	100,0	100,0	n.a.	n.a.	0,0	4 384
Divorciada/Separada/Viuda	100,0	61,2	36,5	2,3	0,4	2 760
Nivel de educación						
Sin educación	100,0	85,4	14,4	0,2	0,1	113
Primaria	100,0	80,1	19,4	0,5	0,2	1 065
Secundaria	100,0	72,6	25,5	1,9	0,3	5 535
Superior	100,0	52,6	44,4	3,1	0,5	4 053
Quintil de riqueza						
Quintil inferior	100,0	81,4	17,6	1,0	0,2	1 347
Segundo quintil	100,0	71,7	27,1	1,1	0,3	1 812
Quintil intermedio	100,0	65,8	31,9	2,3	0,4	2 305
Cuarto quintil	100,0	61,6	36,1	2,4	0,4	2 643
Quintil superior	100,0	58,6	38,2	3,2	0,5	2 658
Total 2014	100,0	65,9	31,9	2,2	0,4	10 766
Total 2009	100,0	71,4	26,5	2,2	0,3	10 384

na= No aplicable.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 11.16
PERÚ: NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES DE LAS MUJERES NO UNIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
(Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Total	Número de parejas sexuales			Promedio de parejas	Número de mujeres
		Ninguna pareja	1	2 y más		
Área de residencia						
Urbana	100,0	63,5	34,1	2,4	0,4	9 000
Rural	100,0	78,3	20,8	0,9	0,2	1 766
Región natural						
Lima Metropolitana 1/	100,0	60,0	37,1	3,0	0,4	4 037
Resto Costa	100,0	67,9	30,4	1,7	0,3	2 730
Sierra	100,0	75,2	23,8	1,0	0,3	2 980
Selva	100,0	57,2	39,2	3,6	0,5	1 019
Departamento						
Amazonas	100,0	62,0	35,4	2,5	0,4	104
Áncash	100,0	69,8	29,0	1,1	0,3	420
Apurímac	100,0	77,9	21,5	0,6	0,2	117
Arequipa	100,0	67,5	30,4	2,1	0,3	570
Ayacucho	100,0	68,2	30,7	1,2	0,3	190
Cajamarca	100,0	80,5	18,9	0,6	0,2	462
Prov. Const. Del Callao	100,0	61,3	36,6	2,1	0,4	440
Cusco	100,0	72,3	26,7	1,0	0,3	365
Huancavelica	100,0	78,8	20,5	0,7	0,2	117
Huánuco	100,0	70,6	26,9	2,6	0,3	230
Ica	100,0	65,3	34,0	0,7	0,4	296
Junín	100,0	68,7	29,9	1,4	0,3	468
La Libertad	100,0	69,6	29,1	1,4	0,3	682
Lambayeque	100,0	75,1	24,0	0,9	0,3	439
Lima	100,0	59,8	37,1	3,0	0,4	3 912
Provincia de Lima 2/	100,0	59,8	37,1	3,1	0,4	3 599
Lima Provincias 3/	100,0	60,2	37,4	2,4	0,4	313
Loreto	100,0	55,1	41,5	3,3	0,5	286
Madre de Dios	100,0	55,0	38,6	6,5	0,5	39
Moquegua	100,0	63,9	35,2	0,8	0,4	56
Pasco	100,0	74,3	25,5	0,3	0,3	74
Piura	100,0	72,6	25,1	2,3	0,3	608
Puno	100,0	81,3	18,6	0,1	0,2	345
San Martín	100,0	52,6	41,7	5,7	0,5	200
Tacna	100,0	69,3	29,2	1,5	0,3	117
Tumbes	100,0	63,8	32,4	3,8	0,4	82
Ucayali	100,0	57,0	38,6	4,4	0,5	147
Total 2014	100,0	65,9	31,9	2,2	0,4	10 766
Total 2009	100,0	71,4	26,5	2,2	0,3	10 384

1/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

2/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

3/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Número de parejas sexuales de mujeres unidas

Evaluando la distribución porcentual de mujeres actualmente casadas o convivientes por número de personas con las que han tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista, se observa que la gran mayoría (97,7%) refirió haber tenido una sola pareja sexual incluyendo el esposo/compañero, lo cual se refuerza con el gran porcentaje de mujeres que manifestaron no haber tenido parejas sexuales (99,4%) excluyendo el esposo/compañero; en tanto, el 0,3% ha tenido dos o más parejas sexuales incluyendo el esposo/compañero.

Entre las mujeres que, incluyendo al esposo/compañero, aceptaron haber tenido dos o más parejas sexuales, un mayor porcentaje estaba ubicada en el quintil intermedio (0,6%). Por área de residencia, en el área urbana (0,4%), por departamento, en Huánuco (0,9%) y en Áncash y Loreto (0,8%, en ambos casos).

CUADRO N° 11.17
PERÚ: NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES DE MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12
MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2014
 (Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Número de parejas sexuales incluyendo esposo/compañero					Número de parejas sexuales excluyendo esposo/compañero				Número de mujeres
	Total	Ninguna	1	2 y más	Promedio	Total	Ninguna	1	Promedio	
Edad										
15-19	100,0	1,7	97,9	0,4	1,0	100,0	98,6	1,4	0,0	488
20-24	100,0	0,9	98,8	0,3	1,0	100,0	99,4	0,6	0,0	1 534
25-29	100,0	1,2	98,4	0,4	1,1	100,0	99,5	0,5	0,1	2 303
30-39	100,0	1,3	98,3	0,4	1,0	100,0	99,6	0,4	0,0	5 256
40-49	100,0	3,4	96,3	0,3	1,0	100,0	99,4	0,6	0,0	4 525
15-24	100,0	1,1	98,6	0,3	1,0	100,0	99,2	0,8	0,0	2 022
Nivel de educación										
Sin educación	100,0	4,8	95,2	0,0	1,0	100,0	99,7	0,3	0,0	394
Primaria	100,0	2,1	97,7	0,2	1,0	100,0	99,6	0,4	0,0	3 608
Secundaria	100,0	1,8	97,8	0,4	1,0	100,0	99,4	0,6	0,1	6 190
Superior	100,0	1,7	97,9	0,4	1,0	100,0	99,4	0,6	0,0	3 913
Quintil de riqueza										
Quintil inferior	100,0	1,6	98,3	0,2	1,0	100,0	99,7	0,3	0,0	2 716
Segundo quintil	100,0	2,0	97,7	0,3	1,0	100,0	99,6	0,4	0,0	3 096
Quintil intermedio	100,0	1,6	97,7	0,6	1,0	100,0	99,1	0,9	0,0	3 070
Cuarto quintil	100,0	1,8	97,8	0,5	1,1	100,0	99,4	0,6	0,1	2 751
Quintil superior	100,0	2,9	97,0	0,1	1,0	100,0	99,5	0,5	0,0	2 472
Total 2014	100,0	1,9	97,7	0,3	1,0	100,0	99,4	0,6	0,0	14 10

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 11.18
PERÚ: NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES DE MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12
MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
(Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Número de parejas sexuales incluyendo esposo/compañero					Número de parejas sexuales excluyendo esposo/compañero				Número de mujeres
	Total	Ninguna	1	2 y más	Promedio	Total	Ninguna	1	Promedio	
Área de residencia										
Urbana	100,0	2,1	97,5	0,4	1,0	100,0	99,4	0,6	0,0	10 365
Rural	100,0	1,5	98,3	0,2	1,0	100,0	99,6	0,4	0,0	3 740
Región natural										
Lima Metropolitana 1/	100,0	2,1	97,5	0,4	1,1	100,0	99,2	0,8	0,1	4 199
Resto Costa	100,0	1,8	97,9	0,4	1,0	100,0	99,5	0,5	0,0	3 610
Sierra	100,0	2,0	97,8	0,2	1,0	100,0	99,6	0,4	0,0	4 291
Selva	100,0	1,9	97,7	0,4	1,0	100,0	99,4	0,6	0,0	2 005
Departamento										
Amazonas	100,0	0,6	99,4	0,0	1,0	100,0	100,0	0,0	0,0	212
Áncash	100,0	1,9	97,3	0,8	1,0	100,0	98,6	1,4	0,0	576
Apurímac	100,0	1,6	98,2	0,1	1,0	100,0	99,9	0,1	0,0	206
Arequipa	100,0	1,6	97,8	0,7	1,0	100,0	99,1	0,9	0,0	620
Ayacucho	100,0	1,9	98,0	0,2	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	303
Cajamarca	100,0	2,0	97,9	0,2	1,0	100,0	99,7	0,3	0,0	719
Prov. Const. Del Callao	100,0	2,4	97,0	0,5	1,0	100,0	99,1	0,9	0,0	457
Cusco	100,0	2,1	97,5	0,4	1,0	100,0	99,7	0,3	0,0	599
Huancavelica	100,0	2,3	97,7	0,0	1,0	100,0	100,0	0,0	0,0	179
Huánuco	100,0	2,0	97,0	0,9	1,0	100,0	98,9	1,1	0,0	343
Ica	100,0	1,0	98,6	0,4	1,0	100,0	99,2	0,8	0,0	413
Junín	100,0	3,0	97,0	0,0	1,0	100,0	99,6	0,4	0,0	540
La Libertad	100,0	1,8	98,1	0,1	1,0	100,0	99,9	0,1	0,0	842
Lambayeque	100,0	1,8	98,0	0,1	1,0	100,0	99,9	0,1	0,0	527
Lima	100,0	2,0	97,6	0,4	1,1	100,0	99,2	0,8	0,1	4 290
Provincia de Lima 2/	100,0	2,0	97,6	0,4	1,1	100,0	99,3	0,7	0,1	3 750
Lima Provincias 3/	100,0	1,8	97,4	0,8	1,0	100,0	99,0	1,0	0,0	540
Loreto	100,0	2,5	96,7	0,8	1,0	100,0	98,7	1,3	0,0	503
Madre de Dios	100,0	3,7	95,8	0,5	1,0	100,0	99,3	0,7	0,0	73
Moquegua	100,0	2,4	97,4	0,2	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	81
Pasco	100,0	1,8	97,9	0,3	1,0	100,0	99,7	0,3	0,0	116
Piura	100,0	1,4	98,5	0,1	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	942
Puno	100,0	1,9	98,1	0,0	1,0	100,0	99,9	0,1	0,0	541
San Martín	100,0	1,7	98,3	0,0	1,0	100,0	99,9	0,1	0,0	474
Tacna	100,0	4,4	95,3	0,2	1,0	100,0	99,5	0,5	0,0	150
Tumbes	100,0	0,7	99,2	0,2	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	127
Ucayali	100,0	1,7	98,1	0,2	1,0	100,0	99,7	0,3	0,0	271
Total 2014	100,0	1,9	97,7	0,3	1,0	100,0	99,4	0,6	0,0	14 105

1/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

2/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

3/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Conocimiento y uso del condón

Entre las mujeres que han oído hablar sobre el VIH/SIDA, el 99,3% conocía sobre el uso de condón, como una forma de prevenir enfermedades, pero solo el 10,2% lo utilizó el último mes. De las mujeres que lo usan como método anticonceptivo, el 2,4% no lo usó en su última relación sexual.

El 77,8% de mujeres conocía que hay fuente médica pública y un 3,3% fuente médica privada para conseguir el condón. El 79,9%, sabía que se adquiere en las farmacias contra un 1,2% que no conoce fuentes para obtenerlos.

Es importante mencionar que las mujeres que reconocieron haber utilizado condones en el último mes fueron las pertenecientes al quintil superior de riqueza y con educación superior (14,0%, en ambos casos), seguido de las mujeres de 20 a 24 años de edad (12,4%).

En cuanto al grupo que usa el condón como método de planificación familiar pero que no los usó en su última relación sexual, fue mayor en mujeres con educación superior (3,8%) y del quintil superior de riqueza (3,5%). Por área de residencia, en la urbana (2,7%) y por departamentos en Moquegua (4,7%) y Piura (3,7%).

CUADRO N° 11.19
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO, FUENTE Y USO DEL CONDÓN, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2014
(Porcentaje)

Característica seleccionada	Conoce sobre el condón 1/	Conoce fuente para el condón 2/					No conoce fuentes para el condón	Uso de condones		Usa condón para PF; pero no usó en última relación	Número de mujeres
		Fuente médica pública	Fuente médica privada	Farmacia	Otra fuente	Podría conseguir uno		El último mes	Antes		
Edad											
15-19	99,7	69,3	3,1	84,6	7,0	62,5	1,6	10,5	10,7	1,8	1 285
20-24	99,2	73,2	4,3	85,6	5,8	72,4	1,1	12,4	7,7	2,7	2 853
25-29	99,5	79,9	4,0	82,6	6,2	72,5	0,9	11,0	4,5	3,3	3 343
30-39	99,4	79,3	3,2	79,1	5,5	73,1	1,1	10,1	2,8	2,5	6 651
40-49	99,1	78,9	2,5	75,2	5,3	66,0	1,6	8,6	1,6	1,7	5 734
15-24	99,4	72,0	3,9	85,3	6,2	69,3	1,3	11,8	8,6	2,4	4 138
Estado conyugal											
Soltera ha tenido RS	99,6	67,4	5,2	90,8	10,6	72,4	0,7	12,4	13,0	2,9	3 554
Casada o Conviviente	99,2	80,5	2,9	76,4	4,5	69,6	1,5	10,9	1,3	2,6	13 627
Divorciada/Separada/Viuda	99,6	77,7	2,7	82,8	5,4	70,0	1,0	3,7	5,2	0,6	2 685
Nivel de educación											
Sin educación	93,4	82,1	0,7	37,0	2,6	37,1	8,9	2,4	1,0	0,0	351
Primaria	97,7	85,3	1,1	52,9	1,5	50,6	4,0	5,2	1,0	0,9	3 965
Secundaria	99,8	79,2	3,0	83,6	4,2	70,4	0,5	9,8	3,8	2,0	8 789
Superior	99,9	71,4	5,1	93,1	10,3	83,0	0,2	14,0	6,0	3,8	6 761
Quintil de riqueza											
Quintil inferior	96,7	89,2	1,7	40,4	1,8	49,7	5,1	4,1	1,5	0,9	2 924
Segundo quintil	99,3	83,6	1,6	74,0	2,8	63,7	1,2	8,0	2,4	2,1	4 029
Quintil intermedio	99,8	78,5	2,6	87,3	3,8	71,6	0,5	10,9	3,7	2,2	4 416
Cuarto quintil	99,9	74,5	3,5	91,1	5,8	76,2	0,5	11,9	5,5	2,7	4 387
Quintil superior	99,9	66,6	6,5	93,7	13,4	83,0	0,2	14,0	5,8	3,5	4 110
Total 2014	99,3	77,8	3,3	79,9	5,7	70,1	1,2	10,2	3,9	2,4	19 866
Total 2009	98,3	78,9	2,9	73,0	6,2	65,3	2,5	9,5	3,2	1,8	18 157

1/ Conocimiento para Planificación Familiar o para prevención de enfermedades.

2/ Para las usuarias actuales se incluye como fuente el último sitio donde obtuvo el condón.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 11.20
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO, FUENTE Y USO DEL CONDÓN, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
 (Porcentaje)

Ámbito geográfico	Conoce sobre el condón 1/	Conoce fuente para el condón 2/					No conoce fuentes para el condón	Uso de condones		Usa condón para PF; pero no usó en última relación	Número de mujeres
		Fuente médica pública	Fuente médica privada	Farmacia	Otra fuente	Podría conseguir uno		El último mes	Antes		
Área de residencia											
Urbana	99,8	74,8	3,7	88,0	6,7	74,3	0,6	11,4	4,5	2,7	15 705
Rural	97,6	89,0	1,6	49,3	1,9	54,3	3,6	5,7	1,7	1,3	4 161
Región natural											
Lima Metropolitana 3/	100,0	69,8	5,0	92,0	9,1	79,0	0,3	12,2	5,7	2,7	6 737
Resto Costa	99,7	76,6	2,2	85,3	5,3	70,3	1,0	10,2	2,9	2,6	5 069
Sierra	98,1	83,2	2,2	64,3	2,6	60,2	2,8	9,6	3,1	2,0	5 431
Selva	99,4	89,2	3,2	70,6	4,2	67,6	0,9	6,1	3,1	1,9	2 629
Departamento											
Amazonas	97,7	89,1	2,5	64,6	1,8	56,6	4,2	5,2	3,0	2,5	269
Áncash	97,2	81,3	3,5	68,0	5,8	58,5	5,2	7,6	3,6	1,3	767
Apurímac	98,9	94,9	1,7	55,8	1,0	58,3	1,6	7,4	3,7	1,3	221
Arequipa	99,3	78,8	2,5	88,4	3,8	72,8	0,7	14,7	5,0	2,9	929
Ayacucho	98,5	93,4	2,8	67,3	3,3	56,9	2,2	9,4	3,3	2,5	392
Cajamarca	97,7	86,4	2,3	59,0	1,9	65,3	3,3	8,0	2,3	2,4	867
Prov. Const. Del Callao	100,0	68,6	4,1	90,4	9,3	78,0	1,1	11,1	4,4	3,1	735
Cusco	98,5	85,2	2,6	66,6	3,7	61,7	2,1	11,9	3,9	1,9	721
Huancavelica	97,7	96,0	2,0	49,9	0,8	57,4	2,5	6,6	3,4	1,6	222
Huánuco	98,8	94,0	2,4	55,2	2,3	66,8	1,7	5,0	2,4	2,7	437
Ica	100,0	73,0	2,4	91,0	9,1	66,9	0,1	12,1	2,5	2,3	571
Junín	99,6	78,1	2,7	75,0	2,1	67,0	0,4	11,7	4,4	2,1	811
La Libertad	99,6	81,4	1,9	79,5	5,1	73,7	0,4	8,1	2,4	2,3	1 170
Lambayeque	99,4	70,0	1,6	84,5	4,6	66,7	0,4	9,9	1,6	2,6	722
Lima	99,9	71,3	4,7	90,8	8,5	78,4	0,4	12,4	5,6	2,5	6 736
Provincia de Lima 4/	100,0	70,0	5,1	92,1	9,1	79,2	0,3	12,4	5,9	2,7	6 010
Lima Provincias 5/	99,7	82,0	1,4	79,6	3,4	72,2	1,9	12,8	3,0	1,4	726
Loreto	99,5	89,6	3,9	64,1	8,8	66,2	0,7	5,2	2,9	1,8	694
Madre de Dios	99,4	86,1	0,8	87,7	4,5	68,5	1,6	9,0	3,6	3,3	99
Moquegua	99,5	91,3	2,4	79,4	3,9	73,2	1,3	14,4	5,4	4,7	115
Pasco	98,3	89,8	1,4	58,8	1,5	71,4	2,2	9,8	2,9	1,4	153
Piura	98,8	70,0	1,7	79,6	4,4	62,4	3,3	8,4	2,1	3,7	1 216
Puno	98,1	72,9	1,6	58,1	1,5	44,0	2,3	6,8	2,8	1,2	650
San Martín	99,7	88,3	3,7	84,2	1,4	65,0	0,2	5,5	2,3	1,6	612
Tacna	99,9	88,0	5,0	82,7	4,0	75,1	0,3	12,6	4,5	1,9	213
Tumbes	100,0	85,9	1,8	85,4	2,7	75,0	0,3	8,1	3,0	1,3	177
Ucayali	99,9	87,9	3,9	72,8	5,8	80,8	0,3	6,3	2,2	1,3	365
Total 2014	99,3	77,8	3,3	79,9	5,7	70,1	1,2	10,2	3,9	2,4	19 866
Total 2009	98,3	78,9	2,9	73,0	6,2	65,3	2,5	9,5	3,2	1,8	18 157

1/ Conocimiento para Planificación Familiar o para prevención de enfermedades.

2/ Para las usuarias actuales se incluye como fuente el último sitio donde obtuvo el condón.

3/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

4/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Uso de condón según tipo de compañero

El uso de condón entre las mujeres que tuvieron relaciones sexuales, en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista, de acuerdo con el tipo de compañero, muestra los siguientes porcentajes: un 12,2% usó condón con su esposo o compañero, en el año 2009 fue 9,8%; el 29,9% los usó con un compañero con el cual no vive, en el año 2009 fue 32,5%; y, un 15,8% usó condón con cualquier compañero, en el año 2009 fue 13,8%. Es decir, hubo un incremento en la mayoría de los casos.

El uso de condón con compañero con el cual no vive fue mayor entre las mujeres de 15 a 19 años de edad (35,2%), seguido de las que tienen de 15 a 24 años de edad y las solteras que han tenido relaciones sexuales (34,8%). Por área de residencia fue más alta en la urbana (30,7%) y por departamento en Junín (43,3%) y Moquegua (37,0%).

El uso de condón con cualquier compañero, ocurrió en mayor porcentaje en mujeres solteras que han tenido relaciones sexuales (34,8%), de 15 a 19 años de edad (23,3%) y con educación superior (23,1%). Por área de residencia, fue en la urbana (18,3%) y por departamento en Pasco (22,7%) y Arequipa (22,6%).

CUADRO N° 11.21
PERÚ: USO DEL CONDÓN POR TIPO DE COMPAÑERO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES
A LA ENTREVISTA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2014
(Porcentaje)

Característica seleccionada	Usó condón con esposo o compañero		Usó con compañero con quien no vive		Usó condón con cualquier	
	Porcentaje	Número de mujeres	Porcentaje	Número de mujeres	Porcentaje	Número de mujeres
Edad						
15-19	7,5	500	35,2	664	23,3	1 162
20-24	13,3	1 572	34,6	1 055	21,9	2 621
25-29	13,3	2 337	29,3	735	17,0	3 052
30-39	12,4	5 281	27,8	795	14,4	6 048
40-49	11,5	4 405	16,2	476	12,0	4 867
15-24	11,9	2 072	34,8	1 718	22,3	3 783
Estado conyugal						
Soltera ha tenido RS	*	4	34,8	2 578	34,8	2 582
Casada o Conviviente	12,1	13 788	18,6	82	12,1	13 820
Divorciada/Separada/Viuda	15,4	301	18,6	1 065	17,8	1 347
Nivel de educación						
Sin educación	2,6	382	*	18	3,2	400
Primaria	6,2	3 581	15,2	223	6,7	3 796
Secundaria	12,7	6 215	27,1	1 553	15,5	7 731
Superior	17,7	3 916	33,9	1 931	23,1	5 822
Quintil de riqueza						
Quintil inferior	4,4	2 710	20,0	253	5,8	2 959
Segundo quintil	10,0	3 102	22,7	521	11,7	3 612
Quintil intermedio	13,7	3 084	28,1	811	16,7	3 870
Cuarto quintil	15,8	2 763	32,2	1 028	20,1	3 776
Quintil superior	17,7	2 435	34,6	1 112	23,0	3 532
Total 2014	12,2	14 094	29,9	3 725	15,8	17 749
Total 2009	9,8	13 781	32,5	3 002	13,8	16 743

Nota: Los porcentajes basados en menos de 25 casos sin ponderar no se muestran (*), y los de 25-49 casos sin ponderar se presentan entre paréntesis.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO N° 11.22
PERÚ: USO DEL CONDÓN POR TIPO DE COMPAÑERO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
 (Porcentaje)

Ámbito geográfico	Usó condón con esposo o compañero		Usó con compañero con quien no vive		Usó condón con cualquier	
	Porcentaje	Número de mujeres	Porcentaje	Número de mujeres	Porcentaje	Número de mujeres
Área de residencia						
Urbana	14,4	10 356	30,7	3 337	18,3	13 633
Rural	6,2	3 738	22,9	388	7,7	4 116
Región natural						
Lima Metropolitana 1/	16,6	4 195	31,7	1 645	20,8	5 807
Resto Costa	12,0	3 624	26,5	891	14,8	4 500
Sierra	10,5	4 267	33,9	745	13,9	5 000
Selva	7,0	2 008	23,1	444	9,9	2 442
Departamento						
Amazonas	6,1	216	24,7	38	8,9	254
Áncash	9,6	573	25,8	134	12,4	701
Apurímac	8,8	203	28,4	26	11,0	229
Arequipa	18,6	625	36,1	192	22,6	813
Ayacucho	11,1	299	27,2	61	13,8	360
Cajamarca	8,8	720	33,5	90	11,4	808
Prov. Const. del Callao	15,3	463	25,8	173	18,0	632
Cusco	13,4	594	37,0	99	16,7	689
Huancavelica	8,7	179	29,1	24	11,1	203
Huánuco	5,0	343	19,8	70	7,6	409
Ica	14,0	412	25,3	105	16,2	515
Junín	12,8	536	43,3	146	19,2	681
La Libertad	8,1	845	26,9	208	11,8	1 052
Lambayeque	11,1	531	22,2	110	13,0	640
Lima	16,4	4 278	32,2	1 602	20,7	5 846
Provincia de Lima 2/	16,7	3 740	32,4	1 472	21,1	5 183
Lima Provincias 3/	14,4	538	30,9	129	17,5	663
Loreto	4,9	500	24,1	135	9,1	629
Madre de Dios	9,3	72	33,4	18	14,1	90
Moquegua	19,3	81	37,0	21	22,7	101
Pasco	11,1	117	34,2	19	14,4	136
Piura	9,6	945	22,1	166	11,5	1 111
Puno	8,2	535	29,6	64	10,5	598
San Martín	6,4	476	17,9	96	8,4	571
Tacna	16,4	145	36,3	37	20,5	180
Tumbes	9,7	131	23,3	30	12,2	161
Ucayali	7,6	274	16,7	64	9,3	337
Total 2014	12,2	14 094	29,9	3 725	15,8	17 749
Total 2009	9,8	13 781	32,5	3 002	13,8	16 743


1/ Comprende la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

2/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

3/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO N° 11.4
PERÚ: USO DE CONDÓN POR TIPO DE COMPAÑERO, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2014
 (Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.