





PERÚ

Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2014

<u>Instituto Nacional de Estadística e Informática</u>

Av. General Garzón N° 658, Jesús María, Lima 11 PERÚ Teléfonos: (511) 433-8398 431-1340 Fax: 433-3591

Web: www.inei.gob.pe

Abril 2015

Impreso en los talleres gráficos de:

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Tiraje : 250 Ejemplares

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2015-05330

Presentación

El Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, en el marco de su política de promoción y difusión de estudios especializados, de contribución al conocimiento de las enfermedades que aquejan a la población peruana y al diseño de políticas públicas de salud, pone a disposición de las autoridades, usuarios públicos y privados, el documento **"Perú: Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles, 2014"**, elaborado con la información recopilada en el Cuestionario de Salud de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, ejecutado entre los meses de marzo a diciembre del 2014, a una muestra de 29 mil 941 viviendas del país, en las que se entrevistó a 27 mil 633 personas de 15 y más años de edad

Este documento forma parte de las acciones conjuntas que vienen implementando el INEI, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas, con el propósito de obtener información estadística actualizada que permita evaluar el cumplimiento de los Programas Presupuestales en el marco de Presupuesto por Resultados.

El documento contiene tres capítulos. El primero presenta los indicadores del Programa de Enfermedades No Transmisibles, como hipertensión arterial medida y diagnosticada por un profesional de salud, la diabetes mellitus, salud ocular, salud bucal, salud mental y factores de riesgo. El segundo capítulo, contiene información sobre indicadores del Programa de Prevención y Control del Cáncer. En el tercer capítulo se abordan indicadores del Programa de Enfermedades Transmisibles, Tuberculosis-BCG y conductas de riesgo de transmisión del Virus de Inmunodeficiencia Humana- VIH. Adicionalmente, se incluye un Anexo Estadístico de los indicadores por cada programa presupuestal.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática expresa su especial agradecimiento a todas las familias del país, por su importante colaboración al brindar información durante el desarrollo de la entrevista, así como a las entrevistadoras, supervisoras y personal de la encuesta que ha permitido obtener información de calidad para la elaboración de este documento.

Lima, abril 2015

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Índice

Pr	esent	ación	3
1.	Prog	rama de Enfermedades No Transmisibles	7
	1.1	Hipertensión	9
		1.1.1 Hipertensión arterial por medición	
		1.1.2 Hipertensión arterial por diagnóstico en los últimos 12 meses	
	1.2	Diabetes Mellitus	
		1.2.1 Diabetes Mellitus y tratamiento médico en los últimos 12 meses	13
	1.3	Factores de riesgo	13
		1.3.1 Consumo de cigarrillos	13
		1.3.2 Consumo de alcohol	17
		1.3.3 Consumo de frutas y verduras	21
		1.3.4 Sobrepeso y obesidad	23
	1.4	Salud ocular	27
		1.4.1 Niñas y niños de 3 a 11 años de edad	28
		1.4.2 Personas de 50 y más años de edad	38
	1.5	Salud bucal	44
		1.5.1 Niñas y niños de 1 a 11 años de edad	44
		1.5.2 Personas de 60 y más años de edad	51
	1.6	Salud mental	53
		1.6.1 Violencia física de pareja	53
		1.6.2 Edad promedio de inicio de consumo de alguna bebida alcohólica	55
		1.6.3 Trastornos por consumo de alcohol	57
2.	Prog	rama de Prevención y Control del Cáncer	61
3.	Prog	rama de Enfermedades Transmisibles	75
	3.1	Tuberculosis	77
	3.2	Virus de Inmunodeficiencia Humana-VIH	77
4.	Anex	co Estadístico	85
Αn	exo 1.	Programa de enfermedades no transmisibles	87
An	exo 2.	Programa de prevención y control del cáncer	127
An	ехо 3.	Programa de enfermedades transmisibles	137

CAPÍTULO 1

Programa de Enfermedades No Transmisibles

1. Programa de Enfermedades No Transmisibles

Las enfermedades crónicas no transmisibles, afectan a todos los grupos de edad y representan un grupo heterogéneo de padecimientos como la diabetes e hipertensión arterial, entre otros; constituyendo un problema de salud pública por ser una causa de morbilidad, en el marco del proceso de envejecimiento de la población en nuestro país y por el modo de vida poco saludable¹.

1.1 Hipertensión

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica en la que la presión ejercida por la sangre al interior del círculo arterial es elevada. Esta afección trae como consecuencia el daño progresivo de diversos órganos del cuerpo, así como el esfuerzo adicional por parte del corazón para bombear sangre a través de los vasos sanguíneos.

1.1.1 Presión arterial alta

La presión arterial elevada se refiere al registro cuantificado, por encima de valores normales de la presión sistólica (PAS >=140 mmHg.) y/o diastólica (PAD >=90 mmHg.) en una persona bajo condiciones estándares para la medición. Para ello, se realiza al menos dos mediciones completas, donde cada medición implica la medición de la PAS y PAD, y se utiliza el valor promedio de PAS y el valor promedio de PAD para determinar el valor de la presión arterial.

De la población de 15 y más años de edad a la que se midió la presión arterial medida, se encontró un 14,8% con hipertensión arterial; siendo los hombres más afectados (18,5%) que las mujeres (11,6%).


La prevalencia de hipertensión arterial es mayor en Lima Metropolitana (18,2%), seguido por la Costa sin Lima Metropolitana (15,5%). La menor prevalencia se registró en la Selva (11,7%) y en la Sierra (12,0%).

GRÁFICO № 1.1

PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON PRESIÓN ARTERIAL ALTA

DE ACUERDO A MEDICIÓN EFECTUADA, SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2014

(Porcentaje)




Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

 $^{1/\} Organización\ Mundial\ de\ la\ Salud:\ Informe\ sobre\ la\ Situación\ Mundial\ de\ las\ Enfermedades\ No\ Transmisibles.\ 2010,\ pág.\ i-1.$

De acuerdo a la medición efectuada, los mayores porcentajes de personas de 15 y más años de edad que presentaron presión arterial fueron en los departamentos de Piura (18,6%), Lima (18,1%) y la Provincia Constitucional del Callao (17,6%). Los menores porcentajes se presentaron en Madre de Dios (7,0%), Ucayali (8,5%) y Pasco (9,6%).

GRÁFICO № 1.2
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON PRESIÓN ARTERIAL ALTA
DE ACUERDO A MEDICIÓN EFECTUADA, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2014
(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

1.1.2 Hipertensión arterial por diagnóstico en los últimos 12 meses

La presión arterial alta diagnosticada por un profesional de salud en un establecimiento de salud, se refiere a la experiencia reportada por la persona encuestada de haber recibido un diagnóstico de hipertensión arterial.

El 10,4% de la población de 15 y más años de edad fue diagnosticada con hipertensión arterial por un médico u otro profesional de la salud. La población femenina que padece la enfermedad alcanzó el 12,2% y la masculina 8,4%.


Los mayores porcentajes de la población con hipertensión arterial se presentaron en la Costa sin Lima Metropolitana (11,8%) y Lima Metropolitana (10,9%); y, los menores porcentajes en la Sierra (8,9%) y la Selva (10,0%).

GRÁFICO № 1.3

PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO

DE HIPERTENSIÓN, SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2014

(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Hipertensión arterial y tratamiento médico en los últimos 12 meses

El 60,3% de la población con diagnóstico médico de hipertensión arterial, ha recibido y/o comprado medicamentos para controlar la presión alta. La población femenina hipertensa con tratamiento farmacológico alcanzó el 61,5% y la masculina 58,4%.


La mayor proporción de hipertensos con tratamiento reside en Lima Metropolitana (67,8%) y en la Costa sin Lima Metropolitana (65,3%); seguido por la Selva (55,4%) y Sierra (47,6%).

GRÁFICO № 1.4

PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN QUE

RECIBIERON TRATAMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2014

(Porcentaje)




1.2 Diabetes Mellitus

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles altos de azúcar en la sangre (glucemia). Esto se puede deber a un funcionamiento incorrecto del páncreas (glándula que normalmente produce la hormona insulina) o por una respuesta inadecuada del organismo ante esta hormona.

El 3,2% de la población de 15 y más años de edad fue diagnosticada con diabetes mellitus. Según sexo, el 3,6% de la población femenina padece de diabetes y el 2,9% de la masculina. Por región natural, el mayor porcentaje de personas con diabetes se ubica en Lima Metropolitana con 4,5% y el menor porcentaje en la Sierra con 2,0%.

GRÁFICO № 1.5
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO
DE DIABETES MELLITUS, SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2014
(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

1.2.1 Diabetes Mellitus y tratamiento médico en los últimos 12 meses

El tratamiento médico se refiere al reporte de la experiencia de haber recibido medicamentos, para tratar la diabetes mellitus diagnosticada por un profesional de la salud.

De las personas que fueron diagnosticadas con diabetes, el 70,3% recibió o compró los medicamentos con receta médica, al menos una vez, para controlar la enfermedad. El 73,7% de las mujeres siguen un tratamiento médico y el 65,4% de los hombres.


En la Costa sin Lima Metropolitana 74,6% de personas de 15 y más años de edad accedieron a medicamentos para la diabetes, seguido por el 71,5% en Lima Metropolitana, 64,4% en la Sierra y 63,9% en la Selva.

GRÁFICO № 1.6

PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS QUE RECIBIERON

TRATAMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2014

(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

1.3 Factores de riesgo

Las enfermedades crónicas se desarrollan por un conjunto de factores de riesgo que en muchos de los casos son prevenibles. Destacan el consumo de tabaco, la baja ingesta de frutas y verduras, el uso nocivo del alcohol y la obesidad.

1.3.1 Consumo de cigarrillos


Consumo de cigarrillo en los últimos 12 meses

Si bien el rol del tabaco como factor causal de cáncer de pulmón es bastante conocido, también está asociado al desarrollo de enfermedad vascular y por ende constituye un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades isquémicas. Actualmente, se estima que las enfermedades cardiovasculares son responsables de casi la mitad de los decesos vinculados al consumo de tabaco en países desarrollados, así como más de un cuarto de estos en países en vías de desarrollo.

El consumo de tabaco aumenta el riesgo de las enfermedades no transmisibles. Este comportamiento afecta a un 20,3% de la población de 15 y más años de edad que fumaron, en los últimos 12 meses, al menos un cigarrillo (de manufactura industrial o artesanal).

Según sexo, el consumo de cigarrillo es más frecuente en los hombres (33,9%) que en las mujeres (8,6%). De acuerdo con la región natural de residencia, se encontró en Lima Metropolitana (24,7%) y la Selva (22,1%) los mayores porcentajes de consumo de cigarrillos en la población de 15 y más años de edad. Con menores porcentajes se ubican la Sierra (17,2%) y Costa sin Lima Metropolitana (17,9%).

GRÁFICO № 1.7
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE FUMARON EN
LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2014
(Porcentaje)




Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Los mayores porcentajes de personas de 15 y más años de edad que fumaron, en los últimos 12 meses, se ubican en Madre de Dios (29,3%), Provincia Constitucional del Callao (27,9%), Pasco (27,2%), Ucayali (26,4%) e Ica (26,2%). Y entre, los menores porcentajes destacaron Piura (10,9%), Lambayeque (12,5%) y Amazonas (13,6%).

GRÁFICO № 1.8

PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE FUMARON
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2014

(Porcentaje)




Consumo de cigarrillo en los últimos 30 días

De la población de 15 y más años de edad encuestada, el 12,3% reportó haber fumado al menos un cigarrillo en los últimos 30 días. Según área de residencia, la prevalencia de consumo de cigarrillo fue 13,2% en el área urbana y 9,4% en el área rural.

Por región natural, los mayores porcentajes de personas que actualmente fuman, destacan en Lima Metropolitana (15,4%) y la Selva (15,0%); y los menores porcentajes, en la Sierra (9,0%) y Costa sin Lima Metropolitana (11,1%).

GRÁFICO № 1.9
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE FUMARON
EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
(Porcentaje)



Consumo de cigarrillo diariamente


De las personas de 15 y más años de edad que han fumado al menos un cigarrillo, en los últimos 30 días, el 2,0% fumaron diariamente; prevalencia que se eleva a 3,3% en la población masculina.

Las regiones que presentaron mayor incidencia en el consumo diario del cigarrillo fueron la Selva (2,9%) y Lima Metropolitana (2,8%) y la menor ocurrencia en la Sierra (0,8%).

GRÁFICO № 1.10

PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE FUMAN DIARIAMENTE
EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS, SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2014

(Porcentaje)



() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


Consumo promedio diario de cigarrillos

De las personas de 15 y más años de edad que fuman diariamente (2,0%), el promedio de cigarrillos consumidos fue 5,6 por día. En el área urbana el promedio diario de cigarrillos consumidos fue 5,9 cigarrillos y en el área rural 3,3 cigarrillos.

De acuerdo con el nivel de educación, la población de 15 y más años de edad con educación secundaria que fuman diariamente consumió en promedio 5,3 cigarrillos al día, y aquella que alcanzó hasta primaria, 3,7 cigarrillos.

GRÁFICO № 1.11

PERÚ: PROMEDIO DIARIO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS POR PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE FUMAN DIARIAMENTE, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA Y NIVEL DE EDUCACIÓN, 2014




^() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Edad promedio de inicio de consumo diario de cigarrillo

En la población de 15 y más años de edad, la edad promedio en la que empezaron a fumar diariamente fue 23,5 años. La brecha por área de residencia fue de 1,6 años a favor del área rural. Por sexo, la edad promedio de inicio de consumo diario de cigarrillos fue mayor en mujeres (24,3 años de edad) que en hombres (23,2 años de edad).

GRÁFICO № 1.12 PERÚ: EDAD PROMEDIO DE INICIO DE CONSUMO DIARIO DE CIGARRILLOS POR PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE FUMAN DIARIAMENTE, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA Y SEXO, 2014



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

1.3.2 Consumo de alcohol

Consumo de bebida alcohólica alguna vez

El uso nocivo de alcohol está considerado como un factor de riesgo en el padecimiento de algún tipo de cáncer, enfermedades cardiovasculares y cirrosis hepática.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 90,2% de las personas de 15 y más años de edad declararon que han consumido bebida alcohólica, alguna vez en su vida. Siendo mayor este porcentaje en los hombres con 94,3% que en las mujeres 86,7%.


El mayor porcentaje de personas que tomaron algún tipo de licor, se encontró en Lima Metropolitana donde un 93,6% tomó alguna bebida alcohólica, alguna vez en su vida. Le sigue la Costa sin Lima Metropolitana con el 93,4%. Los menores porcentajes se hallaron en la Sierra con 84,9% y la Selva con 88,0%.

GRÁFICO № 1.13

PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE CONSUMIERON ALGUNA VEZ

ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA, SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2014

(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Consumo de bebida alcohólica en los últimos 12 meses

El 66,9% de las personas de 15 y más años de edad, consumió bebida alcohólica en los últimos 12 meses. Por otro lado, en el área urbana el 71,8% reportó consumir algún tipo de alcohol y en el área rural el 51,9%.


Según región natural, la mayor proporción de personas que consumieron bebida alcohólica, se ubica en Lima Metropolitana (76,2%) y Costa sin Lima Metropolitana (70,5%); y, las menores proporciones en la Sierra (57,0%) y Selva (60,0%).

GRÁFICO № 1.14

PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE CONSUMIERON ALGUNA BEBIDA

ALCOHÓLICA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014

(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


Los mayores porcentajes de personas de 15 y más años de edad que consumieron alguna bebida alcohólica, en los últimos 12 meses, se presentaron en los departamentos de Piura (77,4%), Ica (76,6%), Lima (75,5%), Provincia Constitucional del Callao (74,3%) y Lambayeque (72,5%).

GRÁFICO № 1.15

PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE CONSUMIERON ALGUNA BEBIDA

ALCOHÓLICA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2014

(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Consumo de bebida alcohólica en los últimos 30 días


En los 30 días anteriores a la encuesta, el 36,1% de las personas de 15 y más años de edad han consumido bebidas alcohólicas o licor. Registrándose la mayor prevalencia en Lima Metropolitana (42,7%) y Costa sin Lima Metropolitana (38,7%); en tanto, la menor prevalencia fue en la Sierra (28,5%). Al analizar por sexo, el consumo actual de bebida alcohólica es mayor en los hombres (46,3%) que en las mujeres (27,2%).

GRÁFICO № 1.16

PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

CONSUMIERON ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA, SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2014

(Porcentaje)




Consumo excesivo de bebida alcohólica en los últimos 30 días

El consumo excesivo de alcohol se refiere a la condición en la que la persona, en alguna ocasión, presentó alteraciones significativas en la conducta y el raciocinio como resultado de dicho consumo. A nivel nacional, ese acontecimiento se reportó en 23,1% de personas de 15 y más años de edad. Este comportamiento fue más frecuente en los hombres, 34,6% que en las mujeres, 13,3%.

El mayor porcentaje de personas que manifestaron consumo excesivo de licor fue en Lima Metropolitana, 25,8%, y el menor porcentaje se registró en la Sierra, 18,4%.

GRÁFICO № 1.17
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE TUVIERON EVENTOS DE CONSUMO EXCESIVO
DE ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS, SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2014
(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

1.3.3 Consumo de frutas y verduras

La baja ingesta de frutas y verduras contribuyen con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o la obesidad. Es considerado entre los principales factores de riesgos comportamentales², que prevalece en áreas rurales, población con bajos ingresos económicos y bajo nivel educativo. En este sentido, el estudio permite conocer la magnitud del problema, en el ámbito de la salud pública.

Promedio de días a la semana de consumo de frutas


En los siete días anteriores a la entrevista, las personas de 15 y más años de edad han consumido fruta entera o en trozos durante 4,4 días en promedio. En el área urbana fue 4,5 días, y en el área rural 3,9 días, en promedio.

Según sexo, las mujeres consumen fruta más días en la semana (4,7 días en promedio), que los hombres (4,0 días en promedio).

GRÁFICO Nº 1.18

PERÚ: PROMEDIO DE DÍAS A LA SEMANA DE CONSUMO DE FRUTAS EN PERSONAS

DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA Y SEXO, 2014



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


Promedio de días a la semana de consumo de verduras

En relación con la ingesta de verduras, las personas de 15 y más años de edad encuestadas consumen verduras o vegetales a la semana durante 3,3 días, en promedio. Al analizar por sexo, resultó que las mujeres consumían verduras a la semana 3,3 días en promedio y los hombres 3,1 días en promedio.

Según región natural, en Lima Metropolitana se consumió verduras más días a la semana (3,5 días en promedio) que en la Sierra (3,0 días en promedio).

^{2/} Organización Mundial de la Salud: "Informe sobre la Situación Mundial de las Enfermedades No Transmisibles", 2010.Pág v.

GRÁFICO Nº 1.19
PERÚ: PROMEDIO DE DÍAS A LA SEMANA DE CONSUMO DE ENSALADA DE VERDURAS
EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2014




Promedio diario del consumo de porciones de fruta

Los resultados de la encuesta mostraron que, la población de 15 y más años de edad consume en promedio 2,0 porciones de frutas al día. Se entiende por porciones a una unidad, tajada, racimo o puñado.

El consumo promedio de porciones de fruta por día en hombres (2,2) y mujeres (1,9) fue similar. Por región natural, en Lima Metropolitana, Costa sin Lima Metropolitana y la Selva el promedio diario del consumo de frutas asciende a 2,1 porciones, en cada caso. En la Sierra fue 1,8 porciones de fruta al día, en promedio.

GRÁFICO Nº 1.20
PERÚ: PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO DE PORCIONES DE FRUTAS EN LA SEMANA
POR PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2014



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Porción de fruta y/o verdura

Según la OMS, el mayor consumo de frutas y verduras variadas garantiza un consumo suficiente de la mayoría de los micronutrientes, de fibra dietética y de una serie de sustancias no nutrientes esenciales.


A nivel nacional el 10,8% de personas de 15 y más años de edad consumió al menos cinco porciones de frutas y/o verduras al día. Por región natural, destacó Lima Metropolitana con 14,2% y Costa sin Lima Metropolitana con 13,7%.

GRÁFICO Nº 1.21

PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE CONSUMEN AL MENOS CINCO PORCIONES

DE FRUTA Y/O ENSALADA DE VERDURAS AL DÍA, SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2014

(Porcentaje)



Promedio diario de consumo de porciones de verduras

El consumo de verduras o vegetales es un componente importante para una dieta saludable, y el consumo diario podría prevenir enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer, por ello es necesario contar con cifras estadísticas que permitan evaluar la ingesta de verduras (excluidas las papas y otros tubérculos feculentos).

Los resultados de la encuesta muestran que las personas de 15 y más años de edad comieron 1,1 porciones diarias de ensalada de verdura. Dicho promedio es similar en cada una de las características seleccionadas (sexo, área de residencia y región natural) (Ver Anexo, Cuadro N° 1.18).

1.3.4 Sobrepeso y obesidad

El síndrome metabólico está compuesto por una serie de anormalidades que incluyen obesidad abdominal, anormalidades del metabolismo de la glucosa, hipertensión, y dislipidemia acompañado de un estado pro trombótico y proinflamatorio el cual lleva en el tiempo al desarrollo de diabetes mellitus 2, así como enfermedad vascular (enfermedad coronaria y enfermedad vascular cerebral).

Índice de masa corporal


El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso en kilos de una persona por el cuadrado de su talla en metros (kg/m²). Se consideran personas con sobrepeso cuando el IMC es mayor o igual a 25 kg/m². y se considera obesa cuando el IMC es mayor o igual a 30 kg/m².

En consecuencia el índice de masa corporal (IMC) es un indicador antropométrico indirecto de la cantidad de tejido graso en el cuerpo. Dicho índice correlaciona con el riesgo de otras enfermedades cardiovasculares y metabólico-endocrinológicas.

El Índice de masa corporal promedio de las personas de 15 y más fue 26,5 kg/m², lo que significa que se trata de una población con sobrepeso. Este índice es más elevado en las mujeres (28,0 kg/m²) que en los hombres (25,9 kg/m²).

En relación con la región natural, las personas residentes en Lima Metropolitana y Costa sin Lima Metropolitana tenían 27,7 y 27,1 de IMC en promedio, respectivamente en el momento de la encuesta; y, en la Sierra y Selva se encontraron 25,0 y 25,3 de IMC en promedio, respectivamente.

GRÁFICO Nº 1.22
PERÚ: ÍNDICE DE MASA CORPORAL PROMEDIO EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2014




Sobrepeso

El índice de masa corporal estima bastante bien el nivel de grasa corporal, pero en personas físicamente muy activas o en los deportistas no es un buen indicador de sobrepeso u obesidad. Asimismo, para el cálculo del indicador no se incluyó a las mujeres embarazadas.

El 34,7% de las personas de 15 y más años de edad, tienen sobrepeso. Según sexo, el 35,8% de los hombres y el 31,7% de las mujeres tenían sobrepeso, en el momento de la encuesta.

En Lima Metropolitana, el 40,2% se encontraban con sobrepeso, seguido por el 35,9% en Costa sin Lima Metropolitana y el 31,1% en la Selva. En la Sierra el 29,2% de personas de 15 y más años de edad resultaron con sobrepeso.


GRÁFICO № 1.23
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON
SOBREPESO, SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2014
(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Las personas de 15 y más años de edad que presentaron mayor porcentaje de sobrepeso se distribuyeron en Madre de Dios (42,5%), Arequipa (40,5%), Lima (40,1%) y Moquegua (39,5%); y, los menores porcentajes en Huancavelica (21,3%), Apurímac (24,0%) y Huánuco (24,9%).

GRÁFICO № 1.24 PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON SOBREPESO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2014 (Porcentaje)




Obesidad

La obesidad expresa la existencia de un exceso de tejido adiposo (grasa) en el cuerpo. La determinación de este indicador se basa en lo medido en forma objetiva durante la entrevista.


El 17,5% de las personas de 15 y más años de edad sufren de obesidad. En la distribución por sexo, el 26,2% de personas obesas son mujeres y el 14,4% hombres; encontrándose una diferencia de 11,8 puntos porcentuales. Según el área de residencia, en el área urbana el 21,3% resultaron ser obesos y en el área rural el 6,6%.

GRÁFICO № 1.25 PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON OBESIDAD, SEGÚN SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, 2014 (Porcentaje)



Según departamento, sobresalen los mayores porcentajes en, Tacna con 25,6%, lca con 24,6%, la Provincia Constitucional del Callao con 24,2%, Moquegua con 24,1% y Lima con 23,6%.

GRÁFICO № 1.26
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON OBESIDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2014
(Porcentaje)



() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Exceso de peso

Según la OMS, un sistema alimentario que no proporciona una cantidad suficiente de alimentos de calidad puede ocasionar tanto un crecimiento insuficiente como un exceso de peso.

En la población de 15 y más años de edad, el 52,2% padece de exceso de peso. El 57,9% de las mujeres tienen exceso de peso, 7,8 puntos porcentuales más que los hombres, 50,1%. Por región natural, en Lima Metropolitana alcanzó un a 64,1%, Costa sin Lima Metropolitana a 58,1%, Selva, 43,1% y la Sierra, 38,2%.

Lima Metropolitana

52,2

57,9

Costa (sin LM)

Selva

Total

Mujer Hombre

Sierra

38,2

GRÁFICO № 1.27
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON EXCESO DE PESO, SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2014
(Porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

1.4 Salud ocular

La salud ocular consiste en la ausencia de enfermedades en el sentido de la vista y estructura de los ojos, así como buena agudeza visual³.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el número de personas con impedimento visual debido a enfermedades oculares y errores refractivos no corregidos es de 314 millones. Asimismo, estima que de dicho total de personas con impedimento visual, 45 millones de personas son ciegas y de estas últimas, el 18% se debe a errores refractivos no corregidos⁴.

En el Perú los problemas visuales constituyen la segunda causa de discapacidad a nivel nacional, involucrando a cerca de 300,000 personas con discapacidad visual severa, en adición a 160,000 ciegos por diversas causas; de los cuales, solo un tercio cuenta con algún tipo de seguro y el resto tiene problemas de accesibilidad a los servicios de salud, agravados por su situación de pobreza⁵.

En el marco de la implementación del Programa Presupuestal de Enfermedades no Transmisibles, se incorporó en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2014, el Módulo de Salud Ocular, focalizando su atención en tres problemas oftalmológicos de primer orden: agudeza visual, errores de refracción y catarata. La población en estudio estuvo conformada por dos grupos de edad: niñas y niños menores de 12 años y adultos de 50 y más años de edad.

^{3/} Salud visual. Disponible en:http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/visual/definicion/salud-visual.html

^{4/} Plan estratégico nacional de salud ocular y prevención de la ceguera evitable (2014-2021). Lima, julio 2013. Disponible en: http://www.paho.org/per/images/stories/FtPage/2013/PlanENSOPC-RD-6julio2013_1v.pdf

^{5/} Problemas visuales son la segunda causa de discapacidad en el Perú – Colegio Médico del Perú. Disponible en: http://www.cmp.org.pe/component/content/article/56-ultimas/1693-problemas-visuales-son-la-segunda-causa-de-discapacidad-en-el-pais. html

1.4.1 Niñas y niños de 3 a 11 años de edad

Agudeza visual


La agudeza visual es la capacidad para discriminar claramente los detalles finos en objetos que están situados a una distancia determinada⁶. Esta capacidad oscila entre la visión completa y la falta de visión. Así, para una distancia constante al objeto, si el paciente ve nítidamente una letra pequeña, tiene más agudeza visual que otro que no la ve.

La valoración de la agudeza visual se realiza a través de un examen que consiste en distinguir letras en una cartilla, gráfica o tabla de Snellen. Para personas que no saben leer se usa otra prueba denominada Test de Lea, en la cual los símbolos a identificar son cuatro figuras (casa, manzana, círculo y cuadrado).

Los resultados referentes a la experiencia reportada por las personas encuestadas de haber recibido un examen administrado por personal de salud para medir su agudeza visual se presenta a continuación.

En el país, solo 15,1% de las niñas y niños de 3 a 11 años de edad recibió un examen de valoración de agudeza visual, efectuado por un personal de salud en los últimos 12 meses. Por grupo de edad, este porcentaje es mayor entre la población de 6 a 11 años de edad (19,7%).

GRÁFICO № 1.28
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON VALORACIÓN DE AGUDEZA VISUAL REALIZADO
POR UN PERSONAL DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD, 2014
(Porcentaje)




Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Por ámbito de residencia, la medición de agudeza visual fue mayor entre los residentes de la Costa (18,0%), así como de áreas urbanas (17,0%).


^{6/} La deficiencia visual. definición y tipologías. Disponible en:http://apsd.wikispaces.com/file/view/Deficiencia+visual+tipos.pdf

GRÁFICO № 1.29 PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON VALORACIÓN DE AGUDEZA VISUAL REALIZADO POR UN PERSONAL DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN ÁREA Y REGIÓN NATURAL DE RESIDENCIA, 2014 (Porcentaje)



Esta práctica fue mayor entre aquellos pertenecientes al quintil superior (26,9%), y disminuye según quintil de bienestar, hasta alcanzar un 9,6% entre aquellos del quintil inferior.

GRÁFICO № 1.30
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON VALORACIÓN DE AGUDEZA VISUAL REALIZADO
POR UN PERSONAL DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN QUINTIL DE BIENESTAR, 2014
(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


A nivel departamental, destaca Moquegua con 25,8%. En contraste, Ucayali presenta el porcentaje más bajo con 10,7%.

GRÁFICO № 1.31

PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON VALORACIÓN DE AGUDEZA VISUAL REALIZADO

POR UN PERSONAL DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2014

(Porcentaje)



() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Errores refractivos

Los errores refractivos o errores de refracción son trastornos oculares muy comunes, en los que el ojo no puede enfocar claramente las imágenes. El resultado es la visión borrosa, que a veces resulta tan grave que causa discapacidad visual⁷.

Los tres errores de refracción más comunes son la miopía (dificultad para ver claramente los objetos distantes); la hipermetropía (dificultad para ver claramente los objetos cercanos); y el astigmatismo (visión distorsionada debido a la curvatura anormal de la córnea, que es la superficie transparente que cubre el globo ocular). Un cuarto trastorno es la presbicia, que tiene como consecuencia la dificultad para leer o enfocar bien a un brazo de distancia. Se distingue de los otros trastornos en que se asocia al envejecimiento y afecta a todas las personas con edad avanzada.

Los errores de refracción no pueden prevenirse, pero pueden diagnosticarse en un examen oftalmológico y tratarse con anteojos correctores, lentes de contacto o cirugía refractiva.

La OMS calcula que en el mundo hay 153 millones de personas con discapacidad visual debido a errores de refracción no corregidos. Esta cifra no incluye a las personas con presbicia no corregida, que según indican algunas pruebas preliminares representan probablemente una proporción muy significativa.

^{7/} Qué son los errores de refracción. Disponible en: http://www.who.int/features/qa/45/es/


En el país, seis de cada 100 niñas y niños de 3 a 11 años de edad, recibió diagnóstico de errores refractivos, valorado en establecimientos de salud. Este diagnóstico es ligeramente mayor entre las niñas (6,5%), que entre los niños (6,1%).

GRÁFICO № 1.32

PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE ERRORES

REFRACTIVOS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD, SEGÚN SEXO, 2014


(Porcentaje)



Nota: Errores refractivos comprende miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Por ámbito de residencia, el diagnóstico de errores refractivos mostró diferencias entre el área urbana (8,6%) y rural (1,3%). Del mismo modo, entre la Costa (9,1%) y la Selva (2,0%).

GRÁFICO № 1.33
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS
EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD, SEGÚN ÁREA Y REGIÓN NATURAL DE RESIDENCIA, 2014
(Porcentaje)



Nota: Errores refractivos comprende miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


La prevalencia de errores refractivos fue mayor entre las niñas y niños pertenecientes al quintil superior (16,4%), en comparación con aquellos del segundo quintil (3,4%).

GRÁFICO № 1.34

PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE ERRORES

REFRACTIVOS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD, SEGÚN QUINTIL DE BIENESTAR, 2014

(Porcentaje)



Nota: Errores refractivos comprende miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia.


() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Tratamiento correctivo con lentes

A nivel nacional, el tratamiento correctivo con lentes, en menores de 3 a 11 años de edad fue de 62,0%, superior en las niñas (65,1%), en comparación con los niños (58,9%).

GRÁFICO № 1.35
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE ERRORES
REFRACTIVOS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y QUE RECIBIERON TRATAMIENTO
CORRECTIVO CON LENTES, SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD, 2014
(Porcentaje)




Nota: Errores refractivos comprende miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Asimismo, el tratamiento correctivo con lentes, mostró importantes diferencias entre los menores residentes en la Costa (65,7%), Sierra (52,9%) y Selva (46,3%).

GRÁFICO Nº 1.36

PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y QUE RECIBIERON TRATAMIENTO CORRECTIVO CON LENTES, SEGÚN ÁREA Y REGIÓN NATURAL DE RESIDENCIA, 2014

(Porcentaje)



Nota: Errores refractivos comprende miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia.

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

El tratamiento correctivo con lentes fue notablemente mayor entre los menores ubicados en el quintil superior (81,9%), en comparación con aquellos pertenecientes a cada uno del resto de quintiles.

GRÁFICO Nº 1.37

PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y QUE RECIBIERON TRATAMIENTO CORRECTIVO CON LENTES, SEGÚN QUINTIL DE BIENESTAR, 2014

(Porcentaje)



Nota: Errores refractivos comprende miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia.

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


Tratamiento con lentes de forma permanente

El 66,7% de las niñas y niños diagnosticados con errores refractivos recibe tratamiento con lentes en forma permanente, especialmente el grupo de 3 a 5 años de edad (82,5%).

GRÁFICO Nº 1.38

PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y QUE RECIBEN TRATAMIENTO CON LENTES DE MANERA PERMANENTE, SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD, 2014

(Porcentaje)



Nota: Errores refractivos comprende miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

La mayor frecuencia de este tratamiento se ubica en el área urbana (67,9%) y la Costa (70,1%).


GRÁFICO № 1.39

PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS

EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y QUE RECIBEN TRATAMIENTO CON LENTES DE MANERA

PERMANENTE, SEGÚN ÁREA Y REGIÓN NATURAL DE RESIDENCIA, 2014

(Porcentaje)




Nota: Errores refractivos comprende miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia.

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Asimismo, el tratamiento con lentes permanentes es mayor entre aquellos menores pertenecientes al cuarto quintil (75,7%) y quintil superior (69,4%).

GRÁFICO № 1.40
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS
EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y QUE RECIBEN TRATAMIENTO CON LENTES DE MANERA
PERMANENTE, SEGÚN QUINTIL DE BIENESTAR, 2014
(Porcentaje)



Nota: Errores refractivos comprende miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia.

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


Prácticas adecuadas de salud ocular

Prácticas adecuadas de salud ocular se refiere a los hábitos y conductas que, ejecutados de forma correcta y consistente, pueden prevenir el desarrollo de afecciones oculares o retrasar su aparición. Cuanto más temprano en la vida se adopten estas prácticas, más probable será su asimilación como parte de las conductas saludables que a futuro contribuirán a prevenir enfermedades oculares.

Es oportuno acotar que el indicador no permite verificar si realmente las prácticas se ejecutan y en qué medida o si éstas son correcta o incorrectamente ejecutadas. Sin embargo, es posible que exista un sesgo de deseabilidad social con un subsecuente sobrereporte de buenas prácticas.

En el país, el 12,6% de las niñas y niños de 3 a 11 años de edad, ejecutan prácticas adecuadas de salud ocular, reportadas por el responsable del cuidado del menor. Este porcentaje es mayor en el grupo de 3 a 5 años de edad (18,8%).

GRÁFICO № 1.41
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON PRÁCTICAS ADECUADAS
DE SALUD OCULAR, SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD, 2014
(Porcentaje)




Nota: Prácticas adecuadas de salud ocular se refiere a los hábitos y conductas que pueden prevenir el desarrollo de afecciones oculares o retrasar su aparición (ver televisión/ computadora/ laptop/ tablet, a una distancia no menor de 30 centímetros, usar gorro con visera, sombrero o lentes de sol durante todo el año mientras se permanece en un lugar sin techo, buena iluminación en el ambiente donde se lee, no leer un texto mientras se está caminando, en el carro o en el mototaxi).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Por ámbito de residencia, se encontró una mayor frecuencia de buenas prácticas en el área rural (16,0%), que en el área urbana (11,0%). Asimismo, la ejecución de prácticas adecuadas fue mayor en la Sierra (19,9%), en comparación con la Costa (9,8%) y la Selva (6,9%).

GRÁFICO № 1.42
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON PRÁCTICAS ADECUADAS
DE SALUD OCULAR, SEGÚN ÁREA Y REGIÓN NATURAL DE RESIDENCIA, 2014
(Porcentaje)




Nota: Prácticas adecuadas de salud ocular se refiere a los hábitos y conductas que pueden prevenir el desarrollo de afecciones oculares o retrasar su aparición (ver televisión/ computadora/ laptop/ tablet, a una distancia no menor de 30 centímetros, usar gorro con visera, sombrero o lentes de sol durante todo el año mientras se permanece en un lugar sin techo, buena iluminación en el ambiente donde se lee, no leer un texto mientras se está caminando, en el carro o en el mototaxi).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

La realización de prácticas adecuadas de salud ocular (12,6% a nivel nacional), muestra diferencias por quintil de bienestar, siendo mayor en el quintil inferior con 15,4%.

GRÁFICO № 1.43
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON PRÁCTICAS
ADECUADAS DE SALUD OCULAR, SEGÚN QUINTIL DE BIENESTAR, 2014
(Porcentaje)




Nota: Prácticas adecuadas de salud ocular se refiere a los hábitos y conductas que pueden prevenir el desarrollo de afecciones oculares o retrasar su aparición (ver televisión/ computadora/ laptop/ tablet, a una distancia no menor de 30 centímetros, usar gorro con visera, sombrero o lentes de sol durante todo el año mientras se permanece en un lugar sin techo, buena iluminación en el ambiente donde se lee, no leer un texto mientras se está caminando, en el carro o en el mototaxi).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Por departamento, destacan Apurímac (30,6%) y Puno (29,8) en la ejecución de buenas prácticas de salud ocular. En contraste, Loreto y Lambayeque mostraron bajos porcentajes (7,3% y 7,7%).

GRÁFICO № 1.44
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON PRÁCTICAS
ADECUADAS DE SALUD OCULAR, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2014
(Porcentaje)



Nota: Prácticas adecuadas de salud ocular se refiere a los hábitos y conductas que pueden prevenir el desarrollo de afecciones oculares o retrasar su aparición (ver televisión/ computadora/ laptop/ tablet, a una distancia no menor de 30 centímetros, usar gorro con visera, sombrero o lentes de sol durante todo el año mientras se permanece en un lugar sin techo, buena iluminación en el ambiente donde se lee, no leer un texto mientras se está caminando, en el carro o en el mototaxi).

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

1.4.2 Personas de 50 y más años de edad

Agudeza visual

A nivel nacional, el 27,8% de personas 50 y más años de edad, reportó un examen de valoración de agudeza visual realizado por personal de salud.


GRÁFICO № 1.45
PERÚ: PERSONAS DE 50 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON VALORACIÓN DE AGUDEZA VISUAL REALIZADA
POR UN PERSONAL DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD, 2014
(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Por área de residencia, este examen de agudeza visual muestra importantes diferencias, siendo más frecuente entre los residentes del área urbana (33,7%) y aquellos de la región Costa (35,3%).

GRÁFICO № 1.46
PERÚ: PERSONAS DE 50 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON VALORACIÓN DE AGUDEZA
VISUAL REALIZADA POR UN PERSONAL DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES,
SEGÚN ÁREA Y REGIÓN NATURAL DE RESIDENCIA, 2014
(Porcentaje)




Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Destacan las diferencias según características tales como educación y capacidad económica. Así, 19,8% de adultos con educación primaria o menos y 8,3% de aquellos del quintil inferior de bienestar recibieron el examen de valoración visual, frente al 42,8% y 46,7% de adultos con educación superior, y pertenecientes al quintil superior, respectivamente.

GRÁFICO № 1.47

PERÚ: PERSONAS DE 50 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON VALORACIÓN DE AGUDEZA VISUAL REALIZADA POR UN PERSONAL DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN Y QUINTIL DE BIENESTAR, 2014




Por departamento destacan Lima (39,1%), la Provincia Constitucional del Callao (38,9%) y Tacna (38,2%), en tanto, Puno (13,4%) y Junín (16,1%) mostraron los menores porcentajes.

GRÁFICO № 1.48

PERÚ: PERSONAS DE 50 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON VALORACIÓN DE AGUDEZA VISUAL REALIZADA

POR UN PERSONAL DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2014

(Porcentaje)



() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


Diagnóstico de cataratas

En medicina oftalmológica, se llama catarata a la opacificación total o parcial del cristalino. A nivel mundial, se estima que el 51% de los casos de ceguera (19,7 millones) se debe a las cataratas, que aparecen con la edad y son la causa principal de ceguera. La operación de cataratas constituye una de las intervenciones sanitarias con más alto costo-beneficio⁸.

La prevalencia de catarata aumenta con la edad y presenta variaciones en los ámbitos urbano y rural.

A nivel nacional, el 13,2% de las personas encuestadas de 50 y más años de edad manifestó haber recibido el diagnóstico de catarata, principalmente aquellos de 70 y más años de edad (24,6%).

GRÁFICO № 1.49
PERÚ: PERSONAS DE 50 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE RECIBIERON EL DIAGNÓSTICO DE CATARATAS,
SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD, 2014
(Porcentaje)




Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Según ámbito de residencia, la prevalencia de catarata fue mayor entre los residentes del área urbana (14,7%) y la región Costa (14,3%).


 $^{8/\ \} Ceguera\ y\ discapacidad\ visual\ Nota\ descriptiva\ N^{\circ}\ 282\ \ Octubre\ de\ 2013.\ .\ Disponible\ en:\ http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/es/$

GRÁFICO Nº 1.50
PERÚ: PERSONAS DE 50 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE RECIBIERON EL DIAGNÓSTICO
DE CATARATAS, SEGÚN ÁREA Y REGIÓN NATURAL DE RESIDENCIA, 2014
(Porcentaje)



Esta enfermedad fue diagnosticada con mayor frecuencia en adultos con menor nivel de educación, hasta primaria o menos (14,4%) y aquellos ubicados en el cuarto quintil de bienestar (17,1%).

GRÁFICO № 1.51
PERÚ: PERSONAS DE 50 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE RECIBIERON EL DIAGNÓSTICO
DE CATARATAS, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN Y QUINTIL DE BIENESTAR, 2014
(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


A nivel nacional, el 20,1% de personas de 50 y más años de edad, reportó dificultad para ver de lejos. Según sexo, este problema es mayor entre mujeres (23,0%), que entre hombres (16,5%). Asimismo, es más frecuente en el grupo de 70 y más años de edad (31,3%) que entre los de 50 a 59 años de edad (14,8%).

GRÁFICO № 1.52

PERÚ: PERSONAS DE 50 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIFICULTAD PARA VER DE LEJOS EN

LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD, 2014


(Porcentaje)



Por ámbito de residencia, la dificultad para ver de lejos muestra importantes diferencias, siendo más frecuente entre los residentes del área rural (22,4%) y la Selva (25,7%).

GRÁFICO № 1.53

PERÚ: PERSONAS DE 50 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIFICULTAD PARA VER DE LEJOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN ÁREA Y REGIÓN NATURAL DE RESIDENCIA, 2014 (Porcentaje)




Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Asimismo, esta dificultad para ver de lejos afecta más a los adultos con menor nivel de educación (24,8%) y aquellos ubicados en el quintil inferior de bienestar (24,5%).

GRÁFICO № 1.54


PERÚ: PERSONAS DE 50 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIFICULTAD PARA VER DE LEJOS EN
LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN Y QUINTIL DE BIENESTAR, 2014

(Porcentaje)



A nivel departamental, Ayacucho (32,9%) y San Martín (29,9%) muestran altos porcentajes de población afectada por dificultades para ver de lejos. En el otro extremo, se encuentran Piura (15,3%) y Lima (16,1%) que mostraron una menor prevalencia.

GRÁFICO Nº 1.55
PERÚ: PERSONAS DE 50 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIFICULTAD PARA VER DE LEJOS EN
LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2014
(Porcentaje)



() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

1.5 Salud bucal

La salud bucal puede definirse como la ausencia de dolor orofacial (perteneciente a la boca y a la cara) crónico, cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos como labio leporino o paladar hendido, enfermedades periodontales (de las encías), caries dental y pérdida de dientes, y otras enfermedades y trastornos que afectan a la boca y la cavidad bucal⁹.

Las enfermedades bucodentales comparten factores de riesgo con las enfermedades crónicas más comunes como las enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes. Siendo el factor de riesgo más importante una higiene bucodental deficiente¹⁰.

En el Perú, la alta prevalencia de enfermedades de la cavidad bucal constituye uno de los 12 principales problemas sanitarios del país.

Según el Estudio Epidemiológico realizado a nivel nacional los años 2001-2002, la prevalencia de caries dental es de 90,4%; además en lo que se refiere a caries dental el índice de dientes cariados, perdidos y obturados (CPOD), a los 12 años de edad es de aproximadamente seis. El Perú, según la Organización Panamericana de la Salud – OPS es un país en estado de emergencia.

1.5.1 Niñas y niños de 1 a 11 años de edad

Prácticas de salud bucal

Las prácticas de salud bucal se refieren a las estrategias activas que se implementan sobre la boca, lengua, dientes y encías para preservar su higiene y funcionalidad, así como prevenir su deterioro.


El ejercicio de prácticas adecuadas de higiene bucal es una actividad poco frecuente entre la población de 1 a 11 años de edad.

A nivel nacional, solo el 24,4% de este colectivo realiza buenas prácticas de salud bucal. El porcentaje es similar por sexo (23,9% en niños y 24,9% en niñas).

^{9/} Salud Bucodental. Disponible en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/es/

^{10/} Salud Bucal. Disponible en: http://www.minsa.gob.pe/portalweb/06prevencion/prevencion_2.asp?sub5=13

GRÁFICO № 1.56
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 1 A 11 AÑOS DE EDAD CON PRÁCTICAS
ADECUADAS DE HIGIENE BUCAL, SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD, 2014
(Porcentaje)




Nota: Prácticas adecuadas de higiene bucal se refiere a las estrategias activas que se implentan sobre la boca, lengua, dientes y encías para preservar su higiene y funcionalidad, así como prevenir su deterioro.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Según ámbito de residencia, la ejecución de estas buenas prácticas mostró importantes diferencias entre residentes urbanos (27,5%), y rurales (17,5%); así como de aquellos de la Costa (29,3%) y la Sierra (16,5%).

GRÁFICO № 1.57
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 1 A 11 AÑOS DE EDAD CON PRÁCTICAS ADECUADAS
DE HIGIENE BUCAL, SEGÚN ÁREA Y REGIÓN NATURAL DE RESIDENCIA, 2014
(Porcentaje)



Nota: Prácticas adecuadas de higiene bucal se refiere a las estrategias activas que se implentan sobre la boca, lengua, dientes y encías para preservar su higiene y funcionalidad, así como prevenir su deterioro.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


De igual modo, el ejercicio de prácticas de higiene bucal fue mayor entre los menores ubicados en el quintil superior con 35,5%. Luego, disminuye en los demás quintiles hasta el 17,2% en el quintil inferior.

GRÁFICO № 1.58

PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 1 A 11 AÑOS DE EDAD CON PRÁCTICAS

ADECUADAS DE HIGIENE BUCAL, SEGÚN QUINTIL DE BIENESTAR, 2014

(Porcentaje)




Nota: Prácticas adecuadas de higiene bucal se refiere a las estrategias activas que se implentan sobre la boca, lengua, dientes y encías para preservar su higiene y funcionalidad, así como prevenir su deterioro.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Por departamento, el ejercicio de prácticas adecuadas de higiene bucal fue mayor en la Provincia Constitucional del Callao y San Martín (35,3% y 34,2%, respectivamente). En Cusco este porcentaje disminuye a 8,7%.

GRÁFICO № 1.59
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 1 A 11 AÑOS DE EDAD CON PRÁCTICAS
ADECUADAS DE HIGIENE BUCAL, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2014
(Porcentaje)



Nota: Prácticas adecuadas de higiene bucal se refiere a las estrategias activas que se implentan sobre la boca, lengua, dientes y encías para preservar su higiene y funcionalidad, así como prevenir su deterioro.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


⁽⁾ Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

Atención en un servicio odontológico

El 27,6% de las niñas y niños menores de 12 años de edad recibió atención odontológica en los últimos seis meses.

A nivel nacional, según edad acudieron con mayor frecuencia las niñas y niños de 3 a 11 años para recibir atención odontológica, principalmente los menores con edades de 6 a 11 años (33,3%).


GRÁFICO № 1.60
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS DE EDAD QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN UN
SERVICIO ODONTOLÓGICO EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD, 2014
(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Por ámbito de residencia, el 30,8% de los menores de 12 años de edad residentes del área urbana y el 20,6% del área rural, recibió atención odontológica. Asimismo, la Costa mostró el mayor porcentaje (30,2%), seguido de la Sierra (27,9%). El menor porcentaje se encontró en la Selva con 18,8%.


GRÁFICO № 1.61
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS DE EDAD QUE HAN SIDO ATENDIDOS
EN UN SERVICIO ODONTOLÓGICO EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, SEGÚN ÁREA Y
REGIÓN NATURAL DE RESIDENCIA, 2014
(Porcentaje)



 $\label{prop:continuous} \textbf{Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.}$


Por quintil de bienestar, se observó notables diferencias. Así, el 42,4% de los menores de 12 años del quintil superior recibió atención odontológica en los últimos seis meses. Este porcentaje se reduce a 18,2% entre aquellos ubicados en el quintil inferior.

GRÁFICO Nº 1.62
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS DE EDAD QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN UN
SERVICIO ODONTOLÓGICO EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, SEGÚN QUINTIL DE BIENESTAR, 2014
(Porcentaje)



Según departamento, destacan por el mayor porcentaje de menores de 12 años de edad que recibieron servicio odontológico: Huancavelica (45,8%), Apurímac (40,5%) y Ayacucho (39,6%). En el otro extremo se encuentran Ucayali (14,0%) y Piura (16,4%).

GRÁFICO Nº 1.63
PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS DE EDAD QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN UN
SERVICIO ODONTOLÓGICO EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2014
(Porcentaje)



^() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Responsables del cuidado de niñas y niños, menores de 12 años, informados sobre prácticas de salud bucal

Información sobre prácticas de salud bucal

La información sobre prácticas de salud bucal, se refiere a los conceptos teóricos que ha recibido el responsable de los menores para el cuidado bucal de ellos, independientemente de la fuente o medio de donde proviene esta información.

En el país, el 57,9% de los responsables del cuidado de menores de 12 años, recibió información sobre prácticas de salud bucal en los últimos 12 meses, principalmente mujeres (58,3%). Según la edad de los responsables, la mayor proporción correspondió a los grupos de 40 a 49 años (61,9%) y de 30 a 39 años (60,1%).


GRÁFICO № 1.64

PERÚ: RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS

DE EDAD QUE RECIBIERON INFORMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS DE SALUD

BUCAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD, 2014

(Porcentaje)




Nota: Prácticas adecuadas de higiene bucal se refiere a las estrategias activas que se implentan sobre la boca, lengua, dientes y encías para preservar su higiene y funcionalidad, así como prevenir su deterioro.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Según ámbito de residencia, este conocimiento fue de 60,7% entre los responsables de menores residentes del área urbana y de 50,6% entre aquellos residentes del área rural. Por región natural, la Costa mostró el más alto porcentaje (60,6%), seguida por la Sierra (57,6%). La Selva mostró el menor porcentaje con 48,6%.

GRÁFICO Nº 1.65

PERÚ: RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS DE EDAD QUE RECIBIERON INFORMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS DE SALUD BUCAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN ÁREA Y REGIÓN NATURAL DE RESIDENCIA, 2014 (Porcentaje)



Nota: Prácticas adecuadas de higiene bucal se refiere a las estrategias activas que se implentan sobre la boca, lengua, dientes y encías para preservar su higiene y funcionalidad, así como prevenir su deterioro.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Se encontró diferencias importantes según nivel de educación y capacidad económica. Así, 48,6% de adultos con educación primaria o menos y 48,3% de aquellos ubicados en el quintil inferior de bienestar recibieron información sobre prácticas de salud bucal, en los últimos 12 meses, frente al 68,5% y 71,2% de adultos con educación superior, y pertenecientes al quintil superior, respectivamente.


GRÁFICO № 1.66

PERÚ: RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS

DE EDAD QUE RECIBIERON INFORMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS DE SALUD BUCAL

EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN Y QUINTIL DE BIENESTAR, 2014

(Porcentaje)




Nota: Prácticas adecuadas de higiene bucal se refiere a las estrategias activas que se implentan sobre la boca, lengua, dientes y encías para preservar su higiene y funcionalidad, así como prevenir su deterioro.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

A nivel departamental, el 79,7% de los responsables de menores de 12 años de Huancavelica y el 77,0% de aquellos de Apurímac, recibieron información sobre prácticas de salud bucal. Ucayali presenta el porcentaje más bajo con 36,4%.

GRÁFICO Nº 1.67

PERÚ: RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS DE EDAD QUE RECIBIERON INFORMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS DE SALUD BUCAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2014 (Porcentaje)



Nota: Prácticas adecuadas de higiene bucal se refiere a las estrategias activas que se implentan sobre la boca, lengua, dientes y encías para preservar su higiene y funcionalidad así, como prevenir su deterioro.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

1.5.2 Personas de 60 y más años de edad

Atención en un servicio odontológico

La población de adultos mayores es más propensa a tener enfermedades de dientes y encías y por lo tanto a requerir tratamientos.

La concurrencia a servicios odontológicos es una actividad poco frecuente entre la población de 60 y más años de edad. Asimismo, es notablemente menor entre los residentes rurales.


En el país, el 22,1% de este colectivo fue atendido en un servicio odontológico en los últimos 12 meses. Según sexo, el porcentaje fue mayor en hombres (23,3%), que en mujeres (21,1%). Por grupos de edad, fue mayor entre aquellos de 60 a 69 años (23,3%) que entre los de 70 y más (20,9%).

GRÁFICO № 1.68

PERÚ: ADULTOS DE 60 Y MÁS AÑOS DE EDAD ATENDIDOS EN UN SERVICIO


ODONTOLÓGICO DURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD, 2014

(Porcentaje)



Según ámbito de residencia, la atención odontológica, fue de 26,2% entre los residentes urbanos y de 12,0% entre aquellos del área rural. Se mantienen las diferencias entre las regiones: superior en la Costa (27,0%), en comparación con la Sierra (16,3%) y la Selva (12,7%).


GRÁFICO № 1.69
PERÚ: ADULTOS DE 60 Y MÁS AÑOS DE EDAD ATENDIDOS EN UN SERVICIO ODONTOLÓGICO
DURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, SEGÚN ÁREA Y REGIÓN NATURAL DE RESIDENCIA, 2014
(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

De igual manera, se mantienen las diferencias por nivel de educación y quintil de bienestar, con porcentajes mayores de atención odontológica entre aquellos con educación superior (44,7%), ubicados en el quintil superior (35,1%), en comparación con los menos educados (14,9%) y pertenecientes al quintil inferior de bienestar (9,5%).

GRÁFICO № 1.70
PERÚ: ADULTOS DE 60 Y MÁS AÑOS DE EDAD ATENDIDOS EN UN SERVICIO ODONTOLÓGICO
DURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN Y QUINTIL DE BIENESTAR, 2014
(Porcentaje)



1.6 Salud mental

En el contexto de la implementación del Programa Presupuestal de Enfermedades no Transmisibles, se incorporó en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2014, el Módulo de Salud Mental, focalizando su atención en dos problemas fundamentales: la violencia física de pareja y el consumo de bebidas alcohólicas.

La salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo conoce sus capacidades, afronta las tensiones normales de la vida, trabaja en forma productiva y contribuye a su comunidad¹¹.

1.6.1 Violencia física de pareja

La violencia física de pareja genera consecuencias inmediatas y agudas así como de larga duración y crónicas. Entre las consecuencias más comunes de la violencia física en las mujeres se encuentran la depresión, tendencia a intentos de suicidio, trastornos de estrés postraumático, trastornos de ansiedad, trastornos de sueño, trastornos alimentarios y trastornos psicosomáticos¹². La violencia de pareja tiene un importante impacto en la mortalidad. Así, se estima que del total de homicidios ocurridos en Lima entre 2000-2008, el 12,0% fue resultado de violencia de pareja. Del total de mujeres fallecidas por homicidios en ese periodo, 40,0% fueron asesinadas por su pareja¹³.

En el país, 5,3% de las personas encuestadas de 15 años y más de edad, en mayor porcentaje las mujeres (6,7%) que los hombres (3,7%), reportaron haber sufrido violencia física por parte de su pareja en los últimos 12 meses. Con relación al grupo de edad, esta experiencia se reportó con mayor frecuencia entre las personas de 20 a 29 años de edad.

^{11/} OMS | Salud mental: un estado de bienestar [Internet]. WHO. [cited 2014 May 8]. Available from: http://www.who.int/features/factfiles/mental health/es/

^{12/} Campbell J, Jones AS, Dienemann J, Kub J, Schollenberger J, O'Campo P, et al. Intimate partner violence and physical health consequences. Arch Intern Med. 2002 May 27;162(10):1157–63.


^{13/ ¿}Quiénes son asesinad@s en Lima? ¿Cómo, cuándo y por qué? [Internet]. [cited 2014 May 8]. Available from: http://www.ciudadnues-tra.org/index.php?fp_cont=1946

GRÁFICO № 1.71

PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE FUERON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FÍSICA

DE PAREJA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD, 2014


(Porcentaje)



() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

La prevalencia de violencia de pareja muestra diferencias poco significativas entre el área urbana (5,5%) y rural (4,8%), así como por región natural, los porcentajes varían entre 5,2% y 5,7%.

GRÁFICO № 1.72
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE FUERON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FÍSICA
DE PAREJA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN ÁREA Y REGIÓN NATURAL DE RESIDENCIA, 2014
(Porcentaje)




Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

No obstante, la violencia de pareja muestra algunas diferencias por nivel de educación y quintil de bienestar. Las víctimas se encontraron principalmente entre aquellos con educación secundaria (6,4%) así como en el quintil intermedio de bienestar (6,8%).

GRÁFICO № 1.73

PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE FUERON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FÍSICA DE PAREJA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN Y QUINTIL DE BIENESTAR, 2014 (Porcentaje)




() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

1.6.2 Edad promedio de inicio de consumo de alguna bebida alcohólica

En el Perú, una gran proporción de personas inicia tempranamente el consumo de bebidas alcohólicas. En escolares de secundaria, la edad promedio del primer consumo de bebidas alcohólicas es de 13 años de edad¹⁴. Resulta importante determinar el momento de inicio de patrones de consumo de ingesta de no solo un sorbo sino de una mayor cantidad de alcohol como un vaso o copa.

En las personas de 15 y más años de edad, la edad promedio de inicio de consumo de al menos un vaso o copa de bebida alcohólica fue de 19,1 años. Según sexo, la edad promedio de inicio entre hombres es de 17,9 años, mientras que en las mujeres el inicio de este patrón de consumo ocurre en promedio a los 20,3 años de edad.

GRÁFICO Nº 1.74
PERÚ: EDAD PROMEDIO DE INICIO DE CONSUMO DE ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA EN PERSONAS
DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD, 2014



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


^{14/} DEVIDA. Estudio Nacional: Prevención y consumo de drogas en estudiantes de secundaria 2005.

Según ámbito de residencia, la edad promedio de inicio es bastante similar en el área urbana (19,0%) y rural (19,8%); ligeramente mayor en la Sierra (19,9) que en la Selva 19,1 años. La Costa registró la menor edad de inicio con 18,8 años.

GRÁFICO № 1.75

PERÚ: EDAD PROMEDIO DE INICIO DE CONSUMO DE ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA EN PERSONAS

DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁREA Y REGIÓN NATURAL DE RESIDENCIA, 2014




Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

La edad de inicio de consumo de alguna bebida alcohólica tiende a ser más tardía entre aquellos con educación primaria o menos (21,0 años), así como entre los pertenecientes al quintil inferior de bienestar (19,8 años).

GRÁFICO № 1.76

PERÚ: EDAD PROMEDIO DE INICIO DE CONSUMO DE ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA EN PERSONAS


DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN Y QUINTIL DE BIENESTAR, 2014



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Por departamentos, la edad promedio de inicio de consumo de alguna bebida alcohólica es más tardía en Puno (21,9 años), Pasco (20,4 años) y Huancavelica (20,3 años). En contraste, el inicio temprano de este patrón de consumo ocurre en promedio a los 18,0 años de edad en Apurímac.

GRÁFICO Nº 1.77
PERÚ: EDAD PROMEDIO DE INICIO DE CONSUMO DE ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA
EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2014



1.6.3 Trastornos por consumo de alcohol

Los trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de alcohol son un conjunto de eventos psicopatológicos iniciados con la intoxicación aguda y sus diferentes manifestaciones. El alcohol que a dosis bajas parece tener efectos estimulantes del comportamiento, produce agitación y agresividad al aumentar la dosis, y a niveles muy elevados da lugar a una clara sedación.


En el país, 5,4% de las personas de 15 y más años de edad que consumió alcohol sufrió trastornos. La prevalencia fue notablemente mayor en hombres (9,8%) con respecto a las mujeres (1,5%), y en el grupo 20 a 29 años de edad (9,3%) comparados con los de 50 a 59 años de edad (4,0%).

GRÁFICO № 1.78

PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON TRASTORNO POR CONSUMO

DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD, 2014

(Porcentaje)




() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

La prevalencia de trastornos por consumo de alcohol fue mayor en el área urbana (6,3%) y la región Costa (6,4%). Entre los residentes del área rural y la Sierra estos porcentajes se reducen a 2,6% y 3,7%, respectivamente.

GRÁFICO № 1.79
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON TRASTORNO POR CONSUMO DE ALCOHOL EN
LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN ÁREA Y REGIÓN NATURAL DE RESIDENCIA, 2014


(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Destacan las diferencias según educación y capacidad económica. Así, 7,8% de adultos con educación superior y 7,9% de aquellos pertenecientes al quintil superior de bienestar sufrieron trastornos por consumo de alcohol. La prevalencia fue menor entre aquellos con educación primaria o menos (1,8%), así como entre los pertenecientes al quintil inferior de bienestar (2,0%).

GRÁFICO № 1.80
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON TRASTORNO POR CONSUMO DE ALCOHOL
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN Y QUINTIL DE BIENESTAR, 2014
(Porcentaje)



CAPÍTULO 2

Programa de Prevención y Control del Cáncer

2. Programa de Prevención y Control del Cáncer

El cáncer es un problema de salud pública, el aumento creciente de las tasas de incidencia y las tasas de mortalidad asociadas a neoplasias generan aumento de los costos a los sistemas de salud por utilización de servicios. La carga de enfermedad por cáncer se debe principalmente a la utilización de los servicios terapéuticos, como la quimioterapia, radioterapia y cirugía, procedimientos que conllevan a costos elevados y a la necesidad de infraestructura adecuada con recursos humanos capacitados. Ningún sistema de salud está preparado para sostener el gasto que genera el aumento de la incidencia de cáncer en las últimas décadas. Por lo cual, en países de bajos y medianos ingresos como el nuestro, la presencia de cáncer es con mayor razón un problema de salud pública.

Las políticas sanitarias abordan el problema del cáncer desde la prevención y detección precoz de casos de cáncer en personas con factores de riesgo. La mayor parte de las neoplasias en Perú están asociadas a hábitos de vida poco saludables como es el consumo excesivo de tabaco y alcohol, consumo exagerado de grasas y poco consumo de vegetales; también están asociadas a agentes infecciosos como el virus del papiloma humano (VPH) y el Helicobacter pylori. Las principales neoplasias en adultos a nivel nacional están localizadas en el cérvix, estómago, mama, piel y próstata. Se pueden realizar intervenciones sobre los factores modificables como el consumo de tabaco y alcohol o la ingesta de vegetales para disminuir la incidencia de algunas neoplasias. Otras estrategias relacionadas con métodos de detección precoz del cáncer de cérvix, de mama o colon-rectal, permiten un tratamiento oportuno disminuyendo la mortalidad.

Percepción del cáncer como enfermedad prevenible

El concepto de percepción del cáncer como una enfermedad prevenible se refiere a que la población reconoce que existen actividades que se pueden realizar para evitar la aparición del cáncer o para un diagnóstico precoz¹⁵. Esto supone un conocimiento previo de la enfermedad y su riesgo e involucra diversos factores culturales y sociales. La valoración del cáncer como una enfermedad prevenible es importante para acercar a la población hacia los programas de detección precoz de cáncer y hacia el cambio de factores de riesgo modificables como el uso del tabaco y el alcohol¹⁶.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 89,6% de las personas de 15 a 59 años de edad consideran que el cáncer es prevenible. Por sexo, el 91,0% de los hombres creen que el cáncer se puede evitar y en las mujeres el 88,5%.

La percepción de que el cáncer es prevenible se presenta en mayor porcentaje entre residentes de Lima Metropolitana (93,3%) y Costa sin Lima Metropolitana (91,6%); y, el menor porcentaje en la Sierra (84,7%).


^{15/} Chan CWH, Yang S_B, Gu C, Wang X, Tao L. Perception of Cervical Cancer Risk and Screening / Behavior: A Literature Review. Int J Nurs Knowl. 2014 Mar 27.

^{16/} Lannin DR, Mathews HF, Mitchell J, Swanson MS, Swanson FH, Edwards MS. Influence of socioeconomic and cultural factors on racial differences in late-stage presentation of breast cancer. Jama. 1998; 279(22):1801–7.

GRÁFICO № 2.1

PERÚ: PERSONAS DE 15 A 59 AÑOS DE EDAD QUE CONSIDERA QUE
EL CÁNCER ES PREVENIBLE, SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2014

(Porcentaje)



Virus del Papiloma humano y cáncer cervical

La infección por el virus del papiloma humano (VPH) se ha convertido en las últimas décadas en la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo, sobre todo en los adolescentes y adultos jóvenes¹⁷. Existen más de 100 genotipos de VPH que pueden infectar al ser humano y de ellos 30 aproximadamente tienen predilección por el tracto genital, mucosa oral y respiratoria¹⁸. Algunos genotipos del VPH pueden provocar cáncer como es el caso de los genotipos 16 y 18 que están asociados a cáncer de la zona anogenital como el cérvix, vulva, vagina, pene, anal¹⁹ y también a cáncer en la zona y cáncer de cabeza y cuello siendo los principales los ubicados en la región orofaríngea²⁰.

La identificación del VPH como una causa de cáncer de cuello uterino por parte de las personas es importante pues permite tener una aproximación a su percepción de riesgo de padecer cáncer de cuello uterino²¹. Muchas intervenciones están diseñadas para acercar los servicios de detección precoz de cáncer a los grupos en riesgo²², otras intervenciones están orientadas a fomentar los estilos de vida saludable y modificar conductas sexuales de riesgo²³, todas ellas destinadas a disminuir los casos de cáncer. Sin embargo, estas intervenciones pueden fallar cuando la población objetivo no es consciente del riesgo de padecer cáncer de cuello uterino y que es una enfermedad que puede detectarse precozmente cuando se participa regularmente de las actividades de despistaje. Poblaciones con un reconocimiento del VPH como agente causal de cáncer cervical podrían tener una mayor disposición a participar de los programas orientados a prevenir éste cáncer.

El 41,5% de las personas de 15 a 59 años de edad creen que el virus del papiloma humano puede causar cáncer al cuello uterino, también llamado cáncer cervical. El conocimiento de la existencia del virus es de 49,6% en las mujeres y 32,1% en los hombres.

^{17/} Munoz N. Human papillomavirus and cancer: the epidemiological evidence. J Clin Virol. 2000;19(1):1-5.

^{18/} Cox JT. Epidemiology and natural history of HPV. J Fam Pr. 2006 Nov; Suppl:3-9.

^{19/} Koutsky P. Epidemiology of genital human papillomavirus infection. Am J Med. 1997;102(5S1):3-8.

^{20/} Termine N, Panzarella V, Falaschini S, Russo A, Matranga D, Muzio LL, et al. HPV in oral squamous cell carcinoma vs head and neck squamous cell carcinoma biopsies: a meta-analysis (1988–2007). Ann Oncol. 2008;19(10):1681–90.

^{21/} Chan CWH, Yang S_B, Gu C, Wang X, Tao L. Ob cit.

^{22/} Garland SM, Bhatla N, Ngan HY. Cervical cancer burden and prevention strategies: Asia Oceania perspective. Cancer Epidemiol Biomark Prev. 2012 Sep;21(9):1414–22.


^{23/} Vaccarella S, Franceschi S, Herrero R, Muñoz N, Snijders PJ, Clifford GM, et al. Sexual behavior, condom use, and human papillomavirus: pooled analysis of the IARC human papillomavirus prevalence surveys. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2006;15(2):326–33.

En Lima Metropolitana (51,6%) se reconoce en mayor porcentaje que el virus del papiloma humano causa el cáncer del cuello uterino, seguido por Costa sin Lima Metropolitana (42,5%); en la Sierra respondieron en menor porcentaje sobre este conocimiento (31,1%).

GRÁFICO № 2.2

PERÚ: PERSONAS DE 15 A 59 AÑOS DE EDAD QUE RECONOCEN AL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO
COMO CAUSA DEL CÁNCER DEL CUELLO UTERINO, SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2014

(Porcentaje)




Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Las personas de 15 a 59 años que reconocen al virus del papiloma humano como causa del cáncer del cuello uterino se encuentran principalmente en los departamentos de Lima (51,0%) y Ucayali (50,6%); mientras que, los de menor porcentaje se ubican en Apurímac (22,8%), Puno (25,5%) y Cusco (26,1%).

GRÁFICO № 2.3

PERÚ: PERSONAS DE 15 A 59 AÑOS DE EDAD QUE RECONOCEN AL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO
COMO CAUSA DEL CÁNCER DEL CUELLO UTERINO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2014

(Porcentaje)



Chequeo para descartar cáncer en los últimos 24 meses

Los tipos de cáncer más frecuente en el Perú son el de cérvix, estómago, mama, piel y próstata. Es posible realizar pruebas de despistaje en la mayoría de estos casos. Existen grupos de investigación que han desarrollados guías de práctica clínica que sirven para conocer los principales tipos que pueden ser detectados precozmente, las diferentes pruebas de descarte y la periodicidad con que deben realizarse²⁴. Es importante que los grupos poblacionales en riesgo para algún tipo de cáncer prevenible recurran a chequeos médicos periódicos para descartar cáncer.

^{24/} Smith RA, Cokkinides V, Eyre HJ. American Cancer Society guidelines for the early detection of cancer, 2006. CA Cancer J Clin. 2006;56(1):11–25.

Las intervenciones destinadas a la detección han demostrado ser costo-efectivas para reducir la morbimortalidad por cáncer^{25 26}. Para el cáncer de cérvix hay varias pruebas para cribado como son el Papanicolaou (PAP), la inspección visual con ácido acético (IVA) y las pruebas de detección de ADN para VPH cada una con su respectiva efectividad para detectar casos precoces de cáncer²⁷. De igual forma muchos estudios han valorado las pruebas de descarte en cáncer de mama; estrategias como auto-examen de mama y la mamografía en grupos etarios bien delimitados²⁸. También, es posible realizar detección del cáncer de estómago mediante la endoscopia y la detección de Helicobacter Pylori²⁹. Del mismo modo se puede realizar tacto rectal en varones entre la cuarta y quinta década de la vida para detección precoz del cáncer de próstata³⁰. Sin embargo, estas intervenciones no son efectivas si las personas objeto de estas pruebas de detección precoz, no asisten a los lugares donde se ofrece este servicio.

El 26,1% de las personas de 40 a 59 años de edad se han realizado algún examen clínico para descartar algún tipo de cáncer, en los últimos 24 meses. Estos exámenes pueden ayudar a los médicos a encontrar y tratar algunos tipos de cáncer en etapa temprana.


De acuerdo con la región natural, en Lima Metropolitana el 33,9% y en la Costa sin Lima Metropolitana el 27,6% se han realizado algún examen de detección para el cáncer, en establecimientos de salud. En tanto, en la Sierra (19,1%) y Selva (20,2%) se realizaron en menor proporción dicho examen.

GRÁFICO № 2.4

PERÚ: PERSONAS DE 40 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO UN CHEQUEO GENERAL PARA

DESCARTAR ALGÚN TIPO DE CÁNCER EN LOS ÚLTIMOS 24 MESES, SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2014

(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Los departamentos con mayor proporción de personas que se han realizado chequeo general para descartar algún tipo de cáncer en los últimos 24 meses son: Arequipa (33,5%), Lima (33,4%) y La Libertad (33,1%).

^{25/} Niëns LM, Zelle SG, Gutiérrez-Delgado C, Rivera Peña G, Hidalgo Balarezo BR, Rodriguez Steller E, et al. Cost-effectiveness of breast cancer control strategies in central america: the cases of costa rica and Mexico. PloS One. 2014;9(4):e95836.

^{26/} Goldie SJ, Gaffikin L, Goldhaber-Fiebert JD, Gordillo-Tobar A, Levin C, Mahé C, et al. Cost-Effectiveness of Cervical-Cancer Screening in Five Developing Countries. N Engl J Med. 2005;353(20):2158–68.

^{27/} Karimi-Zarchi M, Peighmbari F, Karimi N, Rohi M, Chiti Z. A Comparison of 3 Ways of Conventional Pap Smear, Liquid-Based Cytology and Colposcopy vs Cervical Biopsy for Early Diagnosis of Premalignant Lesions or Cervical Cancer in Women with Abnormal Conventional Pap Test. Int J Biomed Sci IJBS. 2014 Dec;9(4):205–10.

^{28/} Elmore JG, Armstrong K, Lehman CD, Fletcher SW. Screening for breast cancer. Jama. 2005;293(10):1245-56.

^{29/} Leung WK, Wu M, Kakugawa Y, Kim JJ, Yeoh K, Goh KL, et al. Screening for gastric cancer in Asia: current evidence and practice. Lancet Oncol. 2008 Mar;9(3):279–87.


^{30/} Harris R, Lohr KN. Screening for prostate cancer: an update of the evidence for the US Preventive Services Task Force. Ann Intern Med. 2002;137(11):917–29.

GRÁFICO Nº 2.5

PERÚ: PERSONAS DE 40 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO UN CHEQUEO GENERAL

PARA DESCARTAR ALGÚN TIPO DE CÁNCER EN LOS ÚLTIMOS 24 MESES, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2014

(Porcentaje)



() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Examen clínico de mama en los últimos 12 meses

El cáncer de mama es el segundo cáncer que afecta a las mujeres en el mundo³¹. Es un problema de salud pública en los países donde los sistemas de salud no tienen organizados programas de prevención y no ofrecen alternativas terapéuticas; en tal escenario la mortalidad por cáncer de mama se eleva dramáticamente³². No obstante, existen estrategias costo efectivas que se pueden implementar en países

^{31/} Dunning AM, Healey CS, Pharoah PD, Teare MD, Ponder BA, Easton DF. A systematic review of genetic polymorphisms and breast cancer risk. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 1999;8(10):843–54.

^{32/} Danaei G, Vander Hoorn S, Lopez AD, Murray CJ, Ezzati M. Causes of cancer in the world: comparative risk assessment of nine behavioural and environmental risk factors. The Lancet. 2005;366(9499):1784–93.

pobres para disminuir el cáncer de mama; una de las principales y que tiene el menor costo es el autoexamen de mama³³.

Los estudios en los cuales la intervención fue el autoexamen de mama de manera regular demostraron ser costo-efectivos para favorecer el diagnóstico de cáncer de mama^{34 35}. En países de bajos y medianos ingresos, se deben implementar intervenciones educativas para que las mujeres se adhieran a realizarse el autoexamen de mama de manera regular. No obstante, no debe ser la única estrategia de prevención del cáncer de mama, sino que debe estar integrada con mamografía usada de manera racional y acceso a tratamiento oportuno³⁶.

Los resultados de la encuesta demostraron que el 22,4% de las mujeres de 30 a 59 años de edad se han realizado algún examen físico de mama, por un médico, obstetra o enfermera en los últimos 12 meses. Por área de residencia, el 26,2% de mujeres del área urbana accedieron a realizarse un examen clínico de mama; mientras que en el área rural fue el 10,1%.


De acuerdo con la región natural, se encontró que en Lima Metropolitana el 30,3% de las mujeres reportaron que un médico u otro profesional de la salud les habían realizado un examen físico de mama, en los últimos 12 meses. En mujeres de la Sierra fue el 14,3% y en la Selva 15,8%.

GRÁFICO № 2.6

PERÚ: MUJERES DE 30 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO EL EXAMEN

CLÍNICO DE MAMA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014

(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Examen de mamografía en los últimos 24 meses

Diversas formas de cáncer, como el cáncer de mama, son detectables tempranamente con una mamografía. Actualmente, la mamografía es el examen recomendado para la detección temprana de cáncer de mama.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, de las mujeres de 40 a 59 años de edad, el 18,7% se han realizado el examen de mamografía en los últimos 24 meses, a fin de detectar anormalidades que puedan indicar un cáncer de mama.


^{33/} Anderson BO, Yip C-H, Smith RA, Shyyan R, Sener SF, Eniu A, et al. Guideline implementation for breast healthcare in low-income and middle-income countries. Cancer. 2008;113(S8):2221–43.

^{34/} De Koning HJ, Martin van Ineveld B, van Oortmarssen GJ, De Haes J, Collette HJ, Hendriks JH, et al. Breast cancer screening and cost-effectiveness; policy alternatives, quality of life considerations and the possible impact of uncertain factors. Int J Cancer. 1991;49(4):531–7. 35/ Baxter N. Preventive health care, 2001 update: Should women be routinely taught breast self-examination to screen for breast cancer? Can Med Assoc J. 2001 Jun 26;164(13):1837–46.

^{36/} Otto SJ, Fracheboud J, Looman CW, Broeders MJ, Boer R, Hendriks JH, et al. Initiation of population-based mammography screening in Dutch municipalities and effect on breast-cancer mortality: a systematic review. The Lancet. 2003;361(9367):1411–7

El 23,2% de mujeres residentes en el área urbana se realizaron dicho examen; mientras que en la rural solo el 4,7%. Este comportamiento en Lima Metropolitana alcanzó el, 30,9% en contraste con la Sierra, 9,4%.

GRÁFICO № 2.7
PERÚ: MUJERES DE 40 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO MAMOGRAFÍA
EN LOS ÚLTIMOS 24 MESES, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Examen de Papanicolaou³⁷ en los últimos tres años

La importancia del PAP en la detección precoz de cáncer ha sido evaluada en muchas publicaciones. Aunque, es controversial dependiendo del contexto donde se realice el PAP; en sistemas de salud poco organizados, con falta de recursos humanos y con poca oferta estos programas no han demostrado ser de utilidad para disminuir la incidencia de cáncer de cérvix. No obstante, cuando se logra tener un sistema de salud eficiente es una política costo-efectiva³⁸.

Las recomendaciones basadas en las Guías de Práctica Clínica (GPC) y en los estudios de costoefectividad recomiendan realizarse un examen PAP cada tres años a partir de los 30 años de edad^{39 40}. Por lo cual, es importante que la población conozca estas consideración acerca del descarte de cáncer mediante el PAP.

De las mujeres entre 30 y 59 años de edad, el 55,3% se realizaron la prueba de Papanicolaou por un médico u otro profesional de la salud. Según área de residencia, el mayor porcentaje de mujeres que, en los tres años precedentes a la encuesta se realizaron esta prueba fueron las residentes del área urbana con 59,9% frente a las del área rural con 40,6%.

Según región natural, las mujeres que residen en Lima Metropolitana (65,5%) se han realizado en mayor proporción el examen de Papanicolaou por un médico u otro profesional de la salud; en comparación con las de la Sierra y Selva (46,2%, en cada caso).

^{37/} La prueba de Papanicolaou es una prueba mediante la cual se hace un raspado del cuello uterino de la mujer para detectar la posible presencia de un cáncer.

^{38/} Goldie SJ, Gaffikin L, Goldhaber-Fiebert JD, Gordillo-Tobar A, Levin C, Mahé C, et al. Ob. Cit.


^{39/} Saslow D, Solomon D, Lawson HW, Killackey M, Kulasingam SL, Cain J, et al. American Cancer Society, American Society for Colposcopy and Cervical Pathology, and American Society for Clinical Pathology screening guidelines for the prevention and early detection of cervical cancer. CA Cancer J Clin. 2012;62(3):147–72.

^{40/} Care CTF on PH. Recommendations on screening for cervical cancer. Can Med Assoc J. 2014;185(1):35-45.

GRÁFICO № 2.8

PERÚ: MUJERES DE 30 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO LA PRUEBA DE PAPANICOLAOU EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014

(Porcentaje)



Examen del Papanicolaou en los últimos tres años y conocimiento del resultado

Saber el número de personas que han recibido y conocen sus resultados del descarte de cáncer de cérvix mediante el PAP permite tener una idea de lo organizado que puede estar el programa de detección precoz. Coberturas bajas de entrega de los resultados de PAP se deben a factores del individuo y a factores del establecimiento de salud que ofrece el servicio.

Los factores del individuo tienen que ver con el nivel de educación en salud y también con aspectos psicológicos por la ansiedad que puede generar conocer los resultados del examen^{41 42}. Los factores del establecimiento de salud están relacionados con la parte logística y con la presencia de citopatólogos para que se procesen las muestras recolectadas en los centros de atención primaria; cuando estos aspectos fallan se genera un obvio retraso en la entrega de resultados^{43 44}.

El 79,2% de mujeres de 30 a 59 años de edad se han realizado la prueba del Papanicolaou y conocen su resultado, en los últimos tres años. Esta proporción, en el área urbana sube a 81,4% de mujeres en que se realizaron la prueba y conocen su resultado; en tanto, en el área rural disminuye a 68,8%.

En Lima Metropolitana (83,9%) y Costa sin Lima Metropolitana (81,3%), se presentaron los más altos porcentajes de acceso a la prueba del Papanicolaou y conocimiento de su resultado. En cambio, en la Sierra este porcentaje fue menor (70,3%).


^{41/} Sudenga SL, Rositch AF, Otieno WA, Smith JS. Knowledge, attitudes, practices, and perceived risk of cervical cancer among Kenyan women: brief report. Int J Gynecol Cancer Off J Int Gynecol Cancer Soc. 2014 Jun;23(5):895–9.

^{42/} Lindau ST, Tomori C, Lyons T, Langseth L, Bennett CL, Garcia P. The association of health literacy with cervical cancer prevention knowledge and health behaviors in a multiethnic cohort of women. Am J Obstet Gynecol. 2002;186(5):938–43.

^{43/} Breen N, Wagener DK, Brown ML, Davis WW, Ballard-Barbash R. Progress in cancer screening over a decade: results of cancer screening from the 1987, 1992, and 1998 National Health Interview Surveys. J Natl Cancer Inst. 2001;93(22):1704–13.

^{44/} Potosky AL, Breen N, Graubard BI, Parsons PE. The association between health care coverage and the use of cancer screening tests: results from the 1992 National Health Interview Survey. Med Care. 1998;36(3):257–70.

GRÁFICO № 2.9
PERÚ: MUJERES DE 30 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO LA PRUEBA DE PAPANICOLAOU
EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS Y CONOCIERON SU RESULTADO, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2014
(Porcentaje)




Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

El mayor porcentaje de mujeres de 30 a 59 años de edad que en los últimos tres años se han realizado la prueba de Papanicolaou y conocen su resultado residen en Ucayali (91,9%), Piura (89,6%), Lima (83,9%), Lambayeque (83,8%), Provincia Constitucional del Callao (83,1%), Amazonas (82,1%), Tumbes (81,8%) y San Martín (80,0%).

GRÁFICO N° 2.10

PERÚ: MUJERES DE 30 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO LA PRUEBA DE PAPANICOLAOU
EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS Y CONOCIERON SU RESULTADO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2014

(Porcentaje)



CAPÍTULO 3

Programa de Enfermedades Transmisibles

3. Programa de Enfermedades Transmisibles

3.1 Conocimiento sobre la tuberculosis


La importancia de valorar el conocimiento sobre la forma de transmisión de la tuberculosis se centra en la necesidad de que la población tenga en cuenta esta información, a fin de lograr conductas de prevención, búsqueda temprana de los servicios de salud, aceptación de las medidas de control y eliminar el estigma que existe frente a esta enfermedad.

La encuesta recogió información sobre el conocimiento de las formas correctas de transmisión que tienen las personas de la tuberculosis respondiendo Sí "cuando una persona enferma tose o estornuda cerca a otra persona" y "cuando una persona enferma habla de cerca con otra persona"; y con un No "cuando una persona enferma toca a otra persona" y "cuando una persona enferma comparte alimentos o utensilios con otra persona".

En este contexto, se encontró un 4,4% de personas de 15 y más años de edad que conoce o ha oído hablar de la TBC y reconoce las formas de transmisión. Según la distribución por sexo, el conocimiento de contagio de la enfermedad fue mayor en las mujeres, 5,1% que en los hombres, 3,5%.

Por región natural, el mayor porcentaje de personas que sabe sobre las formas de transmisión reside en Lima Metropolitana y la Selva (4,9% en cada caso) que en la Sierra (3,4%) y Costa sin Lima Metropolitana (4,6%).

GRÁFICO N° 3.1
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON CONOCIMIENTO SOBRE LAS FORMAS
DE TRANSMISIÓN DE TUBERCULOSIS, SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2014
(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

3.2 Conductas de riesgo de la transmisión del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)


Las actitudes de un individuo frente a una infección como el Virus de Inmunodeficiencia Humana pueden ser adecuadas o no de acuerdo con las concepciones y sobre todo del conocimiento que este tenga.

Conocimiento de las formas correctas y erróneas para prevenir la transmisión sexual del VIH

El conocimiento de las formas de transmisión evitará que el sujeto incurra en comportamientos de riesgo y conductas discriminatorias hacia otra persona. Este conocimiento se basa, por un lado, en la identificación correcta de las formas de prevenir la transmisión sexual del VIH: el entrevistado afirma que el riesgo disminuye teniendo una sola pareja sexual fiel y no infectada, usando preservativo en cada relación sexual y reconociendo que un portador del VIH puede aparentar estar saludable. Por otro lado, cuando el individuo rechaza ideas erróneas con respecto a la transmisión del VIH: aquel que niega la transmisión del VIH a través de la picadura de insectos o vía oral (alimentos, utensilios alimentarios).

De acuerdo con los resultados de la encuesta, por ejemplo el 22,5% de las personas de 15 a 29 años de edad identifican correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual del VIH y rechazan ideas erróneas de la transmisión de la transmisión de VIH. En Lima Metropolitana, el 28,2% conocen la forma de prevenir y rechazan ideas equivocadas de transmisión del VIH, este conocimiento equivale a 16,7% en la Sierra.

GRÁFICO N° 3.2
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD QUE CONOCEN LAS FORMAS DE PREVENIR Y
RECHAZAN IDEAS ERRÓNEAS DE TRANSMISIÓN DEL VIH, SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2014
(Porcentaje)




Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

La proporción de la población de 15 a 29 años de edad que conocen las formas de prevenir y rechazan ideas erróneas de transmisión del VIH alcanza menos del 30,0%. En Junín representa el 28,5%, Loreto el 27,8%, Lambayeque el 27,6%, Lima el 27,5%, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao el 25,7%, en cada caso, entre otros.

GRÁFICO N° 3.3

PERÚ: PERSONAS DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD QUE CONOCEN LAS FORMAS DE PREVENIR Y
RECHAZAN IDEAS ERRÓNEAS DE TRANSMISIÓN DEL VIH, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2014

(Porcentaje)



() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


Prueba de VIH en los últimos 12 meses

El mejoramiento del acceso a la prueba en ciertas poblaciones, puede contribuir a la disminución de la incidencia de la infección por VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual, así como en el cambio de comportamientos de riesgo.

El 15,8% de las personas de 15 a 49 años de edad, se realizaron la prueba de VIH en los últimos 12 meses. En la distribución por sexo, se aprecia que las mujeres (17,8%) se realizaron la prueba en mayor proporción que los hombres (13,6%).

Por región natural, en la Selva (18,6%) y en Lima Metropolitana (17,3%) mayor porcentaje de personas de 15 a 49 años de edad se realizaron la prueba de VIH. En comparación con la Sierra (12,6%) y la Costa sin Lima Metropolitana (16,5%).

GRÁFICO N° 3.4
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE REALIZARON LA PRUEBA
DE VIH EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2014
(Porcentaje)




Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Prueba de VIH y conocimiento del resultado

Determinar el número de personas que se realizaron la prueba y conocen el resultado permite tener un parámetro para evaluar las intervenciones en salud pública que existen actualmente.

Del total de personas que se realizaron la prueba de VIH, el 92,3% conocieron los resultados del examen de laboratorio. Siendo las mujeres (94,3%) las que acudieron en mayor porcentaje a recoger resultados de la prueba, que los hombres (89,3%). Por región natural, la distribución de personas que conocen el resultado de la prueba de VIH oscila entre 86,2% y 94,3%.

GRÁFICO N° 3.5
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DE VIH EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y CONOCIERON LOS RESULTADOS, SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2014 (Porcentaje)




Según departamento, los mayores porcentajes de personas de 15 a 49 años de edad que se realizaron la prueba de VIH y conocieron los resultados residen en Lambayeque (99,6%), Ucayali (96,6%), La Libertad (95,3%), Lima (94,9%), Loreto (94,7%), Junín (94,6%) y San Martín (94,5%), entre otros.

GRÁFICO N° 3.6

PERÚ: PERSONAS DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DE VIH EN
LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y CONOCIERON LOS RESULTADOS, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2014

(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Primera relación sexual


La identificación y caracterización de mujeres de 15 a 49 años de edad que tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años, podrá orientar las intervenciones y los recursos, así como medir la efectividad de los mismos, logrando reducir la incidencia de infecciones como el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

Según los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, la primera relación sexual antes de los 15 años de edad se presentó en un 7,9% de mujeres de 15 a 49 años de edad. Esto ocurre en mayor proporción en mujeres de 25 a 49 años (8,4%) seguido por el grupo de 20 a 24 años (7,8%) y de 15 a 19 años (6,3%).

Por región natural, la primera relación sexual ocurre más temprano en mujeres residentes en la Selva (19,3%) que en Lima Metropolitana (5,1%).

GRÁFICO N° 3.7
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE TUVIERON SU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL ANTES DE LOS 15 AÑOS DE EDAD, SEGÚN GRUPO DE EDAD Y REGIÓN NATURAL, 2014

(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Uso condón en la última relación sexual

Entre las estrategias para la reducción de conductas sexuales de riesgo en la población se ha recomendado el uso del condón. La caracterización de los individuos que utilizan este método en la población permitirá delinear las intervenciones de salud pública orientadas a recomendar el uso del condón, así como para efectos programáticos de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de las ITS, VIH y SIDA (ESNITS).


En este sentido, el 12,0% de mujeres de 15 a 49 años de edad usaron condón en la última relación sexual en los últimos tres meses. En el área urbana, el porcentaje fue 13,7% y en el área rural 6,2%.

Por otro lado, en las mujeres con educación superior (17,3%) fue mayor en 12,2 puntos porcentuales el uso del condón en la última relación sexual que de aquellas que alcanzaron estudiar hasta primaria (5,1%).

GRÁFICO N° 3.8

PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE USARON CONDÓN EN LA ÚLTIMA RELACIÓN
SEXUAL EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA Y NIVEL DE EDUCACIÓN, 2014

(Porcentaje)





Anexo 1 Programa de Enfermedades No Transmisibles

CUADRO № 1.1

PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON PRESIÓN ARTERIAL ALTA DE ACUERDO
A MEDICIÓN EFECTUADA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

(Porcentaje)

		2	013 - II Seme	stre				2014		
Característica seleccionada	Valor estimado –	al 9		Coeficiente de	Total de casos sin	Valor estimado	Intervalo de al 9	5%	Coeficiente de	Total de casos sin
		Inferior	Superior	variación	ponderar		Inferior	Superior	variación	ponderar
Total	16,7	15,2	18,3	4,8	6 221	14,8	14,1	15,6	2,6	27 154
Sexo Hombre	21,5	19,0	23,9	5,8	2 960	18,5	17,3	19,6	3,2	12 751
Mujer	12,5	10,6	14,3	7,7	3 261	11,6	10,7	12,4	3,7	14 403
Grupo de edad										
15 - 19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,8	2,0	3,6	14,7	2 716
20 - 29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5,0	4,1	5,9	9,3	5 106
30 - 39 40 - 49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7,3 13,2	6,2	8,4 14,7	7,7 5,8	5 581 4 629
50 - 59	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	22,1	11,7 19,9	24,3	5,6 5,1	3 627
60 y más	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	39,4	37,1	41,6	2,9	5 495
20 y más	18,4	16,7	20,1	4,7	5 613	16,5	15,7	17,4	2,6	24 438
Área de residencia	-,	-,	-,	,		-,-	-,	,	,-	
Urbana	17,8	15,8	19,8	5,7	3 682	15,6	14,6	16,5	3,1	16 656
Rural	13,5	11,7	15,3	6,8	2 539	12,5	11,6	13,4	3,7	10 498
Dominio de residencia										
Costa	19,4	17,0	21,9	6,5	2 201	17,0	15,8	18,2	3,6	10 480
Lima Metropolitana	18,7	14,9	22,5	10,3	503	18,2	16,3	20,1	5,3	3 186
Costa (sin LM)	20,5	17,7	23,3	6,9	1 698	15,5	14,2	16,9	4,4	7 294
Sierra	13,4	11,6	15,2	6,9	2 690	12,0	11,1	12,8	3,5	11 232
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,8	10,6	13,0	5,2	4 276
Sierra rural Selva	n.a.	n.a. 9,5	n.a.	n.a.	n.a. 1 330	12,1	11,0	13,2	4,7	6 956 5 442
Selva urbana	12,2 n.a.	9,5 n.a.	14,8 n.a.	10,9 n.a.	n.a.	11,7 11,9	10,5 10,5	12,8 13,4	5,1 6,1	3 025
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,3	9,4	13,4	8,7	2 417
	11.4.	11.4.	11.0.	11.4.	11.0.	11,0	3,4	10,2	0,7	2411
Nivel de educación Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,6	20,2	23,0	3,3	9 955
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,3	11,2	13,4	4,4	10 662
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,5	10,2	12,8	5,7	6 534
Quintil de bienestar										
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,4	12,2	14,5	4,4	8 023
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,5	11,3	13,7	4,9	6 664
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,0	12,6	15,4	5,2	5 062
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,3	14,5	18,0	5,5	4 021
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,5	15,7	19,3	5,3	3 384
Departamento										
Amazonas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,4	10,8	18,0	12,8	942
Áncash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,7	10,5	15,0	8,8	1 232
Apurímac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,7	10,6	14,8	8,5	1 019
Arequipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,7	11,4	15,9	8,4	1 042
Ayacucho Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,9 12,7	8,7 9,9	13,1 15,5	10,5 11,1	1 163 930
Prov. Const. del Callao	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	17,6	14,2	21,0	9,8	859
Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,3	8,1	12,5	11,0	989
Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,2	7,4	13,0	14,0	868
Huánuco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,0	7,3	12,6	13,5	969
lca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,1	12,0	16,3	7,8	1 070
Junín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,0	9,7	14,4	9,9	1 019
La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,0	9,8	16,1	12,3	981
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,1	11,5	16,6	9,3	900
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,1	16,3	20,0	5,3	3 262
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,3	16,2	20,4	5,8	2 342
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,1	14,3	20,0	8,4	920
Loreto Madre de Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,6 7,0	13,8	19,3 8,9	8,5 13.7	833 937
Moquegua	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	14,1	5,1 11,2	17,1	13,7 10,7	970
Pasco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,6	7,6	11,7	10,7	1 049
Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,6	14,9	22,3	10,7	1 043
Puno	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,2	9,4	13,0	8,2	1 328
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,1	8,0	12,3	10,9	961
Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,5	13,3	19,6	9,7	893
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,6	10,0	15,2	10,6	904
Ucayali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,5	6,3	10,7	13,1	959

Nota: Se considera hipertensión cuando la presión arterial sistólica (PAS) es >=140 mmHg y/o presión arterial diastólica (PAD) es >= 90mmHg. Excluye a mujeres gestantes.

^{1/} Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

n.a.: No aplicable.

CUADRO Nº 1.2 PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

(Porcentaje)

		2	013 - II Semes	tre		2014				
Característica seleccionada	Valor	Intervalo de confianza Valor al 95%		Coeficiente Total de		Intervalo de confianza Valor al 95%			Coeficiente	Total de
55.500ionudu	estimado -	Inferior	Superior	de variación	casos sin ponderar	estimado -	Inferior	Superior	de variación	casos sin ponderar
Total	12,3	10,7	13,8	6,5	6 271	10,4	9,9	11,0	2,8	27 266
Sexo										
Hombre	10,2	8,3	12,2	9,7	2 981	8,4	7,7	9,1	4,2	12 806
Mujer	14,1	11,6	16,6	9,0	3 290	12,2	11,4	13,0	3,4	14 460
Grupo de edad										
15 - 19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(0,7)	0,4	1,0	22,3	2 725
20 - 29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,1	1,7	2,6	11,3	5 124
30 - 39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5,4	4,5	6,3	8,6	5 612
40 - 49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,5	7,4	9,7	6,6	4 650
50 - 59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,1	15,3	18,9	5,4	3 639
60 y más	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	29,7	27,7	31,6	3,4	5 516
20 y más	13,9	12,1	15,6	6,4	5 660	11,8	11,2	12,5	2,8	24 541
Área de residencia										
Urbana	13,6	11,6	15,7	7,6	3 720	11,1	10,4	11,8	3,3	16 741
Rural	8,3	6,8	9,7	8,8	2 551	8,4	7,7	9,1	4,4	10 525
Dominio de residencia										
Costa	14,4	11,8	16,9	9,1	2 221	11,3	10,4	12,2	4,0	10 535
Lima Metropolitana	15,6	11,5	19,7	13,4	511	10,9	9,5	12,3	6,5	3 222
Costa (sin LM)	12,6	10,4	14,8	8,9	1 710	11,8	10,8	12,8	4,3	7 313
Sierra	8,8	7,3	10,3	8,7	2 714	8,9	8,2	9,6	4,1	11 279
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,4	8,3	10,5	6,0	4 301
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,5	7,5	9,4	5,6	6 978
Selva	11,3	9,0	13,7	10,5	1 336	10,0	8,9	11,1	5,5	5 452
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,9	10,4	13,5	6,6	3 032
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7,5	6,2	8,9	9,2	2 420
Nivel de educación										
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,6	15,4	17,7	3,6	9 988
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7,7	6,9	8,5	5,1	10 706
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,2	7,3	9,1	5,8	6 569
Quintil de bienestar										
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7,9	7,1	8,7	5,0	8 043
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,9	8,0	9,8	5,2	6 682
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,4	8,3	10,5	5,9	5 085
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,6	11,2	14,0	5,8	4 047
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,8	11,3	14,4	6,0	3 409
Departamento										
Amazonas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,1	8,6	13,6	11,3	944
Áncash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,4	6,5	10,3	11,5	1 235
Apurímac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,5	8,0	13,0	12,2	1 020
Arequipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,3	9,0	13,5	10,2	1 046
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,5	4,9	8,0	12,1	1 166
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,2	6,3	10,1	11,7	932
Prov. Const. del Callao	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,4	9,6	15,3	11,7	867
Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,4	7,4	11,3	10,5	993
Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(14,9)	10,4	19,3	15,2	875
Huánuco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,9	5,2	8,5	12,3	973
lca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,4	9,0	13,7	10,6	1 071
Junín La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,5	7,2	11,8	12,5	1 019
La Libertad Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,8 13,7	6,8	10,8 16,8	11,7	986 901
Lima	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	10,7	10,6 9,4	12,1	11,6 6,5	3 297
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,7	9,2	12,1	7,2	2 370
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,0	8,4	13,5	11,9	927
Loreto	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,6	11,1	16,0	9,1	837
Madre de Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,8	9,4	16,3	13,6	939
Moquegua	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,5	11,0	16,0	9,4	979
Pasco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,1	8,8	13,5	10,8	1 056
Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,3	9,2	13,3	9,4	1 076
Puno	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,0	7,9	12,1	10,9	1 333
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7,4	5,4	9,3	13,5	962
Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,6	8,5	14,8	13,8	893
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,8	12,4	17,2	8,3	905
Ucayali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,7	7,2	12,3	13,2	961
y						٠,,,	. ,-	,5	,-	001

Nota: Personas de 15 y más años que reportaron tener presión arterial elevada diagnosticada por un profesional de la salud alguna vez en su vida. Excluye a mujeres gestantes.

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

^{1/} Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

CUADRO Nº 1.3

PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN QUE RECIBIERON TRATAMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA,

2013 - II SEMESTRE Y 2014

(Porcentaje)

		20	13 - II Semes	tre				2014		
Característica seleccionada	Valor estimado –	Intervalo de al 9	5%	Coeficiente de	Total de casos sin	Valor estimado	Intervalo de al 9	5%	Coeficiente de	Total de casos sin
		Inferior	Superior	variación	ponderar		Inferior	Superior	variación	ponderar
Total	62,6	56,4	68,8	5,1	754	60,3	57,6	63,1	2,3	3 032
Sexo										
Hombre	60,5 63,9	50,5 55,8	70,5 72,1	8,4 6,5	279 475	58,4 61,5	54,2 58,2	62,7 64,8	3,7 2,8	1 152 1 880
Mujer	03,9	55,6	12,1	0,5	4/5	01,5	30,2	04,0	2,0	1 000
Grupo de edad 15 - 19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(10,1)	0,0	24,0	69,8	30
20 - 29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(16,1)	9,2	24,6	23,3	159
30 - 39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	32,4	24,6	40,2	12,3	320
40 - 49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	46,8	39,9	53,8	7,6	436
50 - 59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	59,3	53,5	65,0	4,9	614
60 y más	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	74,8	71,6	78,1	2,2	1 473
20 y más	62,7	56,5	68,9	5,1	750	60,7	58,0	63,5	2,3	3 002
Área de residencia	20.0	50.0	70.0		5.17	20.0	00.4	20.0	2.2	0.000
Urbana Rural	66,0 45,9	58,9 35,9	73,0 55,9	5,4 11,1	517 237	63,6 47,2	60,4 43,0	66,8 51,4	2,6 4,5	2 032 1 000
Dominio de residencia	10,0	00,0	00,0	,.	201	11,2	10,0	01,1	1,0	1 000
Costa	69,9	61,7	78,1	6,0	330	66,6	62,8	70,4	2,9	1 303
Lima Metropolitana	69,7	57,6	81,8	8,8	76	67,8	61,9	73,6	4,4	386
Costa (sin LM)	70,1	62,0	78,3	5,9	254	65,3	60,6	69,9	3,6	917
Sierra	46,1	37,7	54,4	9,2	256	47,6	43,5	51,8	4,4	1 140
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50,8	44,5	57,1	6,3	466
Sierra rural Selva	n.a. 51,3	n.a. 39,9	n.a. 62,7	n.a. 11,3	n.a. 168	44,2 55,4	39,0 49,5	49,5 61,4	6,1 5,4	674 589
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	60,7	53,4	68,0	5,4 6,1	389
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	44,8	35,2	54,3	10,9	200
Nivel de educación										
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	62,5	58,9	66,1	2,9	1 553
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	57,4	52,6	62,2	4,3	843
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	60,0	54,1	65,9	5,0	636
Quintil de bienestar						47.0	40.0	50.0	5.0	7.17
Quintil inferior Segundo quintil	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	47,8 49,8	42,8 44,5	52,8 55,1	5,3 5,4	717 707
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	55,5	49,7	61,3	5,3	560
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	62,9	56,7	69,0	5,0	550
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	74,6	69,7	79,5	3,3	498
Departamento										
Amazonas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	51,9	41,9	62,0	9,9	116
Ancash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	68,8	58,2	79,3	7,8	106
Apurímac Arequipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	61,2 57,0	49,9 47,4	72,6 66,7	9,4 8,6	120 137
Ayacucho	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	51,3	38,7	63,9	12,5	100
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	59,4	45,5	73,3	11,9	81
Prov. Const. del Callao	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	71,7	61,8	81,5	7,0	109
Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	46,7	35,5	57,8	12,2	97
Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(35,5)	22,3	48,8	19,0	119
Huánuco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(35,7)	22,5	49,0	18,9	66
lca Junín	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	70,7 46,6	60,6 34,0	80,7 59,2	7,2 13,8	131 104
La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	61,6	47,1	76,1	12,0	92
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	69,6	59,9	79,4	7,1	125
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	66,4	60,4	72,3	4,6	381
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	67,1	60,6	73,7	5,0	279
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	60,6	48,1	73,1	10,5	102
Loreto Madre de Dios	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	59,9 43,2	47,7 34,0	72,0 52,5	10,3 10,9	110 122
Moquegua	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	52,5	34,0 44,6	60,4	7,7	133
Pasco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(31,6)	20,6	42,7	17,9	114
Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	71,0	60,9	81,0	7,2	126
Puno	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(23,2)	16,1	30,2	15,5	138
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	51,1	38,9	63,2	12,1	88
Tacna Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	59,3 43,8	49,6	69,0	8,3	100
i dilines	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a. n.a.	43,8 69,7	33,3 57,1	54,4 82,4	12,3 9,2	128 89

Nota: Personas de 15 y más años que reportaron tener presión arterial elevada diagnosticada por un profesional de la salud. Excluye a mujeres gestantes.

⁽⁾ Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

^{1/} Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

n.a.: No aplicable

CUADRO № 1.4
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2014

(Porcentaje)

	2014									
Característica seleccionada	Valor	Intervalo de c		Coeficiente de	Total de casos					
	estimado	Inferior	Superior	variación	sin ponderar					
Total	3,2	2,9	3,6	5,1	27 266					
Sexo										
Hombre	2,9	2,4	3,3	8,2	12 806					
Mujer	3,6	3,1	4,0	6,7	14 460					
Grupo de edad										
15 - 19	(0,4)	0,1	0,7	41,7	2 725					
20 - 29	(0,3)	0,2	0,5	25,6	5 124					
30 - 39	(1,2)	0,8	1,6	17,9	5 612					
40 - 49	3,2	2,5	4,0	11,7	4 650					
50 - 59	6,8	5,5	8,1	9,9	3 639					
60 y más	8,2	7,0	9,5	7,7	5 516					
20 y más	3,6	3,3	4,0	5,2	24 541					
Área de residencia										
Urbana	3,8	3,4	4,2	5,6	16 741					
Rural	1,4	1,1	1,8	12,1	10 525					
Dominio de residencia										
Costa	4,0	3,5	4,5	6,6	10 535					
Lima Metropolitana	4,5	3,7	5,4	9,4	3 222					
Costa (sin LM)	3,4	2,9	3,9	8,0	7 313					
Sierra	2,0	1,6	2,4	9,6	11 279					
Sierra urbana	2,8	2,2	3,5	11,4	4 301					
Sierra rural	(1,2)	0,8	1,7	18,1	6 978					
Selva	2,5	2,0	3,1	10,8	5 452					
Selva urbana	3,4	2,6	4,3	12,3	3 032					
Selva rural	(1,4)	0,8	1,9	21,2	2 420					
Nivel de educación										
Hasta primaria	4,4	3,7	5,2	8,8	9 988					
Secundaria	2,4	2,0	2,9	9,2	10 706					
Superior	3,2	2,6	3,8	9,3	6 569					
Quintil de bienestar										
Quintil inferior	0,8	0,6	1,1	13,5	8 043					
Segundo quintil	2,4	1,9	2,9	11,1	6 682					
Quintil intermedio	3,2	2,5	3,9	10,8	5 085					
Cuarto quintil	4,2	3,4	5,0	9,8	4 047					
Quintil superior	5,1	4,2	6,1	9,6	3 409					

Nota: Personas de 15 y más años que reportaron tener azúcar alta en la sangre y que fueron diagnosticadas por un profesional de la salud. Excluye a mujeres gestantes.

⁽⁾ Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

CUADRO Nº 1.5

PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS QUE
RECIBIERON TRATAMIENTO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA,

2014 (Porcentaje)

		2014								
Característica seleccionada		Intervalo de confi	anza al 95%	Coeficiente de	Total de casos					
	estimado	Inferior	Superior	variación	sin ponderar					
Total	70,3	65,2	75,3	3,7	821					
Sexo										
Hombre	65,4	56,9	73,8	6,6	329					
Mujer	73,7	67,6	79,9	4,3	492					
Grupo de edad										
15 - 19	(37,3)	0,0	76,5	53,6	10					
20 - 29	(33,2)	8,6	57,8	37,7	21					
30 - 39	(53,6)	35,4	71,9	17,3	56					
40 - 49	64,7	53,4	76,0	8,9	144					
50 - 59	78,1	70,4	85,8	5,0	209					
60 y más	72,8	64,7	80,9	5,7	381					
20 y más	70,8	65,7	75,9	3,7	811					
Área de residencia										
Urbana	70,3	64,8	75,9	4,0	655					
Rural	69,7	60,4	78,9	6,8	166					
Dominio de residencia										
Costa	72,7	66,1	79,3	4,6	449					
Lima Metropolitana	71,5	61,9	81,1	6,8	156					
Costa (sin LM)	74,6	67,3	81,9	5,0	293					
Sierra	64,4	55,7	73,0	6,8	215					
Sierra urbana	64,1	53,1	75,1	8,7	123					
Sierra rural	65,0	51,5	78,5	10,6	92					
Selva	63,9	52,8	74,9	8,8	157					
Selva urbana	65,9	53,0	78,8	10,0	116					
Selva rural	(57,2)	36,9	77,5	18,1	41					
Nivel de educación										
Hasta primaria	75,0	66,7	83,3	5,6	357					
Secundaria	69,5	61,3	77,6	6,0	252					
Superior	64,3	54,9	73,8	7,5	212					
Quintil de bienestar										
Quintil inferior	60,1	48,7	71,4	9,6	89					
Segundo quintil	66,7	57,3	76,1	7,2	174					
Quintil intermedio	74,9	66,3	83,5	5,8	172					
Cuarto quintil	73,3	63,8	82,7	6,6	192					
Quintil superior	68,1	57,6	78,7	7,9	194					

Nota: Personas de 15 y más años que reportaron tener azúcar alta en la sangre y que fueron diagnosticadas por un médico de salud. Excluye a mujeres gestantes.

⁽⁾ Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

CUADRO Nº 1.6 PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE FUMARON EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

(Porcentaje)

			013 - II Semes	stre		2014				
Característica seleccionada	Valor estimado	Intervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos sin	Valor estimado	ntervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos sin
		Inferior	Superior	variación	ponderar		Inferior	Superior	variación	ponderar
Total	20,6	18,7	22,5	4,7	6 370	20,3	19,6	21,1	1,9	27 633
Sexo										
Hombre	34,6	31,8	37,5	4,2	2 981	33,9	32,6	35,3	2,0	12 806
Mujer	8,3	6,5	10,1	10,9	3 389	8,6	7,9	9,4	4,6	14 827
Grupo de edad										
15 - 19	n o	n 0	2.0	2.0	2.0	15,2	13,3	17,1	6,4	2 765
20 - 29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30,3	28,4	32,2	3,1	5 291
30 - 39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,2	23,5	26,9	3,5	5 757
40 - 49	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a.	n.a.	n.a. n.a.	19,4	23,3 17,6	20,9	3,3 4,6	4 665
50 - 59	n.a.	n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a.	17,2	15,4	18,9	5,3	3 639
60 y más	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,0	8,6	11,4	7,2	5 516
	11.a.	II.a.	II.a.	II.a.	II.a.	10,0	0,0	11,4	1,2	3 310
Área de residencia										
Urbana	21,7	19,3	24,1	5,7	3 782	21,8	20,9	22,7	2,2	16 970
Rural	17,3	15,0	19,6	6,8	2 588	16,0	14,9	17,1	3,5	10 663
Dominio de residencia										
Costa	22,6	19,4	25,7	7,0	2 252	21,6	20,5	22,8	2,7	10 675
Lima Metropolitana	26,6	21,6	31,6	9,5	520	24,7	22,9	26,4	3,6	3 262
Costa (sin LM)	16,9	14,5	19,4	7,5	1 732	17,9	16,7	19,2	3,6	7 413
Sierra	16,7	14,7	18,7	6,1	2 751	17,3	16,1	18,4	3,4	11 398
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,0	18,2	21,9	4,7	4 351
Sierra rural		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,5	13,2	15,9	4,7	7 047
Selva	n.a. 21,3	18,4	24,2	6,9	1 367	22,1	20,6	23,6	3,4	5 560
Selva urbana						21,7	19,8	23,6		3 088
Selva urbana Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.				4,4	
Selva rurai	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,6	20,2	25,0	5,4	2 472
Nivel de educación										
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,7	10,8	12,7	4,2	10 083
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,5	21,2	23,7	2,8	10 876
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,1	24,6	27,6	3,0	6 671
Quintil de bienestar										
Quintil de bieriestal Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15,3	14,1	16,5	4,0	8 151
	n.a.				n.a.	17,3	15,9	18,8	4,0	6 782
Segundo quintil Quintil intermedio	n.a.	n.a. n.a.	n.a.	n.a. n.a.	n.a.	21,7	20,1	23,4	3,8	5 153
			n.a.							4 103
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,3	19,6	23,0	4,1	
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,3	23,4	27,3	3,9	3 444
Departamento										
Amazonas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,6	10,5	16,7	11,5	962
Áncash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,9	12,5	17,2	8,1	1 246
Apurímac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,2	13,8	20,6	10,1	1 029
Arequipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,2	18,8	25,5	7,7	1 057
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,5	15,5	21,5	8,3	1 186
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15,3	12,7	18,0	8,8	946
Prov. Const. del Callao	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,9	24,4	31,4	6,4	884
Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15,0	12,2	17,9	9,6	1 000
Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,4	15,4	23,4	10,5	883
Huánuco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,2	14,1	20,3	9,2	982
lca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,2	23,8	28,7	4,8	1 088
Junín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,0	20,5	27,5	7,5	1 032
La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,4	14,1	20,7	9,8	1 005
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,5	10,0	15,0	10,1	918
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,2	22,4	25,9	3,7	3 327
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,3	22,4	26,2	4,0	2 393
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23,2	19,9	26,6	7,4	934
Loreto	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,7	19,8	25,7	6,7	859
Madre de Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	29,3	24,9	33,7	7,6	959
Moquegua		n.a.			n.a.	19,7	16,7	22,6	7,0 7,7	987
Pasco	n.a.		n.a.	n.a.		19,7 27,2	23,2	31,2	7,7 7,5	1 070
	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.					
Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,9	8,4	13,5	11,7	1 087
Puno Son Mortín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,3	14,4	22,2	10,8	1 347
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,2	17,8	24,6	8,1	976
Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,1	11,6	16,6	9,1	903
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,4	20,3	28,5	8,6	921
Ucayali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,4	22,8	29,9	6,9	979

^{1/} Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

n.a.: No aplicable.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO Nº 1.7 PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE ACTUALMENTE FUMAN, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

(Porcentaje)

		2	013 - II Seme	stre		2014				
Característica seleccionada	Valor estimado	Intervalo de al 9	5%	Coeficiente de	Total de casos sin	Valor estimado	Intervalo de al 9	5%	Coeficiente de	Total de casos sin
		Inferior	Superior	variación	ponderar		Inferior	Superior	variación	ponderar
Total	12,5	10,8	14,1	6,7	6 370	12,3	11,7	12,9	2,5	27 633
Sexo										
Hombre	21,7	19,0	24,3	6,2	2 981	21,0	19,9	22,1	2,7	12 806
Mujer	(4,4)	3,1	5,7	15,2	3 389	4,7	4,1	5,3	6,3	14 827
Grupo de edad										
15 - 19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7,5	6,1	8,9	9,4	2 765
20 - 29 30 - 39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,1	16,5	19,8	4,6	5 291
30 - 39 40 - 49	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	15,2 12,1	13,8 10,7	16,6 13,5	4,7 5,8	5 757 4 665
50 - 59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,6	10,1	13,1	6,7	3 639
60 y más	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,1	5,1	7,0	8,1	5 516
Área de residencia										
Urbana	13,6	11,5	15,7	7,8	3 782	13,2	12,5	14,0	2,9	16 970
Rural	9,0	7,1	11,0	10,7	2 588	9,4	8,5	10,2	4,6	10 663
Dominio de residencia										
Costa	14,2	11,5	16,9	9,6	2 252	13,4	12,5	14,4	3,5	10 675
Lima Metropolitana	17,7	13,4	22,1	12,4	520	15,4	13,9	16,8	4,9	3 262
Costa (sin LM)	9,3	7,3	11,3	11,0	1 732	11,1	10,1	12,1	4,7	7 413
Sierra	8,9	7,3	10,4	9,1	2 751	9,0	8,2	9,7	4,4	11 398
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,2	9,0	11,4	6,0	4 351
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7,8	6,8	8,8	6,5	7 047
Selva	13,4	11,1	15,7	8,7	1 367	15,0	13,6	16,3	4,6	5 560
Selva urbana Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,6 15,5	12,9 13,3	16,4 17,6	6,1 7,0	3 088 2 472
	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15,5	13,3	17,0	7,0	2412
Nivel de educación						0.0	0.0	7.0	5.4	40.000
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,9	6,2	7,6	5,1	10 083
Secundaria Superior	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	13,7 15,7	12,7 14,3	14,7 17,0	3,7 4,4	10 876 6 671
·	11.4.	π.α.	11.0.	11.0.	n.u.	10,1	14,0	17,0	7,7	00/1
Quintil de bienestar						0.0	0.0	40.4	5.0	0.454
Quintil inferior Segundo quintil	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	9,2 10,3	8,2 9,2	10,1 11,3	5,2 5,3	8 151 6 782
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,0	11,6	14,4	5,4	5 153
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,9	10,6	13,3	5,6	4 103
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,5	14,8	18,1	5,1	3 444
Departamento										
Amazonas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(8,2)	5,8	10,7	15,1	962
Áncash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,7	7,8	11,5	9,7	1 246
Apurímac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7,9	5,6	10,1	14,6	1 029
Arequipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,9	9,8	14,0	9,0	1 057
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,2	7,7	12,7	12,4	1 186
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,0	7,5	12,6	12,9	946
Prov. Const. del Callao	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,0	16,3	21,7	7,2	884
Cusco Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,2 9,7	6,0 7,2	10,3 12,3	13,5 13,2	1 000 883
Huánuco	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	(7,9)	7,2 5,5	10,2	15,2	982
Ica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,9	14,6	19,1	6,8	1 088
Junín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,2	9,8	14,6	10,0	1 032
La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,7	7,1	12,3	13,5	1 005
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,5	6,1	10,9	14,2	918
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,8	13,3	16,3	5,0	3 327
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,9	13,3	16,5	5,5	2 393
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,0	11,2	16,8	10,2	934
Loreto	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,8	14,4	19,2	7,3 9,0	859
Madre de Dios Moquegua	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	19,3 12,7	15,9 10,1	22,7 15,3	10,3	959 987
Pasco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,4	10,1	16,5	12,0	1 070
Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(6,4)	4,3	8,6	16,9	1 087
Puno	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(8,5)	6,0	11,0	15,1	1 347
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,5	11,5	17,5	10,6	976
Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,2	6,2	10,3	12,7	903
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,4	14,4	22,3	10,9	921
Ucayali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,7	15,6	21,9	8,5	979

Nota: Fumador actual son las personas que fuman al menos un cigarrillo diariamente en los últimos 30 días.

^() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

n.a.: No aplicable.

CUADRO Nº 1.8 PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE FUMAN DIARIAMENTE EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2014

(Porcentaje)

	2014										
Característica seleccionada	Valor	Intervalo de co		Coeficiente de	Total de casos						
	estimado •	Inferior	Superior	variación	sin ponderar						
Total	2,0	1,7	2,3	6,6	27 633						
Sexo											
Hombre	3,3	2,9	3,7	6,7	12 806						
Mujer	(0,9)	0,6	1,2	15,9	14 827						
Grupo de edad											
15 - 19	(0,4)	0,1	0,8	42,8	2 765						
20 - 29	(1,9)	1,3	2,5	16,9	5 291						
30 - 39	2,1	1,6	2,6	12,4	5 757						
40 - 49	(2,6)	1,8	3,3	15,4	4 665						
50 - 59	2,7	1,9	3,5	14,3	3 639						
60 y más	2,0	1,5	2,6	14,8	5 516						
Área de residencia											
Urbana	2,3	1,9	2,6	7,5	16 970						
Rural	1,2	0,9	1,5	11,6	10 663						
Dominio de residencia											
Costa	2,4	2,0	2,8	8,7	10 675						
Lima Metropolitana	2,8	2,1	3,4	12,3	3 262						
Costa (sin LM)	2,0	1,6	2,5	11,1	7 413						
Sierra	0,8	0,6	1,0	14,6	11 398						
Sierra urbana	(0,9)	0,5	1,3	21,3	4 351						
Sierra rural	(0,7)	0,4	0,9	19,1	7 047						
Selva	2,9	2,3	3,5	10,3	5 560						
Selva urbana	3,3	2,5	4,2	13,2	3 088						
Selva rural	(2,4)	1,6	3,2	16,5	2 472						
Nivel de educación											
Hasta primaria	1,1	0,8	1,3	12,0	10 083						
Secundaria	2,3	1,9	2,7	9,0	10 876						
Superior	2,6	2,0	3,2	11,9	6 671						
Quintil de bienestar											
Quintil inferior	1,1	0,8	1,4	14,5	8 151						
Segundo quintil	1,7	1,3	2,1	12,5	6 782						
Quintil intermedio	(1,7)	1,2	2,2	15,4	5 153						
Cuarto quintil	1,5	1,1	1,9	13,2	4 103						
Quintil superior	3,9	3,0	4,8	11,6	3 444						

() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO Nº 1.9

PERÚ: PROMEDIO DIARIO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS POR PERSONAS DE 15 Y MÁS
AÑOS DE EDAD QUE FUMAN DIARIAMENTE, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2014

			2014		
Característica seleccionada	Valor	Intervalo de co		Coeficiente de	Total de casos
	estimado -	Inferior	Superior	variación	sin ponderar
Total	5,6	4,2	6,9	12,3	552
Sexo					
Hombre	4,9	4,2	5,6	7,3	455
Mujer	(7,5)	2,6	12,5	33,4	97
Grupo de edad					
15 - 19	(2,7)	0,5	4,8	41,6	9
20 - 29	3,9	3,1	4,7	11,0	90
30 - 39	4,1	2,9	5,2	14,3	127
40 - 49	(8,0)	2,7	13,3	33,6	107
50 - 59	6,8	5,0	8,6	13,3	104
60 y más	(5,1)	3,3	6,8	17,4	115
Área de residencia					
Urbana	5,9	4,4	7,5	13,4	412
Rural	3,3	2,7	3,8	8,5	140
Dominio de residencia					
Costa	(6,2)	4,3	8,1	15,5	299
Sierra	(3,9)	2,7	5,1	15,9	83
Selva	4,1	3,5	4,7	7,4	170
Nivel de educación					
Hasta primaria	3,7	3,0	4,5	10,0	125
Secundaria	5,3	4,2	6,4	10,4	266
Superior	(6,7)	3,3	10,0	25,8	161

Nota: Personas de 15 y más años de edad que han fumado al menos un cigarrillo completo.

⁽⁾ Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

CUADRO Nº 1.10

PERÚ: EDAD PROMEDIO DE INICIO DE CONSUMO DIARIO DE CIGARRILLOS POR PERSONAS DE 15 Y
MÁS DE EDAD QUE FUMAN DIARIAMENTE, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2014

On an although the an			2014		
Característica seleccionada	Valor	Intervalo de conf	ianza al 95%	Coeficiente	Total de casos
	estimado	Inferior	Superior	de variación	sin ponderar
Total	23,5	22,3	24,6	2,5	551
Sexo	00.0	04.0	04.5	0.0	454
Hombre Mujer	23,2 24,3	21,9 21,8	24,5 26,7	2,9 5,2	454 97
•	24,3	21,0	20,1	3,2	31
Grupo de edad 15 - 19	16,0	15,4	16,6	2,0	10
20 - 29	19,3	18,2	20,3	2,7	91
30 - 39	20,9	19,5	22,3	3,4	126
40 - 49	25,0	22,5	27,5	5,1	106
50 - 59	25,7	23,1	28,3	5,1	104
60 y más	28,2	24,3	32,1	7,1	114
Área de residencia					
Urbana	23,2	21,9	24,6	2,9	414
Rural	24,8	22,9	26,6	3,9	137
Dominio de residencia					
Costa	23,2	21,7	24,7	3,3	300
Lima Metropolitana	23,4	21,3	25,5	4,5	105
Costa (sin LM)	22,9	20,8	25,1	4,8	195
Sierra urbana	25,8 25,3	23,3 21,4	28,4 29,1	5,0 7,7	83 36
Sierra rural	26,6	23,4	29,1	6,2	47
Selva	22,8	21,2	24,5	3,6	168
Selva urbana	23,3	21,1	25,5	4,7	107
Selva rural	22,0	19,8	24,2	5,1	61
Nivel de educación					
Hasta primaria	27,5	24,1	30,8	6,2	123
Secundaria	22,8	21,1	24,6	3,9	267
Superior	22,6	21,2	24,1	3,3	161
Quintil de bienestar					
Quintil inferior	24,0	21,6	26,4	5,0	92
Segundo quintil	23,5	21,5	25,5	4,3	135
Quintil intermedio	25,3	21,6	29,0	7,4	106
Cuarto quintil Quintil superior	23,8 22,5	20,7 20,8	26,9 24,2	6,6 3,9	94 124
·	22,3	20,0	24,2	3,9	124
Departamento	(07.7)	40.0	20.0	40.7	0
Amazonas Áncash	(27,7) 19,7	18,6 16,5	36,9 23,0	16,7 8,4	9 7
Apurímac	(29,8)	0,9	58,8	49,4	3
Areguipa	23,6	19,6	27,5	8,6	21
Ayacucho	(24,0)	15,5	32,5	18,0	11
Cajamarca	(23,3)	15,6	31,1	16,9	9
Prov. Const. del Callao	26,0	20,9	31,0	9,9	39
Cusco	24,1	21,6	26,6	5,3	10
Huancavelica	15,5	15,5	15,5	0,0	2
Huánuco Ica	23,3 24,4	17,0 20,1	29,6 28,8	13,8 9,0	9 31
Junín	26,5	22,5	30,5	7,7	12
La Libertad	(24,7)	16,7	32,8	16,5	14
Lambayeque	23,1	17,3	28,8	12,7	18
Lima	22,8	20,7	24,9	4,7	84
Provincia de Lima 1/	22,8	20,5	25,0	5,0	67
Lima Provincias 2/	23,7	19,1	28,3	9,8	17
Loreto	22,5	19,5	25,5	6,7	35
Madre de Dios	28,0	24,1	32,0	7,1	44
Moquegua Pasco	21,7 26,5	17,3 18,7	26,2 34,3	10,5 15,0	17 16
Piura	20,5	17,8	34,3 25,5	9,0	18
Puno	32,8	29,8	25,5 35,7	4,6	9
San Martín	23,2	19,9	26,5	7,1	26
Tacna	22,5	17,5	27,5	11,3	10
Tumbes	20,5	17,9	23,1	6,4	58
Ucayali	24,1	20,5	27,7	7,7	39

Nota: Fuma diariamente en los últimos 30 días.

⁽⁾ Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

^{1/} Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
n.a. No anlicable

CUADRO Nº 1.11

PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE CONSUMIERON ALGUNA VEZ ALGUNA BEBIDA ALCOHOLICA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

(Porcentaje)

		2	013 - II Semes	stre				2014		
Característica seleccionada	Valor estimado	Intervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos sin	Valor estimado	Intervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos sin
	esumado	Inferior	Superior	variación	ponderar	esumado	Inferior	Superior	variación	ponderar
Total	88,0	86,6	89,5	0,8	6 370	90,2	89,7	90,8	0,3	27 633
Sexo										
Hombre	92,9	91,1	94,7	1,0	2 981	94,3	93,6	94,9	0,3	12 806
Mujer	83,8	81,7	85,9	1,3	3 389	86,7	85,9	87,6	0,5	14 827
Grupo de edad										
15 - 19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	67,4	65,1	69,7	1,8	2 765
20 - 29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	92,3	91,2	93,5	0,6	5 291
30 - 39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	94,3	93,5	95,1	0,4	5 757
40 - 49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	95,2	94,3	96,0	0,5	4 665
50 - 59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	94,5	93,5	95,6	0,6	3 639
60 y más	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	91,7	90,5	92,9	0,6	5 516
	11.4.	π.α.	π.α.	n.a.	n.a.	31,7	30,0	32,3	0,0	3310
Área de residencia										
Urbana	90,6	88,9	92,2	0,9	3 782	92,6	92,0	93,2	0,3	16 970
Rural	80,5	77,7	83,2	1,8	2 588	83,0	81,6	84,4	0,8	10 663
Dominio de residencia										
Costa	91,6	89,6	93,7	1,1	2 252	93,5	92,8	94,2	0,4	10 675
Lima Metropolitana	90,5	87,2	93,7	1,8	520	93,6	92,6	94,7	0,6	3 262
Costa (sin LM)	93,3	91,3	95,3	1,1	1 732	93,4	92,5	94,2	0,5	7 413
Sierra	82,5	80,3	84,7	1,4	2 751	84,9	83,8	86,1	0,7	11 398
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	89,9	88,6	91,2	0,7	4 351
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	80,2	78,4	82,1	1,2	7 047
Selva	85,0	82,4	87,7	1,6	1 367	88,0	86,6	89,4	0,8	5 560
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	90,2	88,5	92,0	1,0	3 088
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	85,1	82,9	87,4	1,4	2 472
	11.0.	11.0.	11.0.	11.0.	11.0.	00,1	02,0	01,1	.,.	22
Nivel de educación										
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	87,7	86,6	88,8	0,7	10 083
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	87,7	86,9	88,6	0,5	10 876
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	96,7	96,1	97,3	0,3	6 671
Quintil de bienestar										
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	80,5	78,9	82,1	1,0	8 151
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	87,8	86,5	89,2	0,8	6 782
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	92,9	91,9	93,8	0,5	5 153
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	94,2	93,2	95,2	0,5	4 103
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	94,6	93,4	95,8	0,6	3 444
•										
Departamento										
Amazonas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	84,9	79,6	90,3	3,2	962
Áncash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	83,8	80,8	86,7	1,8	1 246
Apurímac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	92,2	89,2	95,2	1,7	1 029
Arequipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	92,5	90,4	94,5	1,1	1 057
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	84,7	81,8	87,6	1,7	1 186
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	83,6	79,4	87,7	2,5	946
Prov. Const. del Callao	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	94,5	92,8	96,3	0,9	884
Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	87,8	84,5	91,1	1,9	1 000
Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	77,6	72,8	82,4	3,2	883
Huánuco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	73,6	69,5	77,7	2,8	982
Ica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	94,7	92,9	96,4	1,0	1 088
Junín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	89,7	87,4	92,0	1,3	1 032
La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	87,4	84,8	90,0	1,5	1 005
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	92,4	90,2	94,6	1,2	918
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	93,4	92,4	94,5	0,6	3 327
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	93,5	92,3	94,7	0,6	2 393
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	93,2	91,3	95,1	1,0	934
Loreto	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	86,3	82,5	90,1	2,2	859
Madre de Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	88,0	84,8	91,1	1,8	959
Moquegua	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	92,1	89,9	94,4	1,2	987
Pasco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	81,9	79,0	84,9	1,8	1 070
Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	96,9	95,3	98,4	0,8	1 070
Puno	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	84,5	81,9	87,1	1,6	1 347
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	91,7	89,6	93,8	1,0	976
Tacna						93,2	91,2	95,6 95,3	1,2	903
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		88,2	95,3 92,8		903
	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	90,5			1,3	
Ucayali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	91,7	89,8	93,6	1,1	979

Nota: Se considera si consumió al menos un vaso, copa o unidad similar completa.

⁽⁾ Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

^{1/} Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

n.a.: No aplicable.

CUADRO Nº 1.12 PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE CONSUMIERON ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

(Porcentaje)

		2	013 - II Seme	stre				2014		
Característica seleccionada	Valor	Intervalo de		Coeficiente	Total de	Valor	Intervalo de		Coeficiente	Total de
Seleccionada	estimado -	al 9	Superior	de variación	casos sin ponderar	estimado -	al 9 Inferior	5% Superior	de variación	casos sin ponderar
Total	67,5	65,4	69,5	1,5	6 370	66,9	65,9	67,8	0,7	27 633
Sexo										
Hombre	76,4	73,7	79,1	1,8	2 981	76,7	75,5	77,8	0,8	12 806
Mujer	59,6	56,5	62,7	2,6	3 389	58,4	57,1	59,7	1,1	14 827
Grupo de edad										
15 - 19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	53,8	51,3	56,3	2,4	2 765
20 - 29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	76,3	74,5	78,1	1,2	5 291
30 - 39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	76,0	74,4	77,6	1,1	5 757
40 - 49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	73,1	71,3	75,0	1,3	4 665
50 - 59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	65,8	63,5	68,1	1,8	3 639
60 y más	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	49,4	47,1	51,6	2,3	5 516
Área de residencia										
Urbana	73,1	70,7	75,6	1,7	3 782	71,8	70,8	72,9	0,8	16 970
Rural	50,6	47,4	53,8	3,2	2 588	51,9	49,9	54,0	2,0	10 663
Dominio de residencia										
Costa	74,1	71,1	77,2	2,1	2 252	73,6	72,3	74,9	0,9	10 675
Lima Metropolitana	75,4	70,7	80,2	3,2	520	76,2	74,4	77,9	1,2	3 262
Costa (sin LM)	72,2	69,3	75,2	2,1	1 732	70,5	68,6	72,4	1,4	7 413
Sierra	58,8	55,8	61,7	2,5	2 751	57,0	55,3	58,6	1,5	11 398
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	66,3	64,2	68,3	1,6	4 351
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	48,1	45,6	50,5	2,6	7 047
Selva	58,1	54,5	61,6	3,1	1 367	60,0	57,7	62,2	1,9	5 560
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	65,4	62,5	68,3	2,3	3 088
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	52,9	49,6	56,2	3,2	2 472
Nivel de educación										
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	48,4	46,6	50,1	1,8	10 083
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	69,4	68,2	70,6	0,9	10 876
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	82,4	81,0	83,7	0,8	6 671
Quintil de bienestar										
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	47,2	45,1	49,3	2,2	8 151
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	61,2	59,2	63,1	1,6	6 782
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	70,1	68,2	72,0	1,4	5 153
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	73,9	72,1	75,7	1,2	4 103
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	79,4	77,4	81,3	1,3	3 444
Departamento										
Amazonas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	59,9	54,0	65,8	5,0	962
Áncash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	54,2	49,9	58,4	4,0	1 246
Apurímac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	63,4	58,0	68,8	4,4	1 029
Areguipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	69,8	65,8	73,8	2,9	1 057
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	55,1	49,8	60,5	4,9	1 186
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	53,8	49,1	58,4	4,4	946
Prov. Const. del Callao	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	74,3	71,2	77,5	2,2	884
Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	62,6	57,5	67,7	4,2	1 000
Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	48,1	43,0	53,1	5,4	883
Huánuco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	43,9	39,6	48,2	5,0	982
Ica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	76,6	73,8	79,4	1,9	1 088
Junín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	59,0	54,8	63,1	3,6	1 032
La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	58,2	54,0	62,4	3,7	1 005
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	72,5	67,7	77,2	3,3	918
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	75,5	73,7	77,3	1,2	3 327
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	76,4	74,4	78,3	1,3	2 393
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	69,0	64,9	73,1	3,0	934
Loreto	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	60,0	55,3	64,6	3,9	859
Madre de Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	64,8 65.0	60,3 61.8	69,4 70.1	3,6	959 987
Moquegua Pasco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	65,9 49,4	61,8 44,9	70,1 53,9	3,2 4,7	987 1 070
Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	49,4 77,4	73,3	53,9 81,5	4, <i>1</i> 2,7	1 070
Puno	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	77,4 56,4	52,3	60,5	3,7	1 347
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	63,1	52,3 58,3	67,9	3,7	976
Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	64,6	59,6	69,7	4,0	903
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	67,2	62,7	71,8	3,5	921
	11.4.	11.u.	11.4.	11.4.	11.4.	٠٠,٧	OL,1	, ,,,	0,0	UZ 1

^{1/} Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

n.a.: No aplicable.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO Nº 1.13 PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS CONSUMIERON ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

(Porcentaje)

			013 - II Seme	stre				2014		
Característica seleccionada	Valor estimado –	Intervalo de al 9	5%	Coeficiente de	Total de casos sin	Valor estimado –	Intervalo de al 9	5%	Coeficiente de	Total de casos sin
		Inferior	Superior	variación	ponderar		Inferior	Superior	variación	ponderar
Total	37,0	34,7	39,3	3,2	6 370	36,1	35,1	37,0	1,4	27 633
Sexo										
Hombre	49,8	46,6	53,1	3,3	2 981	46,3	45,0	47,6	1,4	12 806
Mujer	25,7	23,1	28,3	5,1	3 389	27,2	26,0	28,5	2,3	14 827
Grupo de edad										
15 - 19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,1	19,8	24,3	5,2	2 765
20 - 29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	43,6	41,5	45,8	2,5	5 291
30 - 39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	43,1	41,1	45,0	2,3	5 757
40 - 49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	42,4	40,1	44,6	2,7	4 665
50 - 59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	34,3	31,8	36,7	3,6	3 639
60 y más	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,4	22,5	26,3	4,0	5 516
	11.0.	11.0.	n.u.	n.a.	11.4.	24,4	22,0	20,0	7,0	0010
Área de residencia										
Urbana	39,7	36,8	42,6	3,8	3 782	39,6	38,4	40,7	1,5	16 970
Rural	28,8	26,0	31,6	5,0	2 588	25,5	23,9	27,2	3,3	10 663
Dominio de residencia										
Costa	39,4	35,8	43,0	4,7	2 252	40,9	39,5	42,3	1,8	10 675
Lima Metropolitana	38,0	32,4	43,5	7,5	520	42,7	40,6	44,7	2,5	3 262
Costa (sin LM)	41,4	37,4	45,3	4,9	1 732	38,7	36,9	40,5	2,3	7 413
Sierra	33,0	30,0	35,9	4,6	2 751	28,5	27,0	29,9	2,5 2,6	11 398
Sierra urbana		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	34,3	32,1	36,5	3,2	4 351
Sierra rural	n.a.					22,9	20,9	24,9	3,2 4,4	7 047
Selva	n.a.	n.a.	n.a. 39,2	n.a.	n.a. 1 367	32,4	30,3	34,6		5 560
Selva urbana	35,7	32,2		5,0					3,4	
	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	36,9	34,0	39,9	4,0	3 088
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,7	23,6	29,7	5,8	2 472
Nivel de educación										
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,4	21,0	23,8	3,2	10 083
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	37,5	36,1	38,9	1,9	10 876
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	48,2	46,3	50,1	2,0	6 671
Quintil de bienestar										
						21.0	20.2	22.6	4.0	0.454
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,9	20,2	23,6	4,0	8 151
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30,8	29,0	32,6	3,0	6 782
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	38,2	36,3	40,0	2,5	5 153
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	39,6	37,5	41,8	2,7	4 103
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	47,8	45,5	50,2	2,5	3 444
Departamento										
Amazonas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,6	24,0	31,3	6,7	962
Áncash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,1	23,2	28,9	5,6	1 246
Apurímac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	34,3	29,7	38,8	6,8	1 029
Arequipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	38,5	34,8	42,1	4,8	1 057
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	29,1	24,5	33,8	8,2	1 186
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,6	21,3	29,9	8,6	946
Prov. Const. del Callao	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	41,2	37,5	45,0	4,6	884
Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	36,0	31,3	40,7	6,6	1 000
Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,8	17,8	27,7	11,1	883
Huánuco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,0	13,8	20,3	9,7	982
						44,9	41,7		3,6	
Ica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			48,1		1 088
Junín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	28,1	24,0	32,2	7,4	1 032
La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	31,3	27,1	35,5	6,8	1 005
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	40,2	35,9	44,5	5,4	918
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	41,8	39,8	43,9	2,5	3 327
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	42,8	40,5	45,1	2,7	2 393
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	34,5	30,9	38,0	5,2	934
Loreto	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	34,9	30,0	39,7	7,1	859
Madre de Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	32,1	27,6	36,7	7,3	959
Moquegua	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	37,6	32,9	42,4	6,5	987
Pasco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,8	17,4	24,1	8,3	1 070
Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	41,1	36,6	45,6	5,6	1 087
Puno	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	29,0	24,9	33,1	7,3	1 347
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	35,1	29,9	40,4	7,6	976
Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	34,9	30,2	39,6	6,9	903
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	38,3	33,7	42,9	6,2	921
Ucayali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	38,4	33,1	43,7	7,0	979

Nota: Corresponde a la población que consumió alguna bebida alcohólica en los últimos 30 días. 1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

n.a.: No aplicable.

CUADRO Nº 1.14

PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE TUVIERON EVENTOS DE CONSUMO EXCESIVO DE ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

(Porcentaje)

		2	013 - II Semes	tre				2014		
Característica seleccionada	Valor	Intervalo de		Coeficiente	Total de	Valor	ntervalo de		Coeficiente	Total de
Seleccionada	estimado -	al 9	Superior	de variación	casos sin ponderar	estimado —	al 9	Superior	de variación	casos sin ponderar
Total	23,2	21,2	25,2	4,3	6 370	23,1	22,3	24,0	1,8	27 633
Sexo										
Hombre	35,2	32,1	38,2	4,4	2 981	34,6	33,3	35,9	1,9	12 806
Mujer	12,7	10,8	14,7	7,8	3 389	13,3	12,4	14,2	3,5	14 827
-	12,1	10,0	14,7	7,0	3 309	13,3	12,4	14,2	3,3	14 027
Grupo de edad										
15 - 19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,3	9,6	13,1	7,9	2 765
20 - 29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30,5	28,7	32,3	3,0	5 291
30 - 39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30,2	28,3	32,0	3,1	5 757
40 - 49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,8	25,9	29,8	3,6	4 665
50 - 59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,2	19,2	23,2	4,8	3 639
60 y más	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,9	10,5	13,3	6,0	5 516
Área de residencia										
Urbana	25,2	22,6	27,7	5,1	3 782	25,2	24,2	26,3	2,0	16 970
Rural	17,3	15,2	19,4	6,1	2 588	16,8	15,7	18,0	3,5	10 663
Dominio de residencia										
Costa	24,0	20,8	27,1	6,7	2 252	25,6	24,3	26,8	2,5	10 675
Lima Metropolitana	22,0	17,1	26,9	11,4	520	25,8	23,9	27,8	3,8	3 262
Costa (sin LM)	26,7	23,4	30,0	6,2	1 732	25,3	23,8	26,7	2,9	7 413
Sierra	20,7	19,8	24,5	5,4	2 751	18,4	23,6 17,3	20,7 19,4	3,0	11 398
Sierra urbana	1				n.a.	22,6	21,0	24,3	3,7	4 351
Sierra rural	n.a.	n.a. n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,3	12,9	15,7	4,9	7 047
Selva	n.a. 22,3	19,6	n.a. 25,0	n.a. 6,2	1 367	23,6	21,9	25,4	3,8	5 560
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.		n.a.	23,0 27,1	24,7	29,5	4,5	3 088
Selva rural				n.a.		19,2	16,8	29,3	4,3 6,6	2 472
	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,2	10,0	21,1	0,0	2412
Nivel de educación										
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,6	12,5	14,6	3,9	10 083
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,4	24,1	26,7	2,6	10 876
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	29,7	28,1	31,4	2,8	6 671
Quintil de bienestar										
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,8	12,5	15,0	4,6	8 151
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,0	19,6	22,4	3,4	6 782
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,7	24,0	27,4	3,4	5 153
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,1	24,1	28,0	3,8	4 103
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	28,2	26,0	30,3	3,8	3 444
							,	,	,	
Departamento						47.0	11.2	20.0	0.4	000
Amazonas Áncash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,2	14,3	20,0	8,4	962 1 246
	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,4	15,8	21,0	7,3	
Apurímac Arequipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,7	17,2	24,1	8,6 6.7	1 029 1 057
' '	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23,9 20,1	20,8 16,6	27,1 23,6	6,7 9,0	1 186
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	,	,			946
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,4	14,0	20,7	9,8	
Prov. Const. del Callao Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,7	23,1	30,2	6,7	884
Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,1	19,0	25,1	7,1	1 000
	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,5	13,5	23,5	13,9	883 982
Huánuco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,1	10,2	16,0	11,2	
lca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	32,1	28,9	35,2	5,0	1 088
Junín La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,7	15,7	21,7	8,2	1 032
La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,3	15,3	21,3	8,3	1 005
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,8	23,0	30,6	7,2	918
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,4	23,5	27,3	3,9	3 327
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,7	23,6	27,9	4,2	2 393
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23,1	20,0	26,2	6,7	934
Loreto Madre de Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,9	23,9	31,9	7,3	859
	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,0	22,4	29,7	7,2 6.0	959
Moquegua	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,4	23,7	31,1	6,9	987
Pasco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15,1	12,3	17,8	9,4	1 070
Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,6	21,1	28,0	7,1	1 087
Puno San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,9	14,9	21,0	8,6	1 347
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23,4	19,7	27,1	8,1	976
Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,7	19,1	26,3	8,1	903
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30,6	26,3	34,9	7,1	921
Ucayali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	29,6	25,4	33,9	7,3	979

Nota: Consumo excesivo si: hombre tomó cinco vasos, copa o unidad similar y mujer cuatro vasos, copa o unidad similar como mínimo.

^{1/} Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

n.a.: No aplicable.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO № 1.15 PERÚ: PROMEDIO DE DÍAS A LA SEMANA DE CONSUMO DE FRUTAS EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

		2	013 - II Seme	stre				2014	ı	
Característica seleccionada	Valor estimado	Intervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos sin	Valor estimado	Intervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos sin
	estillado	Inferior	Superior	variación	ponderar	esumado	Inferior	Superior	variación	ponderar
Total	4,2	4,1	4,3	1,3	5 451	4,4	4,3	4,4	0,5	24 212
Sexo										
Hombre	3,7	3,6	3,9	1,9	2 487	4,0	3,9	4,0	0,8	10 985
Mujer	4,6	4,5	4,7	1,6	2 964	4,7	4,7	4,8	0,6	13 227
Grupo de edad										
15 - 19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,2	4,1	4,4	1,4	2 453
20 - 29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,3	4,2	4,4	1,0	4 763
30 - 39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,4	4,3	4,5	1,0	5 179
40 - 49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,4	4,3	4,5	1,2	4 128
50 - 59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,4	4,3	4,6	1,5	3 180
60 y más	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,6	4,4	4,7	1,3	4 509
Área de residencia										
Urbana	4,4	4,3	4,5	1,5	3 391	4,5	4,5	4,6	0,6	15 305
Rural	3,5	3,3	3,7	2,5	2 060	3,9	3,8	4,0	1,1	8 907
Dominio de residencia										
Costa	4,4	4,3	4,6	1,9	2 030	4,5	4,5	4,6	0,7	9 666
Lima Metropolitana	4,5	4,3	4,8	2,9	464	4,7	4,6	4,8	1,1	2 963
Costa (sin LM)	4,3	4,1	4,4	1,9	1 566	4,4	4,3	4,4	1,0	6 703
Sierra	3,8	3,7	3,9	1,8	2 273	4,1	4,0	4,1	0,9	9 704
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,4	4,3	4,5	1,1	3 940
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,7	3,6	3,8	1,4	5 764
Selva	4,2	4,0	4,4	2,7	1 148	4,5	4,3	4,6	1,3	4 842
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,4	4,2	4,5	1,5	2 722
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,6	4,4	4,8	2,4	2 120
Nivel de educación										
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,1	4,0	4,2	1,1	8 199
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,4	4,3	4,4	0,8	9 797
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,7	4,6	4,7	0,9	6 215
Quintil de bienestar										
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,7	3,6	3,8	1,4	6 549
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,1	4,0	4,2	1,0	5 983
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,4	4,3	4,5	1,1	4 698
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,5	4,4	4,6	1,1	3 771
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,9	4,8	5,0	1,1	3 211
Departamento										
Amazonas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,2	4,0	4,4	2,6	851
Áncash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,1	3,9	4,3	2,4	1 086
Apurímac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,8	3,6	4,0	2,9	880
Arequipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,5	4,4	4,7	1,9	935
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,0	3,8	4,2	2,8	1 016
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,0	3,8	4,2	2,8	807
Prov. Const. del Callao	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,6	4,4	4,8	2,3	791
Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,9	3,7	4,0	2,0	844
Huancavelica Huánuco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,1	3,8	4,4	3,2	766 757
Ica	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	4,2 4,5	4,0 4,3	4,5 4,7	3,3 2,1	1 021
Junín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,5	4,3	4,7	2,3	950
La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,3	4,1	4,5	2,2	906
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,4	4,2	4,6	2,3	850
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,7	4,6	4,8	1,1	3 058
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,7	4,6	4,8	1,2	2 184
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,5	4,3	4,7	2,1	874
Loreto	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,9	4,7	5,2	2,4	746
Madre de Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,7	3,5	4,0	3,2	805
Moquegua	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,8	4,6	5,0	2,4	865
Pasco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,9	3,7	4,1	2,7	922
Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,0	3,8	4,2	2,7	935
Puno	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,8	3,7	4,0	1,9	1 107
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5,0	4,7	5,2	2,3	938
Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,2	4,0	4,4	2,5	802
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,2	4,0	4,4	2,9	778
Ucayali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,5	3,3	3,7	2,7	796

Nota: Personas de 15 y mas años de edad que han consumido fruta al menos un día en la última semana a la entrevista.

^{1/} Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

n.a.: No aplicable.

CUADRON № 1.16 PERÚ: PROMEDIO DE DÍAS A LA SEMANA DE CONSUMO DE ENSALADA DE VERDURAS EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

		2	013 - II Seme	stre				2014		
Característica seleccionada	Valor estimado	Intervalo de al 9	5%	Coeficiente de	Total de casos sin	Valor estimado	Intervalo de al 9	5%	Coeficiente de	Total de casos sin
		Inferior	Superior	variación	ponderar		Inferior	Superior	variación	ponderar
Total	3,2	3,1	3,3	1,9	4 012	3,3	3,2	3,3	0,8	18 015
Sexo										
Hombre	2,9	2,8	3,1	2,5	1 783	3,1	3,1	3,2	1,1	7 991
Mujer	3,4	3,2	3,6	2,6	2 229	3,3	3,3	3,4	1,0	10 024
Grupo de edad										
15 - 19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,0	2,9	3,2	2,5	1 635
20 - 29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,3	3,2	3,4	1,6	3 451
30 - 39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,2	3,1	3,3	1,5	4 056
40 - 49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,4	3,2	3,5	1,7	3 307
50 - 59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,2	3,1	3,4	2,1	2 449
60 y más	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,3	3,2	3,4	1,8	3 117
Área de residencia										
Urbana	3,3	3,2	3,5	2,2	2 746	3,4	3,3	3,5	0,9	12 289
Rural	2,5	2,3	2,6	3,2	1 266	2,7	2,6	2,8	1,4	5 726
Dominio de residencia										
Costa	3,3	3,1	3,5	2,8	1 604	3,3	3,3	3,4	1,1	7 615
Lima Metropolitana	3,5	3,2	3,8	3,9	400	3,5	3,4	3,6	1,6	2 500
Costa (sin LM)	3,0	2,9	3,2	3,1	1 204	3,1	3,0	3,2	1,5	5 115
Sierra	2,9	2,7	3,0	2,4	1 537	3,0	3,0	3,1	1,2	6 765
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,3	3,2	3,4	1,7	3 086
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,7	2,6	2,8	1,8	3 679
Selva	3,1	2,9	3,3	3,5	871	3,3	3,2	3,4	1,6	3 635
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,6	3,5	3,7	1,8	2 285
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,8	2,7	3,0	2,8	1 350
Nivel de educación										
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,9	2,8	3,0	1,5	5 494
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,2	3,1	3,3	1,2	7 244
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,6	3,5	3,7	1,3	5 277
Quintil de bienestar										
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,6	2,5	2,7	1,6	3 954
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,0	2,9	3,1	1,7	4 334
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,2	3,1	3,3	1,6	3 710
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,4	3,3	3,5	1,6	3 151
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,7	3,6	3,8	1,6	2 866
Departamento										
Amazonas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,2	3,0	3,4	3,4	692
Áncash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,2	3,0	3,4	3,0	843
Apurímac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,1	2,9	3,3	2,8	762
Arequipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,3	3,1	3,4	2,4	863
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,1	2,9	3,3	3,5	633
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,1	2,8	3,3	3,9	560
Prov. Const. del Callao	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,4	3,2	3,6	2,5	637
Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,1	2,9	3,2	2,8	685
Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,8	2,5	3,1	5,0	419
Huánuco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,3	3,1	3,5	3,1	548 743
lca Junín	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	2,9 3,0	2,7 2,7	3,1 3,2	3,4 4,1	690
La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,5	3,3	3,7	3,2	740
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,3	3,1	3,6	3,8	643
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,5	3,4	3,6	1,6	2 521
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,5	3,4	3,7	1,8	1 875
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,1	2,9	3,3	3,5	646
Loreto	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,1	2,8	3,3	3,9	420
Madre de Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,8	3,6	4,0	3,1	736
Moquegua	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,5	3,2	3,7	3,6	668
Pasco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,5	2,4	2,7	3,2	505
Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,3	2,1	2,5	3,9	640
Puno	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,6	2,4	2,8	4,0	583
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,8	3,5	4,0	3,1	722
Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,6	3,4	3,8	2,8	626
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,2	2,1	2,4	4,2	501
Ucayali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,4	3,2	3,6	3,2	635

Nota: Personas de 15 y mas años de edad que han consumido ensalda de verdura al menos un día en la última semana a la entrevista.

^{1/} Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

n.a.: No aplicable.

CUADRO № 1.17
PERÚ: PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO DE PORCIONES DE FRUTAS EN LA SEMANA POR PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

		2	013 - II Semes	tre				2014		
Característica seleccionada	Valor	Intervalo de al 9		Coeficiente	Total de casos sin	Valor	Intervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos sin
	estimado -	Inferior	Superior	de variación	ponderar	estimado –	Inferior	Superior	variación	ponderar
Total	1,9	1,9	2,0	1,5	5 451	2,0	2,0	2,1	0,6	24 105
Sexo										
Hombre	2,0	1,9	2,1	2,2	2 484	2,2	2,1	2,2	0,8	10 916
Mujer	1,9	1,8	1,9	1,7	2 967	1,9	1,9	2,0	0,7	13 189
Grupo de edad										
15 - 19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,4	2,3	2,4	1,4	2 438
20 - 29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,2	2,1	2,2	1,2	4 741
30 - 39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,0	1,9	2,0	1,2	5 162
40 - 49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,0	1,9	2,0	1,2	4 110
50 - 59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,0	1,9	2,0	1,4	3 162
60 y más	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,8	1,8	1,9	1,2	4 492
Área de residencia										
Urbana	1,9	1,9	2,0	1,7	3 391	2,1	2,0	2,1	0,7	15 249
Rural	1,9	1,8	2,0	2,5	2 060	2,0	1,9	2,0	1,0	8 856
Dominio de residencia										
Costa	1,9	1,8	2,0	2,2	2 030	2,1	2,1	2,2	0,8	9 633
Lima Metropolitana	1,8	1,7	1,9	3,8	462	2,1	2,1	2,2	1,3	2 951
Costa (sin LM)	2,1	2,0	2,1	1,9	1 568	2,1	2,1	2,2	1,0	6 682
Sierra	1,9	1,8	1,9	2,0	2 274	1,8	1,8	1,9	0,9	9 665
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,9	1,8	1,9	1,3	3 929
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,8	1,8	1,8	1,1	5 736
Selva	2,1	2,0	2,2	2,4	1 147	2,1	2,1	2,2	1,3	4 807
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,0	1,9	2,1	1,7	2 706
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,2	2,2	2,3	2,0	2 101
Nivel de educación										
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,9	1,8	1,9	1,0	8 162
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,1	2,1	2,2	0,8	9 756
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,1	2,0	2,1	1,0	6 186
Quintil de bienestar										
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,0	1,9	2,0	1,2	6 511
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,0	1,9	2,0	1,0	5 956
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,1	2,0	2,1	1,2	4 680
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,1	2,0	2,1	1,2	3 752
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,1	2,0	2,1	1,3	3 206
						,	,-	,	,-	
Departamento Amazonas						2.1	2.0	2,2	2.0	843
Áncash	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	2,1 2,0	2,0 1,9	2,2 2,1	2,8 2,3	1 080
Apurímac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,0	1,9	2,1	2,3	875
Arequipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,8	1,7	1,9	2,1	932
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,2	2,1	2,3	2,4	1 009
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,7	1,6	1,8	2,7	806
Prov. Const. del Callao	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,2	2,1	2,4	2,5	786
Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,9	1,7	2,0	3,0	843
Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,1	1,9	2,2	3,3	762
Huánuco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,9	1,8	2,0	2,8	756
Ica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,5	2,4	2,6	1,9	1 015
Junín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,0	1,9	2,1	3,4	946
La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,0	2,0	2,1	2,0	902
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,2	2,1	2,3	2,2	848
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,1	2,0	2,2	1,3	3 047
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,1	2,0	2,2	1,4	2 177
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,1	2,0	2,2	2,5	870
Loreto Madro do Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,2	2,0	2,3	3,1	744
Madre de Dios Moquegua	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,0	1,9 1.7	2,1 1 0	2,8	802 861
. •	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,8 1.8	1,7 1.7	1,9 1 0	2,3	
Pasco Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,8 2,2	1,7 2.1	1,9	3,1 2,6	916 931
Piura Puno	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,2 1,6	2,1 1,6	2,3 1 7	2,6 1,9	1 106
San Martín	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	2,0	2,0	1,7 2,1	2,1	932
Tacna	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	2,0 1,8	2,0 1,7	2, i 1,9	2,1	932 801
	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,0	2,0	2,1	2,6 1,6	775
Tumbes										

Nota: Se considera porción a una unidad, tajada, racimo o puñado de fruta en los últimos siete días. Hace referencia a las personas que consumieron al menos una porción de fruta en la última semana a la entrevista.

^{1/} Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

n.a.: No aplicable.

CUADRO № 1.18

PERÚ: PROMEDIO DIARIO DE CONSUMO DE PORCIONES DE ENSALADA DE VERDURAS EN LA SEMANA POR PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

		2	013 - II Seme	stre				2014		
Característica seleccionada	Valor estimado	Intervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos sin	Valor estimado	ntervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos sin
		Inferior	Superior	variación	ponderar		Inferior	Superior	variación	ponderar
Total	1,10	1,08	1,12	1,0	4 009	1,11	1,10	1,12	0,5	18 002
Sexo										
Hombre	1,13	1,10	1,16	1,5	1 779	1,11	1,10	1,13	0,8	7 984
Mujer	1,08	1,05	1,10	1,2	2 230	1,10	1,09	1,12	0,7	10 018
Grupo de edad										
15 - 19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,12	1,08	1,15	1,6	1 635
20 - 29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,14	1,12	1,17	1,2	3 450
30 - 39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,11	1,09	1,13	1,0	4 054
40 - 49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,10	1,08	1,13	1,2	3 306
50 - 59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,10	1,06	1,13	1,6	2 445
60 y más	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,07	1,05	1,10	1,2	3 112
Área de residencia										
Urbana	1,11	1,09	1,14	1,1	2 744	1,12	1,10	1,13	0,6	12 282
Rural	1,06	1,04	1,09	1,3	1 265	1,07	1,05	1,09	1,1	5 720
Dominio de residencia										
Costa	1,11	1,08	1,15	1,4	1 604	1,12	1,10	1,13	0,7	7 612
Lima Metropolitana	1,11	1,06	1,15	2,1	400	1,12	1,10	1,14	1,0	2 499
Costa (sin LM)	1,13	1,09	1,16	1,5	1 204	1,12	1,09	1,14	1,1	5 113
Sierra	1,08	1,05	1,10	1,2	1 538	1,08	1,06	1,10	1,0	6 758
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,10	1,07	1,13	1,4	3 084
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,06	1,02	1,09	1,5	3 674
Selva	1,09	1,05	1,13	1,7	867	1,12	1,09	1,14	1,2	3 632
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,13	1,09	1,16	1,4	2 283
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,10	1,05	1,15	2,2	1 349
Nivel de educación										
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,07	1,04	1,09	1,1	5 488
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,11	1,09	1,13	0,8	7 241
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,13	1,12	1,15	0,9	5 273
Quintil de bienestar										
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,08	1,05	1,11	1,5	3 950
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,09	1,06	1,11	1,1	4 331
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,11	1,08	1,13	1,1	3 706
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,13	1,10	1,16	1,2	3 150
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,12	1,09	1,14	1,0	2 865
Departamento										
Amazonas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,08	1,03	1,12	2,3	692
Áncash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,05	1,01	1,09	1,9	842
Apurímac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,99	0,90	1,08	4,6	761
Arequipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,13	1,06	1,20	3,1	863
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,09	1,01	1,17	4,0	632
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,07	1,03	1,11	1,9	560
Prov. Const. del Callao Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,10	1,06	1,15	2,1 2,6	637 684
Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,11 1,12	1,06 1,04	1,17 1,20	3,5	419
Huánuco	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	1,12	0,99	1,20	3,3 2,2	547
Ica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,12	1,08	1,17	2,1	741
Junín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,13	1,05	1,21	3,7	689
La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,09	1,04	1,14	2,4	740
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,12	1,06	1,17	2,6	643
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,12	1,10	1,14	1,0	2 520
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,12	1,10	1,14	1,0	1 874
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,09	1,05	1,13	2,0	646
Loreto	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,16	1,11	1,22	2,5	420
Madre de Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,14	1,07	1,22	3,5	735
Moquegua	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,12	1,07	1,17	2,4	667
Pasco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,14	1,08	1,19	2,4	505
Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,16	1,09	1,23	3,3	640
Puno San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,02	0,96 1.07	1,08	2,9	582 721
San Martín Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,11 1,09	1,07 1,07	1,16	2,2 1.3	721 626
Tacna Tumbes	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	1,09	1,07 1,03	1,12 1,17	1,3 3,1	501
i ui libuu	11.a.	n.a.	II.a.	11.a.	n.a.	1,10	1,00	1,17	٥, ١	501

Nota: Se considera porción a cuatro cucharadas soperas de ensalada en los últimos siete días. Hace referencia al total de personas que consumieron al menos una porción de ensalada de verdura en la última semana a la entrevista.

^{1/} Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

n.a.: No aplicable.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO Nº 1.19 PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE CONSUMEN AL MENOS CINCO PORCIONES DE FRUTA Y/O ENSALADA DE VERDURAS AL DÍA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, **2013-II SEMESTRE Y 2014**

(Porcentaje)

		2	013 - II Seme	stre				2014		
Característica seleccionada	Valor	Intervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos sin	Valor	ntervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos sin
	estimado -	Inferior	Superior	variación	ponderar	estimado –	Inferior	Superior	variación	ponderar
Total	8,3	6,7	9,9	9,8	6 370	10,8	10,2	11,5	3,1	27 633
Sexo										
Hombre	(6,5)	4,6	8,4	15,1	2 981	9,7	8,9	10,5	4,3	12 806
Mujer	9,8	7,5	12,2	12,1	3 389	11,8	10,9	12,7	3,9	14 827
Grupo de edad										
15 - 19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,9	10,0	13,7	8,0	2 765
20 - 29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,6	10,3	12,9	5,9	5 291
30 - 39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,3	9,0	11,6	6,3	5 757
40 - 49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,2	8,9	11,5	6,6	4 665
50 - 59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,4	9,7	13,1	7,7	3 639
60 y más	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,0	8,5	11,5	7,6	5 516
Área de residencia										
Urbana	10,5	8,4	12,6	10,2	3 782	12,9	12,1	13,8	3,4	16 970
Rural	(1,8)	1,0	2,5	20,8	2 588	4,5	3,9	5,2	7,4	10 663
	(1,0)	.,0	2,0	20,0	2 000	.,0	0,0	0,2	.,.	
Dominio de residencia	44.0	0.5	40.0	40.0	0.050	440	40.0	45.4	2.0	40.075
Costa	11,2	8,5	13,9	12,2	2 252	14,0	12,9	15,1	3,9	10 675
Lima Metropolitana	(11,8)	7,6	16,1	18,3	520	14,2	12,6	15,8	5,9	3 262
Costa (sin LM)	10,3	7,8	12,8	12,4	1 732	13,7	12,4	15,1	5,0	7 413 11 398
Sierra Sierra urbana	3,9	2,9	4,8	12,7	2 751	5,3 8,1	4,7	5,9 9,2	5,7 6,7	4 351
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		7,1			
Selva	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a. 1 367	2,7 9,8	2,1	3,2	10,2	7 047 5 560
Selva urbana	5,8	4,3	7,3	13,5		9, 0 11,4	8,6	11,0 12,9	6,1 6,8	3 088
Selva urbana Selva rural	n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	7,7	9,9 5,9	9,6	12,0	2 472
	n.a.	II.a.	II.a.	II.a.	II.a.	7,1	5,5	3,0	12,0	2412
Nivel de educación										
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5,4	4,7	6,1	6,9	10 083
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,9	10,0	11,8	4,3	10 876
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,4	15,0	17,9	4,5	6 671
Quintil de bienestar										
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,6	2,9	4,3	10,0	8 151
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,8	5,9	7,7	6,6	6 782
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,3	9,1	11,5	5,8	5 153
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,8	11,3	14,3	5,8	4 103
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,5	17,6	21,3	5,0	3 444
Departamento										
Amazonas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,3	7,1	11,6	12,1	962
Áncash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,4	6,1	10,7	13,9	1 246
Apurímac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(4,0)	2,4	5,6	20,3	1 029
Arequipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,1	8,5	13,7	11,9	1 057
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,2	4,4	8,0	14,6	1 186
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(3,7)	2,2	5,2	20,9	946
Prov. Const. del Callao	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,6	10,9	16,3	10,2	884
Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(5,8)	3,9	7,8	17,1	1 000
Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(6,3)	3,3	9,2	24,0	883
Huánuco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(7,2)	4,5	9,9	19,1	982
lca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,1	10,7	15,5	9,3	1 088
Junín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(6,6)	4,5	8,7	16,3	1 032
La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,5	10,9	18,2	12,9	1 005
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15,6	12,3	19,0	11,0	918
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,7	12,1	15,3	6,0	3 327
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,3	12,5	16,1	6,4	2 393
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,1	7,1	11,1	11,3	934
Loreto	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(9,0)	6,2	11,7	15,6	859
Madre de Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(9,6)	6,8	12,4	15,1	959
Moquegua	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,2	9,6	14,8	10,9	987
Pasco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(3,4)	2,1	4,7	19,4	1 070
Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,7	9,9	15,6	11,4	1 087
Puno	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(2,9)	1,7	4,0	19,8	1 347
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,1	9,9	14,3	9,3	976
Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(9,5)	6,6	12,4	15,7	903
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,6	8,1	13,1	12,0	921
Ucayali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,1	8,9	13,3	10,2	979

⁽⁾ Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales. 1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

n.a.: No aplicable.

CUADRO Nº 1.20 PERÚ: ÍNDICE DE MASA CORPORAL PROMEDIO EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, **2013-II SEMESTRE Y 2014**

		2	013 - II Seme	stre				2014		
Característica seleccionada	Valor estimado –	Intervalo de al 9	5%	Coeficiente de	Total de casos sin	Valor estimado	ntervalo de al 9	5%	Coeficiente de	Total de casos sin
		Inferior	Superior	variación	ponderar		Inferior	Superior	variación	ponderar
Total	26,4	26,2	26,5	0,4	6 179	26,5	26,3	26,6	0,2	17 453
Sexo										
Hombre	25,9	25,7	26,2	0,6	2 930	25,9	25,8	26,0	0,3	12 664
Mujer	26,7	26,4	27,0	0,6	3 249	28,0	27,8	28,3	0,4	4 789
Grupo de edad										
15 - 19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,4	22,1	22,7	0,6	1 385
20 - 29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,1	24,9	25,3	0,5	2 298
30 - 39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,8	26,6	27,1	0,4	2 601
40 - 49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,5	27,2	27,9	0,6	2 153
50 - 59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	28,0	27,8	28,3	0,4	3 592
60 y más	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,9	26,7	27,1	0,4	5 424
Área de residencia										
Urbana	26,9	26,7	27,2	0,5	3 657	27,2	27,0	27,3	0,3	10 321
Rural	24,7	24,5	25,0	0,5	2 522	24,4	24,3	24,6	0,3	7 132
	2.,,,	21,0	20,0	0,0	LULL	21,1	21,0	21,0	0,0	7 102
Dominio de residencia	27.0				0.404		27.0	27.0		0.050
Costa	27,2	26,9	27,5	0,6	2 181	27,5	27,3	27,6	0,3	6 658
Lima Metropolitana	27,1	26,6	27,5	0,9	499	27,7	27,5	28,0	0,5	2 040
Costa (sin LM)	27,5	27,2	27,8	0,6	1 682	27,1	26,9	27,4	0,4	4 618
Sierra	25,1	24,8	25,3	0,5	2 674	25,0	24,9	25,2	0,3	7 387
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,1	25,8	26,3	0,5	2 574
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,1	23,9	24,3	0,4	4 813
Selva	25,5	25,2	25,8	0,6	1 324	25,3	25,1	25,5	0,4	3 408
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,3	26,0	26,6	0,6	1 840
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,1	23,8	24,4	0,6	1 568
Nivel de educación										
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,2	26.0	26,4	0,4	7 307
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,2	26,0	26,4	0,4	6 343
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,3	27,0	27,5	0,4	3 800
Ouintil de hienester										
Quintil de bienestar						02.0	00.7	04.0	0.0	5.544
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23,8	23,7	24,0	0,3	5 544
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,8	25,6	26,0	0,4	4 197
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,9	26,7	27,2	0,4	3 033
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,7	27,4	28,0	0,6	2 493
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,9	27,6	28,1	0,5	2 186
Departamento										
Amazonas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,9	24,4	25,3	1,0	596
Áncash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,1	25,5	26,6	1,1	819
Apurímac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,2	23,9	24,6	0,7	714
Arequipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,9	26,4	27,4	1,0	658
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,6	24,3	25,0	0,8	793
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,7	24,3	25,1	8,0	569
Prov. Const. del Callao	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,5	27,0	28,1	1,0	524
Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,2	24,7	25,7	0,9	659
Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,2	23,6	24,8	1,2	579
Huánuco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,3	23,9	24,6	0,7	617
Ica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,4	27,0	27,8	0,7	685
Junín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,3	24,9	25,8	0,9	646
La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,8	26,2	27,4	1,2	599
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,7	26,1	27,3	1,1	573
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,7	27,4	27,9	0,5	2 127
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,7	27,5	28,0	0,5	1 527
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,2	26,7	27,8	1,0	600
Loreto	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,1	24,6	25,6	1,0	520
Madre de Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,1	26,6	27,7	1,0	598
Moquegua	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	28,0	27,4	28,5	1,1	670
Pasco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,8	24,2	25,4	1,2	636
Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,4	25,9	26,9	0,9	687
Puno	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,1	24,7	25,5	0,8	856
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,1	24,7	25,6	0,9	601
Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,5	26,8	28,1	1,1	556
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,5	26,1	26,8	0,6	575
	1	n.a.	n.a.		n.a.	26,4	25,9	26,8	0,9	596

Nota: Excluye a las mujeres gestantes.

^{1/} Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.
2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

n.a.: No aplicable.

CUADRO Nº 1.21

PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON SOBREPESO, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

(Porcentaje)

		2	013 - II Seme	stre				2014		
Característica seleccionada	Valor estimado	Intervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos sin	Valor estimado —	Intervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos sir
		Inferior	Superior	variación	ponderar		Inferior	Superior	variación	pondera
Total	33,8	31,8	35,9	3,1	6 175	34,7	33,6	35,8	1,6	17 453
Sexo										
Hombre	32,8	30,1	35,5	4,2	2 930	35,8	34,5	37,0	1,8	12 664
Mujer	34,8	31,7	37,8	4,5	3 245	31,7	29,6	33,8	3,3	4 789
Grupo de edad										
15 - 19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,9	14,3	19,6	8.0	1 385
20 - 29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	34,6	31,8	37,5	4,1	2 298
30 - 39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	45,8	43,0	48,5	3,1	2 601
40 - 49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	48,1	45,0	51,3	3,4	2 153
50 - 59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	41,2	38,8	43,5	2,9	3 592
60 y más	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,4	22,4	26,5	4,2	5 424
Área de residencia										
Urbana	35,9	33,3	38,5	3,7	3 656	38,4	37,0	39,7	1,7	10 321
Rural	27,8	25,4	30,1	4,3	2 519	24,1	22,5	25,7	3,3	7 132
Daminia da maidanaia		,	,			•	,	,	ŕ	
Dominio de residencia Costa	36,1	32,8	39,4	4,6	2 181	38,3	36,7	39,9	2,1	6 658
Lima Metropolitana	35,7	32, 6 30,5	3 9,4 41,0	4,6 7,5	499	30,3 40,2	36,7 37,8	42,6	3,0	2 040
Costa (sin LM)	36,7	33,7	39,6	4,1	1 682	35,9	34,0	37,9	2,8	4 618
Sierra	29,8	27,5	32,1	3,9	2 671	29,2	27,7	30,7	2,6	7 387
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	38,0	35,7	40,4	3,1	2 574
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,6	19,7	23,5	4,4	4 813
Selva	33,4	29,8	37,1	5,6	1 323	31,1	28,9	33,3	3,6	3 408
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	37,3	34,4	40,2	4,0	1 840
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23,8	20,8	26,7	6,3	1 568
Nivel de educación										
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	28,2	26,4	29,9	3,1	7 307
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	35,1	33,4	36,8	2,5	6 343
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	42,8	40,5	45,0	2,7	3 800
·	11.0.	11.0.	ii.u.	n.u.	11.0.	12,0	10,0	10,0	2,,	0 000
Quintil de bienestar							40 =			
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,3	18,7	22,0	4,2	5 544
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	34,8	32,7	37,0	3,2	4 197
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	38,5	36,1	41,0 41,5	3,2	3 033
Cuarto quintil Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	38,9 40,2	36,2 37,4	41,5	3,5 3,5	2 493 2 186
	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	40,2	31,4	42,3	3,3	2 100
Departamento										
Amazonas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	29,3	25,0	33,7	7,5	596
Áncash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30,1	26,8	33,4	5,6	819
Apurímac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,0	19,4	28,5	9,7	714
Arequipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	40,5	36,2	44,8	5,4	658
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,6	22,3	30,8	8,2	793
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	29,2	24,6	33,7	7,9	569 524
Prov. Const. del Callao Cusco	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	36,9 28,9	31,9 24,8	41,9 33,0	6,9 7,2	659
Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,3	16,9	25,6	10,4	579
Huánuco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,9	20,5	29,2	8,9	617
Ica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	35,0	31,7	38,3	4,8	685
Junín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	32,2	27,3	37,0	7,7	646
La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	33,2	28,4	38,0	7,4	599
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	35,3	28,9	41,7	9,2	573
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	40,1	37,7	42,4	3,0	2 12
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	40,6	38,0	43,2	3,3	1 52
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	36,2	32,1	40,3	5,8	600
Loreto	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30,4	26,2	34,6	7,1	520
Madre de Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	42,5	37,3	47,7	6,3	598
Moquegua	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	39,5	35,0	44,0	5,8	670
Pasco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30,1	24,8	35,4	9,0	630
Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	34,6	30,4	38,9	6,3	68
Puno	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,7	23,1	32,4	8,5	850
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	33,6	28,1	39,0	8,2	60
Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	36,1	31,2	41,0	6,9	550
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	35,6	31,0	40,2	6,6	575
Ucayali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	34,3	29,2	39,3	7,5	596

Nota: Se ha considerado el cálculo de sobrepeso en: adolescentes (15 a 17 años) mayor a una desviación estándar del Índice de Masa Corporal para la edad, adultos (18 a 59 años)

>=25kg/m2, adulto mayor (60 y más años) >=28kg/m2. Excluye a mujeres gestantes.

^{1/} Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

n.a.: No aplicable.

CUADRO № 1.22
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON OBESIDAD, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014
(Porcentaje)

		2	013 - II Seme	stre				2014		
Característica seleccionada	Valor estimado	Intervalo de al 9	5%	Coeficiente de	Total de casos sin	Valor estimado	Intervalo de al 9	5%	Coeficiente de	Total de casos sin
		Inferior	Superior	variación	ponderar		Inferior	Superior	variación	ponderar
Total	18,3	16,6	20,1	4,9	6 175	17,5	16,6	18,4	2,6	17 453
Sexo										
Hombre	15,5	13,1	18,0	8,1	2 930	14,4	13,4	15,3	3,4	12 664
Mujer	20,9	18,1	23,6	6,6	3 245	26,2	24,3	28,2	3,8	4 789
Grupo de edad										
15 - 19 20 - 29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(5,5)	3,7	7,2	16,2	1 385
20 - 29 30 - 39	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	10,0 19,2	8,3 16,8	11,8 21,5	8,8 6,3	2 298 2 601
40 - 49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,2	19,5	24,9	6,2	2 153
50 - 59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	29,9	27,7	32,2	3,8	3 592
60 y más	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,4	11,8	15,0	6,0	5 424
Área de residencia										
Urbana	21,5	19,2	23,8	5,4	3 656	21,3	20,1	22,4	2,7	10 321
Rural	8,9	7,2	10,6	9,7	2 519	6,6	5,8	7,5	6,4	7 132
Dominio de residencia										
Costa	23,8	20,9	26,7	6,1	2 181	23,1	21,8	24,5	3,0	6 658
Lima Metropolitana	22,3	17,8	26,9	10,3	499	23,9	21,9	25,9	4,3	2 040
Costa (sin LM)	25,8	23,1	28,5	5,3	1 682	22,2	20,5	23,9	4,0	4 618
Sierra	10,2	8,6	11,8	7,9	2 671	9,0	8,0	10,0	5,7	7 387
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,8	11,9	15,6	6,8	2 574
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,8	3,9	5,7	9,6	4 813
Selva	13,4	11,1	15,6	8,6	1 323	11,9	10,3	13,6	7,0	3 408
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,2	14,6	19,8	7,7 14,9	1 840
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5,7	4,0	7,3	14,9	1 568
Nivel de educación							40.0	40.0		
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,5	13,0	16,0	5,3	7 307
Secundaria Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,3	15,9 19,7	18,7 23,8	4,1 4,7	6 343 3 800
·	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,8	19,7	23,0	4,7	3 000
Quintil de bienestar										
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,5	3,7	5,2	8,7	5 544
Segundo quintil Quintil intermedio	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	12,1 19,9	10,8 17,9	13,5 21,8	5,7 5,0	4 197 3 033
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,1	21,7	26,5	5,1	2 493
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,4	22,9	28,0	5,1	2 186
Departamento						,	,	,	•	
Amazonas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(9,7)	6,2	13,1	18,2	596
Áncash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,9	12,8	21,0	12,4	819
Apurímac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,1	4,4	7,9	14,7	714
Arequipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,5	14,6	22,4	10,8	658
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(8,1)	5,4	10,9	17,3	793
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(5,9)	3,7	8,1	18,8	569
Prov. Const. del Callao	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,2	19,7	28,6	9,4	524
Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(10,0)	7,0	12,9	15,2	659
Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(6,9)	3,2	10,7	27,3	579
Huánuco Ica	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	(5,4) 24,6	3,3 21,3	7,6 28,0	19,8 6,9	617 685
Junín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(9,2)	5,8	12,6	18,7	646
La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,7	14,2	23,2	12,2	599
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,5	14,9	24,1	12,1	573
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23,6	21,6	25,6	4,3	2 127
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23,9	21,7	26,0	4,6	1 527
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,7	17,4	26,0	10,0	600
Loreto	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(10,8)	7,1	14,4	17,2	520
Madre de Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,3	16,1	26,5	12,4	598
Moquegua Pasco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,1	19,9	28,3	8,8 13,9	670 636
Pasco Piura	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	7,6 18,1	5,5 14,9	9,6 21,4	9,0	687
Puno	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,4	8,7	14,1	12,0	856
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(10,5)	6,9	14,1	17,5	601
Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,6	20,6	30,6	9,9	556
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,7	16,1	23,2	9,2	575
Ucayali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,2	15,4	22,9	10,0	596

Nota: Se ha considerado el cálculo de obesidad en: adolescentes (15 a 17 años), mayor a dos desviaciones estándar del Índice de Masa Corporal para la edad, adultos (18 a 59 años)

>=30kg/m2, adulto mayor (60 y más años) >=32kg/m2. Excluye a mujeres gestantes.

⁽⁾ Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

^{1/} Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

n.a.: No aplicable.

CUADRO Nº 1.23 PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON EXCESO DE PESO, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, **2013-II SEMESTRE Y 2014**

(Porcentaje)

		2	013 - II Seme	stre				2014		
Característica seleccionada	Valor estimado	ntervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos sin	Valor estimado	Intervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos sin
		Inferior	Superior	variación	ponderar		Inferior	Superior	variación	ponderar
Total	52,2	50,2	54,1	1,9	6 179	52,2	51,0	53,4	1,2	17 453
Sexo										
Hombre	48,3	45,4	51,3	3,1	2 930	50,1	48,7	51,5	1,4	12 664
Mujer	55,5	52,3	58,8	3,0	3 249	57,9	55,7	60,2	2,0	4 789
Grupo de edad										
15 - 19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,4	19,5	25,3	6,7	1 385
20 - 29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	44,7	41,7	47,7	3,4	2 298
30 - 39 40 - 49	n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	64,9 70,3	62,3 67,6	67,5 73,0	2,1 2,0	2 601 2 153
50 - 59	n.a. n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	70,3 71,1	68,9	73,0	1,6	3 592
60 y más	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	37,9	35,7	40,1	3,0	5 424
Área de residencia										
Urbana	57,4	54,9	59,9	2,2	3 657	59,6	58,2	61,0	1,2	10 321
Rural	36,6	33,6	39,5	4,1	2 522	30,8	28,9	32,6	3,0	7 132
Dominio de residencia										
Costa	59,9	56,8	63,0	2,6	2 181	61,4	59,7	63,1	1,4	6 658
Lima Metropolitana	58,1	53,4	62,7	4,1	499	64,1	61,7	66,5	1,9	2 040
Costa (sin LM)	62,5	59,1	65,8	2,8	1 682	58,1	55,9	60,4	2,0	4 618
Sierra	40,0	37,4	42,5	3,3	2 674	38,2	36,5	39,9	2,3	7 387
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	51,8	49,3	54,3	2,5	2 574
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,4	24,3	28,6	4,1	4 813
Selva	46,7	43,0	50,4	4,1	1 324	43,1	40,6	45,6	2,9	3 408
Selva urbana Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	54,5 29,5	51,6 26,1	57,5 32,9	2,8 5,9	1 840 1 568
	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	29,5	20, 1	32,9	5,9	1 300
Nivel de educación										
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	42,7	40,7	44,6	2,3	7 307
Secundaria Superior	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	52,4 64,5	50,6 62,3	54,3 66,8	1,8 1,8	6 343 3 800
·	11.4.	II.a.	II.a.	II.a.	11.a.	04,0	02,0	00,0	1,0	3 000
Quintil de bienestar						04.0	00.0	00.7	2.0	5.544
Quintil inferior Segundo quintil	n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	24,8 46,9	22,9 44,6	26,7 49,3	3,9 2,5	5 544 4 197
Quintil intermedio	n.a. n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	58,4	55,9	49,3 61,0	2,3	3 033
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	63,0	60,3	65,7	2,2	2 493
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	65,6	62,9	68,3	2,1	2 186
Departamento										
Amazonas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	39,0	33,9	44,1	6,6	596
Áncash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	47,0	41,9	52,1	5,5	819
Apurímac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30,1	25,5	34,6	7,7	714
Arequipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	59,0	54,1	63,9	4,2	658
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	34,7	29,9	39,5	7,0	793
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	35,1	30,0	40,2	7,4	569
Prov. Const. del Callao	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	61,1	55,8	66,4	4,5	524
Cusco Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	38,9	34,5	43,2	5,7	659
Huánuco	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	28,2 30,3	23,8 26,1	32,6 34,5	7,9 7,1	579 617
Ica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	59,6	55,7	63,5	3,3	685
Junín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	41,4	36,3	46,5	6,3	646
La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	51,9	46,0	57,8	5,8	599
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	54,8	48,7	60,9	5,7	573
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	63,7	61,3	66,1	1,9	2 127
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	64,4	61,8	67,0	2,1	1 527
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	57,9	53,1	62,7	4,2	600
Loreto	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	41,2	35,9	46,4	6,5	520
Madre de Dios Moquegua	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	63,8 63,6	58,5 58,5	69,1 68,7	4,3 4,1	598 670
Pasco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	37,7	31,3	44,0	8,6	636
Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	52,8	47,5	58,1	5,1	687
Puno	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	39,1	34,4	43,9	6,2	856
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	44,1	38,7	49,4	6,2	601
Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	61,7	56,4	67,0	4,4	556
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	55,2	51,0	59,5	3,9	575
Ucayali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	53,4	48,4	58,4	4,8	596

Nota: Se ha considerado el cálculo de exceso de peso en: adolescentes (15 a 17 años) mayor a una desviación estándar del Índice de Masa Corporal para la edad, adultos (18 a 59 años) >=25kg/m2, adulto mayor (60 y más años) >=28kg/m2. Excluye a mujeres gestantes.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

n.a.: No aplicable.

CUADRO Nº 1.24

PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON VALORACIÓN DE AGUDEZA VISUAL REALIZADO POR UN PERSONAL DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

(Porcentaje)

			2013 - II Seme	estre				2014		
Característica seleccionada	Valor	Intervalo de al 95		Coeficiente	Total de	Valor	ntervalo de al 9		Coeficiente	Total de
	estimado	Inferior	Superior	de variación	casos sin ponderar	estimado	Inferior	Superior	de variación	casos sin ponderar
Total	10,5	9,0	12,0	7,3	4 384	15,1	14,2	16,0	3,0	19 420
Sexo										
Hombre	10,1	8,1	12,2	10,3	2 213	15,0	13,9	16,2	3,8	9 855
Mujer	10,9	8,9	13,0	9,5	2 171	15,2	14,1	16,4	3,8	9 565
Grupo de edad										
3 - 5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5,6	4,7	6,4	7,9	6 283
6 - 11	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,7	18,5	20,9	3,0	13 137
						, .	, .	,-	-,-	
Area de residencia Urbana	12,8	10,7	15,0	8,5	2 386	17,0	16,0	18,1	3,3	11 228
Rural	6,2	,	7,7		1 998		9,5	12,6	3,3 7,3	8 192
	0,2	4,7	1,1	12,4	1 990	11,0	9,5	12,0	7,3	0 192
Dominio de residencia										
Costa	13,1	10,3	15,9	10,8	1 390	18,0	16,7	19,4	3,9	6 909
Lima Metropolitana	(13,5)	8,8	18,1	17,5	289	20,5	18,4	22,7	5,3	2 020
Costa (sin LM)	12,8	9,5	16,2	13,3	1 101	15,3	13,7	17,0	5,4	4 889
Sierra	9,6	7,7	11,6	10,2	1 764	13,8	12,2	15,4	5,9	7 619
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15,4	13,5	17,3	6,3	2 733
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,5	10,1	14,9	9,8	4 886
Selva	(5,0)	3,4	6,6	16,1	1 230	8,8	7,4	10,2	8,4	4 892
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,2	8,3	12,2	9,8	2 399
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7,5	5,4	9,6	14,2	2 493
Quintil de bienestar										
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,6	7,9	11,2	8,9	6 632
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,0	11,5	14,6	5,9	4 992
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15,3	13,7	17,0	5,6	3 589
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,4	14,3	18,4	6,3	2 413
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,9	24,2	29,7	5,2	1 794
Departamento										
Amazonas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(12,2)	8,0	16,3	17,4	788
Áncash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,3	14,0	20,6	9,8	896
Apurímac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,6	13,6	23,6	13,6	713
Arequipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,8	14,5	23,1	11,6	613
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,0	8,5	15,6	15,0	769
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(8,3)	2,5	14,1	35,8	762
Prov. Const. del Callao	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,0	16,3	23,6	9,4	603
Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(15,5)	10,7	20,4	15,9	645
Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,1	10,1	18,1	14,5	670
Huánuco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,9	14,6	25,1	13,5	782
lca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,0	9,8	16,1	12,2	695
Junin La Liberted	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,0	9,8	16,2	12,7	663
La Libertad Lambayeque	n.a.	n.a. n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,1 (14,0)	8,5 9,8	15,6 18,2	14,9 15,2	741 679
Lima	n.a. n.a.	n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	20,6	18,4	22,8	5,4	1 986
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,6	18,2	22,9	5,9	1 425
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,0	15,4	26,6	13,6	561
Loreto	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(2,9)	1,5	4,3	24,2	1 026
Madre de Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(7,1)	4,5	9,7	18,6	707
Moquegua	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,8	20,2	31,3	11,0	482
Pasco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15,0	11,0	19,0	13,7	761
Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,5	9,3	15,7	13,2	883
Puno	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(9,3)	6,5	12,1	15,3	751
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(12,6)	8,1	17,1	18,2	781
Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,8	14,8	24,7	12,7	490
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(10,9)	7,4	14,4	16,5	637
Ucayali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(10,7)	7,3	14,1	16,1	897

⁽⁾ Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

n.a.: No aplicable.

CUADRO Nº 1.25

PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

(Porcentaje)

		:	2013 - II Seme	estre				2014		
Característica seleccionada	Valor	Intervalo de al 95		Coeficiente de	Total de casos sin	Valor	Intervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos sin
	estimado	Inferior	Superior	variación	ponderar	estimado	Inferior	Superior	variación	ponderar
Total	6,0	4,9	7,0	9,1	4 384	6,3	5,7	6,8	4,5	19 420
Sexo										
Hombre	5,6	4,0	7,1	14,0	2 213	6,1	5,4	6,8	6,0	9 855
Mujer	6,4	4,8	7,9	12,5	2 171	6,5	5,7	7,2	5,9	9 565
Grupo de edad										
3 - 5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(1,0)	0,6	1,4	20,3	6 283
6 - 11	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,8	8,0	9,5	4,4	13 137
Área de residencia										
Urbana	8,3	6,8	9,9	9,5	2 386	8,6	7,8	9,4	4,6	11 228
Rural	(1,5)	0,7	2,3	26,7	1 998	1,3	1,0	1,6	10,7	8 192
Dominio de residencia										
Costa	9,1	7,1	11,1	11,1	1 390	9,1	8,2	10,1	5,4	6 909
Lima Metropolitana	12,9	9,1	16,6	14,9	289	11,7	10,0	13,3	7,3	2 020
Costa (sin LM)	(5,7)	3,9	7,6	16,4	1 101	6,4	5,6	7,2	6,6	4 889
Sierra	(3,7)	2,6	4,9	15,9	1 764	4,0	3,4	4,6	7,9	7 619
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7,5	6,1	8,8	9,4	2 733
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,3	1,0	1,7	14,2	4 886
Selva	(1,6)	0,8	2,4	24,8	1 230	2,0	1,4	2,5	13,5	4 892
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(3,3)	2,3	4,3	15,7	2 399
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(0,8)	0,4	1,1	23,3	2 493
Quintil de bienestar										
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(0,7)	0,5	0,9	15,0	6 632
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,4	2,7	4,1	10,0	4 992
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,9	5,8	8,0	7,9	3 589
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,3	7,8	10,9	8,4	2 413
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,4	13,9	18,9	7,7	1 794

Nota: Errores refractivos comprende miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia.

⁽⁾ Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

n.a.: No aplicable.

CUADRO Nº 1.26

PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y QUE RECIBIERON TRATAMIENTO CORRECTIVO CON LENTES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

(Porcentaje)

		:	2013 - II Seme	estre				2014		
Característica seleccionada	Valor	Intervalo de al 95		Coeficiente de	Total de casos sin	Valor	Intervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos sin
	estimado	Inferior	Superior	variación	ponderar	estimado	Inferior	Superior	variación	ponderar
Total	60,7	51,1	70,2	7,9	187	62,0	57,7	66,4	3,6	967
Sexo										
Hombre	58,9	45,1	72,8	11,9	87	58,9	52,9	64,8	5,1	467
Mujer	62,3	49,7	74,8	10,1	100	65,1	59,4	70,7	4,4	500
Grupo de edad										
3 - 5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	66,2	48,5	83,9	13,6	45
6 - 11	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	61,8	57,4	66,2	3,6	922
Área de residencia										
Urbana	63,8	53,9	73,8	7,8	159	64,6	60,1	69,2	3,6	848
Rural	(27,8)	3,0	52,6	45,1	28	(25,1)	15,5	34,8	19,6	119
Dominio de residencia										
Costa	66,3	54,5	78,1	9,0	108	65,7	60,3	71,0	4,1	589
Lima Metropolitana	65,9	49,9	81,9	12,3	39	70,4	63,5	77,3	5,0	224
Costa (sin LM)	67,0	51,7	82,2	11,5	69	56,2	49,0	63,4	6,5	365
Sierra	(45,2)	29,7	60,7	17,4	59	52,9	45,2	60,7	7,5	276
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	58,8	49,7	67,9	7,9	201
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(27,8)	15,8	39,8	22,0	75
Selva	(42,6)	18,3	67,0	28,9	20	46,3	34,3	58,2	13,2	102
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	55,7	42,8	68,7	11,8	80
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(10,0)	0,0	20,3	51,7	22
Quintil de bienestar										
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(17,8)	3,1	32,5	42,0	59
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(30,6)	19,8	41,3	17,9	161
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	51,6	43,5	59,7	8,0	246
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	63,0	53,8	72,1	7,4	216
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	81,9	76,0	87,8	3,7	285

Nota: Errores refractivos comprende miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia.

⁽⁾ Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

n.a.: No aplicable.

CUADRO Nº 1.27

PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON DIAGNÓSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y QUE RECIBEN TRATAMIENTO CON LENTES DE MANERA PERMANENTE, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

(Porcentaje)

		:	2013 - II Seme	estre				2014		
Característica seleccionada	Valor	Intervalo de al 95		Coeficiente de	Total de casos sin	Valor	Intervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos sin
	estimado	Inferior	Superior	variación	ponderar	estimado	Inferior	Superior	variación	ponderar
Total	60,6	47,5	73,6	10,8	104	66,7	61,8	71,5	3,7	536
Sexo										
Hombre	(62,0)	41,9	82,2	16,2	47	64,4	57,0	71,9	5,9	247
Mujer	59,3	43,4	75,3	13,5	57	68,6	61,7	75,5	5,1	289
Grupo de edad										
3 - 5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	82,5	65,8	99,2	10,3	25
6 - 11	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	65,7	60,7	70,7	3,9	511
Área de residencia										
Urbana	62,2	48,6	75,8	10,9	97	67,9	62,9	72,9	3,7	507
Rural	(22,0)	0,0	46,8	56,4	7	(21,9)	9,8	34,1	28,2	29
Dominio de residencia										
Costa	66,7	51,0	82,4	11,8	71	70,1	64,4	75,7	4,1	358
Lima Metropolitana	71,9	51,1	92,6	14,5	24	73,2	66,0	80,5	5,0	155
Costa (sin LM)	(56,5)	33,8	79,3	20,1	47	62,3	54,9	69,7	6,0	203
Sierra	(25,0)	7,3	42,7	35,5	25	54,1	44,0	64,3	9,5	136
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	57,6	46,6	68,6	9,7	117
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(22,7)	7,5	38,0	34,1	19
Selva	81,6	76,8	86,4	2,9	8	(54,5)	37,3	71,7	16,0	42
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(57,1)	39,2	75,0	16,0	39
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,0	0,0	0,0	0,0	3
Quintil de bienestar										
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(61,3)	20,4	100,0	34,0	9
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(47,7)	31,0	64,4	17,8	46
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	53,9	41,9	65,8	11,3	122
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	75,7	65,7	85,7	6,7	130
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	69,4	62,0	76,8	5,4	229

Nota: Errores refractivos comprende miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia.

⁽⁾ Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

n.a.: No aplicable.

CUADRO Nº 1.28 PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 11 AÑOS DE EDAD CON PRÁCTICAS ADECUADAS DE SALUD OCULAR, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

(Porcentaje)

		:	2013 - II Seme	estre				2014		
Característica seleccionada	Valor	Intervalo de al 95		Coeficiente	Total de	Valor	Intervalo de al 9		Coeficiente	Total de
	estimado	Inferior	Superior	de variación	casos sin ponderar	estimado	Inferior	Superior	de variación	casos sin ponderar
Total	10,8	9,4	12,1	6,4	4 384	12,6	11,7	13,5	3,5	19 420
Sexo										
Hombre	11,6	9,9	13,4	7,6	2 213	12,8	11,7	13,9	4,3	9 855
Mujer	9,8	8,1	11,6	9,2	2 171	12,4	11,4	13,5	4,4	9 565
Grupo de edad										
3 - 5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,8	17,4	20,2	3,9	6 283
6 - 11	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,7	8,8	10,5	4,6	13 137
Área de residencia										
Urbana	8,1	6,5	9,7	9,8	2 386	11,0	10,1	12,0	4,5	11 228
Rural	15,8	13,2	18,3	8,1	1 998	16,0	14,2	17,8	5,7	8 192
Dominio de residencia										
Costa	5,7	4,1	7,3	14,4	1 390	9,8	8,7	10,9	5,9	6 909
Lima Metropolitana	(2,3)	0,4	4,1	41,4	289	9,2	7,4	10,9	9,8	2 020
Costa (sin LM)	(8,7)	6,1	11,3	15,2	1 101	10,4	9,1	11,8	6,7	4 889
Sierra	20,5	17,7	23,3	7,0	1 764	19,9	18,1	21,6	4,5	7 619
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,7	15,5	20,0	6,4	2 733
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,5	18,9	24,1	6,1	4 886
Selva	5,9	4,3	7,5	13,9	1 230	6,9	5,8	8,0	8,1	4 892
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,2	6,6	9,9	10,3	2 399
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5,7	4,2	7,1	13,0	2 493
Quintil de bienestar										
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15,4	13,4	17,4	6,6	6 632
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,3	11,6	14,9	6,2	4 992
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,4	8,9	11,8	7,2	3 589
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,4	8,8	12,1	7,9	2 413
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,6	10,4	14,7	8,8	1 794
Departamento										
Amazonas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(5,5)	3,0	8,1	23,6	788
Áncash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(9,1)	5,8	12,3	18,2	896
Apurímac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30,6	24,5	36,8	10,2	713
Arequipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,2	13,7	20,7	10,4	613
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,9	17,6	26,1	10,0	769
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,1	10,2	18,0	14,1	762
Prov. Const. del Callao	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(9,4)	6,6	12,3	15,6	603 645
Cusco	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	15,4 (11,7)	10,9 7,8	20,0 15,7	14,9 17,0	670
Huancavelica Huánuco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(13,8)	9,6	17,9	15,4	782
Ica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(9,0)	6,3	11,7	15,4	695
Junín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(14,5)	10,0	18,9	15,6	663
La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(17,3)	11,3	23,3	17,6	741
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7,7	5,4	9,9	14,9	679
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,2	7,5	11,0	9,7	1 986
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,1	7,2	11,1	10,9	1 425
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(10,0)	6,3	13,7	18,9	561
Loreto	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7,3	5,2	9,5	14,8	1 026
Madre de Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,9	7,8	14,0	14,5	707
Moquegua	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23,0	18,1	27,8	10,8	482
Pasco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,3	7,6	13,1	13,6	761
Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,9	10,5	19,3	15,0	883
Puno	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	29,8	25,5	34,2	7,4	751
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(7,3)	4,7	9,8	18,0	781
Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,2	13,7	22,8	12,8	490
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(12,8)	9,0	16,6	15,1	637
Ucayali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(5,1)	3,5	6,7	15,6	897

Nota: Prácticas adecuadas de salud ocular se refiere a los hábitos y conductas que pueden prevenir el desarrollo de afecciones oculares o retrasar su aparición (ver televisión/ computadora/ laptop/ tablet, a una distancia no menor de 30 centímetros, usar gorro con visera, sombrero o lentes de sol durante todo el año mientras se permanece en un lugar sin techo, buena iluminación en el ambiente donde se lee, no leer un texto mientras se está caminando, en el carro o en el mototaxi).

⁽⁾ Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

^{1/} Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

n.a.: No aplicable

CUADRO Nº 1.29

PERÚ: PERSONAS DE 50 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON VALORACIÓN DE AGUDEZA VISUAL REALIZADA POR UN PERSONAL DE SALUD EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

(Porcentaje)

		2	013 - II Seme	stre				2014		
Característica seleccionada	Valor estimado =	Intervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos sin	Valor estimado	Intervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos sin
	estillado	Inferior	Superior	variación	ponderar	estillado	Inferior	Superior	variación	ponderar
Total	28,9	25,0	32,8	6,9	2 181	27,8	26,2	29,4	2,9	9 155
Sexo										
Hombre	26,1	21,6	30,7	8,9	1 049	27,7	25,4	30,1	4,3	4 294
Mujer	31,5	24,9	38,1	10,7	1 132	27,9	25,8	30,0	3,8	4 861
Grupo de edad										
50 - 59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,5	23,2	27,9	4,7	3 639
60 - 69	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	28,7	25,8	31,6	5,2	2 676
70 y más	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30,5	27,5	33,5	5,1	2 840
Área de residencia										
Urbana	34,8	29,8	39,9	7,4	1 183	33,7	31,7	35,8	3,1	5 020
Rural	12,0	9,3	14,7	11,4	998	12,3	10,9	13,7	5,8	4 135
Dominio de residencia										
Costa	36,4	30,3	42,4	8,5	760	35,3	32,9	37,7	3,5	3 360
Lima Metropolitana	42,5	33,2	51,7	11,1	163	40,7	37,0	44,3	4,6	1 015
Costa (sin LM) Sierra	28,2 18,3	22,5 14,9	33,9 21,7	10,3 9,4	597 1 076	28,6 17,6	25,9 15,9	31,4 19,3	4,9 4,9	2 345 4 345
Sierra urbana	n.a.	n.a.	21, <i>1</i> n.a.	9,4 n.a.	n.a.	26,3	22,8	29,9	4,9 6,9	1 274
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,8	10,2	13,4	6,9	3 071
Selva	(17,9)	12,4	23,4	15,7	345	16,8	13,9	19,7	8,8	1 450
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,2	16,9	25,5	10,4	787
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(11,4)	7,8	15,0	16,0	663
Nivel de educación										
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,8	18,0	21,6	4,7	5 804
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	33,6	30,4	36,8	4,8	1 987
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	42,8	38,8	46,7	4,7	1 361
Quintil de bienestar										
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,3	7,0	9,6	7,9	3 337
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,3	16,4	22,1	7,5	1 960
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,9	22,4	29,3	6,8	1 345
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	33,3	29,6	36,9	5,6	1 282
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	46,7	42,7	50,7	4,4	1 231
Departamento										
Amazonas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(18,8)	12,3	25,2	17,6	290
Áncash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,4	15,0	25,7	13,3	452
Apurímac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,5	14,9	26,1	13,9	429
Arequipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	35,2	28,6	41,8	9,6	336
Ayacucho Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,1 (9,9)	14,1 5,1	24,0 14,7	13,4 24,6	445 286
Prov. Const. del Callao	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	38,9	33,0	44,7	24,0 7,7	268
Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,8	15,1	26,4	13,8	388
Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(13,3)	7,7	18,8	21,3	362
Huánuco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(18,8)	12,6	25,1	16,9	314
lca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30,3	24,4	36,3	10,0	351
Junín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,1	11,6	20,6	14,2	368
La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	32,3	24,8	39,9	11,9	305
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23,8	17,5	30,0	13,4	312
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	39,1	35,5	42,8	4,8	1 080
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	40,9	36,8	44,9	5,0	751
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,2	20,2	30,3	10,2	329
Loreto Madre de Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a. n.a.	(12,9) (17,7)	6,1 11,4	19,8 24,0	27,0 18,1	219 239
Moquegua	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a.	30,3	24,1	24,0 36,5	10,1	393
Pasco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23,0	17,1	28,9	13,0	335
Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,3	16,5	26,1	11,5	370
Puno	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,4	9,7	17,0	13,9	569
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(19,9)	14,1	25,8	15,0	245
Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	38,2	30,6	45,9	10,2	267
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(18,3)	10,9	25,8	20,8	268
Ucayali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(18,0)	12,2	23,9	16,6	264

^() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

CUADRO Nº 1.30

PERÚ: PERSONAS DE 50 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE RECIBIERON EL DIAGNÓSTICO DE CATARATAS, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

		2	013 - II Seme	stre				2014		
Característica seleccionada	Valor	Intervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos sin	Valor	ntervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos sin
	estimado -	Inferior	Superior	variación	ponderar	estimado —	Inferior	Superior	variación	ponderar
Total	14,4	11,7	17,2	9,6	2 181	13,2	12,2	14,3	4,0	9 155
Sexo										
Hombre	(13,3)	9,3	17,3	15,4	1 049	12,4	10,9	14,0	6,4	4 294
Mujer	15,5	11,2	19,8	14,1	1 132	13,9	12,4	15,3	5,3	4 861
Grupo de edad										
50 - 59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7,2	6,0	8,4	8,6	3 639
60 - 69	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,8	9,9	13,7	8,2	2 676
70 y más	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,6	22,0	27,2	5,4	2 840
Área de residencia										
Urbana	15,4	11,8	18,9	11,8	1 183	14,7	13,3	16,1	4,7	5 020
Rural	11,7	9,4	14,1	10,2	998	9,4	8,3	10,4	5,7	4 135
Dominio de residencia										
Costa	(14,3)	9,9	18,6	15,6	760	14,3	12,7	15,9	5,6	3 360
Lima Metropolitana	(15,6)	8,5	22,8	23,4	163	15,0	12,6	17,3	8,1	1 015
Costa (sin LM)	12,4	9,3	15,5	12,7	597	13,5	11,6	15,5	7,4	2 345
Sierra	15,0	12,5	17,5	8,4	1 076	12,2	10,9	13,5	5,5	4 345
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,0	13,3	18,7	8,7	1 274
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,7	8,4	11,0	6,6	3 071
Selva	(13,6)	9,2	18,0	16,4	345	10,1	8,0	12,2	10,7	1 450
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,2	9,7	16,6	13,3	787
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(6,3)	4,3	8,3	16,2	663
Nivel de educación										
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,4	13,0	15,9	5,2	5 804
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,6	9,6	13,5	8,5	1 987
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,1	9,7	14,5	10,2	1 361
Quintil de bienestar										
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,1	6,9	9,2	7,1	3 337
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,4	9,5	13,2	8,3	1 960
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,7	10,3	15,2	9,8	1 345
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,1	14,4	19,9	8,1	1 282
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15,8	13,1	18,5	8,6	1 231

⁽⁾ Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

n.a.: No aplicable.

CUADRO № 1.31

PERÚ: PERSONAS DE 50 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON DIFICULTAD PARA VER DE LEJOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

		20	013 - II Seme	stre				2014		
Característica seleccionada	Valor	Intervalo de al 95		Coeficiente de	Total de casos sin	Valor	Intervalo de		Coeficiente de	Total de
	estimado -	Inferior	Superior	variación	ponderar	estimado-	Inferior	Superior	variación	ponderar
Total	23,6	20,2	27,0	7,3	2 181	20,1	18,9	21,3	3,1	9 155
Sexo										
Hombre	17,9	14,3	21,6	10,4	1 049	16,5	14,9	18,2	5,2	4 294
Mujer	28,8	23,6	34,0	9,2	1 132	23,0	21,2	24,8	4,0	4 861
Grupos de edad										
50 - 59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,8	13,0	16,5	6,0	3 639
60 - 69	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,8	15,4	20,2	6,9	2 676
70 y más	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	31,3	28,7	33,8	4,2	2 840
Área de residencia										
Urbana Urbana	23,2	18,8	27,7	9,7	1 183	19,2	17,7	20,8	4,1	5 020
Rural	24,6	21,3	27,7	9, <i>1</i> 6,8	998	22,4	20,6	20,6	4,1 4,1	4 135
	24,0	21,3	21,5	0,0	330	22,4	20,0	24,2	4,1	4 133
Dominio de residencia										
Costa	22,9	17,5	28,3	12,0	760	17,4	15,6	19,1	5,2	3 360
Lima Metropolitana	(20,9)	12,4	29,3	20,6	163	15,7	13,0	18,4	8,8	1 015
Costa (sin LM)	25,7	20,2	31,1	10,8	597	19,5	17,4	21,6	5,6	2 345
Sierra	24,7	21,5	28,0	6,7	1 076	23,3	21,4	25,1	4,0	4 345
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23,3	20,1	26,6	7,1	1 274
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23,2	21,1	25,3	4,7	3 071
Selva	23,9	18,0	29,9	12,6	345	25,7	22,6	28,8	6,2	1 450
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,5	21,2	29,9	8,7	787
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,9	21,5	30,4	8,8	663
Nivel de educación										
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,8	23,1	26,5	3,5	5 804
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,3	13,7	18,9	8,1	1 987
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,6	9,4	13,8	9,7	1 361
Quintil de bienestar										
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,5	22,4	26,6	4,4	3 337
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,2	19,4	25,1	6,6	1 960
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,2	19,0	25,5	7,4	1 345
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,0	18,5	25,4	8,0	1 282
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,9	9,8	14,0	9,1	1 231
Departements										
Departamento Amazonas				20	2.0	22,8	17,3	28,2	12,3	290
Áncash	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	19,7	15,3	24,1	11,4	452
Apurímac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,6	14,0	23,1	12,5	429
Areguipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,3	14,0	24,0	12,3	336
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	32,9	27,8	38,0	8,0	445
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,7	15,3	26,2	13,5	286
Prov. Const. del Callao	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,1	12,3	21,8	14,2	268
Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,5	15,0	26,1	13,8	388
Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,1	15,3	25,0	12,3	362
Huánuco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,8	16,9	28,6	13,1	314
Ica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,8	14,5	25,1	13,6	351
Junín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,9	22,0	33,8	10,8	368
La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,2	19,2	31,2	12,1	305
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(15,9)	10,5	21,2	17,2	312
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,1	13,4	18,8	8,5	1 080
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15,5	12,5	18,4	9,8	751
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,1	16,2	26,0	11,7	329
Loreto	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,0	18,4	33,6	14,9	219
Madre de Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,5	18,6	30,5	12,3	239
Moquegua	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,9	19,8	30,1	10,5	393
Pasco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23,9	18,6	29,3	11,5	335
Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15,3	11,1	19,4	13,9	370
Puno	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	28,1	23,2	33,0	8,9	569
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	29,9	23,2	36,5	11,4	245
Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,2	20,2	32,2	11,6	267
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,5	19,7	35,4	14,6	268
Ucayali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,8	16,0	27,6	13,5	264
	1									

^() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

^{1/} Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

n.a.: No aplicable.

CUADRO Nº 1.32 PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS DE 1 A 11 AÑOS DE EDAD CON PRÁCTICAS ADECUADAS DE HIGIENE BUCAL, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

		20	013 - II Semes	tre		2014					
Característica seleccionada	lı Valor	ntervalo de c 95%		Coeficiente	Total de	Valor	Intervalo de al 9		Coeficiente	Total de	
	estimado	Inferior	Superior	de variación	casos sin ponderar	estimado	Inferior	Superior	de variación	casos sin ponderar	
Total	21,6	19,8	23,4	4,3	5 354	24,4	23,4	25,4	2,1	23 355	
Sexo											
Hombre	22,0	19,7	24,3	5,4	2 695	23,9	22,7	25,2	2,7	11 876	
Mujer	21,2	19,0	23,5	5,5	2 659	24,9	23,7	26,2	2,5	11 479	
Grupos de edad											
1 - 2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,3	9,0	11,6	6,4	3 935	
3 - 5	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23,1	21,6	24,7	3,4	6 283	
6 - 11	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	29,3	28,0	30,7	2,4	13 137	
Área de residencia											
Urbana	24,4	21,9	26,9	5,2	2 912	27,5	26,2	28,9	2,5	13 591	
Rural	16,4	14,1	18,8	7,3	2 442	17,5	16,2	18,9	3,9	9 764	
Dominio de residencia											
Costa	24,9	21,7	28,0	6,4	1 678	29,3	27,6	30,9	2,8	8 352	
Lima Metropolitana	23,2	18,0	28,4	11,4	347	30,7	28,1	33,3	4,3	2 441	
Costa (sin LM)	26,4	22,7	30,1	7,1	1 331	27,7	25,8	29,6	3,4	5 911	
Sierra	16,2	13,8	18,7	7,7	2 172	16,5	14,9	18,2	5,1	9 061	
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,3	16,3	22,3	7,9	3 298	
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,4	12,7	16,0	5,8	5 763	
Selva	23,3	20,0	26,7	7,2	1 504	24,9	23,1	26,8	3,8	5 942	
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	29,3	26,5	32,1	4,8	2 920	
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,9	18,4	23,4	6,0	3 022	
Quintil de bienestar											
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,2	15,7	18,7	4,5	7 889	
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,8	19,9	23,7	4,4	6 026	
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,6	23,4	27,7	4,3	4 343	
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	28,0	25,6	30,3	4,3	2 936	
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	35,5	32,4	38,6	4,5	2 161	
Departamento											
Amazonas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23,0	19,0	27,0	8,8	964	
Áncash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,8	18,2	25,5	8,5	1 073	
Apurímac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,2	15,3	25,0	12,2	836	
Arequipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,7	13,3	20,1	10,3	741	
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,2	14,9	21,6	9,3	905	
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,1	19,3	28,9	10,1	908	
Prov. Const. del Callao	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	35,3	31,5	39,0	5,5	716	
Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,7	6,4	11,1	13,7	773	
Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,0	7,8	14,2	14,9	789 930	
Huánuco Ica	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	19,6 25,4	14,7 21,3	24,5 29,5	12,7 8,3	930 836	
Junín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23,4 17,4	13,1	23,3	12,8	783	
La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,2	18,7	29,6	11,5	897	
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	31,8	27,2	36,3	7,3	819	
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30,0	27,4	32,6	4,4	2 412	
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30,1	27,2	33,0	4,9	1 733	
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	29,2	24,9	33,5	7,5	679	
Loreto	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23,9	20,6	27,2	7,1	1 246	
Madre de Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,2	19,8	28,6	9,3	873	
Moquegua	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,4	17,0	23,9	8,6	565	
Pasco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,2	18,2	26,2	9,2	910	
Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	29,6	25,6	33,7	7,0	1 078	
Puno	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(7,6)	4,7	10,5	19,4	915	
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	34,2	29,4	39,1	7,2	938	
Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	11,1	8,2	14,1	13,4	586	
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	29,5	24,1	34,8	9,3	772 1 000	
Ucayali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,2	18,7	25,7	8,1	1 090	

Nota: Prácticas adecuadas de salud bucal se refiere a las estrategias activas que se implentan sobre la boca, lengua, dientes y encías para preservar su higiene y funcionalidad, así como prevenir su deterioro.

^{1/} Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende los 43 distrilos que conforman la provincia de Lima.
2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
n.a.: No aplicable.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO Nº 1.33

PERÚ: NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS DE EDAD QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN UN SERVICIO ODONTOLÓGICO EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA,

2013-II SEMESTRE Y 2014

(Porcentaje)

		20)13 - II Semes	tre		2014					
Característica seleccionada	lı Valor	ntervalo de c		Coeficiente	Total de	Valor	Intervalo de al 9		Coeficiente	Total de	
	estimado	Inferior	Superior	de variación	casos sin ponderar	estimado	Inferior	Superior	de variación	casos sin ponderar	
Total	26,8	24,8	28,8	3,8	5 811	27,6	26,6	28,6	1,9	25 285	
Sexo											
Hombre Mujer	26,6 27,0	24,0 24,6	29,3 29,5	5,1 4,6	2 934 2 877	27,6 27,6	26,3 26,4	28,9 28,9	2,4 2,4	12 878 12 407	
•		,-	,-	.,-		,+	==,.	,-	_, .		
Grupos de edad 0 - 2	200	n o	n 0	n o	n 0	14,2	12,8	15,5	4,7	5 865	
3 - 5	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	28,5	26,8	30,2	3,0	6 283	
6 - 11	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	33,3	31,9	34,7	2,2	13 137	
						00,0	0.,0	0.,.	_,_		
Àrea de residencia	20.0	07.6	20.7	4.2	2.464	20.0	20.5	20.0	2.0	44.720	
Urbana Rural	30,2 20,5	27,6 17,6	32,7 23,5	4,3 7,4	3 161 2 650	30,8 20,6	29,5 18,8	32,0 22,5	2,0 4,6	14 739 10 546	
	20,5	17,0	20,0	7,4	2 000	20,0	10,0	22,5	4,0	10 340	
Dominio de residencia					4.040			24.0			
Costa	29,4	26,0	32,7	5,8	1 846	30,2	28,7	31,8	2,6	9 095	
Lima Metropolitana	35,1	29,8	40,4	7,7	383	35,8	33,5	38,1	3,3	2 650	
Costa (sin LM)	24,3	19,6	29,0	9,8	1 463	24,2	22,2	26,1	4,1	6 445	
Sierra	26,1	23,2	29,0	5,6	2 325	27,9	26,1	29,8	3,3	9 746	
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	33,2	30,7	35,7	3,8	3 549	
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23,8	21,2	26,4	5,5	6 197	
Selva	21,1	17,3	25,0	9,2	1 640	18,8	16,7	20,8	5,6	6 444	
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,1	20,9	27,3	6,7	3 172	
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,8	11,4	16,2	9,0	3 272	
Quintil de bienestar											
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,2	16,2	20,2	5,6	8 498	
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23,4	21,8	25,0	3,6	6 587	
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	29,9	27,9	31,9	3,4	4 683	
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	32,0	29,6	34,4	3,9	3 202	
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	42,4	39,7	45,2	3,3	2 315	
Departamento											
Amazonas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,1	13,6	22,6	12,8	1 035	
Áncash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,0	16,6	23,3	8,6	1 145	
Apurímac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	40,5	32,8	48,2	9,7	899	
Arequipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	31,3	26,5	36,0	7,7	794	
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	39,6	34,3	45,0	6,9	972	
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23,1	18,0	28,3	11,3	963	
Prov. Const. del Callao	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	31,1	27,1	35,1	6,6	783	
Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	28,1	22,6	33,5	10,0	844	
Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	45,8	39,9	51,6	6,5	850	
Huánuco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	28,1	22,1	34,1	10,9	993	
Ica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	29,5	26,0	33,0	6,0	922	
Junín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	28,6	23,5	33,7	9,1	840	
La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23,8	18.9	28,6	10,4	970	
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,5	15,4	23,7	10,8	889	
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	36,4	34,1	38,7	3,2	2 616	
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	36,4	33,9	38,9	3,5	1 877	
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	36,3	32,1	40,5	5,8	739	
Loreto	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(16,3)	11,3	21,2	15,5	1 364	
Madre de Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,1	21,2	31,0	9,6	939	
Moquegua	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	31,1	26,5	35,7	7,5	609	
Pasco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	34,1	29,8	38,5	6,5	983	
Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,4	12,3	20,6	13,0	1 189	
Puno	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,2	15,0	21,5	9,1	984	
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,7	16,7	22,7	7,8	1 016	
Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	34,6	29,8	39,5	7,1	647	
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,4	16,6	24,2	9,5	846	
Ucayali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,0	11,5	16,4	8,9	1 193	

^() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

n.a.: No aplicable.

CUADRO № 1.34

PERÚ: RESPONSABLES DEL CUIDADO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 12 AÑOS DE EDAD QUE RECIBIERON INFORMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS DE SALUD BUCAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

(Porcentaje)

		20	13 - II Semest	re				2014		
Característica seleccionada	Valor estimado -	Intervalo de c 95%		Coeficiente de	Total de casos sin	Valor estimado-	Intervalo de al 95		Coeficiente de	Total de casos sin
	estillado	Inferior	Superior	variación	ponderar	estillado	Inferior	Superior	variación	ponderar
Total	57,0	53,0	61,0	3,6	1 627	57,9	56,7	59,1	1,0	15 590
Sexo										
Hombre	55,0	49,3	60,7	5,3	828	50,1	45,3	54,9	4,9	782
Mujer	59,2	53,9	64,5	4,5	799	58,3	57,1	59,5	1,1	14 808
Grupos de edad										
15 - 29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	55,0	53,1	57,0	1,8	5 316
30 - 39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	60,1	58,5	61,8	1,4	5 849
40 - 49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	61,9	59,6	64,1	1,9	3 298
50 - 59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	48,2	43,6	52,7	4,9	818
60 y más	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	41,6	34,5	48,6	8,6	309
Área de residencia										
Urbana	60,7	55,3	66,1	4,5	922	60,7	59,3	62,1	1,2	9 758
Rural	49,1	44,0	54,2	5,3	705	50,6	48,5	52,7	2,1	5 989
Dominio de residencia										
Costa	58,9	51,9	65,9	6,1	520	60,6	58,9	62,3	1,4	6 068
Lima Metropolitana	60,9	48,6	73,1	10,2	98	66,7	64,2	69,1	1,9	1 828
Costa (sin LM)	56,9	49,9	63,9	6,3	422	53,6	51,5	55,7	2,0	4 240
Sierra Sierra urbana	59,0 n.a.	53,8 n.a.	64,2 n.a.	4,5	713	57,6 60,5	55,5 57,5	59,8 63,5	1,9 2,5	5 973 2 373
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	55,1	52,1	58,0	2,8	3 600
Selva	45,2	38,4	52,0	7,7	394	48,6	46,2	51,0	2,5	3 706
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	53,3	50,0	56,6	3,1	1 994
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	43,3	39,7	46,9	4,2	1 712
Nivel de educación										
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	48,6	46,5	50,6	2,2	5 264
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	57,7	56,0	59,3	1,5	6 689
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	68,5	66,5	70,5	1,5	3 626
Quintil de bienestar										
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	48,3	45,9	50,7	2,6	4 586
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	53,0	50,8	55,1	2,1	4 067
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	58,0	55,7	60,3	2,0	3 134
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	63,0	60,4	65,6	2,1	2 270
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	71,2	68,5	74,0	2,0	1 690
Departamento										
Amazonas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	44,6	39,6	49,6	5,7	609
Áncash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	61,7	56,8	66,6	4,0	719
Apurímac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	77,0	71,6	82,5	3,6	526
Arequipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	62,5	57,8	67,3	3,9	538
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	54,4	49,1	59,6	5,0	620
Cajamarca Prov. Const. del Callao	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	49,9 61,2	44,8 56,7	55,1 65,7	5,3 3,7	594 527
Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	63,5	58,3	68,6	4,1	532
Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	79,7	74,9	84,4	3,0	495
Huánuco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	56,3	50,6	62,0	5,1	596
Ica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	66,7	62,4	71,0	3,3	614
Junín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	60,1	54,2	66,0	5,0	523
La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	51,2	45,2	57,2	6,0	589
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	44,4	41,2	47,5	3,6	547
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	67,0	64,5	69,5	1,9	1 808
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	67,3	64,6	70,1	2,1	1 309
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	64,5 42,4	59,1	69,8 47,5	4,2 6.2	499 697
Loreto Madre de Dios	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	50,0	37,2 44,8	55,3	6,2 5,3	576
Moquegua	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	55,7	50,3	61,1	5,0	431
Pasco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	62,4	57,9	66,9	3,7	595
Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	42,1	37,1	47,1	6,1	706
Puno	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	48,2	42,9	53,5	5,6	594
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	55,9	50,6	61,3	4,9	642
Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	60,4	55,2	65,6	4,4	444
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	45,8	41,8	49,8	4,4	559
Ucayali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	36,4	32,1	40,8	6,1	666

Nota: Prácticas adecuadas de salud bucal se refiere a las estrategias activas que se implentan sobre la boca, lengua, dientes y encías para preservar su higiene y funcionalidad, así como prevenir su deterioro

su deterioro.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

n.a.: No aplicable

CUADRO № 1.35
PERÚ: ADULTOS DE 60 Y MÁS AÑOS DE EDAD ATENDIDOS EN UN SERVICIO ODONTOLÓGICO DURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

		20	013 - II Semes	stre		2014						
Característica seleccionada	Valor	Intervalo de al 95		Coeficiente de	Total de casos sin	Valor	ntervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos sin		
	estimado -	Inferior	Superior	variación	ponderar	estimado -	Inferior	Superior	variación	ponderar		
Total	26,6	21,9	31,2	8,9	1 340	22,1	20,1	24,2	4,7	5 516		
Sexo												
Hombre	25,6	18,7	32,5	13,8	625	23,3	20,4	26,3	6,4	2 565		
Mujer	27,4	20,4	34,4	12,9	715	21,1	18,4	23,7	6,4	2 951		
Grupos de edad												
60 - 69	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23,3	20,5	26,1	6,1	2 676		
70 y más	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,9	18,1	23,7	6,8	2 840		
Área de residencia												
Urbana	31,9	25,8	38,1	9,8	709	26,2	23,5	28,9	5,3	2 850		
Rural	11,6	8,5	14,6	13,4	631	12,0	10,3	13,7	7,0	2 666		
Dominio de residencia												
Costa	33,3	25,9	40,7	11,3	461	27,0	23,8	30,2	6,1	1 941		
Lima Metropolitana	(36,1)	24,8	47,4	15,9	102	31,9	26,8	37,0	8,1	595		
Costa (sin LM)	28,9	21,9	35,8	12,2	359	20,7	17,5	23,9	7,8	1 346		
Sierra	15,2	12,0	18,4	10,6	686	16,3	14,3	18,2	6,0	2 843		
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,5	18,8	26,2	8,4	765		
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,5	10,5	14,5	8,2	2 078		
Selva	(20,8)	12,1	29,4	21,2	193	12,7	9,6	15,8	12,5	732		
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(15,9)	11,2	20,6	15,2	381		
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(8,8)	5,2	12,4	20,9	351		
Nivel de educación												
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,9	13,0	16,8	6,4	4 056		
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	29,2	24,4	34,0	8,4	885		
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	44,7	38,0	51,5	7,7	572		
Quintil de bienestar												
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,5	7,7	11,3	9,6	2 221		
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15,6	12,5	18,7	10,1	1 141		
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,3	16,2	24,5	10,4	745		
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,7	22,1	31,3	8,7	719		
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	35,1	30,0	40,3	7,4	690		

⁽⁾ Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

n.a.: No aplicable.

CUADRO Nº 1.36 PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE FUERON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FÍSICA DE PAREJA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

		20)13 - II Semes	tre		2014						
Característica seleccionada	Ir Valor_	ntervalo de c 95%		Coeficiente de	Total de casos sin	Valor_	ntervalo de al 9		Coeficiente de	Total de		
	estimado	Inferior	Superior	variación	ponderar	estimado	Inferior	Superior	variación	pondera		
Total	6,0	4,6	7,4	11,8	3 876	5,3	4,8	5,8	4,9	16 668		
Sexo												
Hombre	(3,7)	2,4	5,0	18,2	1 917	3,7	3,1	4,3	8,2	7 882		
Mujer	(8,2)	5,8	10,7	15,1	1 959	6,7	6,0	7,5	5,7	8 786		
Grupos de edad												
15 - 19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(10,6)	4,4	16,7	29,5	24		
20 - 29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,8	9,2	12,4	7,5	2 927		
30 - 39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,8	5,7	7,8	8,0	4 437		
40 - 49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,3	3,3	5,2	11,1	3 54		
50 - 59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(2,6)	1,8	3,5	16,9	2 583		
60 y más	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(2,1)	1,1	3,1	24,9	2 939		
Área de residencia												
Urbana	6,5	4,6	8,4	14,8	2 173	5,5	4,9	6,2	6,1	9 826		
Rural	4,9	3,6	6,2	13,3	1 703	4,8	4,2	5,5	7,0	6 842		
Dominio de residencia												
Costa	(6,2)	3,9	8,6	19,0	1 285	5,2	4,4	6,0	7,9	6 213		
Lima Metropolitana	(8,4)	4,4	12,5	24,4	278	5,8	4,5	7,1	11,5	1 85		
Costa (sin LM)	(3,5)	2,2	4,8	19,1	1 007	4,5	3,7	5,4	9,7	4 362		
Sierra	(5,7)	3,9	7,5	15,7	1 687	5,4	4,7	6,1	6,8	6 89 ·		
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,4	5,1	7,6	9,9	2 483		
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,6	3,8	5,4	9,2	4 408		
Selva	(5,9)	4,1	7,6	15,0	904	5,7	4,8	6,6	7,9	3 564		
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5,5	4,3	6,8	11,4	1 857		
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5,9	4,7	7,2	10,8	1 70		
Nivel de educación												
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,6	3,8	5,3	8,3	6 54		
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,4	5,6	7,3	6,7	6 336		
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,6	3,5	5,7	12,0	3 784		
Quintil de bienestar												
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,9	4,1	5,6	7,7	5 094		
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,3	5,3	7,2	7,8	4 187		
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,8	5,5	8,1	9,7	3 059		
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5,3	3,9	6,7	13,7	2 317		
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(3,5)	2,4	4,6	16,4	2 01		

⁽⁾ Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

CUADRO Nº 1.37
PERÚ: EDAD PROMEDIO DE INICIO DE CONSUMO DE ALGUNA BEBIDA ALCOHÓLICA EN PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN
CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

		2	013 - II Seme	stre				2014		
Característica seleccionada	Valor_	Intervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos sin	Valor	Intervalo de al 9		Coeficiente de	Total de
	estimado	Inferior	Superior	variación	ponderar	estimado	Inferior	Superior	variación	pondera
Total	19,3	19,0	19,5	0,6	5 474	19,1	19,0	19,2	0,3	24 319
Sexo										
Hombre	18,0	17,8	18,2	0,6	2 779	17,9	17,8	18,0	0,3	12 026
Mujer	20,5	20,1	20,9	1,0	2 695	20,3	20,1	20,5	0,4	12 293
Grupos de edad										
15 - 19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15,2	15,1	15,3	0,4	1 753
20 - 29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,5	17,4	17,7	0,3	4 765
30 - 39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,6	18,5	18,8	0,4	5 352
40 - 49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,7	19,5	19,9	0,5	4 343
50 - 59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,6	20,3	20,9	0,7	3 380
60 y más	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,2	21,8	22,5	0,8	4 726
Área de residencia										
Urbana	19,1	18,8	19,4	0,8	3 401	19,0	18,8	19,1	0,3	15 542
Rural	19,9	19,5	20,3	0,9	2 073	19,8	19,6	20,0	0,5	8 777
Dominio de residencia										
Costa	18,9	18,5	19,3	1,0	2 076	18,8	18,6	18,9	0,4	9 943
Lima Metropolitana	18,8	18,2	19,3	1,5	469	18,6	18,4	18,8	0,5	3 066
Costa (sin LM)	19,1	18,6	19,5	1,2	1 607	18,9	18,7	19,1	0,5	6 877
Sierra	20,1	19,8	20,4	0,8	2 241	19,9	19,7	20,1	0,5	9 457
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,6	19,3	19,9	0,8	3 852
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,3	20,1	20,6	0,6	5 605
Selva	19,1	18,6	19,6	1,3	1 157	19,1	18,9	19,4	0,6	4 919
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,2	18,9	19,5	0,8	2 790
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,0	18,6	19,3	1,0	2 129
Nivel de educación										
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,0	20,7	21,2	0,6	8 425
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,3	18,2	18,4	0,4	9 489
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,6	18,4	18,7	0,4	6 403
•	11101					.0,0	.0, .		٥, .	0 100
Quintil de bienestar						40.0	40.0	00.4	0.7	0.505
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,8	19,6	20,1 19,6	0,7	6 505 5 960
Segundo quintil Quintil intermedio	n.a. n.a.	n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a.	19,3 18,9	19,0 18,7	19,0	0,7 0,6	4 746
Cuarto quintil	n.a.	n.a. n.a.	n.a.	n.a.	n.a. n.a.	19,1	18,9	19,3	0,6	3 837
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,7	18,5	18,9	0,6	3 271
	11.0.	n.a.	n.a.	11.4.	n.a.	10,1	10,0	10,3	0,0	0211
Departamento						40.0	40.4			
Amazonas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,8	18,4	19,3	1,2	823
Áncash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,7	19,4	20,1	0,9	1 033
Apurímac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,0	17,5	18,5	1,4	922 968
Arequipa Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,9 19,7	18,5 19,3	19,2 20,2	1,0 1,2	933
Cajamarca	n.a. n.a.	n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	19,7	19,3	20,2	1,2	786
Prov. Const. del Callao	n.a.	n.a. n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,4	18,0	18,8	1,0	834
Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,6	19,2	20,0	1,1	851
Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,3	19,7	20,9	1,5	674
Huánuco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,9	19,4	20,4	1,2	711
Ica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,0	18,7	19,3	0,8	1 026
Junín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,8	19,4	20,3	1,2	917
La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,5	18,9	20,2	1,8	850
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,2	18,8	19,5	0,9	837
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,7	18,5	18,9	0,5	3 119
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,6	18,4	18,9	0,6	2 245
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,1	18,8	19,5	0,9	874
Loreto	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,6	19,0	20,3	1,6	749
Madre de Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,0	18,6	19,4	1,1	852
Moquegua	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,1	18,8	19,3	0,7	898
Pasco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,4	19,8	20,9	1,3	878
Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,4	17,9	18,9	1,4	1 047
Puno	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,9	21,4	22,4	1,2	1 135
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,7	18,3	19,1	1,1	895
Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,1	18,8	19,5	1,0	838
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,7	18,4	19,1	1,0	841
Ucayali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,7	18,3	19,0	1,0	902

^{1/} Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

n.a.: No aplicable.

CUADRO Nº 1.38

PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON TRASTORNO POR CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

(Porcentaje)

		20	013 - II Semes	tre		2014						
Característica seleccionada	Valor	ntervalo de c 95%		Coeficiente de	Total de casos sin	Valor	ntervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos sin		
	estimado —	Inferior	Superior	variación	ponderar	estimado —	Inferior	Superior	variación	ponderar		
Total	5,3	4,4	6,1	8,4	6 370	5,4	4,9	5,8	4,0	27 633		
Sexo												
Hombre	9,1	7,5	10,6	8,7	2 982	9,8	9,0	10,6	4,1	12 806		
Mujer	(1,9)	1,1	2,7	21,0	3 388	1,5	1,2	1,8	10,6	14 827		
Grupos de edad												
15 - 19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(2,5)	1,8	3,3	15,7	2 765		
20 - 29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,3	8,0	10,5	6,9	5 291		
30 - 39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7,5	6,4	8,7	7,8	5 757		
40 - 49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5,3	4,3	6,4	10,1	4 665		
50 - 59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,0	2,9	5,0	13,1	3 639		
60 y más	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(1,4)	0,9	1,9	18,6	5 516		
Área de residencia												
Urbana	6,0	4,9	7,1	9,5	3 782	6,3	5,7	6,8	4,4	16 970		
Rural	(3,1)	2,1	4,0	16,4	2 588	2,6	2,2	3,1	8,4	10 663		
Dominio de residencia												
Costa	5,2	3,9	6,6	13,0	2 252	6,4	5,7	7,0	5,2	10 675		
Lima Metropolitana	(4,9)	2,9	6,9	20,4	520	6,8	5,8	7,8	7,7	3 262		
Costa (sin LM)	5,7	4,1	7,4	14,7	1 732	5,9	5,2	6,6	6,4	7 413		
Sierra	5,2	4,1	6,4	11,1	2 751	3,7	3,2	4,2	6,6	11 398		
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5,3	4,4	6,2	8,2	4 351		
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,2	1,7	2,6	10,7	7 047		
Selva	(5,5)	3,7	7,4	17,0	1 367	4,7	3,9	5,5	9,0	5 560		
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,0	4,7	7,3	11,0	3 088		
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,0	2,2	3,8	14,3	2 472		
Nivel de educación												
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,8	1,4	2,3	12,0	10 083		
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,2	5,5	6,8	5,4	10 876		
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7,8	6,9	8,8	6,2	6 671		
Quintil de bienestar												
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,0	1,6	2,4	10,1	8 151		
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,6	3,8	5,3	8,2	6 782		
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5,8	5,0	6,7	7,6	5 153		
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,1	5,1	7,0	8,0	4 103		
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7,9	6,5	9,3	9,0	3 444		

⁽⁾ Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

n.a.: No aplicable.

Anexo 2 Programa de Prevención y Control del Cáncer

CUADRO № 2.1
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 59 AÑOS DE EDAD QUE CONSIDERA QUE EL CÁNCER ES PREVENIBLE, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA,
2013-II SEMESTRE Y 2014

		20	13 - II Semes	tre				2014		
Característica seleccionada	Valor	Intervalo de o 95%		Coeficiente de	Total de casos sin	Valor	Intervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos sin
	estimado	Inferior	Superior	variación	ponderar	estimado	Inferior	Superior	variación	ponderar
Total	88,4	86,6	90,2	1,0	5 030	89,6	89,0	90,2	0,3	22 117
Sexo										
Hombre	90,8	88,8	92,8	1,1	2 356	91,0	90,2	91,7	0,4	10 241
Mujer	86,3	83,5	89,1	1,6	2 674	88,5	87,6	89,3	0,5	11 876
Grupos de edad										
15 - 29 30 - 39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	90,0 90,5	89,0 89,4	90,9 91,6	0,5 0,6	8 056 5 757
40 - 49	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	89,8	88,6	91,0	0,0	4 665
50 - 59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	87,3	85,7	88,8	0,9	3 639
Área de residencia						,		,-		
Urbana	90,9	88,7	93,2	1,3	3 073	92,6	92,0	93,3	0,3	14 120
Rural	80,8	78,1	83,4	1,7	1 957	80,2	78,6	81,7	1,0	7 997
Dominio de residencia										
Costa	90,7	87,8	93,6	1,6	1 791	92,5	91,7	93,3	0,4	8 734
Lima Metropolitana	90,0	85,2	94,7	2,7	418	93,3	92,1	94,4	0,6	2 667
Costa (sin LM)	91,8	89,4	94,2	1,3	1 373	91,6	90,6	92,7	0,6	6 067
Sierra	84,3	82,1	86,6	1,4	2 065	84,7	83,4	85,9	0,8	8 555
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	91,3	89,9	92,6	0,8	3 586
Sierra rural Selva	n.a. 87,8	n.a. 85,0	n.a. 90,5	n.a. 1,6	n.a. 1 174	77,6 88,2	75,6 86,9	79,7 89,6	1,3 0,8	4 969 4 828
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	92,6	91,1	94,0	0,8	2 707
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	82,6	80,1	85,1	1,5	2 121
Nivel de educación						. , .	,	,	,-	
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	78,3	76,6	79,9	1,1	6 027
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	91,8	91,1	92,6	0,4	9 991
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	94,3	93,4	95,2	0,5	6 099
Quintil de bienestar										
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	76,4	74,6	78,1	1,1	5 930
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	89,8	88,7	90,9	0,6	5 641
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	93,3	92,3	94,3	0,5	4 408
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	92,7	91,5	93,9	0,7	3 384
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	94,1	92,8	95,4	0,7	2 754
Departamento										
Amazonas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	83,7	78,3	89,1	3,3	808
Áncash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	83,4	79,4	87,4	2,5	961
Apurímac Arequipa	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	77,6 90,6	73,2 88,4	82,0 92,8	2,9 1,2	744 860
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	86,2	82,6	89,8	2,1	884
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	85,4	81,5	89,3	2,3	769
Prov. Const. del Callao	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	90,2	87,6	92,8	1,5	740
Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	83,0	79,9	86,1	1,9	765
Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	83,0	78,6	87,3	2,7	615
Huánuco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	83,6	79,6	87,6	2,4	795
lca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	92,1	90,0	94,2	1,2	860
Junín La Libertad	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	90,4 92,1	87,7 89,8	93,2 94,5	1,6 1,3	801 816
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	90,1	87,0	93,1	1,7	741
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	93,5		94,6	0,6	2 654
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	93,6	92,4	94,9	0,7	1 940
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	92,4	90,0	94,9	1,3	714
Loreto	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	86,8	83,9	89,8	1,7	745
Madre de Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	89,2		91,6	1,4	845
Moquegua	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	90,8		93,4	1,5	745
Pasco Piura	n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	88,5 88,9	85,5 86,2	91,5 91,5	1,7 1,5	862 889
Puno	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	84,6	81,7	91,5 87,6	1,8	977
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	92,2		94,4	1,3	861
Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	90,5		92,8	1,3	755
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	89,5		92,0	1,4	784
Ucayali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	88,8		91,9	1,8	841

^{1/} Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

n.a.: No aplicable.

CUADRO № 2.2

PERÚ: PERSONAS DE 15 A 59 AÑOS DE EDAD QUE RECONOCEN AL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO COMO CAUSA DEL CÁNCER DEL CUELLO UTERINO, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

		20	13 - II Semes	tre		2014					
Característica seleccionada		ntervalo de o		Coeficiente	Total de		ntervalo de		Coeficiente	Total de	
seleccionada	Valor_ estimado	95% Inferior	Superior	de variación	casos sin ponderar	Valor_ estimado	al 9	Superior	de variación	casos sin ponderai	
Total	37,9	35,4	40,4	3,3	5 030	41,5	40,4	42,6	1,4	22 117	
Sexo											
Hombre	30,7	27,4	33,9	5,3	2 356	32,1	30,6	33,5	2,3	10 241	
Mujer	44,2	40,7	47,7	4,0	2 674	49,6	48,2	51,1	1,5	11 876	
Grupos de edad											
15 - 29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	36,0	34,3	37,6	2,3	8 056	
30 - 39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	45,7	43,7	47,6	2,2	5 757	
40 - 49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	46,6	44,4	48,8	2,4	4 665	
50 - 59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	42,9	40,4	45,4	3,0	3 639	
Área de residencia											
Urbana	43,3	40,1	46,5	3,8	3 073	47,5	46,1	48,9	1,5	14 120	
Rural	21,4	18,8	24,1	6,3	1 957	22,9	21,4	24,3	3,2	7 997	
Dominio de residencia											
Costa	44,5	40,6	48,5	4,5	1 791	47,4	45,8	49,1	1,8	8 734	
Lima Metropolitana	48,0	41,8	54,2	6,5	418	51,6	49,1	54,1	2,5	2 667	
Costa (sin LM)	39,8	35,6	44,0	5,4	1 373	42,5	40,5	44,4	2,4	6 067	
Sierra	27,3	24,4	30,3	5,4	2 065	31,1	29,4	32,8	2,8	8 555	
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	41,5	38,6	44,3	3,6	3 586	
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,1	18,3	21,9	4,6	4 969	
Selva	34,0	29,9	38,0	6,1	1 174	39,5	37,2	41,8	3,0	4 828	
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50,2	47,1	53,2	3,1	2 707	
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,6	23,0	28,2	5,1	2 121	
Nivel de educación											
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,0	20,3	23,7	3,9	6 027	
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	36,3	34,9	37,7	1,9	9 991	
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	63,5	61,7	65,3	1,5	6 099	
Quintil de bienestar											
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,6	18,2	21,1	3,8	5 930	
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	32,4	30,7	34,2	2,8	5 641	
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	40,9	38,8	42,9	2,5	4 408	
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50,4	47,7	53,1	2,7	3 384	
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	61,1	58,6	63,6	2,1	2 754	
Departamento											
Amazonas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	32,1	28,2	36.0	6,2	808	
Áncash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	31,8	27,7	36,0	6,7	961	
Apurímac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,8	18,4	27,2	9,8	744	
Arequipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	45,9	41,4	50,4	5,0	860	
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	29,1	24,5	33,6	8,0	884	
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	28,6	23,5	33,6	9,0	769	
Prov. Const. del Callao	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	47,1	42,9	51,2	4,5	740	
Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,1	22,6	29,5	6,7	765	
Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	31,3	27,0	35,6	7,0	615	
Huánuco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	37,9	32,7	43,2	7,1	795	
lca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	42,3	38,5	46,2	4,6	860	
Junín La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	41,5 40,8	36,2 35,2	46,8 46,3	6,5	801 816	
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	40,6 41,4	36,2	46,5	7,0 6,4	741	
Lima	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a.	n.a.	51,0	48,5	53,5	2,5	2 654	
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	52,1	49,4	54,9	2,7	1 940	
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	42,2	38,0	46,4	5,1	714	
Loreto	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	41,9	37,4	46,4	5,5	745	
Madre de Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	35,3	31,7	38,8	5,1	845	
Moquegua	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	46,8	41,5	52,2	5,8	745	
Pasco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	36,2	32,0	40,4	5,9	862	
Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	38,6	34,3	42,9	5,7	889	
Puno	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,5	21,3	29,8	8,5	977	
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	39,5	33,5	45,5	7,8	861	
Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	39,4	34,8	43,9	5,9	755	
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	36,8	31,4	42,2	7,5	784	
Ucayali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50,6	46,4	54,9	4,2	841	

^{1/} Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

n.a.: No aplicable.

CUADRO № 2.3

PERÚ: PERSONAS DE 40 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO UN CHEQUEO GENERAL PARA DESCARTAR ALGÚN TIPO DE CÁNCER EN LOS ÚLTIMOS 24 MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

(Porcentaje)

		20	13 - II Semes	tre				2014		
Característica seleccionada	Ir Valor	ntervalo de c 95%		Coeficiente	Total de	Valor	Intervalo de al 9		Coeficiente	Total de
	estimado	Inferior	Superior	de variación	casos sin ponderar	estimado	Inferior	Superior	de variación	casos sin ponderar
Total	22,8	18,6	26,9	9,2	1 815	26,1	24,7	27,6	2,8	8 304
Sexo										
Hombre Mujer	(8,0) 36,2	4,5 30,0	11,6 42,4	22,6 8,7	900 915	10,0 39,1	8,4 37,0	11,6 41,3	8,2 2,8	3 905 4 399
Grupos de edad										
40 - 49 50 - 59	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	25,3 27,2	23,4 24,9	27,1 29,6	3,7 4,4	4 665 3 639
Área de residencia	π.α.	II.a.	II.a.	II.a.	ıı.a.	21,2	24,3	23,0	7,7	3 003
Urbana	26,7	21,4	32,0	10,1	1 072	30,4	28,5	32,2	3,1	5 139
Rural	(10,9)	7,6	14,3	15,4	743	13,5	11,9	15,0	5,9	3 165
Dominio de residencia										
Costa	28,4	21,7	35,2	12,1	637	31,0	28,8	33,3	3,7	3 257
Lima Metropolitana	(29,9) 26,6	18,7 21,0	41,1 32,2	19,1	145 492	33,9 27,6	30,3 25,3	37,5 30,0	5,4 4,4	983 2 274
Costa (sin LM) Sierra	14,8	11,5	32,2 18,2	10,7 11,6	793	27,0 19,1	25,3 17,3	20,9	4,4	3 353
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,0	23,0	29,0	5,9	1 261
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,8	10,8	14,8	7,9	2 092
Selva	17,1	12,2	22,1	14,7	385	20,2	17,4	22,9	7,0	1 694
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,8	23,5	32,0	7,9	949
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	10,9	8,0	13,8	13,4	745
Nivel de educación										
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,1	15,2	19,0	5,7	3 427
Secundaria Superior	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	25,7 38,1	23,2 34,9	28,1 41,4	4,9 4,3	2 786 2 091
·	11.0.	n.u.	n.a.	ii.u.	11.0.	00,1	01,0	,.	1,0	2001
Quintil de bienestar Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,6	7,1	10,1	8,8	2 394
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,1	16,6	21,5	6,6	1 893
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,8	22,6	29,0	6,3	1 485
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	29,2	25,8	32,6	5,9	1 287
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	42,5	39,0	45,9	4,2	1 245
Departamento										
Amazonas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(14,8)	9,9	19,7	16,8	309
Áncash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,8	16,9	28,7	13,2	367
Apurímac Arequipa	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	18,1 33,5	12,9 28,2	23,2 38,8	14,5 8,1	312 338
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(16,4)	10,7	22,1	17,8	341
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(16,3)	11,2	21,4	16,1	276
Prov. Const. del Callao	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	31,9	26,2	37,7	9,2	272
Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,6	16,2	25,1	11,1	322
Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(15,3)	8,1	22,5	23,9	220
Huánuco Ica	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	(10,8) 26,2	6,8 21,3	14,8 31,1	18,8 9,6	269 306
Junín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,0	15,9	26,1	12,4	314
La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	33,1	27,6	38,6	8,5	313
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	30,6	23,8	37,5	11,3	277
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	33,4	29,8	37,1	5,5	970
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	34,1	30,1	38,1	5,9	716
Lima Provincias 2/ Loreto	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a.	27,8 (19,4)	21,2 12,6	34,3 26,3	11,9 18,0	254 250
Madre de Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a. n.a.	25,7	20,8	30,5	9,7	315
Moquegua	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	31,5	25,1	37,9	10,4	328
Pasco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(18,0)	12,4	23,6	15,9	299
Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,8	13,0	22,7	13,9	353
Puno	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,5	9,6	17,4	14,7	414
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,8	15,0	24,7	12,4	306
Tacna Tumbes	n.a. n.a.	n.a. n a	n.a. n.a.	n.a. n.a	n.a. n.a	25,4 25,3	19,2 18,7	31,7 31,8	12,6 13,3	286 281
Ucayali	n.a.	n.a. n.a.	n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	25,3 26,4	20,5	32,2	11,3	266

⁽⁾ Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

n.a.: No aplicable.

^{1/} Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

CUADRO Nº 2.4

PERÚ: MUJERES DE 30 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO EL EXAMEN CLÍNICO DE MAMA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

(Porcentaje)

		20	13 - II Semes	tre		2014						
Característica seleccionada	lr Valor	ntervalo de c 95%		Coeficiente de	Total de casos sin	Valor	Intervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos sin		
	estimado	Inferior	Superior	variación	ponderar	estimado	Inferior	Superior	variación	ponderar		
Total	23,2	19,2	27,2	8,8	1 659	22,4	21,0	23,8	3,2	7 530		
Grupos de edad												
30 - 39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,0	17,9	22,0	5,2	3 131		
40 - 49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,9	22,3	27,4	5,2	2 489		
50 - 59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,6	19,7	25,6	6,7	1 910		
Área de residencia												
Urbana	27,3	22,4	32,3	9,3	1 043	26,2	24,5	28,0	3,4	4 846		
Rural	(9,1)	6,0	12,1	17,0	616	10,1	8,6	11,7	7,7	2 684		
Dominio de residencia												
Costa	30,3	24,1	36,6	10,5	615	28,0	25,8	30,1	3,9	3 039		
Lima Metropolitana	(34,2)	23,8	44,6	15,5	136	30,3	27,0	33,5	5,5	901		
Costa (sin LM)	25,8	20,5	31,1	10,5	479	25,3	22,8	27,9	5,2	2 138		
Sierra	12,9	9,5	16,2	13,3	696	14,3	12,7	16,0	5,8	3 065		
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,5	16,9	22,0	6,7	1 276		
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	9,0	7,2	10,7	9,9	1 789		
Selva	(14,2)	9,2	19,3	18,1	348	15,8	12,8	18,9	9,7	1 426		
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,7	16,4	25,1	10,8	838		
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(8,8)	5,5	12,1	19,1	588		
Nivel de educación												
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,0	10,3	13,7	7,3	3 067		
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,4	19,0	23,9	5,8	2 483		
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	36,1	33,2	38,9	4,0	1 980		
Quintil de bienestar												
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,8	5,5	8,2	10,2	1 990		
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,2	13,7	18,6	7,8	1 744		
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,6	17,7	23,5	7,3	1 465		
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,9	24,7	31,1	5,9	1 226		
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	35,5	32,1	39,0	5,0	1 105		

^() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

n.a.: No aplicable.

CUADRO № 2.5
PERÚ: MUJERES DE 40 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO MAMOGRAFÍA EN LOS ÚLTIMOS 24 MESES,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA,
2013-II SEMESTRE Y 2014

				2014				
Característica seleccionada	Valor	Desviación	Intervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos	Total de casos sin	
	estimado	estándar	Inferior	Superior	variación	ponderados	ponderar	
Total	18,7	1,0	16,7	20,7	5,3	4 644	4 399	
Grupos de edad								
40 - 49	17,0	1,2	14,6	19,4	7,2	2 558	2 489	
50 - 59	20,8	1,5	17,8	23,8	7,4	2 085	1 910	
Área de residencia								
Urbana	23,2	1,3	20,6	25,7	5,5	3 522	2 761	
Rural	4,7	0,7	3,4	6,1	14,7	1 122	1 638	
Dominio de residencia								
Costa	25,1	1,6	22,0	28,2	6,3	2 703	1 749	
Lima Metropolitana	30,9	2,6	25,8	35,9	8,4	1 464	523	
Costa (sin LM)	18,3	1,6	15,1	21,4	8,8	1 239	1 226	
Sierra	9,4	0,9	7,6	11,3	9,8	1 426	1 850	
Sierra urbana	15,4	1,7	12,0	18,7	11,3	691	702	
Sierra rural	(3,9)	0,7	2,6	5,2	17,3	734	1 148	
Selva	10,8	1,6	7,7	13,9	14,6	515	800	
Selva urbana	(16,1)	2,5	11,3	21,0	15,4	305	479	
Selva rural	(3,1)	1,0	1,1	5,1	33,2	210	321	
Nivel de educación								
Hasta primaria	8,8	1,2	6,5	11,2	13,4	1 927	2 116	
Secundaria	16,9	1,5	13,9	19,9	9,0	1 472	1 261	
Superior	36,1	2,2	31,9	40,4	6,0	1 244	1 022	
Quintil de bienestar								
Quintil inferior	(1,9)	0,5	1,1	2,8	23,5	827	1 231	
Segundo quintil	(8,0)	1,4	5,4	10,7	17,0	788	937	
Quintil intermedio	16,0	1,9	12,2	19,7	12,1	866	808	
Cuarto quintil	25,3	2,5	20,4	30,1	9,8	951	710	
Quintil superior	33,9	2,4	29,1	38,6	7,1	1 211	713	

^() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

CUADRO Nº 2.6

PERÚ: MUJERES DE 30 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO LA PRUEBA DE PAPANICOLAOU
EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

		20	13 - II Semes	tre		2014					
Característica seleccionada	Ir Valor_	ntervalo de o 95%		Coeficiente de	Total de casos sin	Valor	Intervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos sin	
	estimado	Inferior	Superior	variación	ponderar	estimado	Inferior	Superior	variación	ponderar	
Total	53,9	49,7	58,2	4,0	1 659	55,3	53,6	57,0	1,6	7 530	
Grupos de edad											
30 - 39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	59,3	56,8	61,8	2,2	3 131	
40 - 49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	57,7	54,9	60,5	2,5	2 489	
50 - 59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	46,9	43,3	50,5	3,9	1 910	
Área de residencia											
Urbana	57,4	52,3	62,5	4,5	1 043	59,9	57,9	62,0	1,7	4 846	
Rural	42,1	35,4	48,8	8,1	616	40,6	38,0	43,3	3,3	2 684	
Dominio de residencia											
Costa	58,6	52,2	64,9	5,5	615	62,0	59,7	64,3	1,9	3 039	
Lima Metropolitana	61,0	50,4	71,5	8,8	136	65,5	61,9	69,0	2,8	901	
Costa (sin LM)	55,7	49,8	61,6	5,4	479	58,0	55,2	60,8	2,5	2 138	
Sierra	48,1	49,0 42,3	53,9	6,1	696	46,2	43,5	48,9	2,3 2,9	3 065	
Sierra urbana	n.a.	42,3 n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	40,2 52,1	43,3 47,9	56,3	2,3 4,1	1 276	
Sierra rural						40,0	36,7	43,3	4,1	1 789	
Selva	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		42,0	50,4		1 426	
	45,6	38,4	52,8	8,0	348	46,2	,		4,7		
Selva urbana Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	53,2	47,5 30,0	58,9	5,4 8,6	838 588	
Selva Iulai	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	36,1	30,0	42,3	0,0	300	
Nivel de educación											
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	40,7	37,8	43,5	3,6	3 067	
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	59,0	56,5	61,6	2,2	2 483	
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	68,6	65,7	71,5	2,2	1 980	
Quintil de bienestar											
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	33,0	29,8	36,1	4,9	1 990	
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	50,1	46,5	53,7	3,6	1 744	
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	56,3	52,6	59,9	3,3	1 465	
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	60,1	55,8	64,4	3,6	1 226	
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	71,2	67,9	74,5	2,4	1 105	
	11.0.	11.0.	11.0.	11.0.	n.u.	7 1,2	01,0	7 1,0	2,1	1 100	
Departamento											
Amazonas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	35,7	27,5	43,9	11,8	268	
Àncash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	53,9	46,1	61,7	7,4	338	
Apurímac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	55,3	47,3	63,2	7,3	254	
Arequipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	56,0	50,0	61,9	5,4	317	
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	48,0	40,4	55,5	8,0	296	
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	44,2	36,1	52,3	9,4	258	
Prov. Const. del Callao	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	64,9	57,8	72,0	5,6	255	
Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	48,8	42,5	55,1	6,6	280	
Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	49,8	40,0	59,6	10,0	202	
Huánuco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	56,3	47,7	64,9	7,8	248	
Ica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	63,0	55,8	70,3	5,9	288	
Junín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	53,6	46,6	60,7	6,7	293	
La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	64,7	55,3	74,2	7,5	294	
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	51,0	44,0	58,0	7,0	269	
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	65,0	61,5	68,6	2,8	896	
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	65,5	61,5	69,4	3,1	649	
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	61,4	54,6	68,3	5,7	247	
Loreto	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	37,4	28,2	46,7	12,6	225	
Madre de Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	54,6	47,3	61,8	6,8	246	
Moquegua	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	59,6	52,4	66,8	6,2	280	
Pasco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	51,0	44,2	57,7	6,8	300	
Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	45,3	38,7	51,8	7,3	308	
Puno	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	32,1	26,9	37,3	8,3	391	
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	45,6	35,6	55,5	11,1	248	
Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	55,8	47,6	64,1	7,5	291	
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	47,6	40,1	55,1	8,0	242	
Ucayali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	51,0	43,5	58,4	7,5	243	

^{1/} Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

n.a.: No aplicable

CUADRO № 2.7

PERÚ: MUJERES DE 30 A 59 AÑOS DE EDAD QUE SE HAN REALIZADO LA PRUEBA DE PAPANICOLAOU EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS Y

CONOCIERON SU RESULTADO, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

(Porcentaje)

		20	13 - II Semes	tre		2014					
Característica seleccionada	Intervalo de confianza al Valor 95%		Coeficiente de	Total de casos sin	Valor	ntervalo de al 9		Coeficiente de	Total de		
	estimado	Inferior	Superior	variación	ponderar	estimado	Inferior	Superior	variación	ponderar	
Total	80,8	76,7	84,8	2,5	831	79,2	77,4	81,0	1,2	3 959	
Grupos de edad											
30 - 39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	76,8	73,9	79,6	1,9	1 78	
40 - 49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	79,2	76,0	82,3	2,0	1 376	
50 - 59	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	83,3	79,9	86,7	2,1	796	
Área de residencia											
Urbana	83,4	78,8	88,0	2,8	580	81,4	79,4	83,4	1,3	2 822	
Rural	68,6	62,7	74,5	4,4	251	68,8	64,8	72,9	3,0	1 137	
Dominio de residencia											
Costa	82,9	77,5	88,4	3,3	351	82,8	80,4	85,1	1,4	1 830	
Lima Metropolitana	83,2	74,7	91,7	5,2	81	83,9	80,5	87,3	2,1	604	
Costa (sin LM)	82,6	76,7	88,5	3,6	270	81,3	78,3	84,3	1,9	1 220	
Sierra	76,0	69,5	82,4	4,3	319	70,3	67,0	73,6	2,4	1 450	
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	74,4	70,0	78,8	3,0	688	
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	64,8	59,8	69,8	3,9	768	
Selva	80,4	73,4	87,4	4,4	161	78,6	73,5	83,6	3,3	673	
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	81,8	76,0	87,5	3,6	453	
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	71,8	61,7	81,9	7,2	220	
Nivel de educación											
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	71,5	68,1	74,9	2,4	1 201	
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	79,9	76,8	83,0	2,0	1 427	
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	83,9	81,1	86,7	1,7	1 331	
Quintil de bienestar											
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	65,4	60,2	70,5	4,0	717	
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	74,3	70,4	78,2	2,7	872	
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	78,2	74,3	82,0	2,5	840	
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	83,0	79,1	87,0	2,4	748	
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	84,4	80,8	88,0	2,2	782	
Departamento											
Amazonas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	82,1	73,4	90,8	5,4	99	
Áncash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	78,3	71,4	85,3	4,5	182	
Apurímac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	59,8	51,9	67,7	6,7	146	
Arequipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	75,5	68,5	82,6	4,7	175	
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	71,4	62,9	79,9	6,1	138	
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	74,5	62,6	86,4	8,1	117	
Prov. Const. del Callao	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	83,1	77,8	88,4	3,2	176	
Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	66,2	56,2	76,3	7,7	132	
Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	60,1	49,6	70,6	8,9	99	
Huánuco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	75,2	65,5	85,0	6,6	144	
Ica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	73,0	65,1	80,8	5,5	178	
Junín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	75,2	67,4	83,1	5,3	155	
La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	75,5	67,3	83,6	5,5	198	
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	83,8	78,7	88,9	3,1	147	
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	83,9	80,5	87,3	2,1	582	
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	84,0	80,2	87,8	2,3	429	
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	82,9	77,0	88,9	3,6	153	
Loreto	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	77,6	64,5	90,6	8,6	82	
Madre de Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	73,9 76,0	63,5 66,9	84,3	7,2 6,1	137 162	
Moquegua Pasco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	76,0 75,3	67,1	85,0 83.6	5,6	159	
Piura	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	75,3 89,6	84,4	83,6 94,9	3,0	133	
Puno	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	52,9	41,2	94,9 64,5	3,0 11,2	111	
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	80,0	67,9	92,1	7,7	114	
Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	79,8	73,5	86,0	4,0	147	
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	81,8	71,7	91,9	6,3	124	
Ucayali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	91,9	86,3	97,4	3,1	122	

^{1/} Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

n.a.: No aplicable.

Anexo 3 Programa de Enfermedades Transmisibles

CUADRO № 3.1

PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON CONOCIMIENTO SOBRE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN DE LA TUBERCULOSIS, SEGÚN
CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2014

			2014		
Característica seleccionada	Valor	ntervalo de c		Coeficiente de	Total de casos
	estimado —	Inferior	Superior	variación	sin ponderar
Total	4,4	4,0	4,8	4,5	27 633
Sexo					
Hombre	3,5	3,0	4,0	7,1	12 806
Mujer	5,1	4,6	5,7	5,6	14 827
Grupo de edad					
15 - 19	4,5	3,5	5,6	11,9	2 765
20 - 29	5,5	4,5	6,4	9,2	5 291
30 - 39	4,8	4,0	5,7	9,2	5 757
40 - 49	4,0	3,2	4,9	10,8	4 665
50 - 59	3,9	3,0	4,8	12,2	3 639
60 y más	3,2	2,3	4,0	13,1	5 516
Área de residencia					
Urbana	4,8	4,3	5,3	5,2	16 970
Rural	3,0	2,6	3,5	7,6	10 663
Dominio de residencia					
Costa	4,8	4,2	5,4	6,5	10 675
Lima Metropolitana	4,9	4,0	5,9	9,7	3 262
Costa (sin LM)	4,6	3,9	5,3	7,7	7 413
Sierra	3,4	2,9	3,9	7,4	11 398
Sierra urbana	4,2	3,3	5,0	10,1	4 351
Sierra rural	2,7	2,2	3,3	10,4	7 047
Selva	4,9	4,2	5,7	7,6	5 560
Selva urbana	5,5	4,5	6,5	9,3	3 088
Selva rural	4,2	3,1	5,3	13,3	2 472
Nivel de educación					
Hasta primaria	3,1	2,5	3,7	9,9	10 083
Secundaria	4,4	3,9	5,0	6,3	10 876
Superior	5,6	4,8	6,5	7,9	6 671
Quintil de bienestar					
Quintil inferior	2,7	2,2	3,2	9,4	8 151
Segundo quintil	4,5	3,7	5,4	9,3	6 782
Quintil intermedio	5,1	4,2	5,9	8,6	5 153
Cuarto quintil	4,6	3,7	5,5	10,0	4 103
Quintil superior	4,8	3,8	5,8	10,7	3 444

⁽⁾ Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

CUADRO Nº 3.2

PERÚ: PERSONAS DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD QUE CONOCEN LAS FORMAS DE PREVENIR Y RECHAZAN IDEAS ERRÓNEAS DE TRANSMISIÓN DEL VIH, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

(Porcentaje)

		2	013 - II Semes	tre				2014		
Característica seleccionada	Valor	ntervalo de c 95%		Coeficiente de	Total de casos sin	Valor	Intervalo de al 9		Coeficiente de	Total de casos sin
	estimado —	Inferior	Superior	variación	ponderar	estimado '	Inferior	Superior	variación	ponderar
Total	26,1	22,3	29,9	7,4	1 874	22,5	21,1	23,9	3,1	8 056
Sexo										
Hombre	25,0	19,6	30,5	11,1	859	22,6	20,5	24,7	4,7	3 710
Mujer	27,0	21,7	32,3	9,9	1 015	22,4	20,6	24,2	4,2	4 346
Grupos de edad										
15 - 29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,7	17,6	21,8	5,4	2 765
20 - 29	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	24,2	22,4	26,0	3,8	5 291
Área de residencia										
Urbana	30,2	25,3	35,0	8,2	1 168	26,0	24,3	27,7	3,4	5 231
Rural	13,0	9,8	16,2	12,4	706	11,2	9,6	12,7	7,0	2 825
Dominio de residencia		24.2		40.0	050					0.454
Costa	31,0	24,8	37,2	10,2	659 160	25,8	23,6	27,9	4,2	3 154
Lima Metropolitana Costa (sin LM)	32,6 28,4	23,4 21,6	41,8 35,3	14,3 12,3	160 499	28,2 23,0	24,8 20,6	31,6 25,4	6,1 5,3	978 2 176
Sierra	17,8	14,5	21,1	9,4	75 4	16,7	15,0	18,5	5,3 5,4	3 015
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23,5	20,7	26,4	6,2	1 343
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8.9	7,2	10,6	9,9	1 672
Selva	23,3	17,5	29,0	12,6	461	21,4	18,8	24,0	6,2	1 887
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,7	24,0	31,5	6,8	1 065
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,5	9,3	15,7	13,0	822
Nivel de educación										
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(5,1)	3,3	6,9	18,5	1 092
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,0	17,3	20,7	4,5	4 777
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	34,8	31,9	37,8	4,3	2 187
Quintil de bienestar										
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,3	6,8	9,8	9,3	2 098
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,2	17,7	22,6	6,2	2 203
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,9	20,0	25,7	6,3	1 711
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,8	24,5	31,2	6,2	1 206
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	32,5	28,3	36,7	6,6	838
Departamento										
Amazonas	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15,2	10,9	19,5	14,4	293
Áncash	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,2	14,3	24,0	12,9	336
Apurímac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(13,8)	8,9	18,7	18,0	259
Arequipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,0	16,0	27,9	13,8	297
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(11,6)	8,0	15,3	16,1	336
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,8	10,4	19,1	15,0	298
Prov. Const. del Callao Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,7	20,5 11,0	30,9 21,1	10,3 16,1	279 255
Huancavelica	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	(16,0) (16,6)	8,8	24,5	24,1	233
Huánuco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(13,9)	9,8	18,1	15,2	314
Ica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,3	17,0	27,5	12,0	310
Junín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	28,5	22,8	34,2	10,2	281
La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,2	13,7	24,8	14,7	294
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,6	21,7	33,5	11,0	275
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,5	24,1	30,9	6,3	969
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	28,5	24,7	32,3	6,7	705
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,4	14,8	26,1	13,9	264
Loreto	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,8	22,2	33,4	10,3	289
Madre de Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(16,1)	11,0	21,2	16,1	318
Moquegua	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	20,6	14,7	26,5	14,6	211
Pasco Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(17,3)	11,8 15.7	22,7 26.6	16,0 13.2	322 317
Piura Puno	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,1	15,7 9,5	26,6 19,4	13,2 17,6	335
San Martín	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	(14,5) (17,4)	9,5 11,8	23,1	16,5	339
Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23,0	17,1	29,0	13,2	249
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(28,1)	18,4	37,8	17,6	293
Ucayali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	25,7	21,0	30,4	9,3	358

Nota: La identificación correcta de las formas de prevenir la transmisión sexual de VIH es teniendo una sola pareja sexual fiel y no infectada, usando preservativo en cada relación sexual y reconociendo que un portador del VIH puede aparentar estar saludable, y rechaza ideas erróneas que la transmisión del VIH es a través de la picadura de insectos o vía oral (alimentos, utensilios alimentarios).

⁽⁾ Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

^{1/} Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

n.a.: No aplicable.

CUADRO № 3.3

PERÚ: PERSONAS DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DE VIH EN LOS
ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2013-II SEMESTRE Y 2014

		2	2013 - II Seme	stre		2014				
Característica seleccionada	Valor	Intervalo de c 95%		Coeficiente	Total de	Valor	Intervalo de al 9		Coeficiente	Total de
	estimado	Inferior	Superior	de variación	casos sin ponderar	estimado	Inferior	Superior	de variación	casos sin ponderar
Total	13,6	12,0	15,2	6,0	4 189	15,8	15,0	16,6	2,6	18 478
Sexo										
Hombre Mujer	11,1 15,8	9,0 13,5	13,3 18,1	9,7 7,5	1 932 2 257	13,6 17,8	12,5 16,6	14,7 19,0	4,1 3,4	8 512 9 966
Grupos de edad										
15 - 19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,2	6,8	9,6	9,0	2 765
20 - 24 25 - 49	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	18,4 17,3	16,1 16,3	20,6 18,3	6,3 2,9	2 446 13 267
	11.a.	n.a.	ıı.a.	II.a.	n.a.	17,5	10,5	10,5	2,3	13 207
Área de residencia Urbana	14,9	12,9	17,0	6,8	2 599	17,4	16,4	18,4	2,9	11 950
Rural	9,7	7,5	11,9	11,6	1 590	10,7	9,6	11,8	5,3	6 528
Dominio de residencia										
Costa	14,5	11,9	17,0	8,9	1 492	16,9	15,7	18,1	3,6	7 315
Lima Metropolitana	13,7	10,1	17,3	13,5	357	17,3	15,5	19,1	5,3	2 247
Costa (sin LM)	15,6	12,3	18,8	10,7	1 135	16,5	15,0	18,0	4,7	5 068
Sierra	10,8	8,8	12,8	9,3	1 675	12,6	11,5	13,7	4,5	7 053
Sierra urbana Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15,5 9,2	13,8 7,9	17,3	5,7	3 077 3 976
Selva	n.a. 16,7	n.a. 13,5	n.a. 20,0	n.a. 9,8	n.a. 1 022	9,2 18,6	7,9 16,7	10,5 20,5	7,3 5,3	4 110
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23,5	20,8	26,1	5,7	2 301
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	12,2	9,8	14,7	10,2	1 809
Nivel de educación										
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,8	7,6	10,0	7,1	4 279
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,5	13,5	15,5	3,6	8 889
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,9	20,3	23,6	3,8	5 310
Quintil de bienestar										
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,7	7,7	9,8	6,2	4 814
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,4	14,8	18,0	4,9	4 822
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,2	14,6	17,9	5,2	3 808
Cuarto quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,3	15,5	19,1	5,2	2 821
Quintil superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,6	17,4	21,8	5,8	2 213
Departamento						44.7	0.0	14.6	40.5	670
Amazonas Áncash	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	11,7 12,6	8,8 9,5	14,6 15,7	12,5 12,6	672 794
Apurimac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(7,5)	5,3	9,7	15,0	600
Areguipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,7	13,1	20,3	11,0	721
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,9	10,7	17,0	11,5	741
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(9,3)	6,3	12,3	16,4	660
Prov. Const. del Callao	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	22,6	18,4	26,7	9,4	616
Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13,8	10,4	17,2	12,5	612
Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(12,5)	8,3	16,7	17,1	521
Huánuco Ica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,0 20,3	10,3 16,5	17,7 24,1	13,4 9,5	668 737
Junín	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	16,0	12,3	19,7	9,5 11,7	664
La Libertad	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	15,2	11,6	18,9	12,1	700
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	14,8	11,2	18,4	12,5	606
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,7	14,9	18,5	5,4	2 247
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	16,6	14,6	18,6	6,0	1 642
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,1	13,5	20,8	10,9	605
Loreto	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	23,1	18,4	27,8	10,4	640
Madre de Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,4	21,8	33,0	10,5	720
Moquegua	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	26,4	22,1	30,7	8,3	594
Pasco Piura	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	17,5 14,1	14,6 10,8	20,4 17,5	8,4 12,2	735 717
Puno	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	(9,3)	6,1	17,5	17,7	717
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18,0	14,7	21,3	9,3	731
Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	17,6	14,7	20,5	8,4	636
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	19,6	15,7	23,5	10,2	653
Ucayali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	21,2	17,9	24,5	7,9	715

⁽⁾ Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

^{1/} Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. n.a.: No aplicable.

CUADRO Nº 3.4

PERÚ: PERSONAS DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DE VIH EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y CONOCIERON LOS RESULTADOS, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA,

2013-II SEMESTRE Y 2014

(Porcentaje)

		20	013 - II Semes	tre		2014				
Característica seleccionada	lr Valor	ntervalo de c 95%		Coeficiente	Total de	Valor	Intervalo de		Coeficiente	Total de
	estimado	Inferior	Superior	de variación	casos sin ponderar	estimado	Inferior	Superior	de variación	casos sin ponderar
Total	94,1	91,5	96,8	1,4	653	92,3	91,0	93,6	0,7	3 132
Sexo										
Hombre	91,3	85,8	96,9	3,1	251	89,3	86,8	91,8	1,4	1 235
Mujer	95,8	93,3	98,3	1,3	402	94,3	93,0	95,6	0,7	1 897
Grupos de edad										
15 - 19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	89,9	85,7	94,1	2,4	238
20 - 24	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	94,9	92,2	97,6	1,5	496
25 - 49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	92,0	90,5	93,5	0,8	2 398
Area de residencia										
Urbana	95,2	92,3	98,2	1,6	479	93,4	92,0	94,8	0,8	2 343
Rural	89,0	82,9	95,1	3,5	174	86,7	83,5	89,9	1,9	789
Dominio de residencia	04.6	00.0	00.0		0.57	04.0	00.7	05.0		4 000
Costa	94,2	90,2	98,2	2,2 3.7	257	94,3	92,7	95,8 96.7	0,9	1 393
Lima Metropolitana Costa (sin LM)	92,9 95,9	86,1 92,9	99,7 99,0	3,7 1,6	55 202	94,2 94,3	91,8 92,4	96,7 96,2	1,3 1,0	446 947
Sierra	93,2	92,9 89,0	99,0 97,4	2,3	202	86,2	83,0	89,5	1,0 1,9	923
Sierra urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	87,7	83,5	91,9	2,4	512
Sierra rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	83,5	78,3	88,6	3,1	411
Selva	95,1	92,1	98,1	1,6	193	93,8	91,8	95,9	1,1	816
Selva urbana	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	95,4	93,2	97,6	1,2	555
Selva rural	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	90,0	85,7	94,4	2,5	261
Nivel de educación										
Hasta primaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	88,6	84,1	93,0	2,6	393
Secundaria	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	91,3	89,2	93,4	1,2	1 450
Superior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	94,2	92,4	95,9	1,0	1 289
Quintil de bienestar										
Quintil inferior	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	85,6	81,5	89,7	2,5	483
Segundo quintil	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	91,8	89,3	94,4	1,4	861
Quintil intermedio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	91,5	88,7	94,3	1,5	716
Cuarto quintil Quintil superior	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	93,6 94,9	90,8 92,7	96,4 97,1	1,5 1,2	597 475
	II.a.	II.a.	II.a.	II.a.	n.a.	34,3	32,1	37,1	1,2	413
Departamento			20			90.2	01 7	06.0	12	02
Amazonas Áncash	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	89,2 88,8	81,7 80,3	96,8 97,3	4,3 4,9	83 92
Apurímac	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	92,8	83,0	100,0	5,4	48
Arequipa	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	86,6	80,2	93,1	3,8	133
Ayacucho	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	87,1	79,7	94,6	4,4	89
Cajamarca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	80,6	64,6	96,6	10,1	63
Prov. Const. del Callao	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	90,7	86,1	95,2	2,6	154
Cusco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	82,0	73,7	90,3	5,2	90
Huancavelica	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	88,9	82,1	95,7	3,9	64
Huánuco	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	88,6	79,9	97,4	5,0 2,6	94
lca Junín	n.a.	n.a. n.a.	n.a.	n.a. n.a.	n.a.	92,3 94,6	87,6 90,6	97,0 98,7	2,0 2,2	156 113
La Libertad	n.a. n.a.	n.a.	n.a. n.a.	n.a.	n.a. n.a.	95,3	91,1	99,5	2,2	109
Lambayeque	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	99,6	98,8	100,0	0,4	87
Lima	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	94,9	92,5	97,4	1,3	406
Provincia de Lima 1/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	94,8	92,1	97,6	1,5	294
Lima Provincias 2/	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	95,6	91,1	100,0	2,4	112
Loreto	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	94,7	90,9	98,4	2,0	145
Madre de Dios	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	93,5	88,9	98,2	2,5	200
Moquegua	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	88,4	83,1	93,8	3,1	165 143
Pasco Piura	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	90,7 91,6	84,7 85,9	96,6 97,2	3,3 3,1	143 103
Puno	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	n.a. n.a.	91,6 82,0	65,9 71,2	97,2 92,7	3, I 6,7	60
San Martín	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	94,5	91,0	97,9	1,9	136
Tacna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	92,5	86,4	98,6	3,4	118
Tumbes	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	91,9	84,9	98,9	3,9	136
Ucayali	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	96,6	92,6	100,0	2,1	145

^{1/} Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

n.a.: No aplicable

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

CUADRO Nº 3.5
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE TUVIERON SU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL ANTES DE LOS 15 AÑOS DE EDAD, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2014
(Porcentaje)

			2014		
Característica seleccionada	Valor_	Intervalo de confi	anza al 95%	Coeficiente	Total de casos
Sciedolollada	estimado	Inferior	Superior	de variación	sin ponderar
Total	7,9	7,5	8,4	2,9	24 872
Grupos de edad					
15 - 19	6,3	5,4	7,2	7,3	4 351
20 - 24 25 - 49	7,8	6,7	8,8	6,7	3 648
	8,4	7,8	9,0	3,4	16 873
Área de residencia Urbana	6.4	5.0	0.0	2.0	40.053
Orbana Rural	6,4 13,2	5,9 12,1	6,9 14,3	3,9 4,2	16 953 7 919
Dominio de residencia		, -	,-	-,-	
Costa	5,7	5,1	6,3	5,3	10 655
Lima Metropolitana	5,1	4,2	5,9	8,4	3 495
Costa (sin LM)	6,5	5,7	7,3	6,2	7 160
Sierra	7,7	7,0	8,3	4,6	9 155
Sierra urbana	5,6	4,7	6,5	8,2	4 230
Sierra rural	10,0	8,9	11,1	5,6	4 925
Selva	19,3	17,7	21,0	4,4	5 062
Selva urbana	15,2	13,5	16,9	5,8	3 033
Selva rural	25,4	22,1	28,7	6,6	2 029
Nivel de educación					
Hasta primaria	17,5	16,3	18,8	3,6	6 317
Secundaria	8,1	7,4	8,7	4,1	11 440
Superior	1,5	1,2	1,8	11,1	7 115
Quintil de bienestar					
Quintil inferior	15,6	14,3	16,9	4,3	5 855
Segundo quintil	10,3	9,2	11,3	5,2	5 899
Quintil intermedio	7,6	6,6	8,5	6,4	5 219
Cuarto quintil Quintil superior	5,5 2,6	4,6 2,0	6,3 3,3	7,9 12,2	4 306 3 593
·	2,0	2,0	3,3	12,2	3 393
Departamento Amazonas	15,9	11,6	20,2	13,8	816
Áncash	7,1	5,2	9,1	13,9	1 114
Apurímac	12,0	9,7	14,3	9,8	764
Arequipa	4,9	3,5	6,4	14,8	990
Ayacucho	10,7	8,5	12,9	10,3	892
Cajamarca	10,7	8,3	13,2	11,5	930
Prov. Const. del Callao	6,3	4,5	8,0	14,0	987
Cusco	6,0	4,8	7,3	10,7	787
Huancavelica	8,7	6,1	11,3	15,0	676
Huánuco	12,4	9,2	15,6	13,2	813
Ica	7,3	5,6	9,0	11,9	1 015
Junín	(8,3)	5,4	11,3	18,0	871
La Libertad	8,6	6,3	11,0	13,7	1 022
Lambayeque	(4,6)	3,0	6,2	17,9	965
Lima	5,5	4,6	6,3	8,0	3 312
Provincia de Lima 1/	4,9	4,0	5,9	9,4	2 521
Lima Provincias 2/	10,1	8,1	12,2	10,2	791
Loreto	20,2	16,7	23,6	8,8	885
Madre de Dios	15,5	12,8	18,1	8,7	842
Moquegua	(4,4)	3,1	5,7	15,2	762
Pasco	(9,5)	5,9	13,0	19,2	935
Piura	5,2	4,0	6,5	12,2	1 038
Puno Con Martín	(4,7)	3,2	6,2	16,4	987
San Martín	23,7	21,1	26,3	5,6	874
Tacna	(4,9)	3,2	6,7	18,1	815
Tumbes	(9,5)	6,5	12,5	16,0	857

⁽⁾ Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

^{1/} Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

CUADRO Nº 3.6
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE USARON CONDÓN EN LA ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL
EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2014

			2014		
Característica	Valor	Intervalo de conf	ianza al 95%	Coeficiente	Total de casos
seleccionada	estimado	Inferior	Superior	de variación	sin ponderar
Total	12,0	11,3	12,6	2,7	20 725
Grupos de edad					
15 - 19	15,0	12,4	17,5	8,6	1 420
20 - 24	15,3	13,6	17,1	5,8	2 939
25 - 49	11,1	10,4	11,8	3,1	16 366
Área de residencia					
Urbana	13,7	12,9	14,5	3,0	13 970
Rural	6,2	5,3	7,0	7,0	6 755
Dominio de residencia					
Costa	13,5	12,6	14,5	3,7	8 708
Lima Metropolitana	15,0	13,5	16,5	5,1	2 873
Costa (sin LM)	11,6	10,6	12,7	4,7	5 835
Sierra	10,8	9,8	11,8	4,7	7 463
Sierra urbana	15,2	13,7	16,8	5,2	3 363
Sierra rural	5,9	4,7	7,1	10,1	4 100
Selva	7,5	6,5	8,4	6,5	4 554
Selva urbana	8,9	7,6	10,2	7,5	2 711
Selva rural	5,4	4,1	6,7	12,3	1 843
Nivel de educación					
Hasta primaria	5,1	4,3	5,9	8,1	5 985
Secundaria	11,7	10,7	12,7	4,3	8 660
Superior	17,3	16,0	18,5	3,7	6 080
Quintil de bienestar					
Quintil inferior	4,4	3,7	5,2	8,8	4 960
Segundo quintil	9,3	8,2	10,4	6,0	5 022
Quintil intermedio	12,6	11,3	14,0	5,5	4 340
Cuarto quintil	14,7	13,3	16,2	5,1	3 516
Quintil superior	17,1	15,4	18,9	5,2	2 887
Departamento					
Amazonas	(6,6)	4,7	8,6	15,2	720
Áncash	9,3	7,3	11,3	11,1	913
Apurímac	(9,2)	6,3	12,1	16,0	626
Arequipa	18,3	15,2	21,3	8,5	781
Ayacucho	10,9	7,9	13,9	14,1	762
Cajamarca	8,1	5,7	10,4	14,8	762
Prov. Const. del Callao	13,4	10,7	16,1	10,3	810
Cusco	13,6	10,5	16,7	11,8	641
Huancavelica	(8,7)	5,6	11,7	17,9	555
Huánuco	(5,9)	3,9	7,8	17,4	674
lca lunin	13,3	10,9	15,6	8,9	822
Junín La Libertad	13,8 9,4	10,6 6,8	17,0 12,0	11,9 14,3	713 823
Lambayeque	10,1	7,7	12,0	12,0	727
Lima	15,1	13,6	16,6	5,1	2 759
Provincia de Lima 1/	15,2	13,5	16,8	5,6	2 074
Lima Provincias 2/	14,7	12,0	17,4	9,3	685
Loreto	6,3	4,7	7,9	13,1	807
Madre de Dios	10,7	8,4	12,9	10,7	757
Moquegua	17,5	14,4	20,6	9,0	659
Pasco	10,7	8,1	13,2	12,3	773
Piura	8,8	6,7	10,9	12,3	851
Puno	8,4	6,4	10,3	12,0	774
San Martín	(6,6)	4,2	9,0	18,5	794
Tacna	14,6	12,0	17,1	9,0	673
Tumbes	9,8	7,4	12,1	12,1	717
Ucayali	7,5	5,7	9,3	12,3	832

^() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

^{1/} Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

^{2/} Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.