

PRINCIPALES INDICADORES

INDICADOR/ÁREA DE RESIDENCIA	2009	2010	2011	2012	2013
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA VIVIENDA Y DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL (Porcentaje)					
Viviendas con agua potable 1/	65,2	62,3	64,1	66,3	67,8
Área urbana 1/	86,1	83,8	91,5	88,4	81,8
Área rural 1/	53,1	49,3	47,8	54,0	58,3
Viviendas con servicio de desagüe 2/	26,2	35,9	39,1	35,8	36,4
Área urbana 2/	64,8	79,8	84,2	73,5	68,5
Área rural 2/	3,9	9,3	12,5	14,9	14,7
Mujeres en edad fértil con secundaria o más	52,2	53,8	51,6	54,9	60,9
Área urbana	76,6	77,9	79,1	nd	81,0
Área rural	34,0	38,2	31,8	nd	42,7
Mujeres en edad fértil con algún seguro de salud	65,2	71,7	77,7	77,2	77,3
Área urbana	50,0	53,3	59,8	61,4	64,6
Área rural	76,6	83,6	90,5	87,8	88,8
FECUNDIDAD					
Tasa Global de Fecundidad 3/	3,2	2,9	2,9	3,0	2,6
Área urbana 3/	2,1	2,4	1,9	2,6	1,9
Área rural 3/	4,0	3,2	3,6	3,3	3,2
Número medio de niñas y niños nacidos vivos de mujeres de 40 a 49 años de edad	5,3	5,2	4,7	4,9	4,4
Área urbana	4,1	4,0	3,5	3,7	3,1
Área rural	5,9	6,1	5,7	5,7	5,4
Mujeres en edad fértil con Seguro Integral de Salud	57,6	61,1	66,0	66,3	62,0
Área urbana	35,8	31,8	35,0	39,4	36,7
Área rural	73,8	80,0	88,3	84,4	84,9
OTROS DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD (Porcentaje)					
Mujeres actualmente unidas	59,1	61,2	59,4	61,7	60,1
Área urbana	50,4	53,8	48,7	56,4	52,5
Área rural	65,5	66,0	67,0	65,4	67,0
Mujeres que ha estado unida alguna vez	70,9	71,0	67,9	70,2	70,9
Área urbana	64,2	66,1	61,5	68,1	65,8
Área rural	76,0	74,2	72,4	71,8	75,5
Mujeres de 25-49 años de edad:					
Edad mediana a la primera unión	19,3	20,2	20,5	20,5	20,6
Área urbana	20,5	21,7	21,5	21,5	22,3
Área rural	18,7	19,1	19,6	19,9	19,8
Edad mediana al primer nacimiento	20,2	19,9	20,2	20,4	20,7
Área urbana	21,3	21,1	21,7	21,5	21,8
Área rural	19,6	19,5	19,4	19,9	20,2
Duración media de la amenorrea postparto (en meses)	14,8	11,8	12,4	13,4	13,2
Duración media de la abstinencia postparto (en meses)	6,7	5,7	5,6	5,4	6,8
PREFERENCIAS REPRODUCTIVAS					
Porcentaje de mujeres actualmente unidas:					
Que no desea tener más hijas e hijos (incluyendo mujeres esterilizadas)	65,0	68,4	65,5	60,4	62,6
Que desea postergar el nacimiento siguiente dos años o más	22,2	19,7	20,7	28,3	23,0
Número medio ideal de hijas e hijos para las mujeres de 15 a 49 años de edad	2,5	2,6	2,4	2,5	2,4
Área urbana	2,3	2,6	2,4	2,5	2,2
Área rural	2,6	2,6	2,5	2,5	2,5

Continúa...

PRINCIPALES INDICADORES

INDICADOR/ÁREA DE RESIDENCIA	2009	2010	2011	2012	2013
Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos por mujeres en edad fértil (MEF)					
Porcentaje de mujeres que conoce algún método de planificación familiar	99,4	99,2	98,7	99,4	99,8
Porcentaje de mujeres actualmente unidas:					
Conoce algún método moderno	99,6	99,8	99,8	99,7	100,0
Área urbana	100,0	nd	nd	nd	nd
Área rural	99,4	nd	nd	nd	nd
Actualmente usa algún método	68,2	71,9	75,5	74,4	71,1
Área urbana	71,3	74,5	74,0	72,9	66,5
Área rural	66,4	70,6	76,4	75,2	74,4
Actualmente usa un método moderno	52,1	55,3	56,6	58,6	53,1
Área urbana	51,0	53,1	50,3	53,6	53,3
Área rural	52,7	56,5	60,0	61,4	53,0
Actualmente usa un método tradicional	16,1	16,6	18,9	15,8	18,0
Área urbana	20,3	21,4	23,7	19,2	13,2
Área rural	13,7	14,1	16,4	13,8	21,4
Proporción de mujeres con demanda insatisfecha de planificación familiar	11,1	11,1	7,7	9,7	13,3
Área urbana	6,8	7,0	5,4	9,3	16,1
Área rural	13,5	13,3	8,8	9,8	11,4
ATENCIÓN MATERNA					
Porcentaje de últimos nacimientos cuyas madres recibieron: 4/					
Atención de un profesional de salud calificado (médico, obstetrix y enfermera) durante el embarazo (atención prenatal)	95,4	97,9	96,7	99,4	96,5
Área urbana	97,7	97,8	100,0	100,0	98,4
Área rural	94,4	97,8	95,5	99,2	95,6
Atención del parto en un establecimiento de salud	73,1	82,1	82,7	90,0	86,7
Área urbana	91,2	96,1	98,6	99,3	99,2
Área rural	64,9	75,3	76,4	85,2	80,6
Atención de un profesional de salud calificado (médico, obstetrix y enfermera) durante el parto	78,4	85,5	84,7	92,8	87,6
Área urbana	94,7	97,8	100,0	98,9	99,1
Área rural	71,6	80,2	79,3	89,9	82,0
Nacimientos por cesárea	8,8	10,7	10,9	11,8	12,8
Área urbana	15,0	19,8	28,4	19,4	20,5
Área rural	6,1	6,8	4,8	8,1	9,1
Control postnatal en los primeros dos días	86,9	84,3	87,8	93,2	92,9
Área urbana	95,2	94,0	98,7	97,0	95,1
Área rural	83,2	79,7	83,5	91,4	91,6
VACUNACIÓN					
Porcentaje de niñas y niños de 18 a 29 meses de edad con tarjeta de vacunación	72,8	79,1	76,0	82,5	88,7
Área urbana	(63,8) a/	* a/	* a/	(95,2) a/	nd
Área rural	77,8	80,1	83,7	75,4	nd
Porcentaje de niñas y niños de 18 a 29 meses de edad que han recibido: 5/					
BCG	94,0	89,4	92,6	92,1	93,2
Área urbana	(95,7) a/	* a/	* a/	(94,3) a/	nd
Área rural	93,1	89,9	89,3	90,8	nd
DPT (las tres dosis)	79,6	78,6	70,2	87,4	91,1
Área urbana	(69,1) a/	* a/	* a/	(100,0) a/	nd
Área rural	85,4	79,3	72,7	80,3	nd

Continúa...

PRINCIPALES INDICADORES

INDICADOR/ÁREA DE RESIDENCIA	2009	2010	2011	2012	2013
Polio (las tres dosis)	79,4	79,4	66,8	92,5	92,4
Área urbana	(68,2) a/	* a/	* a/ (100,0) a/		nd
Área rural	85,6	77,4	74,0	88,3	nd
Antisarampionosa	82,4	84,6	91,5	96,0	91,3
Área urbana	(75,7) a/	* a/	* a/ (100,0) a/		nd
Área rural	86,2	88,3	93,1	93,8	nd
Todas las vacunas 6/	64,6	59,4	61,8	78,5	83,6
Área urbana 6/	(57,5) a/	* a/	* a/ (94,3) a/		nd
Área rural 6/	68,6	67,8	66,8	69,6	nd
Prevalencia de enfermedades en menores de cinco años de edad					
Porcentaje de niñas y niños con diarrea 7/	15,4	13,1	11,7	10,9	9,8
Área urbana 7/	17,9	18,1	12,8	15,0	9,1
Área rural 7/	14,4	10,8	11,3	8,9	10,2
Porcentaje de niñas y niños con diarrea tratados con sobres de rehidratación oral SRO	29,5	26,0	24,8	17,7	nd
Área urbana	49,3	nd	* a/	* a/	nd
Área rural	19,0	nd	21,9	(14,1) a/	nd
Porcentaje de niñas y niños enfermos con IRA	22,6	20,7	13,5	16,8	18,5
Área urbana	10,4	13,5	10,2	13,9	20,8
Área rural	27,8	23,8	14,6	18,2	17,3
NUTRICIÓN EN LA NIÑEZ (Porcentaje)					
Niñas y niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica (Patrón OMS)	39,2	37,4	34,3	30,9	29,0 b/
Área urbana	22,8	21,7	14,8	10,6	14,6 b/
Área rural	46,2	44,2	42,2	39,3	35,5 b/
Niñas y niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica (Patrón NCHS)	32,7	31,0	28,8	24,5	22,1 b/
Área urbana	14,9	14,2	9,5	7,7	11,5 b/
Área rural	40,3	38,3	36,6	31,5	26,9 b/
Niñas y niños menores de cinco años de edad con anemia	43,4	51,1	41,8	38,7	34,8
Área urbana	31,4	43,2	21,8	26,4	29,4
Área rural	49,0	54,5	49,7	44,3	37,1
Niñas y niños menores de cinco años de edad que recibieron suplementos de hierro en los últimos siete días	21,2	33,3	19,7	nd	nd
Área urbana	17,1	28,5	12,8	nd	nd
Área rural	23,1	35,3	22,2	nd	nd
Niñas y niños menores de cinco años de edad que recibieron suplementos de vitamina A los últimos seis meses	12,2	37,9	11,5	nd	nd
Área urbana	10,4	29,3	4,0	nd	nd
Área rural	13,0	41,5	14,2	nd	nd
Niñas y niños nacidos con bajo peso al nacer (menos de 2,5 kg.)	7,9	8,8	8,7	10,7	9,9
Área urbana	2,2	2,9	10,5	6,5	6,8
Área rural	10,3	11,4	8,1	12,7	11,3
Niñas y niños menores de seis meses de edad con lactancia exclusiva	74,3	83,4	79,5	74,3	97,0
Niñas y niños menores de cuatro meses de edad amamantados	nd	nd	nd	nd	nd
Duración mediana de la lactancia (en meses) 8/	25,3	23,9	24,2	24,6	22,4
NUTRICIÓN DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL (Porcentaje)					
Mujeres que recibieron suplemento de hierro en el último nacimiento	83,1	84,8	82,7	91,3	87,0
Área urbana	78,8	88,4	86,7	89,4	88,8
Área rural	85,0	83,1	81,2	92,2	86,1
Mujeres que tomaron hierro por 90 días o más durante el embarazo	29,7	32,0	33,6	nd	nd
Área urbana	24,9	30,7	39,1	nd	nd
Área rural	31,9	32,6	31,5	nd	nd

Continúa...

PRINCIPALES INDICADORES

Conclusión.

INDICADOR/ÁREA DE RESIDENCIA	2009	2010	2011	2012	2013
Mujeres con anemia	15,8	26,2	18,3	16,8	14,7
Área urbana	9,3	23,1	17,1	12,9	11,9
Área rural	21,1	28,2	19,1	19,4	17,3
Madres con talla menor de 145,0 cms.	15,3	16,1	13,6	15,2	12,6
Área urbana	10,1	8,4	9,1	9,9	7,1
Área rural	19,3	21,2	16,7	18,8	17,5
PREVALENCIA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL (Porcentaje)					
Con una ITS	2,5	1,2	1,0	0,4	1,1
Área urbana	3,8	1,4	1,3	0,7	1,4
Área rural	1,6	1,1	0,8	0,1	0,8
Con flujo vaginal	12,7	14,6	10,2	9,2	8,4
Área urbana	8,9	15,7	11,6	8,0	11,6
Área rural	15,3	14,0	9,3	9,9	5,6
Úlceras llagas genitales	2,0	1,0	0,6	1,6	1,5
Área urbana	1,6	2,4	0,8	0,4	1,0
Área rural	2,2	0,2	0,5	2,4	2,0
VIOLENCIA FAMILIAR A MUJERES ALGUNA VEZ UNIDAS (Porcentaje)					
Experimentaron violencia psicológica o verbal por el esposo o compañero	82,2	80,4	75,9	70,4	71,7
Área urbana	82,7	80,0	83,6	67,0	77,2
Área rural	82,0	80,6	71,2	72,3	67,7
Experimentaron violencia física por el esposo o compañero	33,2	34,9	34,2	26,3	30,0
Área urbana	37,2	38,6	42,6	29,5	29,8
Área rural	31,0	32,8	29,1	24,4	30,2
Experimentaron violencia sexual por el esposo o compañero	10,3	5,2	7,5	7,0	6,6
Área urbana	11,6	6,9	12,4	9,2	7,7
Área rural	9,6	4,3	4,5	5,8	5,8
Fueron agredidas alguna vez bajo los efectos del alcohol por el esposo o compañero	62,3	65,1	57,0	60,1	55,1
Área urbana	62,6	59,7	49,4	59,2	56,7
Área rural	62,0	68,4	64,3	60,9	53,8
Mujeres de 15-49 años de edad que fueron maltratadas por otras personas	14,1	14,4	13,1	nd	10,9
Área urbana	20,6	22,0	22,7	nd	13,7
Área rural	9,7	9,6	6,6	nd	8,8

1/ Comprende agua potable dentro, fuera de la vivienda y pilón/grifo público.

2/ Servicio con desagüe comprende el servicio higiénico conectado a red pública dentro y fuera de la vivienda.

3/ Tomando como base los nacimientos ocurridos durante los tres años anteriores a la encuesta.

4/ Tomando como base los nacimientos ocurridos en los últimos cinco años anteriores a la encuesta.

5/ Información obtenida del carnet de vacunación y de la información proporcionada por la madre.

6/ Incluye BCG, tres dosis de polio, tres dosis de DPT y antisarampionosa.

7/ Niñas y niños menores de cinco años de edad cuyas madres declararon que aquéllos tuvieron diarrea durante las dos semanas anteriores a la encuesta.

8/ Calculado por el método de Prevalencia/ Incidencia.

a/ Los porcentajes basados en menos de 20 casos sin ponderar no se muestran (*) y los de 20-24 casos sin ponderar se presentan entre paréntesis.

b/ Los porcentajes corresponden al periodo 2012-2013.

nd = No disponible.