

CAPÍTULO 3

Programa de Enfermedades Transmisibles

3. Programa de Enfermedades Transmisibles

Las enfermedades transmisibles, conocidas como enfermedades contagiosas o infecciosas, son aquellas que son causadas por agentes infecciosos específicos o por productos tóxicos.

3.1 Conocimiento sobre la tuberculosis

La tuberculosis es una enfermedad bacteriana que afecta, casi siempre a los pulmones (TBC pulmonar). Es una enfermedad curable y prevenible.


La importancia del conocimiento sobre la forma de contagio de la tuberculosis se centra en la necesidad de que la población tenga en cuenta esta información, a fin de lograr conductas de prevención, búsqueda temprana de los servicios de salud, aceptación de las medidas de control y eliminar el estigma que existe frente a esta enfermedad.

La encuesta recogió información sobre el conocimiento de las formas de contagio de la tuberculosis respondiendo Sí “cuando una persona enferma tose o estornuda cerca a otra persona” y “cuando una persona enferma habla de cerca con otra persona”; y con un No “cuando una persona enferma toca a otra persona” y “cuando una persona enferma comparte alimentos o utensilios con otra persona”.

En este contexto, se encontró un 4,0% de personas de 15 y más años de edad que conoce o ha oído hablar de la TBC y reconoce las formas de transmisión. Según la distribución por sexo, el conocimiento de contagio de la enfermedad fue mayor en las mujeres, 4,3% que en los hombres, 3,7%.

Por región natural, el mayor porcentaje de personas que sabe sobre las formas de transmisión reside en la Costa (sin Lima Metropolitana) (4,7%), la Selva (4,4%) y Lima Metropolitana (3,9%) que en la Sierra (3,3%).

GRÁFICO N° 3.1
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON CONOCIMIENTO SOBRE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN DE TUBERCULOSIS, SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2015
(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

3.2 Conductas de riesgo de la transmisión del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)


Las actitudes de un individuo frente a una infección como el Virus de Inmunodeficiencia Humana pueden ser adecuadas o no de acuerdo con las concepciones y sobre todo según el nivel de conocimiento que tenga sobre las conductas de riesgo.

Conocimiento de las formas correctas y erróneas para prevenir la transmisión sexual del VIH

El conocimiento de las formas de transmisión evitará que el sujeto incurra en comportamientos de riesgo y conductas discriminatorias hacia otra persona. Este conocimiento se basa, por un lado, en la identificación correcta de las formas de prevenir la transmisión sexual del VIH: el entrevistado afirma que el riesgo disminuye teniendo una sola pareja sexual fiel y no infectada, usando preservativo en cada relación sexual y reconociendo que un portador del VIH puede aparentar estar saludable. Por otro lado, cuando el individuo rechaza ideas erróneas con respecto a la transmisión del VIH: aquel que niega la transmisión del VIH a través de la picadura de insectos o vía oral (alimentos, utensilios alimentarios).

De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 18,6% de las personas de 15 a 29 años de edad identifican correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual del VIH y rechazan ideas erróneas de la transmisión de VIH. En Lima Metropolitana, el 24,3% conocen la forma de prevenir y rechazan ideas equivocadas de transmisión del VIH, este conocimiento equivale a 14,3% en la Sierra.


GRÁFICO N° 3.2
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD QUE CONOCEN LAS FORMAS DE PREVENIR Y RECHAZAN IDEAS ERRÓNEAS DE TRANSMISIÓN DEL VIH, SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2015
(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

La proporción de la población de 15 a 29 años de edad que conocen las formas de prevenir y rechazan ideas erróneas de transmisión del VIH alcanza menos del 30,0%. En Tumbes representa el 28,9%, Ica el 26,8%, Provincia Constitucional del Callao el 24,3% y Lima el 24,0%.

GRÁFICO N° 3.3
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD QUE CONOCEN LAS FORMAS DE PREVENIR Y
RECHAZAN IDEAS ERRÓNEAS DE TRANSMISIÓN DEL VIH, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2015
(Porcentaje)



() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ A partir del año 2014 se presenta el departamento de Lima de manera independiente de la Provincia Constitucional del Callao.

2/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

3/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


Prueba de VIH en los últimos 12 meses

Una mayor accesibilidad de ciertas poblaciones para realizarse la prueba de VIH, puede contribuir a la disminución de la incidencia de la infección por VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual, así como en la mejora en los comportamientos de riesgo.

El 19,9% de las personas de 15 a 49 años de edad, se realizaron la prueba de VIH en los últimos 12 meses. En la distribución por sexo, se aprecia que las mujeres (22,7%) se realizaron la prueba en mayor proporción que los hombres (16,9%).

Por región natural, en la Selva (22,8%) y en la Costa (sin Lima Metropolitana) (21,5%) mayor porcentaje de personas de 15 a 49 años de edad se realizaron la prueba de VIH. En comparación con la Sierra (16,2%).

GRÁFICO N° 3.4
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DE VIH EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2015
 (Porcentaje)




Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Prueba de VIH y conocimiento del resultado

Determinar el número de personas que se realizaron la prueba y conocen el resultado permite tener un parámetro para evaluar las intervenciones en salud pública que existen actualmente.

Del total de personas que se realizaron la prueba de VIH, el 93,0% conocieron los resultados del examen de laboratorio. Siendo las mujeres (93,2%) las que acudieron en mayor porcentaje a recoger resultados de la prueba, que los hombres (92,8%). Por región natural, la distribución de personas que conocen el resultado de la prueba de VIH oscila entre 91,1% en la Sierra y 94,9% en la Costa (sin Lima Metropolitana).


GRÁFICO N° 3.5
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DE VIH EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y CONOCIERON LOS RESULTADOS, SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2015
 (Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Según departamento, los mayores porcentajes de personas de 15 a 49 años de edad que se realizaron la prueba de VIH y conocieron los resultados residen en Loreto (97,3%), San Martín (96,1%), Ica (95,9%), Cajamarca y Tumbes (95,6% en ambos casos), La Libertad (95,4%) y Piura (95,1%), entre otros.

GRÁFICO N° 3.6
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DE VIH EN LOS ÚLTIMOS
12 MESES Y CONOCIERON LOS RESULTADOS, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2015
(Porcentaje)



1/ A partir del año 2014 se presenta el departamento de Lima de manera independiente de la Provincia Constitucional del Callao.

2/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

3/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


Primera relación sexual

La identificación y caracterización de mujeres de 15 a 49 años de edad que tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años, podrá orientar las intervenciones y los recursos, así como medir la efectividad de los mismos, logrando reducir la incidencia de infecciones como el VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

Según los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, la primera relación sexual antes de los 15 años de edad se presentó en un 8,2% de mujeres de 15 a 49 años de edad. Esto ocurre en mayor proporción en mujeres de 20 a 24 años (9,0%) seguido por el grupo de 25 a 49 años (8,1%) y de 15 a 19 años (7,9%).

Por región natural, la primera relación sexual ocurre más temprano en mujeres residentes en la Selva (19,7%) que en Lima Metropolitana (5,3%).

GRÁFICO N° 3.7
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE TUVIERON SU PRIMERA RELACIÓN SEXUAL ANTES DE
LOS 15 AÑOS DE EDAD, SEGÚN GRUPO DE EDAD Y REGIÓN NATURAL, 2015
(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


Uso condón en la última relación sexual

Entre las estrategias para la reducción de conductas sexuales de riesgo en la población se ha recomendado el uso del condón. La caracterización de los individuos que utilizan este método en la población permitirá delinear las intervenciones de salud pública orientadas a recomendar el uso del condón, así como para efectos programáticos de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de las ITS, VIH y SIDA (ESNITS).

En este sentido, el 12,9% de mujeres de 15 a 49 años de edad manifestaron haber usado condón en la última relación sexual en los últimos tres meses. En el área urbana, el porcentaje fue 14,6% y en el área rural 6,5%.

Por otro lado, en las mujeres con educación superior (17,8%) fue mayor en 11,6 puntos porcentuales el uso del condón en la última relación sexual que de aquellas que alcanzaron estudiar hasta primaria (6,2%).

GRÁFICO N° 3.8
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE USARON CONDÓN EN LA ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL EN
LOS ÚLTIMOS TRES MESES, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA Y NIVEL DE EDUCACIÓN, 2015
(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

