CAPÍTULO 11:

CONOCIMIENTO DE VIH E ITS

11.

CONOCIMIENTO DE VIH E ITS

En la mayoría de los países en desarrollo, las infecciones de transmisión sexual (ITS) ocupan el segundo lugar entre las causas de enfermedad de las mujeres en edad reproductiva, después de aquellas relacionadas con la maternidad. La prevención y el tratamiento de las ITS constituyen un mecanismo de intervención que mejora la salud pública, dado el grado de morbilidad y mortalidad que causan, y evita la transmisión del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

El comportamiento del VIH y del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en el Perú es el de una epidemia concentrada, así desde el primer caso diagnosticado de SIDA en el Perú en el año 1983 hasta diciembre de 2016, se han reportado 34 mil 795 casos de SIDA y 65 mil 657 casos notificados de VIH[1/] pero se estima que más de 100 mil personas estarían viviendo con el virus de inmunodeficiencia humana hasta el año 2040. La magnitud del problema, la rápida propagación del VIH/SIDA, la inexistencia de cura para la enfermedad y la relación entre ITS y VIH confirman la importancia de monitorear el conocimiento de la población sobre la transmisión, prevención y percepción de los riesgos.

El cuestionario individual de la ENDES 2016 sigue incluyendo una sección, con preguntas previamente evaluadas y mejoradas, para indagar sobre el conocimiento general de las mujeres acerca de las infecciones transmitidas sexualmente: conocimiento de las distintas infecciones, si han adquirido infecciones en los 12 meses anteriores a la entrevista y, en caso positivo, lugar y persona donde buscó tratamiento o consejo. Con relación al VIH/SIDA, se indagó sobre qué debe hacerse para evitar contraer el VIH, si una persona puede ser VIH-positiva aunque parezca saludable, y si cree que el VIH puede ser transmitido de la madre a la hija o hijo y en qué momento.

Igualmente se les pidió a las mujeres opinar sobre los derechos de las personas con VIH-positivo para participar en el mercado laboral o llevar una vida en comunidad. También se hicieron preguntas sobre la conducta sexual en los últimos 12 meses: número y tipo de parejas sexuales y uso del condón.

11.1 CONOCIMIENTO DE VIH/SIDA Y FORMAS DE EVITAR

A las mujeres entrevistadas se les preguntó si habían oído hablar de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana y del SIDA. A quienes respondieron afirmativamente, se indagó si había algo que una persona pueda hacer para evitar infectarse con el VIH. Se presenta el conocimiento de formas programáticas y específicas de evitar el virus, la percepción de la entrevistada sobre el riesgo de infección por el VIH y los aspectos sociales de la prevención y mitigación.

Conocimiento de VIH/SIDA

- Del total de mujeres entrevistadas en la Encuesta 2016, el 98,4% conoce o ha oído hablar del VIH/SIDA lo que implica una mejora de 1,8 puntos porcentuales, en relación con el año 2012 donde el porcentaje era de 96,6%. Este resultado corrobora que el acceso a la información ha mejorado con el tiempo y ha permitido que más mujeres estén informadas y tengan conocimiento sobre este tema.

1/ Ministerio de Salud: Dirección General de Epidemiología / Boletín Mensual Diciembre 2016

- En el año 2016, el 5,4% de mujeres entrevistadas manifestó que desconocía alguna forma de prevención de las dos formas consideradas de importancia programática para evitar el VIH. En el año 2012, este porcentaje fue 6,9%.

- Con respecto a los aspectos relacionados con el VIH/SIDA, aquellas entrevistadas sin nivel de educación (18,4%) y las que pertenecen al quintil inferior de riqueza (7,6%) constituyen el mayor porcentaje de mujeres.

- Según área de residencia, este porcentaje fue mayor en el área rural (6,2%), en comparación al área urbana (0,4%) y por región el mayor porcentaje de mujeres con desconocimiento sobre el VIH/SIDA se registró en Amazonas (6,5%), seguido por Cajamarca (6,0%), y Huánuco (5,2%).

- Sobre el conocimiento de las formas específicas de evitar el VIH, el 86,9% de las mujeres respondió "limitar el número de parejas sexuales o mutua fidelidad"; con relación al año 2012 se aprecia un incremento de 3,9 puntos porcentuales. Asimismo, el conocimiento sobre el uso del condón creció al pasar de 75,1%, en el año 2012 a 81,4% en el 2016.

GRÁFICO Nº 11.1
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE FORMAS ESPECÍFICAS PARA EVITAR EL VIH, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2016
(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar .

CUADRO Nº 11.1
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE FORMAS DE IMPORTANCIA PROGRAMÁTICA Y ESPECÍFICAS DE EVITAR EL VIH, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2016
(Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Total	No conoce VIH/SIDA	Conocimiento de dos formas de importancia programática de evitar el VIH			Conocimiento de dos formas específicas		Número de mujeres
			Ninguna de las dos formas 1/	Una forma	Dos formas	Usar condones	Limitar el número de parejas sexuales 2/	
Edad								
15-19	100,0	1,6	6,3	23,3	68,8	76,2	84,6	5 264
20-24	100,0	1,2	5,3	18,6	74,9	82,5	86,0	5 237
25-29	100,0	1,0	5,3	16,3	77,3	83,0	87,9	4 898
30-39	100,0	1,6	4,7	16,4	77,4	82,6	88,4	9 869
40-49	100,0	2,3	5,7	15,9	76,1	81,6	86,6	7 868
15-24	100,0	1,4	5,8	20,9	71,8	79,3	85,3	10 501
Estado conyugal								
Soltera	100,0	1,6	5,1	20,6	72,8	79,2	86,8	10 383
Ha tenido RS	100,0	1,1	4,6	16,9	77,3	84,2	87,4	5 091
Nunca ha tenido RS	100,0	2,1	5,5	24,0	68,4	74,4	86,3	5 292
Casada o Conviviente	100,0	1,8	5,6	16,3	76,4	82,2	86,8	19 034
Divorciada/Separada/Viuda	100,0	1,0	4,7	17,2	77,1	83,6	87,8	3 718
Nivel de educación								
Sin educación	100,0	18,4	19,6	24,1	37,9	47,0	52,9	578
Primaria	100,0	5,9	11,4	22,1	60,5	69,9	73,3	5 751
Secundaria	100,0	0,6	4,5	19,4	75,5	82,0	88,4	15 155
Superior	100,0	0,0	2,7	13,0	84,3	88,1	93,5	11 651
Quintil de riqueza								
Quintil inferior	100,0	7,6	12,0	21,7	58,6	67,4	71,5	5 426
Segundo quintil	100,0	0,9	6,3	19,5	73,2	80,6	85,5	6 553
Quintil intermedio	100,0	0,7	4,1	18,7	76,5	82,9	88,8	7 100
Cuarto quintil	100,0	0,1	3,2	15,4	81,1	86,7	91,3	6 943
Quintil superior	100,0	0,1	2,7	14,4	82,9	86,2	93,8	7 113
Total 2016	**100,0**	**1,6**	**5,4**	**17,7**	**75,3**	**81,4**	**86,9**	**33 135**
Total 2012	100,0	3,4	6,9	21,2	68,4	75,1	83,0	23 888

Nota: Las dos formas de importancia programática son: usar condones y limitar el número de parejas sexuales. Las respuestas provienen tanto de respuestas espontáneas como sondeos.
1/ Mujeres que no han oído hablar de VIH/SIDA o que no conocen las formas de importancia programática.
2/ Incluye ser mutuamente fiel.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO Nº 11.2
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE FORMAS DE IMPORTANCIA PROGRAMÁTICA Y ESPECÍFICAS DE EVITAR EL VIH, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2016
(Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Total	No conoce VIH/SIDA	Conocimiento de dos formas de importancia programática de evitar el VIH			Conocimiento de dos formas específicas		Número de mujeres
			Ninguna de las dos formas 1/	Una forma	Dos formas	Usar condones	Limitar el número de parejas sexuales 2/	
Área de residencia								
Urbana	100,0	0,4	3,9	17,1	78,6	84,2	90,0	26 353
Rural	100,0	6,2	10,9	20,3	62,7	70,7	74,9	6 782
Región natural								
Lima Metropolitana 3/	100,0	0,3	2,8	14,8	82,1	86,6	92,4	11 048
Resto Costa	100,0	0,7	5,2	18,9	75,2	81,6	87,7	8 664
Sierra	100,0	3,9	7,3	19,6	69,3	76,7	81,4	8 780
Selva	100,0	2,1	8,1	19,0	70,8	77,7	82,9	4 643
Región								
Amazonas	100,0	6,5	6,9	21,2	65,4	75,4	76,6	415
Áncash	100,0	4,6	6,3	17,3	71,8	78,1	82,8	1 155
Apurímac	100,0	3,4	4,8	19,0	72,8	77,1	87,5	481
Arequipa	100,0	0,3	2,4	21,0	76,3	84,3	89,2	1 395
Ayacucho	100,0	4,0	3,1	21,6	71,4	76,7	87,7	563
Cajamarca	100,0	6,0	12,7	16,4	64,9	72,3	73,9	1 653
Prov. Const. Del Callao	100,0	0,3	3,0	18,1	78,7	85,2	90,3	1 152
Cusco	100,0	2,9	4,0	21,1	71,9	78,6	86,4	1 299
Huancavelica	100,0	2,1	5,4	18,5	74,0	80,9	85,7	397
Huánuco	100,0	5,2	10,6	21,8	62,4	72,5	74,1	753
Ica	100,0	0,8	5,3	18,5	75,4	80,2	89,1	964
Junín	100,0	0,4	6,5	16,6	76,5	83,1	86,5	1 284
La Libertad	100,0	1,2	7,6	16,5	74,7	81,1	84,8	2 089
Lambayeque	100,0	1,4	6,4	19,6	72,5	77,2	87,4	1 316
Provincia de Lima 4/	100,0	0,4	2,8	14,4	82,5	86,8	92,6	9 896
Región Lima 5/	100,0	0,6	5,5	17,0	76,9	81,9	88,9	1 073
Loreto	100,0	2,9	9,2	18,6	69,3	75,8	81,4	1 178
Madre de Dios	100,0	0,9	7,2	24,6	67,3	79,2	80,0	150
Moquegua	100,0	0,6	5,6	19,4	74,5	82,8	85,5	197
Pasco	100,0	1,6	6,3	19,4	72,7	81,9	82,8	256
Piura	100,0	1,7	5,8	20,9	71,6	79,4	84,7	2 224
Puno	100,0	3,3	7,9	22,1	66,7	74,9	80,7	1 124
San Martín	100,0	0,1	6,3	20,3	73,3	79,2	87,5	915
Tacna	100,0	0,8	5,5	20,9	72,9	83,8	82,9	363
Tumbes	100,0	0,4	3,5	20,4	75,7	81,9	89,8	290
Ucayali	100,0	1,4	7,4	18,4	72,9	79,8	84,3	552
Lima 6/	100,0	0,4	3,0	14,6	82,0	86,3	92,3	10 970
Total 2016	**100,0**	**1,6**	**5,4**	**17,7**	**75,3**	**81,4**	**86,9**	**33 135**
Total 2012	100,0	3,4	6,9	21,2	68,4	75,1	83,0	23 888

Nota: Las dos formas de importancia programática son: usar condones y limitar el número de parejas sexuales. Las respuestas provienen tanto de respuestas espontáneas como sondeos.
1/ Mujeres que no han oído hablar de VIH/SIDA o que no conocen las formas de importancia programática.
2/ Incluye ser mutuamente fiel.
3/ Comprende la provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao
4/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.
5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
6/ Comprende la provincia de Lima y la Región Lima.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

11.2 CONOCIMIENTO DE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL VIH

A las mujeres entrevistadas se les hizo una serie de preguntas sobre asuntos relacionados con el VIH con el propósito de evaluar el grado de conocimiento sobre el tema. Específicamente se les preguntó si una persona que parece saludable puede ser VIH-positiva, si puede ser trasmitido de la madre a la hija o hijo y en qué momento.

Aspectos relacionados con el VIH

- El 80,3% de mujeres entrevistadas en el año 2016 manifestó que una persona que parece saludable pueda tener el VIH, incrementándose en 4,8 puntos porcentuales con respecto al año 2012 (75,5%). Por otro lado se constata la tendencia hacia una mejora entre las mujeres que respondieron "No sabe o no tiene información", al registrar un porcentaje menor en el año 2016 (6,0%) respecto al año 2012 (9,4%). En efecto en términos comparativos disminuyó en 3,4 puntos porcentuales. .

- Las mujeres que respondieron en mayor porcentaje acerca de que una persona que parece saludable pueda tener el VIH, fueron las que alcanzaron educación superior (92,1%) así como las ubicadas en el quintil superior de riqueza (92,0%). Por área de residencia, fue mayor en la urbana (85,0%) que en el área rural (62,5%).

- En 10 regiones, más del 80% de mujeres opinó que una persona que parece saludable puede tener el VIH, los cuales son: Provincia de Lima (88,9%), Provincia Constitucional del Callao (86,9%), Arequipa (86,1%), Ica (85,8%), Tumbes (84,0%), Ucayali (83,4%), Región Lima (82,8%), San Martin (82,2%), Moquegua (80,4%) y Junín (80,2%).

- Son muy preocupantes los datos obtenidos respecto a la transmisión vertical (madre a hija o hijo) del VIH. Al respecto, se constató que el 19,2% de mujeres no consideraron esta posibilidad.

- Entre las mujeres que identifican las formas de transmisión del VIH de madre a hija o hijo, un 69,6% mencionó que puede ocurrir durante el embarazo o parto, frente al 65,5% de esa respuesta en el 2012 y un 35,5% se refirió con la lactancia, frente a 37,6% del 2012.

CUADRO Nº 11.3
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON EL VIH Y TRANSMISIÓN DEL VIH DE LA MADRE A LA HIJA O HIJO, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2016
(Porcentaje)

Característica seleccionada	Una persona que parece saludable puede tener el VIH			El VIH se puede transmitir de la madre a la hija o hijo				Número de mujeres
	Si	No	No sabe / No conoce	No 1/	Durante el embarazo o parto	Durante la lactancia	No sabe 2/	
Edad								
15-19	78,4	16,8	4,8	20,7	66,0	34,4	1,6	5 264
20-24	82,6	12,5	4,9	17,5	71,1	39,8	1,2	5 237
25-29	82,7	12,6	4,7	17,5	72,3	38,3	1,0	4 898
30-39	81,5	12,6	5,9	18,5	71,2	35,4	1,6	9 869
40-49	77,2	14,4	8,4	21,3	67,4	31,6	2,3	7 868
15-24	80,5	14,7	4,8	19,1	68,6	37,1	1,4	10 501
Estado conyugal								
Soltera	82,6	13,0	4,4	17,3	71,6	35,7	1,6	10 383
Ha tenido RS	86,3	10,1	3,6	14,7	74,7	38,2	1,1	5 091
No ha tenido RS	79,1	15,7	5,2	19,8	68,7	33,3	2,1	5 292
Casada o Conviviente	78,6	14,4	7,0	20,7	68,0	35,6	1,8	19 034
Divorciada/Separada/Viuda	82,8	11,8	5,4	16,8	72,4	34,1	1,0	3 718
Nivel de educación								
Sin educación	38,5	29,0	32,5	62,0	22,1	21,2	18,4	578
Primaria	60,2	23,7	16,0	42,7	41,2	27,9	5,9	5 751
Secundaria	80,5	14,8	4,7	17,3	70,7	35,6	0,6	15 155
Superior	92,1	6,5	1,4	7,9	84,7	39,7	0,0	11 651
Quintil de riqueza								
Quintil inferior	58,6	24,3	17,2	41,9	42,0	30,5	7,6	5 426
Segundo quintil	76,4	17,3	6,2	22,6	63,7	34,9	0,9	6 553
Quintil intermedio	81,2	13,9	4,9	15,6	73,0	37,3	0,7	7 100
Cuarto quintil	88,3	9,0	2,7	11,1	79,6	35,7	0,1	6 943
Quintil superior	92,0	6,4	1,6	10,2	83,0	37,6	0,1	7 113
Total 2016	**80,3**	**13,7**	**6,0**	**19,2**	**69,6**	**35,5**	**1,6**	**33 135**
Total 2012	75,5	15,1	9,4	21,0	65,5	37,6	3,4	23 888

1/ Incluye las que respondieron no y no sabe acerca de la transmisión del VIH de la madre a la hija o hijo.
2/ No ha oído hablar de VIH/SIDA.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO Nº 11.4
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE ASUNTOS RELACIONADOS CON EL VIH Y TRANSMISIÓN DEL VIH DE LA MADRE A LA HIJA O HIJO, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2016
(Porcentaje)

Ámbito geográfico	Una persona que parece saludable puede tener el VIH			El VIH se puede transmitir de la madre a la hija o hijo				Número de mujeres
	Si	No	No sabe / No conoce	No 1/	Durante el embarazo o parto	Durante la lactancia	No sabe 2/	
Área de residencia								
Urbana	85,0	11,4	3,7	14,4	75,4	36,5	0,4	26 353
Rural	62,5	22,6	15,0	37,7	47,3	31,2	6,2	6 782
Región natural								
Lima Metropolitana 3/	88,7	8,9	2,4	11,7	79,0	38,7	0,3	11 048
Resto Costa	81,8	13,3	4,9	18,0	71,8	33,3	0,7	8 664
Sierra	70,5	18,4	11,0	28,9	57,8	32,2	3,9	8 780
Selva	76,3	16,7	7,0	21,0	65,7	37,8	2,1	4 643
Región								
Amazonas	64,1	23,4	12,5	24,9	64,1	34,5	6,5	415
Áncash	74,9	13,5	11,7	24,4	63,8	31,6	4,6	1 155
Apurímac	67,1	20,3	12,6	22,8	58,7	36,9	3,4	481
Arequipa	86,1	10,3	3,7	13,5	78,7	30,4	0,3	1 395
Ayacucho	70,8	14,4	14,8	31,9	51,3	34,3	4,0	563
Cajamarca	64,3	18,2	17,5	37,2	48,3	30,1	6,0	1 653
Prov. Const. Del Callao	86,9	10,8	2,2	12,1	77,6	36,1	0,3	1 152
Cusco	69,3	22,6	8,1	16,8	72,2	45,2	2,9	1 299
Huancavelica	67,8	25,6	6,6	23,0	50,8	51,0	2,1	397
Huánuco	70,3	18,2	11,5	27,1	56,6	33,6	5,2	753
Ica	85,8	9,3	4,9	11,7	75,3	38,7	0,8	964
Junín	80,2	16,0	3,8	19,8	69,4	32,8	0,4	1 284
La Libertad	78,7	12,5	8,8	28,7	61,7	28,2	1,2	2 089
Lambayeque	79,8	12,2	8,0	20,9	71,9	26,4	1,4	1 316
Provincia de Lima 4/	88,9	8,6	2,4	11,6	79,1	39,0	0,4	9 896
Región Lima 5/	82,8	12,8	4,4	17,9	69,8	36,6	0,6	1 073
Loreto	78,0	16,7	5,3	26,2	59,4	36,6	2,9	1 178
Madre de Dios	79,8	13,1	7,1	18,3	71,7	33,0	0,9	150
Moquegua	80,4	12,2	7,4	16,1	73,5	34,6	0,6	197
Pasco	75,3	19,6	5,1	23,2	67,0	27,6	1,6	256
Piura	76,6	19,3	4,1	20,6	69,4	33,4	1,7	2 224
Puno	65,6	25,0	9,4	40,0	48,9	22,8	3,3	1 124
San Martín	82,2	14,3	3,4	10,2	70,2	47,1	0,1	915
Tacna	77,3	14,7	8,0	16,5	73,2	31,4	0,8	363
Tumbes	84,0	12,2	3,7	18,9	65,0	45,0	0,4	290
Ucayali	83,4	11,3	5,3	19,1	71,4	37,7	1,4	552
Lima 6/	88,3	9,1	2,6	12,2	78,2	38,8	0,4	10 970
Total 2016	**80,3**	**13,7**	**6,0**	**19,2**	**69,6**	**35,5**	**1,6**	**33 135**
Total 2012	75,5	15,1	9,4	21,0	65,5	37,6	3,4	23 888

1/ Incluye las que respondieron no y no sabe acerca de la transmisión del VIH de la madre a la hija o hijo.
2/ No ha oído hablar de VIH/SIDA.
3/ Comprende la provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao
4/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.
5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
6/ Comprende la provincia de Lima y la Región Lima.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Aspectos sociales de la prevención del VIH

- Del total de mujeres entrevistadas que conoce del VIH/SIDA, cerca de dos tercios (64,5%) opinó que una maestra o maestro con VIH si puede seguir enseñando, sin embargo, aún una proporción importante de mujeres piensan lo contrario (31,4%).

- Las opiniones sobre si la persona VIH-positiva podría ser despedida de su trabajo fueron las siguientes: el 17,5% opinó que si puede ser despedida y 78,5% manifestó que "no".

- Si las mujeres entrevistadas estarían dispuestas a cuidar en el hogar a un pariente con el VIH: la respuesta afirmativa (sí lo harían), llega al 77,8% en el 2016.

- La respuesta "No sabe", a cada una de las tres preguntas mencionadas (menos del 5%), también debe llamar la atención por su relevancia en las acciones que se deben tomar para el futuro. El 4,1% de mujeres no sabía si a una maestra o maestro con VIH se le debe permitir o no continuar impartiendo clases en la escuela, colegio o universidad; igualmente, un 4,0% no sabía si una persona VIH-positiva podría ser despedida de su trabajo y un 4,1% no sabía si cuidaría en el hogar a un pariente que vive con el VIH.

- Se observa que la mayoría de mujeres con educación primaria (62,4%). opinaron que una maestra o maestro con VIH no debe continuar impartiendo clases en la escuela, colegio o universidad, seguidas de las mujeres que se ubican en el quintil inferior de riqueza (61,2%) y, con residencia rural (57,9%).

- El mayor porcentaje de mujeres que opinó que una persona con el VIH no puede ser despedida del trabajo, se encuentra especialmente entre las mujeres con educación superior (93,1%) las ubicadas en el quintil superior de riqueza (92,6%), con residencia urbana (85,4%); y según Región en la Provincia Constitucional del Callao (90,3%), Arequipa (87,9%). Ica (87,2%), Moquegua (84,0%), la Región Lima y Lambayeque (83,1% en cada una), Ucayali (82,6%) y Tumbes (82,4%).

- Asimismo, entre aquellas que manifestaron estarían dispuestas a cuidar a un pariente VIH-positivo en el hogar, mayor porcentaje se presentó en las mujeres solteras que han tenido relaciones sexuales (85,5%), seguidas de mujeres con educación superior (83,4%), y Por área de residencia, en la urbana (80,9%).

CUADRO Nº 11.5
PERÚ: MUJERES POR RESPUESTAS A PREGUNTAS SOBRE CIERTOS ASPECTOS SOCIALES DE LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL VIRUS, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2016
(Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Maestra/Maestro con VIH debe seguir enseñando			Persona VIH-positiva puede ser despedida del trabajo			Dispuesta a cuidar pariente con VIH en el hogar			Número de mujeres
	Sí	No	No sabe	Sí	No	No sabe	Sí	No	No sabe	
Edad										
15-19	61,0	35,1	3,8	16,3	80,3	3,4	78,4	17,3	4,3	5 264
20-24	67,6	29,2	3,2	14,8	82,1	3,0	80,3	16,5	3,2	5 237
25-29	66,7	28,7	4,6	15,8	80,8	3,4	75,3	20,7	4,0	4 898
30-39	65,2	30,6	4,2	17,7	78,0	4,2	76,5	19,2	4,3	9 869
40-49	62,4	33,2	4,4	20,7	74,1	5,2	78,7	16,7	4,6	7 868
15-24	64,3	32,2	3,5	15,6	81,2	3,2	79,3	16,9	3,8	10 501
Estado conyugal										
Soltera	70,6	26,0	3,4	12,1	84,7	3,2	83,9	12,5	3,6	10 383
Ha tenido RS	75,3	22,0	2,7	10,0	87,3	2,7	85,5	11,6	2,9	5 091
Nunca ha tenido RS	66,1	29,8	4,2	14,1	82,2	3,7	82,5	13,3	4,3	5 292
Casada o Conviviente	60,6	34,9	4,5	20,7	74,7	4,6	74,1	21,3	4,6	19 034
Divorciada/Separada/Viuda	67,2	29,0	3,8	15,9	81,0	3,1	79,4	17,4	3,2	3 718
Nivel de educación										
Sin educación	14,0	61,6	24,4	39,2	34,0	26,9	49,6	27,8	22,7	578
Primaria	28,5	62,4	9,2	40,7	48,4	11,0	65,5	26,9	7,6	5 751
Secundaria	65,2	31,5	3,3	17,0	80,4	2,6	79,1	17,7	3,2	15 155
Superior	83,7	14,6	1,7	5,6	93,1	1,3	83,4	13,9	2,7	11 651
Quintil de riqueza										
Quintil inferior	28,5	61,2	10,3	40,9	46,9	12,2	62,7	27,9	9,4	5 426
Segundo quintil	53,6	42,5	3,9	24,8	71,1	4,1	76,4	20,6	3,1	6 553
Quintil intermedio	68,8	27,6	3,6	12,6	84,6	2,8	81,3	15,1	3,6	7 100
Cuarto quintil	78,4	19,4	2,1	8,6	89,5	1,9	81,9	15,2	2,9	6 943
Quintil superior	83,9	14,1	2,0	6,4	92,6	1,0	83,0	14,2	2,9	7 113
Total 2016	**64,5**	**31,4**	**4,1**	**17,5**	**78,5**	**4,0**	**77,8**	**18,1**	**4,1**	**33 135**
Total 2012	58,0	35,4	6,6	20,7	72,7	6,6	72,1	20,6	7,2	24 212

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO Nº 11.6
PERÚ: MUJERES POR RESPUESTAS A PREGUNTAS SOBRE CIERTOS ASPECTOS SOCIALES DE LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL VIRUS, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2016
(Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Maestra/Maestro con VIH debe seguir enseñando			Persona VIH-positiva puede ser despedida del trabajo			Dispuesta a cuidar pariente con VIH en el hogar			Número de mujeres
	Sí	No	No sabe	Sí	No	No sabe	Sí	No	No sabe	
Área de residencia										
Urbana	72,5	24,6	2,9	12,3	85,4	2,3	80,9	16,0	3,1	26 353
Rural	33,3	57,9	8,8	37,7	51,7	10,6	65,6	26,4	8,0	6 782
Región natural										
Lima Metropolitana 1/	78,9	18,7	2,4	9,3	89,4	1,4	81,7	15,2	3,1	11 048
Resto Costa	66,9	29,7	3,4	13,5	83,1	3,4	80,0	16,1	3,9	8 664
Sierra	48,4	45,1	6,5	28,7	63,7	7,6	71,5	22,8	5,7	8 780
Selva	55,9	39,1	4,9	23,2	72,1	4,7	76,1	19,8	4,1	4 643
Región										
Amazonas	44,9	45,4	9,7	28,1	61,6	10,3	72,9	18,5	8,6	415
Áncash	56,2	36,6	7,2	22,6	69,9	7,5	73,2	19,3	7,5	1 155
Apurímac	42,1	53,0	4,9	40,5	53,1	6,5	68,9	26,7	4,4	481
Arequipa	71,8	25,4	2,8	9,7	87,9	2,4	83,7	14,2	2,2	1 395
Ayacucho	45,9	43,7	10,3	30,8	60,2	9,0	72,1	21,0	6,9	563
Cajamarca	40,1	50,4	9,5	29,5	57,6	12,9	72,0	19,0	9,0	1 653
Prov. Const. Del Callao	77,9	20,6	1,5	8,3	90,3	1,3	79,8	16,9	3,4	1 152
Cusco	50,8	44,5	4,7	29,9	65,0	5,1	69,3	27,0	3,7	1 299
Huancavelica	33,3	63,9	2,7	48,3	47,3	4,4	68,4	29,1	2,5	397
Huánuco	46,5	45,7	7,8	33,6	58,1	8,3	69,1	23,0	7,9	753
Ica	72,1	24,6	3,3	9,5	87,2	3,3	72,7	21,9	5,4	964
Junín	60,3	36,6	3,2	23,1	75,2	1,7	79,9	17,6	2,5	1 284
La Libertad	60,9	33,6	5,5	18,4	75,9	5,8	81,3	14,7	4,0	2 089
Lambayeque	68,0	27,8	4,2	11,5	83,1	5,4	77,3	17,3	5,4	1 316
Provincia de Lima 2/	79,0	18,4	2,5	9,4	89,2	1,4	81,9	15,0	3,1	9 896
Región Lima 3/	67,3	29,4	3,2	14,2	83,1	2,7	79,3	17,1	3,6	1 073
Loreto	57,0	38,4	4,6	21,2	74,9	3,9	73,6	22,2	4,2	1 178
Madre de Dios	57,8	35,7	6,4	17,0	75,5	7,5	77,2	18,6	4,2	150
Moquegua	69,6	27,3	3,1	12,7	84,0	3,2	79,8	15,5	4,7	197
Pasco	54,6	42,6	2,8	25,8	70,8	3,3	75,4	20,7	3,9	256
Piura	57,7	38,6	3,7	16,7	79,6	3,8	80,1	16,3	3,6	2 224
Puno	45,7	50,3	4,0	28,9	63,4	7,7	61,7	33,3	4,9	1 124
San Martín	53,3	43,4	3,3	26,5	71,2	2,4	81,5	16,1	2,3	915
Tacna	69,7	25,6	4,7	17,6	79,4	3,0	78,3	17,3	4,4	363
Tumbes	69,9	25,9	4,2	14,0	82,4	3,6	80,7	16,0	3,2	290
Ucayali	72,8	23,3	4,0	14,5	82,6	2,9	79,5	17,7	2,8	552
Lima 4/	77,9	19,5	2,6	9,9	88,6	1,5	81,7	15,2	3,1	10 970
Total 2016	**64,5**	**31,4**	**4,1**	**17,5**	**78,5**	**4,0**	**77,8**	**18,1**	**4,1**	**33 135**
Total 2012	58,0	35,4	6,6	20,7	72,7	6,6	72,1	20,6	7,2	24 212

1/ Comprende la provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao
2/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.
3/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
4/ Comprende la provincia de Lima y la Región Lima.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

11.3 CONOCIMIENTO DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

Los programas de control de VIH reconocen, en la actualidad, la importancia de controlar las ITS para reducir la transmisión del virus. Se reconoce que entre los esfuerzos necesarios, uno de los más importantes es la educación para que la población reconozca los síntomas de las ITS. Asimismo, poco se sabe sobre cómo las personas perciben y responden a las ITS. Por esta razón en la Encuesta 2016, se preguntó a las entrevistadas si habían oído hablar de otras enfermedades que se pueden transmitir a través de las relaciones sexuales; cuáles enfermedades conocía; y que síntomas y signos pueden hacer parecer que una mujer o un hombre tenga una infección de transmisión sexual.

Conocimiento de las ITS

- El 72,7% de mujeres entrevistadas en la encuesta 2016, conoce sobre las ITS, pero si se considera que el 27,3% de entrevistadas declaró desconocerlas, entonces se debe reconocer que existe un grave problema de salud, pues implica un riesgo potencial de adquirirlas y esto incluye la posibilidad de padecer secuelas y complicaciones importantes de no atenderlas a tiempo, así como las importantes implicancias económicas y sociales que eso representa

- El mayor desconocimiento de las ITS se presentó entre las mujeres sin nivel de educación (72,9%), así como en las mujeres ubicadas en el quintil inferior (59,4%). Por área de residencia, fue mayor en el área rural (56,2%) y por regiones, Cajamarca (61,8%), Apurímac (59,6%), Pasco (54,4%), Puno (54.0%), Amazonas (50,9%), Ayacucho (50,2%).

GRÁFICO N° 11.2
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y SUS SÍNTOMAS, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2016
(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

- Un 23,1% de las mujeres entrevistadas no conocía síntomas de las ITS, lo que revela que no se avanzó mucho desde el 2012 (22,0%), un 18,6% conocía un síntoma y 31,0% dos o más síntomas. Estos porcentajes significan que una gran mayoría de mujeres no sabría identificar una ITS con el consiguiente riesgo de transmitirla a otras personas, no recibir un tratamiento oportuno y padecer secuelas o complicaciones a futuro.

- Respecto a ITS específicas, la más conocida por las mujeres que conocen alguna ITS, sigue siendo la sífilis (39,5%), le sigue la gonorrea (35,5%) hubo una disminución en comparación al 2012 (42,3%) y (39,4%) respectivamente. Por el contrario, hubo un aumento en el porcentaje de mujeres que conocen las verrugas genitales/condiloma (de 4,1% en el año 2012 a 5,2% en el año 2016).

- La sífilis fue la enfermedad más reconocida por las mujeres con nivel de educación superior (54,2%) y el quintil superior de riqueza (50,9%). Por área de residencia fue mayor en la urbana (42,1%) y, por Región la mitad o algo más de mujeres de Ucayali (50,4%), así mismo menos de la mitad de mujeres conocen la sífilis en la Provincia de Lima (45,4%), Ica (44,2%), Junín (43,4%) la Provincia Constitucional del Callao (43,0%), Pasco (42,6%), Moquegua (42,3%) y Ancash (40,3%).

- La gonorrea fue más conocida en mujeres con educación superior (48,1%), en las ubicadas en el quintil superior de bienestar (44,1%) y las solteras que han tenido relaciones sexuales (43,1%). Por área de residencia fue mayor en la urbana (37,2%) y por región, en Ucayali (70,2%), Loreto (60,6%) y San Martín (56,4%).

CUADRO Nº 11.7
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS ESPECÍFICOS DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y MUJERES QUE CONOCEN ITS ESPECÍFICAS, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2016
(Porcentaje)

Característica seleccionada	Total	No conoce sobre las ITS	Síntomas específicos de las ITS			Número de mujeres	Conoce ITS específicas						Número de mujeres que conocen síntomas
			No conoce síntomas de ITS	Conoce un síntoma	Conoce dos o más síntomas		Sífilis	Gonorrea	Verrugas genitales/ Condiloma	Chancro	Herpes	Otras ITS 1/	
Edad													
15-19	100,0	35,2	30,0	16,4	18,3	5 264	22,7	29,3	5,9	9,2	15,8	14,8	3 410
20-24	100,0	27,8	21,7	19,0	31,5	5 237	38,7	37,8	5,6	13,1	18,2	22,0	3 782
25-29	100,0	23,1	22,3	18,3	36,3	4 898	46,0	39,7	4,6	18,1	14,4	21,0	3 766
30-39	100,0	24,2	21,4	19,8	34,5	9 869	45,8	37,9	4,7	19,2	11,4	22,6	7 481
40-49	100,0	28,4	21,8	18,6	31,2	7 868	37,6	31,8	5,6	16,6	7,2	23,3	5 634
15-24	100,0	31,5	25,9	17,7	24,9	10 501	31,1	33,8	5,8	11,3	17,1	18,6	7 192
Estado conyugal													
Soltera	100,0	26,0	25,0	19,8	29,2	10 383	35,1	38,9	6,0	14,1	18,7	20,7	7 685
Ha tenido RS	100,0	18,3	21,4	22,5	37,9	5 091	41,4	43,1	6,8	16,8	18,6	25,1	4 161
Nunca ha tenido RS	100,0	33,4	28,4	17,3	20,9	5 292	27,6	33,9	5,2	11,0	18,9	15,6	3 524
Casada o Conviviente	100,0	29,1	22,2	17,9	30,8	19 034	41,6	33,6	4,9	16,6	9,4	21,0	13 495
Divorciada/Separada/Viuda	100,0	22,1	22,0	19,2	36,6	3 718	41,5	35,6	4,6	18,7	10,9	24,0	2 895
Nivel de educación													
Sin educación	100,0	72,9	15,6	6,0	5,4	578	1,7	7,6	2,4	5,4	0,4	10,0	156
Primaria	100,0	57,4	22,1	8,5	12,0	5 751	9,9	15,8	2,4	9,9	1,9	13,6	2 449
Secundaria	100,0	28,8	28,0	17,9	25,3	15 155	32,2	28,0	5,0	13,0	9,9	20,1	10 790
Superior	100,0	8,4	17,5	25,2	48,9	11 651	54,2	48,1	6,1	20,7	17,9	24,5	10 678
Quintil de riqueza													
Quintil inferior	100,0	59,4	20,5	9,3	10,8	5 426	16,0	23,4	1,2	12,6	2,4	12,5	2 205
Segundo quintil	100,0	36,0	25,4	15,7	22,9	6 553	29,5	30,0	4,1	16,1	6,8	16,8	4 191
Quintil intermedio	100,0	25,4	25,8	20,0	28,7	7 100	38,1	32,3	4,7	17,0	10,1	20,2	5 295
Cuarto quintil	100,0	15,7	23,8	20,8	39,8	6 943	44,2	37,4	6,3	15,7	15,2	22,5	5 855
Quintil superior	100,0	8,2	19,4	25,0	47,4	7 113	50,9	44,1	6,6	16,7	19,4	27,0	6 528
Total 2016	**100,0**	**27,3**	**23,1**	**18,6**	**31,0**	**33 135**	**39,5**	**35,5**	**5,2**	**16,0**	**12,6**	**21,3**	**24 074**
Total 2012	100,0	36,6	22,0	14,8	26,6	23 888	42,3	39,4	4,1	21,1	11,0	10,0	15 145

1/ A partir del año 2010, se excluye Herpes.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO Nº 11.8
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS ESPECÍFICOS DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y MUJERES QUE CONOCEN ITS ESPECÍFICAS, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2016
(Porcentaje)

Ámbito geográfico	Total	No conoce sobre las ITS	Síntomas específicos de las ITS			Número de mujeres	Conoce ITS específicas						Número de mujeres que conocen síntomas
			No conoce síntomas de ITS	Conoce un síntoma	Conoce dos o más síntomas		Sífilis	Gonorrea	Verrugas genitales/ Condiloma	Chancro	Herpes	Otras ITS 1/	
Área de residencia													
Urbana	100,0	19,9	23,7	20,9	35,5	26 353	42,1	37,2	5,7	16,3	13,7	22,2	21 104
Rural	100,0	56,2	20,8	9,9	13,1	6 782	21,0	23,4	2,0	14,0	4,2	14,7	2 970
Región natural													
Lima Metropolitana 2/	100,0	14,7	20,9	22,7	41,7	11 048	45,2	36,5	7,0	15,8	16,3	27,7	9 426
Resto Costa	100,0	26,0	27,2	19,2	27,6	8 664	36,0	31,6	4,9	10,6	11,5	17,3	6 414
Sierra	100,0	44,8	22,6	13,6	19,1	8 780	32,9	26,7	3,5	18,8	10,2	17,4	4 847
Selva	100,0	27,1	21,6	17,3	34,0	4 643	39,8	53,0	3,1	23,0	7,7	16,7	3 386
Región													
Amazonas	100,0	50,9	20,2	11,5	17,3	415	35,3	33,7	5,5	30,7	7,4	10,3	204
Áncash	100,0	41,8	19,0	14,5	24,6	1 155	40,3	28,7	9,2	10,6	13,6	11,6	672
Apurímac	100,0	59,6	13,5	12,4	14,6	481	33,8	23,7	2,6	22,6	5,7	31,8	194
Arequipa	100,0	14,9	25,6	20,3	39,2	1 395	36,2	32,3	2,8	16,2	16,4	21,3	1 187
Ayacucho	100,0	50,2	18,3	14,6	16,8	563	37,6	30,0	3,5	27,3	9,7	20,2	280
Cajamarca	100,0	61,8	17,7	8,8	11,7	1 653	32,1	30,5	4,3	15,9	10,1	9,8	632
Prov. Const. Del Callao	100,0	22,2	23,1	18,1	36,7	1 152	43,0	34,0	5,4	11,4	14,1	28,1	896
Cusco	100,0	31,5	24,3	18,3	25,9	1 299	37,4	29,3	2,2	24,1	10,8	19,8	890
Huancavelica	100,0	48,3	21,1	13,6	17,0	397	19,7	17,0	3,2	17,7	4,2	4,0	205
Huánuco	100,0	39,0	27,1	14,6	19,4	753	36,2	30,6	5,2	19,8	7,7	22,2	460
Ica	100,0	19,8	26,0	19,8	34,4	964	44,2	36,8	6,7	14,1	11,3	21,0	773
Junín	100,0	33,9	24,7	21,2	20,2	1 284	43,4	35,7	4,2	32,4	13,0	19,6	849
La Libertad	100,0	21,8	42,1	16,1	20,1	2 089	28,8	26,5	3,3	7,2	8,6	15,7	1 635
Lambayeque	100,0	33,5	30,0	16,0	20,5	1 316	34,4	32,6	4,5	11,1	10,1	16,6	875
Provincia de Lima 3/	100,0	13,8	20,6	23,3	42,3	9 896	45,4	36,7	7,2	16,3	16,5	27,7	8 530
Región Lima 4/	100,0	22,6	23,7	21,9	31,8	1 073	36,8	28,7	6,1	11,7	12,2	20,8	831
Loreto	100,0	25,6	27,0	18,8	28,6	1 178	38,0	60,6	1,5	19,5	5,6	16,4	876
Madre de Dios	100,0	27,5	25,3	19,0	28,2	150	35,5	34,4	4,2	24,0	7,1	15,2	109
Moquegua	100,0	22,3	26,3	17,8	33,5	197	42,3	30,8	2,9	14,5	12,0	16,4	153
Pasco	100,0	54,4	12,3	12,3	20,9	256	42,6	36,9	4,1	22,8	10,9	16,8	117
Piura	100,0	37,9	17,7	17,8	26,6	2 224	32,1	30,5	4,0	8,2	10,8	15,8	1 382
Puno	100,0	54,0	24,7	8,8	12,5	1 124	26,8	23,5	4,2	16,6	6,6	17,6	517
San Martín	100,0	6,4	13,2	19,4	61,0	915	34,5	56,4	2,7	20,7	7,2	17,8	857
Tacna	100,0	21,0	27,1	25,7	26,1	363	36,1	32,3	2,9	10,7	12,5	16,8	287
Tumbes	100,0	30,6	26,7	20,5	22,2	290	39,5	32,4	3,9	13,7	8,6	11,1	201
Ucayali	100,0	15,9	20,3	15,4	48,4	552	50,4	70,2	3,9	22,7	7,6	12,5	464
Lima 5/	100,0	14,7	20,9	23,1	41,3	10 970	44,6	36,0	7,1	15,9	16,1	27,1	9 361
Total 2016	**100,0**	**27,3**	**23,1**	**18,6**	**31,0**	**33 135**	**39,5**	**35,5**	**5,2**	**16,0**	**12,6**	**21,3**	**24 074**
Total 2012	100,0	36,6	22,0	14,8	26,6	23 888	42,3	39,4	4,1	21,1	11,0	10,0	15 145

1/ A partir del año 2010, se excluye Herpes.
2/ Comprende la provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao
3/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.
4/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
5/ Comprende la provincia de Lima y la Región Lima.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Síntomas y signos de las ITS

- En cuanto a los síntomas y signos específicos de las ITS, de los cuales tenían conocimiento las mujeres entrevistadas, están el enrojecimiento/picazón en genitales (29,2%), seguido de úlceras/llagas genitales (20,4%), inflamación o hinchazón en genitales (17,0%), secreción mal oliente (15,4%), pérdida de peso (14,7%) y secreción por genital (14,6%).

- En relación al enrojecimiento/picazón en genitales, el mayor porcentaje fue mencionado por las mujeres con educación superior (36,3%), las ubicadas en el quintil superior de riqueza (34,8%), según el estado conyugal en las divorciadas, separadas, viudas (33,2%) y en porcentaje similar, en las solteras con relaciones sexuales (32,7%). Por área de residencia, fue más alto el porcentaje en el área urbana (30,5%) y por Región, en San Martín (48,6%), Provincia Constitucional del Callao (34,6%), Apurímac (32,4%), Ucayali (31,9%), Ancash (31,4%), Piura (30,6%), Ica (30,4%).

- Las úlceras/llagas genitales fueron referidas en mayor porcentaje por las mujeres solteras con relaciones sexuales (25,4%), las que alcanzaron educación superior (28,1%) y las ubicadas en el quintil superior de riqueza (28,6%). Por área de residencia, en el área urbana (21,9%) y por Región, en la Provincia Constitucional del Callao (27,7%), Pasco (26,3%), Provincia de Lima (25,7%), Región Lima (24,0%), Lambayeque (23,4%), Piura (22,0%), Arequipa (21,8%), Ica (21,6%), San Martin y Tumbes (20,4% cada uno).

- La inflamación o hinchazón en genitales fue manifestada en mayor porcentaje por mujeres con educación superior (20,2%) y ubicadas en el quintil superior de riqueza (19,6%). Por área de residencia en el área urbana (17,6%) y por región en San Martín (46,5%), Ucayali (21,0%), Piura (20,0%).

- Aunque no se especifica cuáles son, 19,0% de las mujeres con conocimiento de las ITS refirió que identifican “otros síntomas”.

- Llama la atención que un síntoma evidente como es la secreción o pus por el pene solo fue reconocido por un 3,6% de mujeres para el año 2016, porcentaje que continúa disminuyendo (el 2009 fue de 6,8% y el 2012 4,8%). Las verrugas genitales fueron identificadas como probable ITS por solo el 13,7% de mujeres entrevistadas.

CUADRO Nº 11.9
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS Y SIGNOS ESPECÍFICOS DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS), SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2016
(Porcentaje)

Característica seleccionada	Síntomas y signos de las infecciones de transmisión sexual (ITS)														Número de mujeres
	Dolor abdominal	Secreción por genital 1/	Secreción mal oliente	Molestia al orinar	Enrojecimiento/ Picazón en genitales	Inflamación o hinchazón en genitales	Úlceras/ Llagas genitales	Verrugas genitales	Sangre en la orina	Pérdida de peso	Puede no haber síntomas	Impotencia / Infertilidad	Secreción o pus por el pene	Otros síntomas	
Grupo de edad															
15-19	6,1	6,3	7,5	8,6	18,9	10,3	17,3	11,2	2,8	12,0	0,9	0,4	1,8	18,2	3 410
20-24	6,6	13,5	14,8	10,0	30,7	20,4	21,0	16,5	2,8	14,8	1,3	0,7	3,7	20,3	3 782
25-29	6,9	14,7	17,8	11,6	30,8	17,2	22,9	15,8	3,3	14,6	1,6	0,5	4,5	19,4	3 766
30-39	6,1	17,1	17,2	10,8	31,4	16,8	22,2	13,8	2,1	16,3	1,5	0,4	3,7	19,7	7 481
40-49	7,9	16,8	16,4	9,6	30,6	19,0	17,9	11,9	1,3	14,5	1,7	0,6	3,8	17,4	5 634
15-24	6,4	10,1	11,3	9,3	25,1	15,7	19,2	13,9	2,8	13,5	1,1	0,6	2,8	19,3	7 192
Estado conyugal															
Soltera	6,2	11,1	13,2	9,3	26,7	15,3	21,9	15,4	3,1	15,4	1,6	0,3	3,0	20,5	7 685
Ha tenido RS	7,1	15,0	16,7	10,2	32,7	19,1	25,4	18,7	2,8	15,1	1,6	0,3	4,2	19,8	4 161
Nunca ha tenido RS	5,0	6,5	9,0	8,2	19,6	10,8	17,9	11,6	3,3	15,7	1,6	0,3	1,6	21,4	3 524
Casada o Conviviente	7,0	15,9	15,8	10,6	29,8	17,7	19,7	13,1	1,9	14,3	1,3	0,6	3,9	18,5	13 495
Divorciada/Separada/Viuda	6,7	17,7	19,1	10,7	33,2	18,4	20,0	12,1	2,3	15,4	1,6	0,6	3,5	17,2	2 895
Nivel de educación															
Sin educación	9,1	9,2	8,2	3,2	14,0	9,8	9,6	0,6	0,8	8,0	0,5	0,0	3,7	12,3	156
Primaria	7,3	10,7	8,1	9,7	20,3	14,8	6,8	4,1	0,9	9,2	0,8	0,3	3,8	12,2	2 449
Secundaria	6,2	10,8	11,9	8,6	24,5	14,5	16,1	10,9	2,1	13,6	1,2	0,6	2,6	18,0	10 790
Superior	7,0	19,3	20,6	12,0	36,3	20,2	28,1	18,9	2,9	17,3	1,9	0,5	4,5	21,7	10 678
Quintil de riqueza															
Quintil inferior	7,9	9,7	8,3	9,6	17,6	12,8	8,6	4,4	0,8	10,4	1,0	0,1	4,1	11,4	2 205
Segundo quintil	7,2	12,8	13,0	11,1	24,0	14,1	13,5	8,5	1,9	14,3	1,1	0,7	4,4	17,1	4 191
Quintil intermedio	6,6	12,7	13,5	9,7	26,6	16,7	17,4	11,3	2,4	16,1	1,4	0,4	3,0	20,8	5 295
Cuarto quintil	5,5	16,1	16,2	9,2	33,5	18,2	23,4	16,3	3,1	15,5	1,9	0,7	3,4	18,9	5 855
Quintil superior	7,2	17,5	20,1	11,2	34,8	19,6	28,6	19,7	2,3	14,8	1,5	0,4	3,5	21,5	6 528
Total 2016	**6,7**	**14,6**	**15,4**	**10,2**	**29,2**	**17,0**	**20,4**	**13,7**	**2,3**	**14,7**	**1,4**	**0,5**	**3,6**	**19,0**	**24 074**
Total 2012	4,7	14,9	15,6	11,6	30,5	18,9	21,0	8,7	2,1	14,5	1,4	0,5	4,8	18,6	15 145

1/ A partir del año 2004 en la variable secreción por genital incluye secreción de flujo por la vagina y secreción/goteos en genitales.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO Nº 11.10
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO DE SÍNTOMAS Y SIGNOS ESPECÍFICOS DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS), SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2016
(Porcentaje)

Ámbito geográfico	Síntomas y signos de las infecciones de transmisión sexual (ITS)														Número de mujeres
	Dolor abdominal	Secreción por genital 1/	Secreción mal oliente	Molestia al orinar	Enrojecimiento/ Picazón en genitales	Inflamación o hinchazón en genitales	Úlceras/ Llagas genitales	Verrugas genitales	Sangre en la orina	Pérdida de peso	Puede no haber síntomas	Impotencia / Infertilidad	Secreción o pus por el pene	Otros síntomas	
Área de residencia															
Urbana	6,5	15,1	16,2	10,4	30,5	17,6	21,9	14,8	2,4	15,1	1,5	0,6	3,7	20,0	21 104
Rural	8,3	10,8	9,5	9,2	20,4	13,0	9,9	5,7	1,6	12,6	1,0	0,2	2,9	12,3	2 970
Región natural															
Lima Metropolitana 2/	6,5	14,9	16,7	9,5	35,0	18,7	25,9	18,9	2,6	15,0	1,4	0,5	2,9	23,4	9 426
Resto Costa	5,3	13,2	12,3	9,2	25,2	15,5	19,5	12,4	2,5	14,4	1,2	0,5	2,4	19,1	6 414
Sierra	7,2	12,1	14,8	9,8	22,8	11,9	14,0	9,9	1,8	15,1	1,7	0,6	1,7	13,3	4 847
Selva	9,2	19,8	18,4	14,9	30,3	22,7	16,0	7,2	1,6	14,3	1,4	0,4	10,1	15,0	3 386
Región															
Amazonas	9,9	16,0	13,7	8,0	18,7	14,7	17,1	7,3	2,2	12,9	1,3	0,4	4,1	15,9	204
Áncash	7,4	16,0	13,3	11,3	31,4	11,8	16,5	16,7	5,1	13,9	0,5	0,8	3,1	14,3	672
Apurímac	8,5	11,2	16,2	13,1	32,4	9,7	11,6	4,0	1,2	14,9	0,2	1,1	0,7	13,9	194
Arequipa	4,3	14,8	23,3	12,6	28,6	18,9	21,8	14,8	1,8	13,6	3,0	0,7	0,8	12,5	1 187
Ayacucho	6,5	10,8	14,0	8,7	24,1	11,7	16,3	7,2	0,7	15,1	3,4	0,5	1,3	16,5	280
Cajamarca	8,1	10,6	11,4	9,5	25,8	14,0	10,5	5,6	2,2	14,6	0,2	0,5	1,5	10,4	632
Prov. Const. Del Callao	4,5	13,1	17,4	11,0	34,6	19,9	27,7	17,9	2,4	12,6	0,8	0,5	4,8	20,3	896
Cusco	7,6	11,1	14,6	10,7	27,0	10,6	17,9	13,9	2,5	16,1	2,0	0,6	2,3	15,0	890
Huancavelica	18,4	14,5	11,0	8,6	18,5	8,6	7,2	7,1	2,7	19,4	1,1	0,8	1,7	16,3	205
Huánuco	6,6	15,0	13,2	5,3	17,9	11,6	13,1	9,4	1,4	12,9	0,7	0,1	1,7	4,7	460
Ica	4,6	14,4	17,3	12,9	30,4	19,1	21,6	17,3	2,3	10,7	3,0	0,3	4,0	12,5	773
Junín	9,4	8,2	9,8	7,3	18,6	10,2	12,4	8,4	2,3	25,2	2,0	0,2	3,1	19,9	849
La Libertad	3,8	4,7	11,8	8,1	15,2	9,1	10,9	9,0	2,2	12,1	0,3	0,0	0,7	11,1	1 635
Lambayeque	4,2	8,7	10,6	4,3	20,3	12,8	23,4	10,1	1,5	14,1	0,1	0,2	3,0	17,5	875
Provincia de Lima 3/	6,7	15,1	16,6	9,3	35,0	18,5	25,7	19,0	2,7	15,3	1,5	0,5	2,7	23,7	8 530
Región Lima 4/	6,0	16,5	12,4	9,5	25,9	17,7	24,0	17,7	2,2	16,7	0,7	1,0	3,2	24,0	831
Loreto	8,9	22,6	16,2	14,9	23,2	15,5	12,3	4,8	1,4	12,1	0,6	0,2	15,0	18,3	876
Madre de Dios	8,7	17,5	12,9	13,5	22,0	8,6	14,0	10,8	2,0	15,6	2,9	1,9	1,4	4,1	109
Moquegua	8,7	20,1	18,7	10,9	25,2	15,5	15,3	10,4	1,2	12,7	3,1	0,5	0,6	17,5	153
Pasco	5,4	17,3	9,9	11,8	26,5	19,7	26,3	10,9	3,0	17,9	0,3	0,3	1,4	14,7	117
Piura	7,6	19,5	7,9	9,0	30,6	20,0	22,0	9,3	2,6	17,7	1,6	1,1	2,6	33,9	1 382
Puno	6,3	13,7	16,8	12,2	13,2	5,8	7,9	4,9	1,0	10,6	1,2	0,8	2,4	4,1	517
San Martín	7,9	21,3	22,6	16,4	48,6	46,5	20,4	5,9	1,6	11,6	2,6	0,6	12,5	17,1	857
Tacna	3,0	14,0	9,9	9,5	27,9	11,1	12,3	12,5	1,7	12,3	5,5	0,3	1,5	18,6	287
Tumbes	3,1	14,2	11,1	5,3	17,9	15,2	20,4	6,9	0,9	20,0	0,7	0,1	2,1	10,7	201
Ucayali	14,5	30,4	30,2	27,9	31,9	21,0	15,2	9,6	1,8	12,1	0,6	0,7	16,4	11,1	464
Lima 5/	6,7	15,3	16,2	9,3	34,2	18,5	25,6	18,9	2,6	15,4	1,4	0,5	2,8	23,7	9 361
Total 2016	**6,7**	**14,6**	**15,4**	**10,2**	**29,2**	**17,0**	**20,4**	**13,7**	**2,3**	**14,7**	**1,4**	**0,5**	**3,6**	**19,0**	**24 074**
Total 2012	4,7	14,9	15,6	11,6	30,5	18,9	21,0	8,7	2,1	14,5	1,4	0,5	4,8	18,6	15 145

1/ A partir del año 2004 en la variable secreción por genital incluye secreción de flujo por la vagina y secreción/goteos en genitales.
2/ Comprende la provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao
3/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.
4/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
5/ Comprende la provincia de Lima y la Región Lima.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

11.4 PREVALENCIA DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

A las mujeres entrevistadas se les hizo una serie de preguntas para disponer de información que facilite la estimación de la prevalencia de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). En particular, a cada mujer entrevistada se le preguntó si en los 12 meses anteriores a la entrevista le diagnosticaron alguna infección de transmisión sexual, si había tenido algún flujo o secreción genital, si había tenido llaga o úlceras en sus genitales. Y a las que tuvieron alguno de esos problemas se les preguntó a quién acudió en búsqueda de consejo o tratamiento.

Prevalencia de Infecciones de Transmisión Sexual

- Entre las mujeres entrevistadas que respondieron haber mantenido relaciones sexuales, un 0,6% informó haber tenido una ITS y/o síntomas asociados, en los 12 meses anteriores a la entrevista (En el año 2012 fue 0,7%).

- Según características de las mujeres que respondieron haber padecido alguna ITS, el mayor porcentaje pertenecen al cuarto quintil de riqueza (1,1%) y mujeres Divorciadas/separadas/viudas (1,1%), y aquellas con educación superior (0,7%).

- Las regiones, que registraron los más altos porcentajes de mujeres con episodios de ITS fueron: Tacna (2,8%), San Martin (1,7%), Provincia Constitucional del Callao (1,0%).

- El 13,0% de mujeres declaró haber tenido una ITS o algún síntoma como flujo vaginal o úlceras/ llagas genitales. El porcentaje se ha reducido en 0,7 puntos porcentuales, respecto al año 2012 (13,7%). Los mayores porcentajes fueron declarados por mujeres de 20 a 24 años de edad (15,9%), solteras (14,2%), situadas en el quintil superior de riqueza (13,9%) o en el segundo quintil (13,6%), según educación en los niveles de Secundaria o Superior (13,4% y 13,3% en cada uno). Por área de residencia, fue mayor en la urbana (13,5%), por región natural en Lima Metropolitana (15,3%) y la Sierra (15,1%). Por Región, en Ayacucho (25,2%), Cusco (20,3%), Apurímac (18,1%), Arequipa (17,8%), Provincia Constitucional del Callao y Ancash (15,9% en cada una), Moquegua (15,5%), Región Lima (15,4%), Provincia de Lima (15,3%) y Tacna (15,1%).

CUADRO Nº 11.11
PERÚ: MUJERES POR PREVALENCIA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y SÍNTOMAS DE ITS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2016
(Porcentaje)

Característica seleccionada	Informó ITS o síntoma			Porcentaje de mujeres con una ITS o flujo vaginal o úlceras/ llagas	Número de mujeres
	Porcentaje con una ITS	Porcentaje con flujo vaginal	Úlceras/ llagas genitales		
Edad					
15-19	0,4	13,9	1,0	14,6	1 639
20-24	0,7	14,6	1,5	15,9	4 258
25-29	0,5	11,9	1,3	13,1	4 647
30-39	0,7	10,9	1,9	12,6	9 565
40-49	0,6	10,1	1,5	11,6	7 734
15-24	0,6	14,4	1,4	15,6	5 897
Estado conyugal					
Soltera	0,8	12,9	1,1	14,2	5 091
Casada o Conviviente	0,5	11,4	1,8	12,7	19 034
Divorciada/Separada/Viuda	1,1	11,0	1,4	12,9	3 718
Nivel de educación					
Sin educación	0,5	9,7	2,5	10,9	547
Primaria	0,6	10,4	2,2	12,0	5 517
Secundaria	0,6	12,0	1,5	13,4	11 617
Superior	0,7	11,8	1,3	13,3	10 162
Quintil de riqueza					
Quintil inferior	0,2	10,0	1,3	10,7	4 556
Segundo quintil	0,6	12,1	1,7	13,6	5 663
Quintil intermedio	0,7	11,3	1,8	13,1	5 951
Cuarto quintil	1,1	11,6	1,7	13,4	5 818
Quintil superior	0,5	12,6	1,4	13,9	5 855
Total 2016	**0,6**	**11,6**	**1,6**	**13,0**	**27 843**
Total 2012	0,7	12,2	1,8	13,7	19 427

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO Nº 11.12
PERÚ: MUJERES POR PREVALENCIA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y SÍNTOMAS DE ITS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2016
(Porcentaje)

Ámbito geográfico	Informó ITS o síntoma			Porcentaje de mujeres con una ITS o flujo vaginal o úlceras/llagas	Número de mujeres
	Porcentaje con una ITS	Porcentaje con flujo vaginal	Úlceras/llagas genitales		
Área de residencia					
Urbana	0,7	12,0	1,7	13,5	22 052
Rural	0,3	10,2	1,3	11,1	5 791
Región natural					
Lima Metropolitana 1/	0,9	13,6	1,5	15,3	9 275
Resto Costa	0,6	8,8	1,7	10,2	7 219
Sierra	0,4	13,9	1,9	15,1	7 187
Selva	0,7	8,1	1,0	9,2	4 162
Región					
Amazonas	0,7	5,8	1,4	7,0	372
Áncash	0,6	15,1	1,0	15,9	966
Apurímac	0,4	17,0	2,4	18,1	393
Arequipa	0,7	16,1	2,4	17,8	1 147
Ayacucho	0,7	23,4	3,2	25,2	478
Cajamarca	0,1	11,6	1,3	12,5	1 410
Prov. Const. Del Callao	1,0	14,2	1,4	15,9	985
Cusco	0,7	18,0	2,8	20,3	1 047
Huancavelica	0,1	10,2	2,1	11,1	319
Huánuco	0,8	11,0	1,5	12,3	643
Ica	0,8	2,9	1,3	4,4	831
Junín	0,4	9,9	1,6	11,1	1 051
La Libertad	0,3	6,7	1,4	7,7	1 691
Lambayeque	0,6	7,4	1,0	8,5	1 078
Provincia de Lima 2/	0,8	13,5	1,6	15,3	8 290
Región Lima 3/	0,3	14,2	2,7	15,4	891
Loreto	0,2	3,9	0,3	4,3	1 061
Madre de Dios	0,8	12,0	2,5	13,8	134
Moquegua	0,2	14,3	1,6	15,5	169
Pasco	0,3	10,7	1,0	11,5	217
Piura	0,3	8,0	1,9	9,8	1 835
Puno	0,2	14,0	1,3	14,3	934
San Martín	1,7	8,3	1,2	10,3	847
Tacna	2,8	11,4	1,5	15,1	306
Tumbes	0,2	7,0	2,3	8,1	251
Ucayali	0,8	5,0	0,6	6,1	497
Lima 4/	0,8	13,6	1,7	15,3	9 182
Total 2016	**0,6**	**11,6**	**1,6**	**13,0**	**27 843**
Total 2012	0,7	12,2	1,8	13,7	19 427

1/ Comprende la provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao
2/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.
3/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
4/ Comprende la provincia de Lima y la Región Lima.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO Nº 11.3
PERÚ: PREVALENCIA DE ITS Y/O SÍNTOMAS ASOCIADOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2016
(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Fuente de consejo o tratamiento de las ITS

- Entre las mujeres que tuvieron una ITS en los 12 meses anteriores a la entrevista, el 70,4% buscó consejo o tratamiento por un médico y 83,0% los recibió de cualquier fuente, un 10,2% no recibió ni consejo ni tratamiento y 3,1% se auto recetó, es decir, utilizó medicamentos por su cuenta. Otras fuentes mencionadas fueron los curanderos (6,1%) y las farmacias/boticas (24,6%).

- Las entrevistadas que en mayor porcentaje consultaron a un médico fueron las mujeres con educación superior (77,2%), aquellas ubicadas en el quintil superior de riqueza (75,8%), por edad entre 40 a 49 años de edad (73,5%). Por área de residencia fue mayor en el área urbana (72,1%).

- A la farmacia/botica acudieron en mayor porcentaje las mujeres de 25 a 29 años de edad (32,8%), aquellas divorciadas/separadas/viudas (29,4%), las que se ubican en el quintil inferior de riqueza (26,3%). Por área de residencia, el mayor porcentaje estuvo en el urbana (25,0%). Por región, en 10 de ellos en un rango que va entre 26,3% y 39,4% de mujeres acudieron a la farmacia/ botica: en Madre de Dios (39,4%), San Martín (32,7%), Amazonas (30,1%), Pasco (29,6%), Ancash y Lima Provincias (29,5% en cada uno), Huánuco (29,3%), Cajamarca (28,7%), Moquegua 26,6%) y La Libertad (26,3%).

CUADRO Nº 11.13
PERÚ: MUJERES QUE RECIBIERON CONSEJO O TRATAMIENTO PARA UNA ITS, POR FUENTE DE TRATAMIENTO, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2016
(Porcentaje)

Característica seleccionada	Fuente de tratamiento de ITS 1/				Consejo o tratamiento de amigos o familiares	Se auto-recetó	Ni consejo ni tratamiento	Número de mujeres con una ITS 2/
	Médico	Curandero	Farmacia / Botica	Consejo o tratamiento de cualquier fuente				
Edad								
15-19	52,3	4,7	21,0	62,9	15,0	0,3	21,7	239
20-24	69,0	6,9	25,4	81,3	3,8	2,5	12,4	678
25-29	71,5	5,6	32,8	85,9	2,4	3,6	8,2	608
30-39	71,8	7,1	22,3	85,1	3,6	2,4	8,9	1 206
40-49	73,5	5,0	22,6	84,7	1,7	5,0	8,7	896
15-24	64,6	6,4	24,2	76,5	6,7	1,9	14,8	918
Estado conyugal								
Soltera	63,7	5,9	26,3	74,2	6,2	3,2	16,4	724
Casada o Conviviente	72,8	6,1	23,2	85,7	2,8	2,8	8,7	2 422
Divorciada/Separada/Viuda	68,1	6,3	29,4	82,4	4,3	4,5	8,8	481
Nivel de educación								
Sin educación	64,4	12,4	23,8	79,1	2,2	7,9	10,8	60
Primaria	63,1	10,8	24,7	77,2	3,6	5,4	13,8	660
Secundaria	67,8	5,6	25,6	81,6	4,4	2,2	11,8	1 557
Superior	77,2	4,2	23,5	87,5	3,0	2,8	6,7	1 351
Quintil de riqueza								
Quintil inferior	62,3	15,1	26,3	76,9	3,8	6,2	13,1	487
Segundo quintil	67,1	9,1	25,3	81,5	5,1	4,4	9,1	770
Quintil intermedio	70,3	4,4	25,5	83,1	2,7	2,6	11,6	777
Cuarto quintil	73,1	3,3	24,1	85,1	1,9	1,9	11,2	782
Quintil superior	75,8	2,3	22,7	85,8	5,0	1,8	7,4	811
Total 2016	**70,4**	**6,1**	**24,6**	**83,0**	**3,7**	**3,1**	**10,2**	**3 627**
Total 2012	66,3	6,3	23,5	81,0	4,1	4,4	10,5	2 657

1/ Las entrevistadas podían informar más de una fuente de tratamiento.
2/ Incluye las mujeres que informaron tener una ITS o flujo vaginal o llagas/granos genitales, en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO Nº 11.14
PERÚ: MUJERES QUE RECIBIERON CONSEJO O TRATAMIENTO PARA UNA ITS, POR FUENTE DE TRATAMIENTO, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2016
(Porcentaje)

Ámbito geográfico	Fuente de tratamiento de ITS 1/				Consejo o tratamiento de amigos o familiares	Se auto-recetó	Ni consejo ni tratamiento	Número de mujeres con una ITS 2/
	Médico	Curandero	Farmacia / Botica	Consejo o tratamiento de cualquier fuente				
Área de residencia								
Urbana	72,1	4,9	25,0	84,2	3,6	2,7	9,4	2 987
Rural	62,4	11,8	23,0	77,0	3,9	5,0	14,1	640
Región natural								
Lima Metropolitana 3/	73,9	4,4	23,5	84,9	3,2	1,6	10,3	1 424
Resto Costa	71,5	4,4	24,6	84,2	3,5	2,5	9,8	734
Sierra	63,2	7,3	26,0	77,8	4,8	5,4	11,9	1 086
Selva	75,7	12,7	25,2	88,1	2,6	3,4	5,9	383
Región								
Amazonas	70,8	12,3	30,1	86,0	1,0	0,7	12,2	26
Áncash	56,8	2,3	29,5	70,6	6,2	4,5	18,8	154
Apurímac	68,7	4,0	21,0	81,6	5,8	7,9	4,7	71
Arequipa	63,4	2,0	23,8	79,1	4,4	2,9	13,7	204
Ayacucho	67,6	3,6	21,5	79,8	3,2	2,9	14,1	120
Cajamarca	59,3	12,9	28,7	77,9	3,4	8,5	10,2	176
Prov. Const. Del Callao	73,7	3,4	23,8	85,0	5,9	1,9	7,2	156
Cusco	76,4	7,5	25,7	87,7	3,4	0,8	8,0	213
Huancavelica	53,1	13,5	24,7	72,4	4,4	8,3	14,9	35
Huánuco	73,9	9,1	29,3	85,4	1,7	8,4	4,5	79
Ica	74,9	4,6	11,6	80,1	4,5	5,9	9,4	36
Junín	78,0	5,2	24,2	89,4	5,6	1,3	3,8	116
La Libertad	75,4	5,1	26,3	83,7	8,4	2,7	5,1	131
Lambayeque	69,0	3,3	20,1	81,4	1,9	1,8	14,9	92
Provincia de Lima 4/	73,9	4,5	23,4	84,9	2,9	1,5	10,7	1 267
Región Lima 5/	75,2	5,5	29,5	87,1	3,3	3,6	6,0	137
Loreto	73,6	11,9	23,4	84,4	6,3	3,0	6,3	46
Madre de Dios	73,7	11,1	39,4	89,1	1,3	3,0	6,6	18
Moquegua	74,2	2,8	26,6	85,1	1,0	3,1	10,9	26
Pasco	68,2	12,2	29,6	82,1	7,0	4,2	6,7	25
Piura	69,3	5,3	22,6	86,3	1,7	1,9	10,1	180
Puno	45,9	14,8	25,5	67,2	3,9	11,7	17,2	134
San Martín	80,4	23,9	32,7	89,0	3,6	4,5	2,8	88
Tacna	69,1	5,1	16,1	80,3	0,9	2,7	16,0	46
Tumbes	69,3	2,6	21,3	79,1	9,5	2,3	9,1	20
Ucayali	75,2	5,8	22,5	90,2	3,5	0,0	6,3	30
Lima 6/	74,0	4,6	24,0	85,1	2,9	1,7	10,3	1 405
Total 2016	**70,4**	**6,1**	**24,6**	**83,0**	**3,7**	**3,1**	**10,2**	**3627**
Total 2012	66,3	6,3	23,5	81,0	4,1	4,4	10,5	2 657

1/ Las entrevistadas podían informar más de una fuente de tratamiento.
2/ Incluye las mujeres que informaron tener una ITS o flujo vaginal o llagas/granos genitales, en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista.
3/ Comprende la provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao
4/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.
5/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
6/ Comprende la provincia de Lima y la Región Lima.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

11.5 CONDUCTA SEXUAL, USO DEL CONDÓN Y ACCESO AL CONDÓN

La conducta sexual individual y el uso de condón son determinantes claves del riesgo de contraer ITS y cuando esta información se agrega a nivel de la población, permite describir el contexto en el cual se deben diseñar e implementar los programas preventivos y curativos del VIH e ITS. En la Encuesta 2016, se preguntó a las mujeres acerca de sus relaciones sexuales en los últimos 12 meses, así como por el número de parejas sexuales, uso de condón en la última relación y conocimiento de fuentes para la obtención del condón. Asimismo se indagó acerca del nivel de conocimiento de la mujer respecto a la persona con quien mantuvo contacto sexual, para distinguir la pareja sexual regular de la no regular, cohabitante o no.

Número de parejas sexuales de las mujeres no unidas

- La distribución porcentual de mujeres no unidas por el número de personas con quienes tuvieron relaciones sexuales en los últimos 12 meses anteriores a la entrevista muestra que el 62,8% refirió no haber tenido pareja sexual (68,8% en el año 2012), 34,8% respondió haber tenido una pareja (28,8% en el año 2012), y 2,4% tuvo dos o más parejas (similar al año 2012).

- Las mujeres no unidas sin nivel de educación respondieron en mayor porcentaje no haber tenido pareja sexual (92,3%), seguido de aquellas de 15 a 19 años de edad (81,9%) y las del quintil inferior de riqueza (83,0%).

- En el área rural se encontró un mayor porcentaje de mujeres no unidas que respondieron no haber tenido pareja sexual en los últimos 12 meses (80,5%). En 9 Regiones el 70% o más de mujeres no unidas (ni casadas ni convivientes) o no tuvieron pareja sexual en ese tiempo de referencia: Huancavelica (82,7%), Puno (77,2%,), Cajamarca (76,0%), Pasco (75,4%), Apurímac (73,5%), Cusco (72,4%), Ancash (71,3%), Amazonas (70,6%) y Piura (70,4%).

CUADRO Nº 11.15
PERÚ: NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES DE LAS MUJERES NO UNIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2016
(Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Total	Número de parejas sexuales			Promedio de parejas	Número de mujeres
		Ninguna pareja	1	2 y más		
Edad						
15-19	100,0	81,9	16,7	1,4	0,2	4 681
20-24	100,0	48,5	48,4	3,1	0,5	3 031
25-29	100,0	43,6	52,4	4,0	0,6	1 695
30-39	100,0	54,8	41,9	3,3	0,5	2 674
40-49	100,0	66,8	31,8	1,4	0,3	1 985
15-24	100,0	68,7	29,2	2,1	0,3	7 713
Estado conyugal						
Soltera	100,0	64,5	33,3	2,2	0,4	10 351
Soltera ha tenido RS	100,0	27,3	68,1	4,6	0,8	5 060
Soltera no ha tenido RS	100,0	100,0	0,0	0,0	-0,0	5 291
Divorciada/Separada/Viuda	100,0	58,1	38,8	3,0	0,5	3 717
Nivel de educación						
Sin educación	100,0	92,3	7,7	0,0	0,1	128
Primaria	100,0	75,5	23,2	1,3	0,3	1 204
Secundaria	100,0	71,3	26,9	1,8	0,3	6 876
Superior	100,0	49,6	46,9	3,5	0,5	5 860
Quintil de riqueza						
Quintil inferior	100,0	83,0	16,1	0,9	0,2	1 740
Segundo quintil	100,0	67,4	29,9	2,6	0,4	2 400
Quintil intermedio	100,0	62,4	35,1	2,5	0,4	3 029
Cuarto quintil	100,0	59,2	38,2	2,7	0,4	3 250
Quintil superior	100,0	53,6	43,6	2,8	0,5	3 648
Total 2016	100,0	**62,8**	**34,8**	**2,4**	**0,4**	**14 067**
Total 2012	100,0	68,8	28,8	2,4	0,3	10 264

na= No aplicable.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO Nº 11.16
PERÚ: NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES DE LAS MUJERES NO UNIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2016
(Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Total	Número de parejas sexuales			Promedio de parejas	Número de mujeres
		Ninguna pareja	1	2 y más		
Área de residencia						
Urbana	100,0	59,8	37,5	2,7	0,4	12 029
Rural	100,0	80,5	18,4	1,0	0,2	2 038
Región natural						
Lima Metropolitana 1/	100,0	54,9	42,2	2,9	0,5	5 330
Resto Costa	100,0	66,3	31,7	2,1	0,4	3 649
Sierra	100,0	73,3	25,0	1,7	0,3	3 554
Selva	100,0	57,5	39,0	3,5	0,5	1 534
Región						
Amazonas	100,0	70,6	28,4	1,1	0,3	115
Áncash	100,0	71,3	28,2	0,5	0,3	462
Apurímac	100,0	73,5	25,1	1,5	0,3	185
Arequipa	100,0	61,3	33,9	4,8	0,4	664
Ayacucho	100,0	66,0	32,7	1,2	0,3	211
Cajamarca	100,0	76,0	23,3	0,7	0,2	575
Prov. Const. Del Callao	100,0	56,2	39,4	4,3	0,5	530
Cusco	100,0	72,4	26,0	1,6	0,3	548
Huancavelica	100,0	82,7	16,7	0,6	0,2	151
Huánuco	100,0	64,1	34,3	1,6	0,4	294
Ica	100,0	64,4	33,8	1,8	0,4	375
Junín	100,0	66,7	31,8	1,4	0,3	576
La Libertad	100,0	69,3	28,5	2,2	0,3	883
Lambayeque	100,0	68,6	30,4	1,0	0,3	583
Provincia de Lima 2/	100,0	54,8	42,5	2,7	0,5	4 800
Región Lima 3/	100,0	65,3	32,3	2,5	0,4	448
Loreto	100,0	60,1	35,6	4,4	0,4	350
Madre de Dios	100,0	54,5	38,9	6,6	0,5	50
Moquegua	100,0	64,1	34,7	1,2	0,4	82
Pasco	100,0	75,4	23,4	1,2	0,3	94
Piura	100,0	70,4	27,6	2,0	0,3	930
Puno	100,0	77,2	21,6	1,2	0,2	415
San Martín	100,0	47,1	48,6	4,3	0,6	288
Tacna	100,0	67,1	28,4	4,5	0,4	154
Tumbes	100,0	60,6	35,5	3,9	0,4	105
Ucayali	100,0	48,9	45,1	6,0	0,6	200
Lima 4/	100,0	55,7	41,6	2,7	0,5	5 248
Total 2016	**100,0**	**62,8**	**34,8**	**2,4**	**0,4**	**14 067**
Total 2012	100,0	68,8	28,8	2,4	0,3	10 264

1/ Comprende la provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao
2/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.
3/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
4/ Comprende la provincia de Lima y la Región Lima.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Número de parejas sexuales de mujeres unidas

- Evaluando la distribución porcentual de mujeres actualmente casadas o convivientes por número de personas con las que han tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses (anteriores a la entrevista), se observa que la gran mayoría (97,9%) refirió haber tenido una sola pareja sexual incluyendo el esposo/compañero, lo cual se refuerza con el gran porcentaje de mujeres que manifestaron no haber tenido parejas sexuales (99,5%) excluyendo el esposo/compañero; en tanto, el 0,4% ha tenido dos o más parejas sexuales incluyendo el esposo/compañero.

- Entre las mujeres que, incluyendo al esposo/compañero, aceptaron haber tenido dos o más parejas sexuales (0,4%), Las mujeres de 15 a 19 respondieron en mayor porcentaje (2,5%), seguido de aquellas del quintil superior de riqueza (1,0%) y mujeres con nivel de educación superior (0,5%). Por área de residencia, en el área urbana (0,5%) en comparación a la rural. Por regiones Provincia Constitucional del Callao y Provincia de Lima (0,9% en cada una), Ucayali (0,8%), Huánuco (0,7%) y Moquegua (0,5%).

CUADRO Nº 11.17
PERÚ: NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES DE MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2016
(Distribución porcentual)

Característica seleccionada	Número de parejas sexuales incluyendo esposo/compañero					Número de parejas sexuales excluyendo esposo/compañero					Número de mujeres
	Total	Ninguna	1	2 y más	Promedio	Total	Ninguna	1	2	Promedio	
Edad											
15-19	100,0	0,9	96,6	2,5	1,0	100,0	96,5	3,5	0,0	0,0	575
20-24	100,0	0,8	98,8	0,4	1,0	100,0	99,1	0,9	0,0	0,0	2 199
25-29	100,0	0,8	99,1	0,2	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	0,0	3 200
30-39	100,0	1,5	98,0	0,5	1,0	100,0	99,5	0,5	0,0	0,0	7 175
40-49	100,0	2,9	96,9	0,2	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	0,0	5 883
15-24	100,0	0,8	98,4	0,8	1,0	100,0	98,5	1,5	0,0	0,0	2 775
Nivel de educación											
Sin educación	100,0	6,5	93,5	0,0	0,9	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	450
Primaria	100,0	1,8	98,0	0,2	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	0,0	4 547
Secundaria	100,0	1,7	98,0	0,4	1,0	100,0	99,4	0,6	0,0	0,0	8 268
Superior	100,0	1,4	98,1	0,5	1,0	100,0	99,4	0,6	0,0	0,0	5 769
Quintil de riqueza											
Quintil inferior	100,0	2,0	97,9	0,1	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	0,0	3 687
Segundo quintil	100,0	1,6	98,1	0,4	1,0	100,0	99,7	0,3	0,0	0,0	4 148
Quintil intermedio	100,0	1,5	98,2	0,2	1,0	100,0	99,6	0,4	0,0	0,0	4 067
Cuarto quintil	100,0	1,9	97,9	0,2	1,0	100,0	99,5	0,5	0,0	0,0	3 692
Quintil superior	100,0	1,8	97,2	1,0	1,0	100,0	98,9	1,0	0,0	0,0	3 440
Total 2016	**100,0**	**1,7**	**97,9**	**0,4**	**1,0**	**100,0**	**99,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**19 033**
Total 2012	100,0	1,9	97,8	0,3	1,0	100,0	99,6	0,4		0,0	13 264

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO Nº 11.18
PERÚ: NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES DE MUJERES ACTUALMENTE UNIDAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2016
(Distribución porcentual)

Ámbito geográfico	Número de parejas sexuales incluyendo esposo/compañero					Número de parejas sexuales excluyendo esposo/compañero					Número de mujeres
	Total	Ninguna	1	2 y más	Promedio	Total	Ninguna	1	2	Promedio	
Área de residencia											
Urbana	100,0	1,8	97,7	0,5	1,0	100,0	99,4	0,6	0,0	0,0	14 290
Rural	100,0	1,5	98,4	0,1	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	0,0	4 742
Región natural											
Lima Metropolitana 1/	100,0	2,1	97,1	0,9	1,0	100,0	98,9	1,1	0,0	0,0	5 695
Resto Costa	100,0	1,6	98,3	0,1	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	0,0	5 014
Sierra	100,0	1,9	98,1	0,1	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	0,0	5 223
Selva	100,0	1,2	98,3	0,4	1,0	100,0	99,6	0,4	0,0	0,0	3 101
Región											
Amazonas	100,0	2,0	97,5	0,5	1,0	100,0	99,5	0,5	0,0	0,0	300
Áncash	100,0	2,0	98,0	0,0	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	0,0	693
Apurímac	100,0	1,4	98,6	0,0	1,0	100,0	99,9	0,1	0,0	0,0	296
Arequipa	100,0	1,4	98,2	0,3	1,0	100,0	99,6	0,4	0,0	0,0	731
Ayacucho	100,0	2,2	97,8	0,0	1,0	100,0	99,7	0,3	0,0	0,0	351
Cajamarca	100,0	0,4	99,6	0,0	1,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	1 074
Prov. Const. Del Callao	100,0	2,4	96,6	0,9	1,0	100,0	98,9	1,1	0,0	0,0	621
Cusco	100,0	2,7	97,0	0,2	1,0	100,0	99,2	0,8	0,0	0,0	750
Huancavelica	100,0	2,3	97,7	0,0	1,0	100,0	99,9	0,1	0,0	0,0	246
Huánuco	100,0	1,9	97,4	0,7	1,0	100,0	99,3	0,7	0,0	0,0	459
Ica	100,0	1,7	98,2	0,1	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	0,0	589
Junín	100,0	1,3	98,4	0,3	1,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	708
La Libertad	100,0	1,3	98,7	0,0	1,0	100,0	99,9	0,1	0,0	0,0	1 206
Lambayeque	100,0	1,6	98,4	0,0	1,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	733
Provincia de Lima 2/	100,0	2,0	97,1	0,9	1,0	100,0	98,9	1,1	0,0	0,0	5 074
Región Lima 3/	100,0	1,5	98,1	0,4	1,0	100,0	99,5	0,5	0,0	0,0	625
Loreto	100,0	1,7	98,0	0,3	1,0	100,0	99,9	0,1	0,0	0,0	826
Madre de Dios	100,0	0,6	99,3	0,1	1,0	100,0	99,9	0,1	0,0	0,0	100
Moquegua	100,0	2,2	97,3	0,5	1,0	100,0	98,9	1,0	0,1	0,0	116
Pasco	100,0	2,0	97,8	0,1	1,0	100,0	99,9	0,1	0,0	0,0	162
Piura	100,0	1,4	98,6	0,0	1,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	1 294
Puno	100,0	2,0	98,0	0,0	1,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	709
San Martín	100,0	1,5	98,4	0,1	1,0	100,0	99,8	0,2	0,0	0,0	625
Tacna	100,0	2,8	96,8	0,4	1,0	100,0	99,6	0,4	0,0	0,0	209
Tumbes	100,0	1,5	98,4	0,2	1,0	100,0	99,6	0,4	0,0	0,0	184
Ucayali	100,0	1,7	97,5	0,8	1,0	100,0	99,2	0,8	0,0	0,0	351
Lima 4/	100,0	2,0	97,2	0,8	1,0	100,0	99,0	1,0	0,0	0,0	5 699
Total 2016	**100,0**	**1,7**	**97,9**	**0,4**	**1,0**	**100,0**	**99,5**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**19 033**
Total 2012	100,0	1,9	97,8	0,3	1,0	100,0	99,6	0,4		0,0	13 264

1/ Comprende la provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao
2/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.
3/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
4/ Comprende la provincia de Lima y la Región Lima.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Conocimiento de fuente y uso del condón

- Entre las mujeres que han oído hablar sobre el VIH/SIDA solo el 10,7% utilizó condón el último mes. De las mujeres que lo usan como método anticonceptivo, el 3,16% no los usó en su última relación sexual.

- El 78,7% de mujeres conocía que hay fuente médica pública y un 2,6% fuente médica privada para obtener condones. El 82,0%, sabía que se adquiere en las farmacias contra un 0,9% que no conoce fuentes para obtenerlos.

- Es importante mencionar que las mujeres que reconocieron haber utilizado condones en el último mes fueron aquellas pertenecientes al quintil superior de riqueza (15,0%), las solteras con relaciones sexuales (14.3%), las que alcanzaron educación superior y las mujeres de 25 a 29 años de edad (13,9%) cada uno, seguida de las mujeres de 15 a 19 (12,8%).

- En cuanto al grupo que usa el condón como método de planificación familiar pero que no los usó en su última relación sexual, fue mayor en mujeres del quintil superior de riqueza (4,4%) y con educación superior (4,5%). Por área de residencia en la urbana (3,5%) y por región en Provincia de Lima (4,7%), Arequipa y Moquegua (4,6% cada uno), Lambayeque (4,3%), Junín (4,1%), Lima provincias y Provincia Constitucional del Callao (3,7% en cada caso).

CUADRO Nº 11.19
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO, FUENTE Y USO DEL CONDÓN, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2016
(Porcentaje)

Característica seleccionada	Conoce fuente para el condón 2/					No conoce fuentes para el condón	Uso de condones		Usa condón para PF; pero no usó en última relación	Número de mujeres
	Fuente médica pública	Fuente médica privada	Farmacia	Otra fuente	Podría conseguir uno		El último mes	Antes		
Edad										
15-19	69,7	3,0	85,0	7,0	61,1	1,2	12,8	13,2	2,1	1 607
20-24	76,2	3,0	85,6	7,4	73,4	0,9	11,5	9,2	3,6	4 211
25-29	82,5	3,6	85,1	6,5	74,4	0,3	13,9	5,3	3,6	4 608
30-39	79,9	2,3	82,0	8,1	73,6	0,7	11,2	2,9	3,4	9 421
40-49	78,0	2,2	77,5	7,1	68,0	1,4	7,1	2,0	2,4	7 569
15-24	74,4	3,0	85,4	7,3	70,0	1,0	11,8	10,3	3,2	5 818
Estado conyugal										
Soltera ha tenido RS	66,8	4,1	90,1	11,9	73,7	0,8	14,3	15,3	3,2	5 034
Casada o Conviviente	81,9	2,3	79,5	5,9	70,4	0,9	11,0	1,4	3,5	18 700
Divorciada/Separada/Viuda	78,4	2,0	83,9	8,5	73,5	1,0	3,9	6,5	1,0	3 682
Nivel de educación										
Sin educación	84,3	0,0	34,7	1,1	37,1	8,2	2,4	0,1	0,7	448
Primaria	86,7	1,7	55,4	2,1	51,8	2,8	5,6	1,1	1,1	5 243
Secundaria	80,8	1,8	85,6	5,3	71,8	0,4	10,5	4,2	2,8	11 564
Superior	71,8	4,1	93,7	12,7	82,7	0,2	13,9	7,1	4,5	10 160
Quintil de riqueza										
Quintil inferior	91,6	1,4	44,7	1,5	49,2	3,1	4,1	1,2	1,0	4 233
Segundo quintil	85,2	1,8	78,9	3,3	67,4	1,2	9,4	3,1	2,4	5 606
Quintil intermedio	80,3	2,4	89,4	5,1	72,8	0,4	10,7	4,9	2,8	5 917
Cuarto quintil	76,0	2,3	92,6	8,8	79,0	0,3	12,4	5,9	4,2	5 809
Quintil superior	63,9	4,8	94,0	16,4	82,4	0,2	15,0	7,2	4,4	5 850
Total 2016	**78,7**	**2,6**	**82,0**	**7,4**	**71,4**	**0,9**	**10,7**	**4,6**	**3,1**	**27 416**
Total 2012	81,7	2,9	76,7	6,2	65,1	1,2	10,3	3,5	2,3	18 779

1/ Conocimiento para Planificación Familiar o para prevención de enfermedades.
2/ Para las usuarias actuales se incluye como fuente el último sitio donde obtuvo el condón.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO Nº 11.20
PERÚ: MUJERES POR CONOCIMIENTO, FUENTE Y USO DEL CONDÓN, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2016
(Porcentaje)

Ámbito geográfico	Conoce fuente para el condón 1/					No conoce fuentes para el condón	Uso de condones		Usa condón para PF; pero no usó en última relación	Número de mujeres
	Fuente médica pública	Fuente médica privada	Farmacia	Otra fuente	Podría conseguir uno		El último mes	Antes		
Área de residencia										
Urbana	75,5	3,0	89,5	8,7	75,8	0,5	11,8	5,4	3,5	21 959
Rural	91,3	1,3	51,9	2,2	53,8	2,6	6,2	1,6	1,6	5 457
Región natural										
Lima Metropolitana 2/	69,4	3,8	93,7	13,1	79,7	0,2	14,0	6,6	4,6	9 250
Resto Costa	75,5	2,1	86,6	6,7	70,9	0,7	9,5	3,6	2,6	7 168
Sierra	88,2	2,1	67,3	2,4	62,8	2,1	9,8	3,8	2,6	6 918
Selva	89,0	1,9	72,5	3,8	68,3	0,7	6,6	3,4	1,5	4 080
Región										
Amazonas	89,7	1,6	67,8	2,6	64,0	2,5	6,8	2,7	1,8	347
Áncash	79,6	4,1	72,4	4,9	61,9	3,4	9,2	3,4	1,0	923
Apurímac	91,6	1,1	69,0	1,7	59,3	1,7	10,1	3,6	2,8	379
Arequipa	82,6	2,0	90,3	3,7	74,7	1,4	13,7	5,2	4,6	1 142
Ayacucho	96,1	1,9	67,8	2,8	58,3	1,3	11,0	4,1	3,1	458
Cajamarca	86,6	2,0	61,6	1,1	52,6	3,0	6,2	1,9	0,4	1 335
Prov. Const. Del Callao	76,0	2,8	93,0	10,5	81,1	0,2	15,0	4,3	3,4	982
Cusco	91,5	3,7	76,4	4,4	72,7	1,1	13,3	6,9	3,7	1 013
Huancavelica	97,5	1,2	53,6	1,9	59,2	0,5	7,5	2,3	1,1	312
Huánuco	91,6	1,3	53,8	1,9	68,9	1,4	8,1	3,1	1,6	612
Ica	80,7	1,7	85,7	6,9	73,9	0,3	10,6	3,3	1,7	822
Junín	87,6	1,1	83,3	4,1	78,5	0,7	12,3	5,4	4,1	1 048
La Libertad	81,0	1,7	77,2	6,3	65,0	0,2	10,2	4,1	1,5	1 675
Lambayeque	61,8	0,9	84,8	7,3	74,6	0,5	8,5	2,5	4,3	1 064
Provincia de Lima 3/	68,6	3,9	93,8	13,4	79,6	0,2	13,9	6,9	4,7	8 267
Región Lima 4/	83,1	2,4	84,6	5,8	71,4	1,5	11,0	4,7	3,7	886
Loreto	86,1	1,6	60,3	5,2	63,6	0,6	3,6	2,8	1,2	1 032
Madre de Dios	82,8	1,0	84,1	1,5	69,0	0,2	9,2	2,6	2,3	133
Moquegua	91,1	3,1	77,8	2,3	80,6	0,8	10,6	6,8	4,6	168
Pasco	93,2	1,3	62,6	3,0	71,8	1,0	7,9	2,7	2,4	214
Piura	71,1	1,8	88,2	7,4	64,3	1,3	5,9	2,4	2,5	1 811
Puno	84,6	2,9	60,9	1,4	53,3	2,7	7,8	3,4	2,1	901
San Martín	90,3	2,8	84,9	4,2	70,6	0,1	7,0	3,1	1,3	846
Tacna	84,1	3,4	79,5	3,1	74,3	0,9	13,2	4,0	1,1	304
Tumbes	89,1	0,9	86,1	2,4	77,7	0,5	6,6	2,5	0,9	251
Ucayali	90,4	1,6	77,0	3,7	78,0	0,7	6,7	2,8	0,9	491
Lima 5/	70,0	3,8	92,9	12,7	78,8	0,3	13,6	6,7	4,6	9 153
Total 2016	**78,7**	**2,6**	**82,0**	**7,4**	**71,4**	**0,9**	**10,7**	**4,6**	**3,1**	**27 416**
Total 2012	81,7	2,9	76,7	6,2	65,1	1,2	10,3	3,5	2,3	18 779

1/ Para las usuarias actuales se incluye como fuente el último sitio donde obtuvo el condón.
2/ Comprende la provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao
3/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.
4/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
5/ Comprende la provincia de Lima y la Región Lima.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Uso de condón según tipo de compañero

- Entre las mujeres que tuvieron relaciones sexuales en los últimos 12 meses, anteriores a la entrevista, el uso de condón de acuerdo con el tipo de compañero, fue: un 12,5% usó condón con su esposo o compañero (en el año 2012 fue 11,7%); el 34,8% los usó con un compañero con el cual no vive (en el año 2012 fue 32,0%) y, un 17,2% usó condón con cualquier compañero, (en el año 2012 fue 15,5%). En comparación con el 2012 hubo un incremento según cada tipo de compañero.

- El uso de condón con un compañero con el cual no vive fue mayor en las casadas o convivientes (49,9%), entre las mujeres de 15 a 19 años de edad (41,9%), en las que se ubican en el quintil superior (40,7%), en aquellas que tienen educación superior (38,6%). Por área de residencia fue más alta en la urbana (35,6%) y según Región en Cusco (60,3%), Apurímac (40,3%), Provincia de Lima (38,8%), Junín (38,6%), Provincia Constitucional del Callao (36,2%), Ayacucho (35,6%), Ica (35,5%) y Huancavelica (35,3%).

- El uso de condón por tipo de compañero, ocurrió en mayor porcentaje en mujeres con las características siguientes: solteras con relaciones sexuales (40,3%), de 15 a 19 años de edad (28,8%), de 15 a 24 años de edad (24,5%), del quintil superior (25,1%), con educación superior (24,3%). Por área de residencia, fue en la urbana (19,6%) y por regiones Provincia de Lima (23,7%), Cusco (23,0%), Provincia Constitucional del Callao (22,4%), Arequipa (21,5%) y Junín (20,4%).

CUADRO Nº 11.21
PERÚ: USO DEL CONDÓN POR TIPO DE COMPAÑERO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2016
(Porcentaje)

Característica seleccionada	Usó condón con esposo o compañero		Usó con compañero con quien no vive		Usó condón con cualquier compañero	
	Porcentaje	Número de mujeres	Porcentaje	Número de mujeres	Porcentaje	Número de mujeres
Edad						
15-19	10,5	592	41,9	873	28,8	1 450
20-24	12,6	2 249	37,6	1 588	22,9	3 820
25-29	15,3	3 267	40,2	963	21,0	4 221
30-39	13,6	7 212	30,2	1 262	15,8	8 430
40-49	9,7	5 816	19,9	670	10,8	6 474
15-24	12,2	2 841	39,1	2 461	24,5	5 270
Estado conyugal						
Soltera ha tenido RS	*	5	40,3	3 707	40,3	3 712
Casada o Conviviente	12,4	18 677	49,9	93	12,5	18 702
Divorciada/Separada/Viuda	14,6	454	20,8	1 557	19,4	1 980
Nivel de educación						
Sin educación	3,1	426	*	10	3,0	436
Primaria	6,8	4 532	17,7	303	7,4	4 825
Secundaria	12,8	8 340	31,8	2 033	16,4	10 323
Superior	17,1	5 838	38,6	3 011	24,3	8 810
Quintil de riqueza						
Quintil inferior	4,7	3 677	19,1	304	5,7	3 974
Segundo quintil	11,6	4 213	27,6	797	14,0	4 992
Quintil intermedio	13,1	4 075	34,2	1 155	17,7	5 214
Cuarto quintil	15,8	3 726	35,4	1 347	21,0	5 060
Quintil superior	17,7	3 444	40,7	1 753	25,1	5 154
Total 2016	**12,5**	**19 136**	**34,8**	**5 357**	**17,2**	**24 394**
Total 2012	11,7	13 578	32,0	3 250	15,5	16 776

Nota: Los porcentajes basados en menos de 25 casos sin ponderar no se muestran (*), y los de 25-49 casos sin ponderar se presentan entre paréntesis.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

CUADRO Nº 11.22
PERÚ: USO DEL CONDÓN POR TIPO DE COMPAÑERO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENTREVISTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2016
(Porcentaje)

Ámbito geográfico	Usó condón con esposo o compañero		Usó con compañero con quien no vive		Usó condón con cualquier compañero	
	Porcentaje	Número de mujeres	Porcentaje	Número de mujeres	Porcentaje	Número de mujeres
Área de residencia						
Urbana	14,3	14 393	35,6	4 953	19,6	19 254
Rural	7,1	4 744	24,8	404	8,4	5 140
Región natural						
Lima Metropolitana 1/	17,4	5 709	38,5	2 488	23,5	8 138
Resto Costa	11,6	5 069	28,6	1 240	14,9	6 300
Sierra	11,5	5 228	36,5	959	15,3	6 173
Selva	6,9	3 130	30,0	669	10,9	3 782
Región						
Amazonas	7,3	299	30,8	35	9,9	333
Áncash	10,9	687	31,7	134	14,3	821
Apurímac	10,8	297	40,3	49	15,0	346
Arequipa	17,0	752	34,9	260	21,5	1 003
Ayacucho	12,5	348	35,6	73	16,5	421
Cajamarca	6,6	1 093	27,1	142	9,0	1 235
Prov. Const. del Callao	17,2	618	36,2	240	22,4	847
Cusco	15,3	740	60,3	157	23,0	895
Huancavelica	8,9	245	35,3	26	11,4	271
Huánuco	9,6	459	23,9	108	12,1	564
Ica	11,4	587	35,5	134	15,9	721
Junín	15,7	719	38,6	191	20,4	908
La Libertad	13,2	1 217	29,5	272	16,2	1 487
Lambayeque	10,0	742	23,7	183	12,7	925
Provincia de Lima 2/	17,4	5 091	38,8	2 248	23,7	7 291
Región Lima 3/	14,6	638	30,2	159	17,6	794
Loreto	3,0	830	29,1	143	6,9	970
Madre de Dios	9,2	102	27,7	23	12,6	124
Moquegua	16,3	117	34,5	31	19,9	147
Pasco	9,8	161	30,7	24	12,4	184
Piura	6,9	1 311	22,0	275	9,5	1 585
Puno	9,5	705	34,9	95	12,5	800
San Martín	7,2	630	27,5	155	10,9	782
Tacna	17,6	206	30,8	52	20,3	258
Tumbes	6,0	186	27,6	42	10,0	227
Ucayali	6,3	353	23,6	106	10,3	455
Lima	17,1	5 730	38,2	2 408	23,1	8 085
Total 2016	**12,5**	**19 136**	**34,8**	**5 357**	**17,2**	**24 394**
Total 2012	11,7	13 578	32,0	3 250	15,5	16 776

1/ Comprende la provincia de Lima y Provincia Constitucional del Callao
2/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.
3/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.
4/ Comprende la provincia de Lima y la Región Lima.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

GRÁFICO Nº 11.4
PERÚ: USO DE CONDÓN POR TIPO DE COMPAÑERO, SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2016
(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.