

PRINCIPALES INDICADORES

INDICADOR/ÁREA DE RESIDENCIA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
POBLACIÓN DE LA MUESTRA								
Mujeres de 15 a 49 años de edad	24 213	22 946	22 517	23 888	22 919	24 872	35 766	33 135
Área urbana	18 050	16 924	16 802	17 866	17 644	19 366	28 380	26 353
Área rural	6 162	6 022	5 715	6 022	5 276	5 506	7 386	6 782
Niñas y niños nacidos en los últimos cinco años anteriores a la encuesta	9 305	8 484	8 426	8 804	8 182	8 981	13 112	12 201
Área urbana	5 994	5 447	5 506	5 773	5 585	6 315	9 620	8 906
Área rural	3 311	3 037	2 920	3 031	2 597	2 666	3 492	3 295
Sobrevivientes menores de cinco años de edad	9 088	8 331	8 276	8 651	8 024	8 825	11 521	12 020
Área urbana	5 880	5 370	5 439	5 679	5 484	6 230	8 317	8 785
Área rural	3 208	2 961	2 837	2 972	2 541	2 595	3 204	3 235
Niñas y niños vivos de 12 a 23 meses de edad	1 809	1 725	1 612	1 725	1 590	1 840	2 381	2 400
Niñas y niños vivos de 24 a 35 meses de edad	1 691	1 678	1 831	1 778	1 580	1 692	2 474	2 552
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA VIVIENDA Y DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL (Porcentaje)								
Viviendas con agua potable ^{1/}	77,2	76,5	77,1	78,9	79,9	81,7	81,3	80,3
Área urbana 1/	85,5	82,5	82,6	85,0	84,3	86,5	85,4	83,8
Área rural 1/	60,1	63,6	64,7	65,7	68,7	69,0	69,6	70,4
Viviendas con servicio de desagüe ^{2/}	55,7	56,3	58,4	59,3	64,6	66,1	66,8	68,2
Área urbana 2/	77,9	77,3	79,0	81,0	83,6	84,8	84,6	85,7
Área rural 2/	9,8	11,1	12,5	12,7	16,0	17,7	15,6	17,8
Mujeres en edad fértil con secundaria o más	74,0	73,7	75,2	75,2	77,3	79,2	78,9	80,9
Área urbana	85,2	84,8	86,2	85,3	86,3	88,1	87,0	88,9
Área rural	41,6	42,8	42,5	45,2	47,1	47,7	48,0	49,9
Mujeres en edad fértil con algún seguro de salud	51,0	56,9	59,5	57,0	62,8	68,6	73,0	74,9
Área urbana	47,0	51,4	53,7	53,2	58,8	65,1	70,0	72,2
Área rural	62,7	72,1	76,3	68,4	76,1	80,7	84,4	85,3
Mujeres en edad fértil con Seguro Integral de Salud (SIS)	27,4	33,6	33,8	31,5	35,9	40,6	44,5	46,7
Área urbana	17,1	21,6	21,2	21,1	25,9	31,0	35,9	38,4
Área rural	57,8	67,2	70,8	62,5	69,4	74,2	77,8	79,0
FECUNDIDAD								
Tasa Global de Fecundidad ^{3/}	2,6	2,5	2,6	2,6	2,4	2,5	2,5	2,5
Área urbana	2,3	2,2	2,3	2,3	2,1	2,3	2,3	2,3
Área rural	3,6	3,5	3,5	3,5	3,4	3,3	3,3	3,3

Continúa...

PRINCIPALES INDICADORES

INDICADOR/ÁREA DE RESIDENCIA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Número medio de niñas y niños nacidos vivos de mujeres 40 a 49 años de edad	3,6	3,6	3,5	3,5	3,3	3,2	3,2	3,2
Área urbana	3,1	3,1	3,0	3,0	2,9	2,8	2,8	2,8
Área rural	5,2	5,0	5,0	4,9	4,7	4,6	4,6	4,5
OTROS DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD (Porcentaje)								
Mujeres actualmente unidas	57,1	56,8	56,3	57,0	56,6	56,7	57,9	57,5
Área urbana	53,3	53,6	52,2	53,4	53,1	53,5	54,8	54,2
Área rural	68,2	66,1	68,3	67,8	68,1	67,9	69,5	69,9
Mujeres que han estado unidas alguna vez	66,6	67,3	67,0	67,2	67,7	67,8	69,6	68,7
Área urbana	63,5	65,1	64,1	64,7	65,3	65,5	67,7	66,4
Área rural	75,6	73,8	75,4	74,5	75,4	76,0	76,6	77,7
Mujeres de 25-49 años de edad								
Edad mediana a la primera unión	21,8	21,5	21,6	21,6	21,6	21,8	21,9	22,1
Área urbana	22,9	22,3	22,6	22,4	22,4	22,7	22,7	22,8
Área rural	19,4	19,7	19,5	19,7	19,5	19,5	19,6	19,6
Edad mediana al primer nacimiento	22,0	21,9	21,9	21,9	21,9	22,1	22,1	22,2
Área urbana	23,0	22,7	22,9	22,8	22,8	22,9	22,9	23,0
Área rural	20,0	20,1	20,0	20,0	20,0	20,0	20,1	20,1
Duración media de la amenorrea postparto (en meses)	10,9	10,8	9,3	9,5	8,9	8,7	10,3	10,8
Duración media de la abstinencia postparto (en meses)	5,8	5,5	4,2	4,4	4,4	4,1	5,7	5,7
PREFERENCIAS REPRODUCTIVAS								
Porcentaje de mujeres actualmente unidas:								
Que no desea tener más hijas e hijos (incluyendo mujeres esterilizadas)	63,3	64,0	62,6	62,0	60,5	60,6	59,8	59,7
Que desea postergar el nacimiento siguiente dos años o más	22,3	21,7	22,4	22,8	23,1	22,8	23,5	24,9
Número medio ideal de hijas e hijos para las mujeres de 15 a 49 años de edad	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
Área urbana	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3
Área rural	2,5	2,4	2,4	2,4	2,5	2,6	2,6	2,5
Uso de métodos anticonceptivos por mujeres en edad fértil (MEF)								
Que actualmente usa algún método	73,2	74,4	75,4	75,5	74,0	74,6	74,6	76,2
Área urbana	74,6	75,2	75,9	75,8	73,9	74,6	74,8	76,4
Área rural	70,0	72,4	74,2	74,8	74,1	74,8	74,1	75,5
Que actualmente usa un método moderno	50,0	50,5	51,1	51,8	51,3	52,2	53,3	54,3
Área urbana	53,3	53,6	54,2	54,8	53,3	54,1	55,1	56,4
Área rural	42,3	43,4	44,1	44,7	46,2	46,8	47,6	47,9

Continúa...

PRINCIPALES INDICADORES

INDICADOR/ÁREA DE RESIDENCIA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Que actualmente usa un método tradicional	23,2	23,9	24,3	23,7	22,7	22,4	21,3	21,9
Área urbana	21,3	21,6	21,7	20,9	20,6	20,4	19,6	20,0
Área rural	27,8	29,0	30,1	30,2	27,9	28,0	26,5	27,6
Proporción de mujeres con demanda insatisfecha de planificación familiar	7,2	6,9	6,1	8,2	9,0	8,6	6,5	6,0
Área urbana	6,5	6,0	5,5	7,6	8,6	8,1	6,2	5,7
Área rural	8,7	9,1	7,5	9,6	10,1	10,1	7,5	6,8
MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ								
Tasa de mortalidad neonatal ^{4/}	11,0	9,0	8,0	9,0	11,0 (10,0) a/	10,0	-	-
Tasa de mortalidad infantil ^{4/}	20,0	17,0	16,0	17,0	16,0	17,0	15,0	-
Tasa de mortalidad de menores de cinco años de edad ^{4/}	26,0	23,0	21,0	21,0	21,0	20,0	18,0	-
Tasa de mortalidad perinatal ^{5/}	16,0	13,0	14,0	16,0	17,0	15,0	13,0	-
ATENCIÓN MATERNA								
Porcentaje de últimos nacimientos cuyas madres recibieron: ^{6/}								
Atención prenatal de un profesional de salud calificado (médico, obstetrix y enfermera) durante el embarazo	94,3	94,7	95,4	96,0	95,9	96,9	97,0	97,6
Área urbana	97,9	98,1	98,9	98,9	98,9	98,8	99,0	99,0
Área rural	87,1	87,9	88,1	90,0	88,9	91,9	91,3	93,2
Parto institucional	81,3	83,7	84,3	86,0	88,0	89,2	90,7	91,9
Área urbana	93,1	94,8	94,8	95,2	96,3	96,0	96,7	97,3
Área rural	57,6	62,0	62,6	67,3	68,6	72,0	73,2	76,0
Atención del parto en un establecimiento de salud	82,0	84,4	85,1	86,8	88,6	89,5	91,0	92,2
Área urbana	93,4	95,1	95,2	95,7	96,8	96,2	96,8	97,4
Área rural	59,0	63,7	64,2	68,6	69,8	72,6	74,2	76,8
Atención de parto por un profesional de salud calificado (médico, obstetrix y enfermera)	82,5	83,8	85,0	86,7	89,1	89,9	91,6	92,4
Área urbana	94,4	95,0	96,0	95,7	97,3	97,0	97,7	98,2
Área rural	61,0	63,7	64,4	69,6	71,3	73,1	75,0	76,9
Nacimientos por cesárea	21,4	20,4	22,9	25,3	26,5	28,6	31,6	31,6
Área urbana	29,1	27,1	30,7	32,9	33,5	35,6	38,5	38,4
Área rural	7,5	8,4	8,2	10,8	11,5	12,0	12,9	13,2
VACUNACIÓN								
Porcentaje de niñas y niños menores de 36 meses de edad con tarjeta de vacunación	69,6	76,2	82,1	83,0	82,2	83,5	86,7	84,6
Área urbana	69,5	76,1	82,7	82,8	81,8	82,9	86,6	84,7
Área rural	70,0	76,5	81,0	83,3	83,0	85,1	86,8	84,1

Continúa...

PRINCIPALES INDICADORES

INDICADOR/ÁREA DE RESIDENCIA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Porcentaje de niñas y niños menores de 36 meses de edad que han recibido vacuna: ^{7/}								
Tuberculosis (BCG)	91,5	90,6	93,7	94,0	93,6	92,2	94,7	94,7
Área urbana	94,0	93,5	96,1	96,0	95,5	93,8	96,1	96,2
Área rural	86,6	85,3	88,9	89,9	89,4	88,4	90,9	90,5
Difteria, pertussis o tos ferina y tétano (DPT, las tres dosis)	71,1	72,6	81,4	81,4	79,4	77,8	80,2	80,7
Área urbana	72,1	72,2	82,7	81,3	79,2	77,8	79,9	81,1
Área rural	69,2	73,4	78,9	81,8	79,6	77,9	81,1	79,6
Polio (las tres dosis)	66,9	75,4	84,7	84,2	80,8	73,9	79,0	81,2
Área urbana	67,1	74,8	85,8	84,1	81,2	74,4	79,7	82,0
Área rural	66,4	76,5	82,7	84,5	80,1	72,6	77,0	78,7
Antisarampionosa	73,3	80,3	85,0	86,0	82,6	79,0	83,4	83,7
Área urbana	72,8	79,3	84,4	85,4	81,7	77,6	82,8	83,3
Área rural	74,2	82,1	86,2	87,1	84,4	82,4	85,0	84,7
Todas las vacunas ^{8/}	53,7	61,0	71,5	72,8	66,1	61,1	69,4	71,4
Área urbana ^{8/}	55,1	62,6	73,2	73,8	66,7	61,3	70,0	72,2
Área rural ^{8/}	50,9	58,2	68,3	70,8	64,7	60,4	67,8	69,4
Prevalencia de enfermedades en menores de cinco años de edad								
Porcentaje de niñas y niños con diarrea ^{9/}	14,0	14,9	13,9	12,3	10,9	12,1	12,0	11,5
Área urbana ^{9/}	14,0	15,2	13,3	12,0	10,6	11,7	11,4	11,4
Área rural ^{9/}	13,9	14,3	15,0	12,8	11,5	12,9	13,6	11,8
Porcentaje de niñas y niños con diarrea tratados con sobres de rehidratación oral SRO	32,0	32,2	29,8	30,9	29,5	28,2	32,0	34,6
Área urbana	38,9	36,6	36,3	35,2	33,8	31,6	36,7	38,3
Área rural	19,2	23,5	18,7	23,2	20,9	20,7	21,9	24,9
Porcentaje de niñas y niños enfermos con IRA	16,0	17,1	16,4	13,9	13,3	16,8	15,1	15,9
Área urbana	14,3	17,2	15,9	12,9	13,6	16,2	14,6	15,6
Área rural	19,1	17,0	17,6	15,7	12,7	18,3	16,5	16,9
NUTRICIÓN EN LA NIÑEZ (Porcentaje)								
Niñas y niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica (Patrón OMS)	23,8	23,2	19,5	18,1	17,5	14,6	14,3	13,1
Área urbana	14,2	14,1	10,1	10,5	10,3	8,3	9,1	7,9
Área rural	40,3	38,8	37,0	31,9	32,3	28,8	27,7	26,5
Niñas y niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica (Patrón NCHS)	18,3	17,9	15,2	13,5	13,1	10,7	10,0	9,3
Área urbana	9,9	10,1	7,4	7,3	7,1	5,8	6,1	5,3
Área rural	32,8	31,3	30,0	24,6	25,3	21,9	20,5	19,5

Continúa...

PRINCIPALES INDICADORES

INDICADOR/ÁREA DE RESIDENCIA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Niñas y niños menores de cinco años de edad con anemia	37,2	37,7	30,7	32,9	34,0	35,6	32,6	33,3
Área urbana	33,2	33,0	26,5	28,6	31,1	31,7	29,8	30,1
Área rural	44,1	45,7	38,6	40,7	39,8	44,4	39,7	41,4
Niñas y niños menores de cinco años de edad que recibió suplementos de hierro en los últimos siete días	11,9	14,8	13,6	14,9	17,6	16,4	19,8	19,3
Área urbana	10,4	12,8	11,6	13,3	15,2	15,0	18,1	18,6
Área rural	14,6	18,6	17,5	18,0	22,7	19,9	24,3	21,2
Niñas y niños menores de cinco años de edad que recibió suplementos de vitamina "A" los últimos seis meses	5,8	9,1	3,9	3,1	3,7	5,7	6,5	3,3
Área urbana	3,4	4,3	1,7	1,8	1,9	3,7	4,3	2,1
Área rural	10,2	17,7	8,1	5,6	7,6	10,6	12,5	6,7
Niñas y niños nacidos con bajo peso al nacer (menos de 2,5 kg.)	6,4	7,2	6,5	7,4	7,3	6,0	7,5	7,0
Área urbana	6,3	6,7	6,0	6,7	7,1	5,4	7,3	6,7
Área rural	6,5	8,2	7,3	8,8	7,7	7,4	8,9	8,1
Niñas y niños menores de seis meses de edad con lactancia exclusiva	68,5	68,3	70,6	67,6	72,3	68,4	65,2	69,8
Niñas y niños menores de cuatro meses de edad amamantados	99,3	97,9	99,3	98,8	97,4	98,8	97,9	98,4
Duración mediana de la lactancia (en meses) 10/	20,8	21,2	20,4	20,1	20,7	21,2	20,4	20,7
NUTRICIÓN DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL (Porcentaje)								
Mujeres que recibieron suplemento de hierro en el último nacimiento	78,1	84,4	86,5	87,2	88,5	87,6	90,0	92,2
Área urbana	79,3	86,6	88,5	88,8	89,6	88,8	91,0	93,7
Área rural	75,6	80,0	82,4	84,0	86,1	84,7	87,2	87,7
Mujeres que tomó hierro por 90 días o más durante el embarazo	30,3	35,4	40,4	44,7	49,1	47,8	55,4	59,7
Área urbana	32,8	38,8	45,0	48,2	53,0	51,5	58,9	63,5
Área rural	25,3	28,7	30,8	37,5	40,2	38,4	46,0	48,6
Mujeres con anemia	21,0	21,5	17,4	17,7	18,7	21,6	20,7	20,8
Área urbana	20,7	20,3	16,8	16,3	18,1	20,8	20,8	21,1
Área rural	22,1	24,9	19,3	21,7	20,4	24,3	20,3	19,6
Madres con talla menor de 145 cms.	10,4	9,5	9,4	9,5	9,3	8,3	8,5	8,1
Área urbana	8,4	7,6	7,3	7,7	7,6	6,6	7,1	6,8
Área rural	16,0	14,7	15,3	14,8	14,9	14,2	13,9	13,1
PREVALENCIA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL (Porcentaje)								
Con una ITS	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6
Área urbana	0,6	0,9	0,7	0,9	0,8	0,8	0,6	0,7
Área rural	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3

Continúa...

PRINCIPALES INDICADORES

INDICADOR/ÁREA DE RESIDENCIA	Conclusión.							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Con flujo vaginal	12,8	12,9	12,6	12,2	10,7	11,5	11,7	11,6
Área urbana	13,0	13,3	12,7	12,8	11,0	12,1	11,8	12,0
Área rural	12,4	11,6	12,3	10,4	9,4	9,4	11,3	10,2
Úlceras llagas genitales	2,1	1,7	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0	1,6
Área urbana	2,4	1,7	1,7	1,9	1,7	2,0	2,2	1,7
Área rural	1,6	1,7	1,4	1,5	2,0	1,7	1,5	1,3

VIOLENCIA FAMILIAR A MUJERES ALGUNA VEZ UNIDAS (Porcentaje)

Experimentaron violencia psicológica o verbal por el esposo o compañero	73,0	72,1	70,0	70,6	67,5	69,4	67,4	64,2
Área urbana	73,2	71,6	69,9	70,5	67,5	69,9	67,8	64,4
Área rural	72,6	73,2	70,3	70,8	67,5	68,1	66,1	63,8
Experimentaron violencia física por el esposo o compañero	38,2	37,7	38,0	36,4	35,7	32,3	32,0	31,7
Área urbana	38,7	38,5	38,9	37,3	36,4	32,8	32,7	32,6
Área rural	36,9	35,8	36,0	34,2	33,9	30,9	29,9	28,9
Experimentaron violencia sexual por el esposo o compañero	8,8	8,6	9,3	8,7	8,4	7,9	7,9	6,6
Área urbana	8,6	8,6	9,4	8,6	8,4	7,7	7,7	6,4
Área rural	9,1	8,6	9,1	9,0	8,5	8,5	8,4	7,4
Fueron agredidas alguna vez bajo los efectos del alcohol por el esposo o compañero	57,1	55,6	55,3	56,7	55,4	50,8	52,9	49,1
Área urbana	53,7	51,0	52,4	54,0	53,2	47,6	51,5	46,9
Área rural	64,3	66,4	62,4	63,3	61,8	59,8	57,5	56,7
Mujeres de 15-49 años de edad que fueron maltratadas por otras personas	20,3	18,1	16,3	16,0	15,1	17,3	16,1	16,0
Área urbana	23,0	20,3	18,1	18,0	16,6	19,0	17,7	17,7
Área rural	13,4	12,6	11,7	10,7	10,6	11,8	10,4	10,1

1/ Comprende agua potable dentro, fuera de la vivienda y pilón/grifo público.

2/ Servicio con desagüe comprende el servicio higiénico conectado a red pública dentro y fuera de la vivienda.

3/ Tomando como base los nacimientos ocurridos durante los tres años anteriores a la encuesta.

4/ Defunciones por cada 1 000 nacidos vivos para el período de cinco años precedente a la encuesta, 2009-2011; 2011-2012, 2013, 2014 y 2014-2015.

5/ Es la suma del número de mortinatos y muertes neonatales temprana dividida por los embarazos de siete o más meses de duración, para el período de cinco años antes de la encuesta, 2009-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015.

6/ Tomando como base los nacimientos ocurridos en los últimos cinco años anteriores a la encuesta.

7/ Información obtenida del carnet de vacunación y de la información proporcionada por la madre.

8/ Incluye BCG, tres dosis de polio, tres dosis de DPT y antisarampión.

9/ Niñas y niños menores de cinco años de edad cuyas madres declararon que aquéllos tuvieron diarrea durante las dos semanas anteriores a la encuesta.

10/ Calculado por el método de Prevalencia/ Incidencia.

a/ Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15,0% considerados como referenciales.

nd = No disponible.