

CAPÍTULO III

Programa de Enfermedades Transmisibles



3. Programa de Enfermedades Transmisibles

Las enfermedades transmisibles, conocidas como enfermedades contagiosas o infecciosas, son aquellas que son causadas por agentes infecciosos específicos o por productos tóxicos.

3.1 Conocimiento sobre la tuberculosis

La tuberculosis es una enfermedad bacteriana que afecta, casi siempre a los pulmones (TBC pulmonar). Es una enfermedad curable y prevenible.


La importancia del conocimiento sobre la forma de contagio de la tuberculosis se centra en la necesidad de que la población tenga en cuenta esta información, a fin de lograr conductas de prevención, búsqueda temprana de los servicios de salud, aceptación de las medidas de control y eliminar el estigma que existe frente a esta enfermedad.

La encuesta recogió información sobre el conocimiento de las formas de contagio de la tuberculosis respondiendo Sí “cuando una persona enferma tose o estornuda cerca a otra persona” y “cuando una persona enferma habla de cerca con otra persona”; y con un No “cuando una persona enferma toca a otra persona” y “cuando una persona enferma comparte alimentos o utensilios con otra persona”.

En este contexto, en el 2017 se encontró un 3,4% de personas de 15 y más años de edad que conoce o ha oído hablar de la TBC y reconoce las formas de transmisión, similar porcentaje se registró en el 2016. Según la distribución por sexo, el conocimiento de contagio de la enfermedad fue mayor en las mujeres (3,9%) que en los hombres (2,8%).

Por región natural, los mayores porcentajes de personas que conocen sobre las formas de transmisión residen en Lima Metropolitana (3,8%), en la Selva (3,6%) y en el Resto Costa (3,4%) y en menor proporción en la Sierra (2,6%).

GRÁFICO N° 3.1
PERÚ: PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON CONOCIMIENTO SOBRE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN DE TUBERCULOSIS,
SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2014 - 2017
(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

3.2 Conductas de riesgo de la transmisión del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)


Las actitudes de un individuo frente a una infección como el Virus de Inmunodeficiencia Humana pueden ser adecuadas o no, de acuerdo con las concepciones y sobre todo según el nivel de conocimiento que tenga sobre las conductas de riesgo.

3.2.1 Conocimiento de las formas correctas y erróneas para prevenir la transmisión sexual del VIH

El conocimiento de las formas de transmisión evitará que el sujeto incurra en comportamientos de riesgo y conductas discriminatorias hacia otra persona. Este conocimiento se basa, por un lado, en la identificación correcta de las formas de prevenir la transmisión sexual del VIH: la persona entrevistada afirma que el riesgo disminuye teniendo una sola pareja sexual fiel y no infectada, usando preservativo en cada relación sexual y reconociendo que un portador del VIH puede aparentar estar saludable. Por otro lado, cuando el individuo rechaza ideas erróneas con respecto a la transmisión del VIH, como negar que la transmisión del VIH es a través de la picadura de insectos o por vía oral (alimentos, utensilios alimentarios).

Del total de personas entrevistadas en el año 2017, el 19,6% de las personas de 15 a 29 años de edad identifican correctamente las formas de prevenir la transmisión sexual del VIH y rechazan ideas erróneas de su transmisión, lo que implica un aumento de 2,2 puntos porcentuales con respecto al año 2016 (17,4%). Según región natural, en Lima Metropolitana, el 25,1% conocen la forma de prevenir y rechazan ideas equivocadas de transmisión del VIH, en la Sierra este conocimiento equivale a 13,6%. Con relación al 2016, Lima Metropolitana aumenta en 2,2 puntos porcentuales y la Sierra en 1,5 puntos porcentuales.


GRÁFICO N° 3.2
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD QUE CONOCEN LAS FORMAS DE PREVENIR Y RECHAZAN IDEAS ERRÓNEAS DE TRANSMISIÓN DEL VIH,
SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2014 - 2017
(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Por región, la proporción de la población de 15 a 29 años de edad que conocen las formas de prevenir y rechazan ideas erróneas de transmisión del VIH fue menor de 28,0%, encontrándose siete regiones y la provincia de Lima por encima del promedio nacional (19,6%).

GRÁFICO N° 3.3
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 29 AÑOS DE EDAD QUE CONOCEN LAS FORMAS DE PREVENIR Y RECHAZAN IDEAS ERRÓNEAS DE TRANSMISIÓN DEL VIH,
SEGÚN REGIÓN, 2017
 (Porcentaje)



() Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15% considerados como referenciales.

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


3.2.2 Prueba de VIH en los últimos 12 meses

Una mayor accesibilidad de ciertas poblaciones para realizarse la prueba de VIH, puede contribuir a la disminución de la incidencia de la infección por VIH y de otras enfermedades de transmisión sexual, así como a la mejora en los comportamientos de riesgo.

En el 2017 la ENDES encontró que el 20,9% de las personas de 15 a 49 años de edad, se realizaron la prueba de VIH en los últimos 12 meses. En este mismo tiempo de referencia, en el 2016 el porcentaje fue de 20,5%. En la distribución por sexo, entre los años que se muestra en la serie, se aprecia que las mujeres se realizaron la prueba en mayor proporción que los hombres.

Por región natural en el año de análisis, el porcentaje de personas que se realizaron esa prueba fue mayor en la Selva (24,7%) y en Lima Metropolitana (21,8%). Por el contrario, la Sierra registra el porcentaje más bajo 17,5%. En el 2016, la Selva (22,7%) y Resto Costa (22,5%) tuvieron mayor porcentaje de personas de 15 a 49 años de edad que se realizaron la prueba de VIH.


GRÁFICO N° 3.4
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DE VIH EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES,
SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2014 - 2017
 (Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Las regiones con mayor proporción de personas de 15 a 49 años de edad que se realizaron la prueba de VIH residen en Tumbes (35,1%), Loreto (30,1%), Pasco (28,6%), Madre de Dios y Región Lima (27,8% cada uno); y fue menor en Cajamarca (12,5%), Puno y Lambayeque (13,5% cada uno) y en Ayacucho (14,9%).

GRÁFICO N° 3.5
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DE VIH EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, SEGÚN REGIÓN, 2017
(Porcentaje)



1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

3.2.3 Prueba de VIH y conocimiento del resultado

Determinar el número de personas que se realizaron la prueba y que conocieron su resultado permite tener un parámetro para evaluar las intervenciones en salud pública que existen actualmente.

El 95,0% del total de personas que se realizaron la prueba de VIH, en el 2017 conocieron los resultados del examen de laboratorio. Este comportamiento tiende al incremento con respecto al 2016 (1,4 puntos porcentuales). Por sexo, las mujeres y hombres superaron el 93,0%, del mismo modo, en cada una de las regiones naturales.

GRÁFICO N° 3.6
PERÚ: PERSONAS DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DE VIH EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y CONOCIERON
LOS RESULTADOS, SEGÚN SEXO Y REGIÓN NATURAL, 2014 - 2017
 (Porcentaje)




Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Según región, los mayores porcentajes de personas de 15 a 49 años de edad que se realizaron la prueba de VIH y conocieron los resultados residen en Ucayali (98,4%), Ica (98,1%), Loreto (96,6%), Lambayeque (96,4%) y la Región Lima (96,3%); y los menores porcentajes se registran en los residentes de Huancavelica (89,3%), Ayacucho (90,2%) y Huánuco (90,5%).

MAPA N° 3.1

PERÚ: PERSONAS DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE SE REALIZARON LA PRUEBA DE VIH
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES Y CONOCIERON LOS RESULTADOS,
SEGÚN REGIÓN, 2017
(Porcentaje)



1/ Comprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima

2/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Ley N° 27795 - Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ley de Demarcación y Organización Territorial: "En tanto se determina el saneamiento de los límites territoriales, conforme a la presente Ley, las delimitaciones censales y/u otros relacionados con las circunscripciones existentes son de carácter referencial".


3.2.4 Mujeres que usaron condón en la última relación sexual

Entre las estrategias para la reducción de conductas sexuales de riesgo en la población se ha recomendado el uso del condón. La caracterización de los individuos que utilizan este método en la población permitirá delinear las intervenciones de salud pública orientadas a recomendar el uso del condón, así como para efectos programáticos de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de las ITS, VIH y SIDA (ESNITS).

En este sentido en el 2017, el 14,1% de mujeres de 15 a 49 años de edad manifestaron haber usado condón en la última relación sexual en los últimos tres meses. Esta proporción fue menor en el año 2016 (12,7%). Según área de residencia, el uso del condón fue más frecuente en el área urbana (16,0%) que en el área rural (6,4%).

Por otro lado, en el 2017 en las mujeres con educación superior (19,2%) fue mayor en 13,6 puntos porcentuales el uso del condón en la última relación sexual que en aquellas que alcanzaron estudiar hasta primaria (5,6%).

GRÁFICO N° 3.7
PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE USARON CONDÓN EN LA ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES,
SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA Y NIVEL DE EDUCACIÓN, 2014- 2017
(Porcentaje)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.